



GERARDI 3 363012

COMMENTARIA

JOHANNI SCHERHART

PHORISMOS

GENOSCENTIS & CERANTIS
NORBIS

1814



TYPOGRAPHIA REGIA



GERARDI L. B. VAN SWIETEN,

*Augustiss. Imperator. & Imperatric. a Consiliis, Archiat. Com.,
Bibliothecae Augustae Praefecti, Inclyt. Facult. Medic. Vienn.
Praesidis perpetui, nec non Academiae Reg. Scient. & Chirurg.
Paris., Academiae Scient. Petropolit., Academ. Natur.
Curios., Institut. Bonon., Collegii Regii Medic. Edinburg.,
Societ. Scient. Harlem., Botanic. Florent. Germanic.
Jenens. Degli Agiati di Roveret. Membri,*

COMMENTARIA


IN

HERMANNI BOERHAAVE
APHORISMOS

DE

COGNOSCENDIS, ET CURANDIS
MORBIS.

TOMI QUARTI PARS ALTERA.



T A U R I N I,
EX TYPOGRAPHIA REGIA.

M D C C L X I V.

INDEX CAPITUM

HUJUS TOMI PARTIS II.

	Pag.
<i>Morbi Virginum</i>	393
- - - - <i>Gravidarum</i>	450
<i>Partus Difficilis</i>	513
<i>Morbi Puerperii</i>	581
- - - - <i>Infantum</i>	647

INDEX CAPITUM

HUIUS TOMI PARTIS II.

Page

393

470

513

REIMPRIMATUR.

187 F. Joannes Dominicus Piselli Ord. Praedic. Vicarius Generalis
S. Officii Taurini.

740

V. Allionus P. & R.

V. Se ne permette la ristampa.

GALLI per la Gran Cancelleria.

MORBI

MORBI VIRGINUM.

§. 1283. **P**Raeter omnia haec Acutorum, & Chronicorum genera sunt nonnulli morbi virginibus, gravidis, puerperisque proprii, tum & puerili aetati.

Haftenus dictum fuit de morbis fluidarum, & solidarum partium tam simplicibus, quam compositis, acutis, & chronicis. Verum praeter hos alii morbi sunt, qui observantur illo tantum vitae tempore, dum corpus foemininum aptum fit ad suscipiendam prolem; alii morbi sunt, qui a momento conceptus per totum graviditatis decursum molesti sunt: ipsum puerperium, quamvis legitimum, & naturale fuerit, saepe non caret difficultate: post partum demum sollicita cura requiritur, ut puerpera sic restituatur, ut integra, sana, & foecunda maneat.

Sed & recens nati infantes morbos patiuntur huic aetati proprios, quibus vel omnino non, vel rarius saltem obnoxii sunt reliquo vitae tempore, dum sensim magis magisque firmum redditum corpus non adeo facile afficitur a levioribus morborum causis.

De omnibus ergo his singulatim agendum est, & ordo postulat, ut primo dicatur de insigni illa mutatione, quae observatur in corpore muliebri circa floris menstrui eruptionem, & de variis molestiis, quae illam praecedere, vel & comitari solent.

§. 1284. **Q**Uo tempore foemininum corpus ad incrementum suum pervenit, in bene facta temperie plus solet conficere cruoris, quam qui vasis contineatur, unde arteriis uterinis floris Menstrui nomine secernitur.

Constat in foemineo sexu, dum corpus ad propagandam speciem humanam aptum fit, miras, & satis subitas contingere mutationes: crescit saepe subito incremento corporis statura, mammae turgidulae fororiari incipiunt, pubescunt pudenda, de muliebri sinu sanguis prodire incipit, & in sana puella statis temporibus idem redit sanguinis effluxus, qui floris menstrui nomine vocatur, quia, mensis spatio elapso circiter, denuo apparere solet; ita tamen, ut quaedam varietas observetur in diversis, licet caeterum sanissimis puellis, quoad intervallum inter has sanguinis excretiones. Aliquando enim

bis in mense, quibusdam tertia quavis septimana, plurimis quarta redeunt menstrua. Neque observatur, si caeterum sanae fuerint virgines, ab intervalli hujus diversitate impediri, vel minui foecunditatem, modo constans maneat periodus haec, nec variet perpetuo. Tales enim foecundas observavi, & si conciperent, facile abortum patiebantur; similis etiam diversitas in quantitate sanguinis excreti observatur pro varia ipsius uteri dispositione in singulis. Hoc monuit *Hippocrates* (v); *Mulieribus quibusdam quidem menstruae purgationes abundantes, quibusdam pauciores expurgantur. Quod si in natura, & genere semper contingat* (μηνπαύων σπάνι ἐστίν) *ipsis uterinum est.* Varia hinc etiam nomina imposita fuerunt huic fluori: a Periodo enim magis communi, *fluor menstruus, menstrua, menses, catamenia*, vocatur, & *purgatio menstrua*, cum multi crediderint, aliquid noxii per hunc fluorem expurgari de corpore: multi etiam dixerunt *Flores*, quia, uti hi fructum praecedunt in regno vegetabili, sic & menstrua futurae foecunditatis signum dant: his enim apparentibus nubilis virgo habetur, & dicitur.

Plerumque circa decimum quartum aetatis annum menses primo apparere solent, raro ante decimum tertium; plerumque circa quadragesimum, & quinque aetatis annum cessare solent (x), in quibusdam tamen citius, in aliis serius desinunt. Toto hoc tempore, dum menstrua ordinatim fluunt, foecundae dicuntur mulieres; illis cessantibus, vocantur effoetae, quia raro, vel nunquam post menstruorum cessationem concipiunt. Unde videtur menstrui fluxus duratio coïncidere cum foecunditatis tempore. Observatur etiam in calidioribus regionibus citius prodire menstrua puellis, sed & citius cessare; in borealibus regionibus contrarium obtinet. Sic observavit *Linnaeus* (y), *Lapponicas foeminas menstruum fluxum, parciolem tamen, statâ periodo pati.* Plures vidit, quae toto vitae tempore carebant menstruis, sed viro junctae manebant steriles. Juvenulas noverat, quae aestate solum menstruantur; hyeme, quae rigida admodum, & longa in his locis est, nunquam. Aderant & aliae, quae semel in anno menstruantur tantum, sed hae, quotquot vidit, habebant pedes oedematosos.

Quamvis autem illo aetatis tempore communiter soleant menstrua prodire, tamen raras observationes docuerunt, non diu post nativitatem contigisse fluorem menstruum. Sic legitur (z), recens natae puellae octiduo post nativitatem, secundum alias relationes tertio tantum mense prodiisse menstrua. Sed quarto aetatis anno absoluto eadem haec puella jam aequabat tres pedes cum dimidio, corporis altitudine, cum iusta omnium membrorum proportionem. Partes autem genitales, & mammae eodem se habebant modo, uti in virgine octodecim annorum observari solent, ita ut perfecte nubilis videretur. Primo vitae mense vidi profluxisse menstrua, & videbatur septimo aetatis anno nubilis; laxae tamen temperiei; satis sana vixit, &

(v) De natur. puer. cap. 10. Charter. Tom. V. pag. 323.

(x) Mauriceau traité des malad. des femm. gross. Tom. I. pag. 49.

(y) Flora Lappon pag. 324.

(z) Acad. des scienc. l'an. 1708. hist. pag. 63.

& decimo nono aetatis anno nupta plures postea proles sanas peperit. Varios similes casus colligere ex Historia Medica facile foret; unde minus mirum videtur, in Indiis orientalibus nono aetatis anno jam parere foeminas (a).

Pariter & observatum fuit, longe diutius perstitisse fluxum menstruum: quin imo in decrepita senectute rediisse absque noxa. Sic *Daniel Puera-rius*, Genevensis Medicus, scripsit *Thomae Bartholino* sequentia, quorum testem autoptem se fatetur. *Mulier quaedam octogenaria, a duobus circiter annis, menstrua patitur, euntibus, cum sanitatis commodo, & eūpnoia.* (b). Centesimo, & sexto aetatis anno menstrua adhuc fluxisse, alibi (c) legitur. Interim commune axioma est, quod ex raro contingentibus nunquam formentur regulae.

Cum ergo generali naturae lege in foemineo sexu determinato aetatis tempore prodirent menstrua, atque alio aetatis tempore denuo cessarent sponte, consideraverunt sedulo Medici omnia, quae causam menstrui floris illustrare possent, & determinare loca, unde sanguis ille fluit. Cum enim non continuus, sed periodicus sit ille fluxus, debet adesse mutatio quaedam in partibus, unde fluit, illo tempore, dum fluxus menstruus adest. Cum autem in morbis defunctorum cadaveribus semper iusta adsit suspicio, multa per morbum mutata occurrere, facile patebat, pulcrius haec indagari posse in violenta, aut subita morte peremptis, illo tempore, dum fluor menstruus aderat. *Columbus* (d) voluit, menstruum sanguinem non effundi per uteri vasa, sed ab illis, quae in uteri cervicem ad ejus latera inseruntur: testaturque alio in loco (e) idem his verbis: *Quemadmodum saepe numero vidi hisce oculis in aliquibus mulieribus, quae violenta morte perierunt, dum adhuc illis menses fluere, neque in his modo, sed etiam in aliis quibusdam, quibus instabant, & mox fluxuri erant.* Imprimis autem se hoc observasse credit in muliere infanticida, quae ultimo supplicio affecta fuit; mensis spatio elapso, quo gemellos pepererat, & in lucem editos mox suffocaverat. In illo cadavere numerosis spectatoribus ostendit illas venas, quae in aliis non admodum magnae esse solent, esse insignes, nigerrimas, & propterea satis perspicuas: inde autem conclusit; per quas venas fluunt menstrua, eas non transire per uterum.

Alia autem, & fide dignissima quidem observata evincunt, menstruum fluorem ex ipso utero, praecipue ex vasis, quae ad fundum uteri pertinent, procedere. Sic *Mauriceau* (f) in cadavere infanticidae, suspensae menstruorum tempore, invenit totum fundum cavum uteri obductum grumulis sanguinis coagulati; vasa fundi uteri multo ampliora erant, quam illa,

a 2

(a) Ibidem.

(b) Thom. Barthol. Epist. Med. Centur. IV. pag. 432.

(c) Académ. des scienc. in loco modo citato.

(d) De Re Anatomica Lib. XI. pag. 243.

(e) Lib. VI. pag. 173. Ibidem.

(f) Traité des Malad. des femmes grosses &c. Tom. I. pag. 48.

illa, quae ad cervicem uteri spectabant: orificia autem horum vasorum in uteri cavum hiantia, plena erant sanguine grumoso. Confirmatur hoc & celeberrimi *Littre* (g) observatis. In cadavere enim foeminae, quae embryonem in tuba Fallopiana gestabat, & moriebatur, dum menstrua fluebant, invenit uterum tumidum, sanguine rutilo, sed concreto plenum; quo ablato, in superficie cava uteri vidit numerosissima foraminula, quae fetam porcinam facile admittebant, & plena erant sanguine rutilo, qui, pressa inter digitos uteri substantia, guttatim exhibat. Sollicite examinans deinde internam vaginae superficiem, nihil simile invenit; unde conclusit, menstruum fluorem ex uteri cavo, non ex vagina prodire: idem & in aliis menstruantium cadaveribus se vidisse testatur, & (quod videtur hanc opinionem extra omne dubium ponere) in tribus prolapsu uteri laborantibus, ita, ut orificium uteri prolapsi intra pudendi labia haereret, vidit, sanguinem menstruum ex uteri orificio prodire, dum ne gutta quidem exiret de vaginae cavo.

Huic sententiae & accedit accuratissimus *Anatomicus Morgagni* (h), qui vidit in virgine, fluente adhuc menstruo sanguine, a capitis ictu demortua, universum uteri fundum sanguineis maculis, quas & figura adumbravit (i), scatere; ex quibus maculis vel mediocri pressione cruentas guttas elicere admodum facile erat: tamen nec in vagina, nec in cervice uteri inveniebatur aliquid, quod, cruorem ex earum parietibus prodiisse, significaret. Postea autem in plurium mulierum cadaveribus, quibus forte non ita pridem sanguis menstruus profluxerat, vidit similes maculas in uteri fundo, sed coloris multo dilutioris, ex quibus subcruentas guttulas prolicere potuit; sed in cervice, & vagina nil tale invenit. Interim negare noluit, quod & menstruus sanguis ex vaginae parietibus prodeat, cum plures graves, & fide digni autores se hoc observasse testentur, quos plures recenset. Sic *Piso* (k) scripsit, quod in puellae, quo tempore menses fluerent, strangulatae cadavere, superioribus annis hic publice dissecto, solus sinus pudoris observatus fuerit sanguine perfusus, tinctusque menstruo, uterus autem prorsus siccus, & arte connivens. In cadavere menstruantis foeminae *Heisterus* (l) vidit, & ex uteri cavo, & ex vagina prodiisse menstrua.

Cum ergo & celebris *Anatomicus Vvinslov* (m) invenerit, membranam internam, quae fundum uteri obvelat, multis foraminulis pertusam esse, quae oculis facile percipiuntur, & ex quibus sanguis prodit, si uteri substantia prematur: si praeterea consideretur, eandem hanc membranam instar holoserici villosam esse, & hos villos, & haec foraminula plus, minusve sanguine tincta esse in illis, quae tempore menstrui floris perierunt; tandem

(g) Académ. des scienc. 1702. mém. pag. 281. 282.

(h) Adversar. Anatom. I. pag. 45. 46.

(i) Ibidem Tab. 3.

(k) De Morbis ex colluv. serosa sect. 2. part. 2. Cap. VII. pag. 131.

(l) Medicin. Chirurg. Anat. Wahrnehm. pag. 840.

(m) Exposit. Anatom. de la Struct. du Corps humain. pag. 574.

dem, si is addatur, quod aqua, vel ceracea materies, arteriis injecta, ex ultimis osculis apertis in cavum uteri exeat (*n*), videtur ex omnibus his concludi posse, quod locus, unde naturaliter menstrua fluunt, sit uteri cavum interius, & praecipue fundus uteri. Cum autem vagina, & totum in foemina pudendum assidue sudent ex apertis, ultimis, rectis arteriis humorum tenuem, blandum, aquosum, serosum (*o*), & similes, ac uterus ipse, arterias accipiant (*p*), videtur admodum credibile, & per horum vasorum extrema dilatata sanguinem exire quandoque: & forte in gravidis, quibus consuetum est graviditatis tempore fluorem menstruum pati absque noxa, sed minori quantitate, ex vasis vaginae ille sanguis prodit. Si enim ex uteri cavo veniret, abortus sequeretur periculum. Plures vidi gravidas, quibus id contigit, & maturum, sanum, robustum foetum debito tempore pepererunt.

Sequitur jam, ut considerentur illa, quae clarissimi Medici statuerunt de causis menstrui floris, & ratione, quare statuta periodo idem fluor redire soleat in sanis virginibus.

Dum viderent Medici, purum sanguinem hoc modo exire de sano corpore, absque sanitatis detrimento, imo potius cum euphoria, & simul observarent, citius ad debitam staturam pervenire puellas, quam mares adolescentes, menstruumque fluorem signum dare, quo noscitur, corpus foeminae jam aptum esse, ut concipiat, & conceptum nutriet foetum, donec, novem mensium spatio, ex minima incipientis hominis molecula in notabilem adeo molem excrevens, tandem naturali partu excludatur, totumque illud foetus incrementum maternis humoribus deberi; patuit, quod corpus foeminae aptum esse debeat, ut non tantum se ipsum, sed & alium hominem nutrire posset toto graviditatis tempore. Unde concluderunt, in non gravidis plus confici sanguinis, quam corpus indigebat, & ideo requiri, ut evacuetur illud superabundans, ne accumulatum noceret sanitati: Dixerat jam *Aristoteles* (*q*); *Mulieribus superfluum* (*ὑπερπαραπλεονάζον*) in purgationem (*menstruam*) vertitur. Confirmabatur ulterius haec sententia, quod mater, si prolem propriis nutriet uberibus, lactationis tempore communiter careat fluxu menstruo, vel longo intervallo, & parca copia tantum eum experiatur, cum illud superfluum in alimentum proles, lac nempe, cedat. Duro labore quae corpus quotidie exercent, foeminae; parcius menstruari solent contra, quae molliter, & opipare in otio vivunt, singulis mensibus, & saepius quoque sanguine diffuunt. Hoc jam notavit *Moschione* (*r*), cuius saepius mentio fiet in sequentibus. Autor ille omnino diversus est a *Theodoro Moschione*, cuius *Plinius*, *Galenus*, *Aëtius*, *Alexander Trallianus* meminerunt: antiquo enim

(*n*) Kaau Perspirat. dicta Hippocr. pag. 98.

(*o*) Ibid. pag. 96. (*p*) Eustach. Tab. XIII.

(*q*) De hist. anim. Lib. VII. cap. 2. Tom. II. pag. 365.

(*r*) Spachii gynaeceor. pag. 2. N. 16.

enim hoc *Moschione* longe junior auctor est, & librum de illis, quae ad partum pertinent, in gratiam obstetricum Graecarum ex latina versum lingua, & triginta duobus capitibus auctum, dedit. Multa cum habeat bona, hinc in omnibus collectionibus gynaeciorum adest, quae nempe de mulierum, tum aliis, tum gravidarum, parientium, & puerperarum affectibus, & morbis agunt. Cum autem *Israël Spachius* suam collectionem ediderit anno 1597. post binas priores a *Casparo Volfio*, & a *Caspere Bauhino* editas, & plura contineat, hinc illa collectione gynaeciorum uti malui (s).

Patet hinc, multas rationes adfuisse, cur Medici a plethora fluxum menstruum deduxerint. Si ergo nulla nasceretur plethora, ut in robustissimis, & duro labore exercitatis mulieribus, tunc naturaliter, & absque ullo damno carere possent fluore menstruo. Tales sunt illae, quas *Moschio* (t), dum recenset causas retentorum menstruum, dixit, *absque ulla infirmitate naturaliter non purgari*. Testatur *Fernelius* (u) se vidisse mulierem, cui *nunquam, vel menses, vel aliud quidquam fluxit ab utero, ac nihilominus bene habitata prorsusque incolumis, annos vixit circiter sexaginta*. Quadragenariam mulierem, & lapsu graviter laesam, curavit *Hildanus* (v), quae sancte affirmabat, se nec virginitatis tempore, nec in matrimonio unquam menstrua habuisse. In puerperio lochia parce fluxerant: septem enim pepererat proles, quarum major pars superstes athleticè valebat. Robusta, valida, morbisque parum obnoxia vixit, & cum paupere victu duros labores sustinere cogebatur; unde plethorae colligendae nulla dabatur occasio. Sic integram foemellarum regionem apud *Tapuyas* in *Brasilia* per totum vitae decursum Catameniis destitui, legitur (x). Alii itinerarii notaverunt, parcissime tantum fluere menstrua, uti & de *Lapponibus* foeminis ante dictum fuit. Forte plura similia in nostris regionibus habentur exempla, quorum, uti *Pecklinus* (y) monet, *conscientiam sexus ille sibi reservat, non facile Medicis, qui & ipsi plebeja non magnopere curant, in testimonium rei vocatis*. Haec dum considerabat *Celeberrimus Astruc* (z), fere inducebatur, ut crederet, non ex primaeva naturae lege adeo copiosa menstrua prodire foeminis, cum in illis nationibus, in quibus frugalis vita constanter obtinet, parce fluant, & in quibusdam mulieribus nihil omnino; apud politiores vero nationes sexum foemininum lauto in otio molliter vivere, opipara frui mensa, hinc & maiorem copiam sanguinis accumulari, & per uteri vasa statis periodis exire.

Interim videtur fluor menstruus ex naturae instituto fieri certo aetatis tempore, non tantum, ut superabundans sanguinis copia tollatur de corpore, verum

(s) Vid. Fabric. biblioth. graec. Tom. XII. Lib. VI. cap. 7. pag. 696. & seq.

(t) Spach. gynaec. pag. 11. N. 126. & Harmon. gynaec. part. poster. cap. 2. pag. 20.

(u) Pathol. Lib. VI. cap. 16. part. 2. pag. 197.

(v) Oper. omn. observat. Cent. V. pag. 408.

(x) Gualt. Charletoni de causis catamen. cap. 4. pag. 39.

(y) Observat. Phys. Medic. N. 35. pag. 83.

(z) Traité des malad. des femmes Tom. I. pag. 85.

verum etiam, ut uterus disponatur ad conceptum. An vero integrae nationes menstruis careant, & tamen foecundae sint mulieres, non adeo liquido constat. Itinerum scriptores saepe audita referunt, & plerumque illis deest occasio, aut voluntas, ut similia exacte inquirant. Parciorum menstruum copiam apud *Lappones* invenit *Linnaeus*, uti ante dictum fuit; sed simul monuit, illas, quae menstruis omnino carebant, semper fuisse steriles. Quadragenariae illi viduae, quae, incolumis quamvis, & quadrata foret, nunquam menstruum fluorem passa fuerat (a), alteris statim nuptiis ad primum coitum menses prodierunt, & per integrum biennium stato tempore redierunt, antequam conceperit. Debito termino peperit feliciter sanam prolem, & in tertiam usque vicem foecunda fuit, antequam menstruus fluor per aetatem cessaverit. Unde videtur concludi posse, quod apertis extremis vasorum uterinorum oculis, exeunte sanguine, plethora quidem levetur, adeoque & pro varia sanguinis abundantia copia menstrui floris esse possit diversa; sed simul illa vasorum uterinorum dilatatio, & apertura ad foecunditatem facere videtur, de qua re dicetur postea.

Praeterea crediderunt Medici, ex ipsa fabrica, corporis muliebris patere rationem, quare illud superfluum per uterum potius, quam per alias corporis partes exiret. Si enim consideretur pelvis ossei fabrica in muliere, invenitur notabilis diversitas, & major amplitudo, quam in viro. Lumborum enim vertebrae magis retrorsum vergunt; distantia inter os sacrum & ossa pubis major est; uti & distantia inter ossa Ilii; Coccygis os rectius est, & magis mobile, quam in viris, in quibus antrosum magis incurvatur; ossa pubis obtusiori angulo uniuntur inter se; praeterea ossium Ischii tubera magis a se invicem distant; unde foemorum cervices magis transversim ponuntur, & cum acetabulis faciunt angulos minus acutos. Hinc circa pelvim major latitudo in foemina, quam in viro, ut turgens in gravidis abdomen firmitus possit sustineri. Hanc diversitatem in corpore muliebri scite novērunt exprimere pictores, & statuarii (b).

In ampla sic pelvi locatur uterus, inter intestinum rectum & vesicam, totus vasculosus, fere liber, nec multum pressus: totus enim fundus uteri in gravidis libere ascendit, in prolapsu autem uteri descendit saepe, ut extra pudendum promineat; praeterea uterus antrorsum, retrorsum, & ad latera delabi potest, uti postea dicetur, quando de partu difficili agendum erit. Quamvis autem uterus in junioribus puellis, & in adultis virginibus ad tactum firmus & solidus deprehendatur, tamen graviditas docet, haec vasa facile cedere posse, & in magnam amplitudinem dilatari, cum ultimo graviditatis tempore uterus instar spongiae sanguine plenae appareat, dum vasa, ante vix conspicua in utero non gravido, jam digiti minoris apicem quandoque capiant. Numerosas autem arterias accipit uterus a Spermaticis, Hypogastricis, Haemorrhoidalibus, Iliacis externis. Simili apparatu, & origine

a 4

gine

(a) Vide Pechlin. in loco citato.

(b) Vide de his Herm. Boerh. Instit. medic. §. 663.

gine venae ad uterum veniunt, valvulis carentes, omnes inter se communicantes; quod & in arteriis uteri observatur; unde copiosi sanguinis liberima circumductio sequitur. Simul interna uteri cavitas pertunditur exiguis hiatibus, qui humorem blandum, aquoso-mucosum sudant, ut lubrica, madida maneat semper interna uteri superficies, & impediatur cavitatis concretio (c).

Intellectis his, quae ad uteri situm, fabricam vasculosam, & facilem expansionem spectant, considerabatur, quod citius foeminae, quam mares, ad apicem sui incrementi perveniant, & hoc tempore viscera tamen pergant ex ingestis bonos humores conficere simili copia, ac ante, qui tamen non amplius augendae corporis staturae serviunt; cumque simul observaretur, muliebria corpora minus virilibus perspirare (d), hinc sequebatur, humorum sanorum copiam augeri in vasis, adeoque plethoram nasci, utilem quidem, si gravida facta mulier non tantum se ipsam, sed & foetum nutrire debeat; at contra in non gravidis nocituram, & quotidie augendam, nisi illud superfluum exiret de corpore, ubi copia jam nocere posset. Ut autem concipiendo, & alendo foetui apta foret semper mulier, illud abundans praesto semper esse debebat, simulque adesse debebant viae, per quas eliminari posset illud idem, dum non esset gravida mulier.

Cum autem uterus totus vasculosus foret, in loco libero positus, facile dilatabilis, cavum haberet, in quod exire possent humores, & postea per os uteri expelli de corpore, hinc distenta sensim magis uteri vasa ob auctam copiam humoris sani, tandem sic dilatabantur, ut extrema orificia, quae antea rorem humidum trans mittebant tantum, auctis sensim diametris partem rubram sanguinis dimitterent in uteri cavum, sicque fluor menstruus, sequeretur, cuius secretioni, & excretioni favet etiam erectus foeminae humanae incessus.

Postquam autem per sanguinem de utero excretum minuta est plethora, tunc vasa minus distenta se contrahunt proprio robore in minorem diametrum, angustata non amplius dimittunt sanguinem, sed tenuiores tantum humores, sicque sensim ad solitam angustiam redeunt extrema vasorum oscula, quae in cavum uteri hiant, donec, ab iisdem causis renata plethora, denuo dilatentur simili temporis intervallo. Hoc modo explicabatur reditus periodicus floris menstrui, dum simul satis commode elucidabantur illa, quae fluorem menstruum praecedere, comitari, vel sequi solent. De his omnibus fuse egit *Celeberrimus Freind* (e); quin & calculo subduxit, quantum singulis diebus accumuletur in corpore muliebri, ut, nata sic plethora, menstruorum debita copia prodire possit, absque corporis damno; dum in non gravidis tantum sic eliminatur illud, quod superabundat, mensis spatio sensim congestum. Confirmabat autem hanc sententiam *Freind* (f), quod, men-

(c) Ibidem §. 664.

(d) Ibidem §. 662.

(e) Emmenolog. pag. 21. & seq.

(f) Ibidem pag. 55.

menstruis deficientibus , per varias vias exitum moliretur sanguis , ut hoc modo & plethora tolli posset.

Adeo simplex , adeo respondens phaenomenis , visa fuit haec menstrui floris explicatio , solis communibus corporum legibus superextracta , ut a plurimis recepta fuerit , tanquam omnino evidens , & vera : interim tamen si omnia haec argumenta ponderentur adamussim , & comparentur cum observatis certis , & quotidianis , magnae adhuc superesse videntur difficultates.

Qui a plethora deducunt menstrui floris causam , dum nempe corpus muliebre ad incrementi sui apicem pervenit , non videntur attendisse , quod frequenter admodum contingat , ut puellae , jam ordinatam periodum floris menstrui habentes , insigniter postea crescant . Dum ante triginta , & amplius annos legeram *Celeberrimi Simpsoni tractatum pulcherrimum de systemate uteri* (g) , qui hoc monuerat , attentus fui ad hanc rem , & vidi , illum verissima dixisse . Plerumque enim post prima menstrua notabile corporis incrementum observatur : vidi tamen aliquas , quibus decimo octavo anno , & adhuc serius , menstrua prodierant , neque postea sensibilibiter aucta fuit corporis statura . Credo etiam , me observasse , quod incrementum corporis humani non adeo regulariter semper procedat , ac quidem creditur . Citissime crescere humanum corpus , dum origini suae proximum est , docet foetus , qui ex minima molecula , novem mensium spatio , in notabilem adeo molem excrescit . Verum procedente aetate vidi magnam incrementi diversitatem . Circa pubertatis tempus saepe subitum incrementum observatur ; in quibusdam etiam serius , ita ut paucorum mensium spatio plus augeatur statura corporis , quam antea factum fuerat integro biennio . Notum est , juniores morbis febrilibus , imprimis acutis , correptos , si evaserint , resurgere proceriores . Solet hoc explicari , quod velocius per febris impetum moti humores vasa elongaverint omnia , dum ossa nondum penitus dura cedere adhuc facile poterant . Sed , cessante morbo , cessat & haec subiti incrementi causa : & tamen vidi toties , praecipuum staturae augmentum non adeo tempore morbi , sed post morbum factum fuisse . Curavi adolescentem sedecim annorum , pusillae admodum staturae , a variolis , discretis quidem , sed numerosissimis . Morbi tempore longitudo corporis aucta fuit quidem , sed non adeo insigniter ; perrexit tamen incrementum adeo , ut post tres annos , dum illum viderem , vix agnoscerem , cum sex pedes altitudine superaret , vigesimo anno nondum impleto . Ante paucos menses puellam variolis mitissimis , & numero paucis correptam curavi . Lenis aderat in statu contagii febricula , quae integre cessavit , erumpentibus variolis , & per reliquum morbi decursum rediit nunquam : increvit morbi tempore non tantum , sed illud incrementum , per quinque jam menses a morbo finito , satis notabile pergit , una cum optima sanitate , & aucto totius corporis robore . Hinc videntur & aliae esse incrementi causae , quae ex illis , quae de corpore humano novimus , non adeo facile explicari possunt .

Al-

(g) System of the Womb pag. 10.

Alterum argumentum, quod urget *Celeberrimus Simson* (b), ut probet, plethoram corporis non esse menstrui floris causam, est illud, quod *Freind* supponat, gradatim quotidie increfcere plethoram inter binas Periodos menstruas, imprimis confidens *Sanctorio*, afferenti, quod & in corpore virili mensis spatio pondus corporis ad unam, alteramve libram augetur. Tabulae autem *Keilianae* contrarium demonstrant; nempe, non fieri in corpore sano quotidianum tale, & aequabile incrementum humorum, sed e contra ingentes hic contingere variationes in minuto, vel aucto pondere; quod mirum non est, cum ingestorum, & egestorum quantitas tam varia observe- tur etiam in sanis hominibus.

Praeterea, si a plethora sensim accumulata menstruus fluor penderet, deberet necessario retardari periodus, si quacunque evacuatione minueretur humorum quantitas, vel rerum penuria, aut strictiori diaeta impediretur haec accumulatio. Audacter provocat *Simson* (i) ad testimonium omnium Medicorum, qui in praxi versati sunt, an unquam observaverint retardari Periodum per sanguinis missionem intermedio tempore institutam. Certum est, quod venae sectiones, in morbis factae, vel & in sanis mulieribus, quae quotannis assueverant sanguinis missionibus, raro mutant solitam periodum, imo & aliquando accelerent eandem, quod aliquoties vidi. *Hoffmannus* (k), multiplici edoctus experientia, affirmat, etiam vulgo compertum esse, secta ante tempus menstruum vena liberiores eorum fluxum fieri.

His difficultatibus motus *Celeberrimus Simson* negavit, plethoram universalem esse menstruum causam, sed aliam proposuit. Credebat enim corporis incrementum non cessare, quia partes sensim firmiores redditae resistebant nimis suae elongationi, & extensioni, sed quia vis extendens, & elongans partes minuebatur. Dum enim major est resistentia circa extrema vasorum flexilium, tunc liquores, vi cordis per haec vasa pulsati, magis elongant, & distendunt vasa; & contra, ubi liberior fit transitus per eadem, minuitur distensio, & elongatio canalium. Unde putat, tunc corpus ad augmentum sui incrementi pervenisse, quando omnia corporis vasa liberissima, pervia, & aperta facillimum transitum liquidis impulsis concedunt. Unde concludit, incrementum non cessare, quia partes cedere amplius nequeunt, sed quia virium distendentium efficacia deficit, vel plurimum minuitur.

Confirmabat suam sententiam ideo, quia si per obstructionem viscerum in adulto corpore nascatur liberae humorum circumductioni obstaculum, tunc mole denuo augeantur, & immaniter quandoque, uti in Hepate, Liene, Renibus &c., Observationes Medicae numerosissimae docent. Sic in steatomatosis tumoribus, quo magis accumulatur in folliculo secreta a sanguine mate-

(b) System. of the Womb pag. 6. & seq.

(i) Ibidem pag. 9.

(k) Med. Rat. & System. Tom. 2. pag. 464.

materies, mole sua comprimens vasa vicina, pari ratione & increſcunt hæc vasa, dum ob impeditam liberam circulationem a ſanguine impulſo plus diſtenduntur. (1).

Ex his concludit, menſtrum fluorem eſſe cauſam, quare uterus incrementi ſui apicem attingat, & creſcere deſinat. Dum enim aperta vaſorum oſcula in uteri cavum mediate, vel immediate per ſinus in ſubſtantia uteri prius repletos, ſanguinem in ejus cavum effundunt, tunc liberrimus humorum motus eſt per vaſa uterina, adeoque vis diſtendens, & elongans vaſa ceſſat. Ubi autem in utero imprægnato chorion, & placenta, uteri cavo accreta, liberum ſanguinis exitum impediunt, de novo increſcit uterus, & inſigne molis augmentum acquirit.

Gradatim autem factum uteri incrementum ſtatuit eſſe cauſam eruptionis menſtruorum. Semper enim liquidum in cavum uteri pervenit, ut humectetur, & a concretione impediatur latera. Verum hæc vaſa exhalantia tenuiſſima ſunt, & tandem, creſcente utero, magis magisque dilatata, ſanguinem ipſum transmittunt, tuncque fluor menſtruus incipit, & poteſt apparere abſque plethora totius corporis. Dum autem ſanguis libere fluit per hæc orificia dilatata, minuitur reſiſtentia ſanguini per vaſa uterina propulſo, hinc cauſa dilatans vaſa ceſſat, & propria contractione anguſtantur, donec tandem non amplius ſanguinem, ſed tenuiores tantum humores transmittere poſſint; adeoque tunc menſtruus fluor ceſſare debet ſponte (m). Inde etiam explicat, quare in robuſtis foeminis citius deſinant menſtrua; quia nempe firmior vaſorum compages in his, dum minuitur cauſa urgens, facit, ut citius, & validius contrahantur vaſa; dum e contra molles, & delicatulae foeminae ſaepe diuturnum, & copioſum fluorem menſtrum patiuntur. Cum vero per ipſam evacuationem hanc debeant vaſa contracta obicem ponere huic cruori, ſponte ceſſat ille fluxus; ſed & tunc denuo adeſt cauſa, reſiſtentia nempe major vaſorum, quae certo tempore, ſenſim dilatando canales, renovare debet fluorem menſtrum, qui ergo periodice redibit. Fatetur tamen candide egregius auctor, quod inde non pateat evidens ratio, quare in pleriſque foeminis periodi floris menſtrui menſis lunaris intervallo plerumque a ſe invicem diſtent (n). Secundum hanc ſententiam fluor menſtruus non penderet a plethora totius corporis, ſed a plethora potius uteri, dum numeroſiſſima vaſa antea tantum tenuioribus ſanguine humoribus pervia, ſenſim dilatata, recipiunt ſanguinem rubrum; quae dilatatio, ubi uſque ad extrema vaſorum oſcula pervenerit, quae in ſinus uterinae ſubſtantiae primo, vel & directe in cavum uteri hiant, tunc fluor menſtruus prodeat. Ergo patet, ante fluorem menſtrum uteri vaſa majori copia diſtendi, & minus ſanguinis redire per venas reducentes; adeoque particularis plethora in utero adeſſe poteſt, licet in reliquis totius corporis vaſis non abundet ſanguinis copia.

Fa-

(1) Simon System. of the Womb. pag. 27. &c.

(m) Ibidem pag. 54.

(n) Ibidem pag. 60.

Fatendum videtur, plurima floris menstrui phaenomena feliciter ex hac sententia explicari posse, quam ubi plethora universalis statuitur menstruationis causa unica. Hinc illam plethoram particularem uteri plurimis, & summis in arte viris placuisse, mirum non est. Sic *Celeberrimus Astruc* (o), qui recentissime de hac re scripsit, eandem sententiam amplectitur, licet alio modo explicet (p), & credat, sanguinem menstruum ex uteri venis prodire per quasdam appendices venosas, quas *coecales* vocat, quae in extremis suis corrugatae sanguini viam occludunt, tempore vero menstrui floris ab urgente sanguine accumulato in uterinis vasis aperiuntur, & sanguinem dimittunt. Quamvis valde ingeniosa & haec explicatio videatur, liceat mihi, pace tanti Viri (ex cujus eruditissimis scriptis me plurima didicisse, gratus recordor) suspendere iudicium, cum aliqua saltem supponat in uteri fabrica, quae nondum videntur Anatomice satis demonstrata.

Lubens agnosco, artem nostram plurimum debere Mathematicae, & Physicae generalis disciplinae, per quam communia omnibus corporibus attributa explicantur; & dum data certa sunt, quibus superstruitur tale ratiocinium, nullum adest erroris periculum. Hydraulicae leges corpori humano applicari possunt: constat enim canalibus, & liquidis per illos motus, habet sinus, receptacula &c. Sed non credo, omnia ex hydraulicis explicari posse. Canales nostri vivi sunt, dilatantur quidem vi cordis impellentis liquida, & nituntur redire ad pristinam diametrum elasticitate sua, sed praeter haec & aliae causae in nostra vasa agunt, quae per hydraulicas leges nec intelligi, nec explicari possunt. Conati fuerunt celebres viri proportionem truncorum ad ramos, ramorum ad se invicem, angulorum, secundum quos rami vasorum ex truncis exeunt, diversitatem determinare &c. Sed nec haec sufficiunt ad intelligenda illa, quae in nostro corpore fiunt. A sola cogitatione mutata canales nostri in momento temporis mutantur, sic ut subito dilatentur, subito contrahantur. Pacato homini, & sano subitus terror nascitur, mox pallet totus, & vasa sanguinea faciei nullum admittunt sanguinem, quem antea trans mittebant liberrime. Coram pudica virgine lascivum quis dicat verbum, mox non tantum genae, sed tota facies, collum, cervix intense rubent. Dum stimulus irritans quicunque applicatur parti vel externae corporis, in illo loco statim arteriae & fortius pulsant, & celerius; de qua re §. 382. in historia inflammationis, & alibi, pluribus locis, dixi. Sed & in ipso menstruo fluore quoties non contingit, ut a subito metu, inopinave calamitate statim compressus fuerit, & vel omnino non, vel difficillime, postea in ordinem redigi potuerit? Haec, & similia multa, quae hic memorare nimis longum foret, fecerunt, ut crederem, ex cognita partium fabrica per generales omnium corporum proprietates non facile explicari posse illa, quae
in

(o) *Traité des malad. des femmes* Tom. I. pag. 39. 48.

(p) *Ibidem* pag. 1. & seq.

in humano corpore contingunt ; solis observationibus cognoscenda nempe, dum fiunt, licet ignoremus quomodo fiant.

Quamcumque enim quis amplectatur sententiam de causa fluoris menstrui, sive plethoram universalem, sive uteri solius, vel certam hujus fabricam quandam, semper manebit difficultas, cur uteri vasa incipiant magis impleri, & distendi certo vitae tempore, tuncque aperta sanguinem effundant, non antea; & cur certa satis periodo redeant. Sane uterus in virginibus, licet menstrua jam passis, densus, & solidus tactu percipitur, nec videtur adeo facile distendenda vasa habere. Verum, uti alia occasione monui ad §. 1265., in corpore humano observantur plura talia, quae per annos manent absque notabili mutatione, & dein subito incipiunt crescere, & mutari. Dentes, qui septimo, vel octavo (imo & serius) aetatis anno prodibunt, jam haerent in maxillis abortuum, crescunt lente cum reliquis partibus corporis; sed subitum incrementum sequitur, dum emergendi sunt suo tempore: bulbilli pilorum sub cute haerent in pube diu, nec crescunt tamen, circa pubertatis tempus in utroque sexu emergunt, & crescunt subito.

Insignes autem mutationes in corpore fieri circa illud tempus, dum generationi aptum redditur, certum est, ita ut Medici quandoque difficillimorum morborum curam sperent pubertatis tempore, quam nullis remediis obtinere potuerant; uti in *Historia Epilepsiae*, & aliis in locis monitum fuit: noverunt tunc Medici mutari plura, sed nemo haecenus evidenter explicuit, quomodo haec mutatio fieret.

Ex comparata Anatome autem constat, in animalibus, dum generationis tempus adest, & oestro Venereo turgent, genitalia organa miris mutari modis. *Reaumur* (q) descripsit, ex observatis *Sarrazini*, *glirem*, quem ab odore moschi, quem spirat, *moschatum* vocant: illo tempore anni, dum generationi operam dat hoc animal, partium genitalium fabricam exacte descripsit, prout nempe mensibus Aprili, & Majo observantur: mirum autem erat, pari passu, quo deservesceret oestrum, minui testiculos, epididymidem, vesiculas seminales, &c., & tandem autumno adulto, & hyemali tempore fere evanescere, figuram, colorem, situm mutare penitus. Sed & observatum fuit, uterum in animalibus, quae certo tantum tempore anni generationi dant operam, miro mutari modo, humidum dimittere per pudenda, saepe satis copiosum, & quandoque subcruentum; tuncque haec animalia uno, alterove coitu implentur: & in his ergo vasa dilatata dimittunt humores, quos antea retinebant. An hoc a priori explicari poterit? In oviparis animalibus vitellarium numerosissimos continet vitellos, qui, antequam gallina ova deponere incipit, aciculae caput vix aequant, postea subito crescunt, non omnes simul, sed successive, ita ut in gallina, ova pariente, diversissimae magnitudinis vitelli inveniantur: & tamen hi vitelli ab iisdem vasis humores accipiunt suos. In piscibus la-

etes

(q) Académ. des Scienc. 1725. Mém. pag. 486. &c.

etes, & ovorum numerosissimorum congeries magnam abdominis partem implent certo anni tempore; alio integre quasi disparere, etiam in culinis notum est. Unde videtur generationis opus, & omnia, quae ad illud pertinent, haecenus nondum explicari liquido posse: per fideles magnorum virorum observationes multa novimus, quae facta sunt, sed nondum sufficere videntur haec cognita, ut intelligi possit, quomodo haec fiant.

Variae, ut apparuit, & ingeniosae rationes fluxus menstrui propositae fuerunt a viris Celeberrimis, & structurae corporis humani peritis, per quas quaedam phaenomena satis bene fuerunt explicata, sed non omnia. Uramur cognitis: cavendum tantum, ne regulae practicae superstruantur incertis.

In foemina humana fluorem menstruum foecunditatis signum esse, satis unanimis Medicorum sententia est: observatur prodire naturaliter illo vitae tempore, dum corpus aptum est concipiendo, servando, & nutriendo foetui; cessat idem, dum per aetatem corpus huic muneri ineptum redditur; unde tunc effoetae vocantur mulieres. Cum autem non certo anni tempore, ut in brutis, sed semper in utroque sexu generandi potestas adsit, hinc foeminae humanae uterus singulis mensibus fluore hoc irrigatur, cum in brutis uterus, & pudenda tantum diffuant humoribus illo anni tempore, quo oestro venereo stimulantur. Fluor ille in brutis sanguinolentus purus nunquam observatur, tantum aliquando quid subcruenti exire visum fuit, at non constanti lege. Sed in foemina humana, dum gravida est, uterus extenditur, nec tamen hac extensione tenuior redditur: hinc majorem sanguinis copiam continere debet in vasis suis, ita ut ultimo graviditatis tempore instar spongiae sanguine plenae appareat; adeoque debebat in foemina foecunda talis copia sanguinis praesto esse, quae uteri gravidi ampliora vasa replere posset, & ne in non gravidis aucta haec copia gravaret corpus, requirebantur viae, per quas sanguis ille exire posset commode.

Praeterea foetus, membranis suis inclusus, nectitur toti superficiei cavi uteri quidem, sed imprimis placentae ope firmiter adhaeret uteri fundo, cui haec placenta solet adcrefcere. Per menstruum autem fluorem, qui imprimis ex fundo uteri prodire solet, ut dictum fuit, sic disponuntur finis, & vasa uteri, ut placenta facilius his quasi irradicari possit. Unde & Galenus (r), statuit: *Id vero (conceptus) potissimum fit, quum menstrua novissime cessant, quo maxime tempore uteri semen concipiunt.* Rationem autem dat alibi (s); *Vasorum uteri, quae interiorum ipsius partem adeunt, quibus etiam menses purgantur, oscula, quum foemina conceptura est, aperiantur: hoc autem tempus est, vel incipientibus, vel cessantibus mensibus.* *Aperiuntur etiam alio toto purgationis tempore vasa haec, non tamen tunc intra se concipit mulier; non enim semen in utero manere potest, quod ab*

(r) De femine Lib. I. cap. 3. in fine. Charter. Tom. III. pag. 186.

(s) De uteri dissectione Cap. X. Charter. Tom. IV. pag. 281.

influentis sanguinis copia abluatur. At cessantibus, vel incipientibus menstruis, vasorum ora aperta sunt, & menstruum neque multum, neque affatim, sed paucum, & paulatim effluit. Ita & apud Moschionem (1) legitur de fluore menstruo, quod paret utilem, & aptum locum, a quo semen imbibi possit.

Cum autem in brutis, dum oestro venereo stimulantur, ex pudendis depuant humores, quod alio tempore non fit, uti antea dictum fuit, hinc Veneris stimulum pro praecipua fluoris menstrui causa statuerunt alii (2). Volebant enim simile quid contingere, ac in pene virili, dum turget, ab extravasato sanguine in cellulis corporum cavernosorum, ita tamen, ut in uteri substantiam sic effusus sanguis stagnaret diutius, nec resorberi posset tam facile per venas, uti fit in pene virili, dum flaccescit; & tandem mole accumulata irritarentur fibrae musculares uterinae, quae tunc contractae expellerent sanguinem collectum per sinuum orificia in cavum uteri. Credebatur huic opinioni favere facilis illa distensibilitas vasorum, & sinuum uteri, quae in gravidis observatur, & quod Graefius (3) testetur, *in uteri vasis saepe reperiri Polypos, & quidem tantos, ut ipsa adimpleant, nec non quandoque in callosam quasi substantiam degenerent.* Uterum propria vi se contrahere posse, docet & puerperium (de quo postea), & quod post partum uterus duarum, vel trium septimanarum spatio ad pristinam molem redeat, cum ultimo graviditatis tempore adeo distensus fuerit. Dixit Hippocrates (4); *Mulieribus plerisque, quum menses apparituri sunt, uteri os sese magis, quam alias, contrahit.* Hoc autem videretur docere, circa menstruorum tempus majorem adesse in utero contractionem, per quam nempe expelleretur illud, quod accumulatum erat. Accedit, quod saepius observatum fuerit a Medicis, virgines, quae difficulter menstruabantur, post matrimonium levamen habuisse.

Non tamen ex his patere videtur, quod menstrui fluoris causa a Venereo pendeat appetitu. Matura virgo Veneris stimulos sentit, non tantum dum menstrua instant, sed & postquam fluxerunt; dum cessant, lascivientes toties videmus jam effoetas mulieres, quae menstruis carent sanae. Novi plures, rite menstruantes, quae in venerem segnes maritorum evitabant complexus morosae. Uti penis virilis, tumidus, & rigens, post coitum flaccescit, sic & clitoris, nymphae, vagina, simili modo turgidae, pariter finito veneris certamine collabuntur. Constat ex Ruyschii, & aliorum observatis, tubas Fallopianas in actu Venereo turgidas erigi, & postea demum flaccescere. Unde nulla ratio videtur, quare uterus, si a fervida Venere turgeret totus, non collaberetur denuo, effuso sanguine resorpto per venas, uti in reliquis generationis organis utriusque sexus observatur fieri.

Cum

(1) Israel Spach. gynaec. pag. 2.

(2) Emmet. theor. nouvelle du flux. menstruel pag. 77 &c.

(3) De Mulier. Organ. pag. 113.

(4) De superfœtatione cap. 7. Charter. Tom. VII. pag. 364.

Cum autem sequenti paragrapho dicetur de illis malis, quae sequuntur diminutionem, vel & integram suppressionem fluoris menstrui, operae pretium erit considerare, an determinari possit quantitas sanguinis, quae per menstruum hanc evacuationem exire solet de corpore sanae mulieris. Monuerat enim *Hippocrates* (y) sequentia: *Menstruis copiosioribus profluentibus, morbi oboriuntur; at non prodeuntibus, accidunt ab utero morbi*. Optime *Galenus*, dum commentatur hunc Aphorismum, notat, quod a copiosioribus menstruis totius corporis morbos praesagiverit *Hippocrates*, dum a nimia iactura sanguinis cachecticum corpus redditur: ubi autem non prodeunt menstrua, tunc in ipso utero morbi nascuntur vel a vasis nimis rigidis, vel a sanguine in substantia uteri accumulato, vel ab utrisque his simul concurrentibus: atque inde affectum inflammatorium, erysipelatosum, scirrhosum, carcinomatosum metuendum esse, docet (z); quae mala toties observantur illo vitae tempore, quando menstrua per aetatem cessare solent; imprimis in illis mulieribus, quibus copiosi fluebant menses, & dein subito supprimuntur.

Nihil ergo hic certi statui poterit, nisi habeatur cognita illa quantitas sanguinis, quae menstrua hac periodo exire solet in sanis.

Interim ex illis, quae ante dicta fuerunt, jam patuit, magnam diversitatem h. e. obtinere pro diversis regionibus, pro diversa corporis temperie, pro vario vitae genere. Lapponibus mulieribus parca, in calidis regionibus copiosiora prodeunt menstrua: in laxa temperie copia major, in stricto, & robusto corpore minor. Quae lautis epulis, & inertio otio fruuntur, diffuunt copioso sanguine menstruo, dum rustica mulier quotidianis firma laboribus pauculum tantum stillat sanguinis, sana tamen: dum, apud Batavos, mulieres tepidis aquosis potibus per totam fere vitam abutuntur, & hybernis mensibus, hypocaustulis suppositis, inferiores corporis partes perpetuo calore foveant, nimio menstruorum fluxu exhaustae languent, & totae redduntur cachecticae. Non mirum ergo est, tantam diversitatem occurrere apud auctores circa quantitatem fluoris menstrui debitam. Praeterea difficulter in singulis mulieribus quantitas exeuntis sanguinis determinari poterit, dum linteamina, & vestes sanguine menstruo madescunt, & calore corporis denuo exsiccantur.

Hippocrates (a) quantitatem sic definiit: *At omni mulieri, si sana sit, prodeuntes menses moderati sunt, qui ad duarum Atticarum heminarum mensuram, aut paullo plus, vel minus, idque ad biduum, vel triduum manant. Longius autem tempus, aut brevius, morbosum, aut sterile est*. Atticam autem mensuram aequivalere Heminae Romanae plerique auctores statuerunt; vocabantur autem cotylae etiam librae, quae duodecim uncias mensurales continebant, quae aequabantur decem unciis ponderalibus, totidem scilicet,

(y) Aphorism. 57. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 229.

(z) Ibidem pag. 240.

(a) De Mulier. Morb. Lib. I. cap. 9. Charter. Tom. VII. pag. 734.

cet., quot Hemina Romana pendebat (b). Disputaverunt quidem auctores de his mensuris, attamen haec opinio admodum verosimilis videtur, & licet aliqua diversitas fuerit inter Cotylam Atticam, & Heminam Romanam, non videtur hoc magni momenti esse posse in determinanda floris menstrui quantitate, quae absque hoc exquisitè definiri nequit. Videmus tamen, plerisque Medicos statuisse, viginti, vel viginti quatuor uncias singulis mensibus sic evacuari, prout nempe uncias mensurales, vel ponderales computabant. Sic *Celeberrimus Freind* (c) vulgarem catameniorum mensuram statuerebat unciam viginti, & dein computabat, quantum singulis diebus de sanguine accrescere deberet, ut menstrua illa plethora fieret.

Haec autem floris menstrui quantitas non fuit probata omnibus auctoribus Medicis; imo plures multum recesserunt inde: *Celeb. Astruc* (d), postquam monuerat, magnam varietatem occurrere in diversis mulieribus, imo & in eadem foemina quantitatem variare diversis periodis, communiter tamen statuit limites hujus varietatis ab octo unciis ad sedecim poni posse, quamvis & dentur foeminae, quibus, licet sanis, minor, & major copia singulis mensibus evacuatur. Sex, vel octo uncias pro communi mensura floris menstrui statuit, *Hallerus* (e): quatuor uncias raro excedere, vult *Brudenell Exton* (f). Alia arte usus fuit *Celeberrimus de Haen* (g), ut exactius scire posset copiam floris menstrui: sanguini recens misso, & adhuc calenti, cujus copiam noverrat praecise, immisit linteamina, deinde magnitudinem oriundarum inde macularum examinavit, notavit. Saepius haec tentando, didicit sanguinis linteaminibus excepti quantitatem, quovis deposito pretio, exacte calculare; sicque juste determinare potuit, quantum sanguinis ex menstruante utero exiret.

Invenit autem, nonnullas foeminas menstruo tempore tres uncias sanguinis dimittere, alias quatuor, quinque, pauciores esse, quae semilibram; raras admodum, quae uncias decem evacuant, nisi uteri quopiam defectu laborarent.

Per haec ergo experimenta apparet, quod copia menstruorum longe minor sit illa, quam *Hippocrates* statuerat; imo & ex ipso *Hippocrate* videtur hoc probari posse: dixit enim (h), *Prodeunt autem lochia sanae mulieri satis abunde, primum Atticae heminae, & dimidia mensura, aut paullo copiosiora; deinde ad hujus rationem pauciora, donec desinant.* Nemo autem, qui vidit lochia, quae in puerperio, separata placenta, exeunt, dubitare poterit, menstruum fluorem ad hanc quantitatem nullo modo accedere. Verum quidem est, quod Graecae mulieres vivebant reclusae, in calida regione, & hinc forte copiosius menstruantur. Cum autem fere tantum ex conspectu linteaminum sanguine maculatorum de hac copia judicent Medici, & saepe muliercularum relationi confidant unice, facile potuit hic error subrepere, cum & mulierum custodes saepius turpiter in tali casu hallucinentur.

Tom. IV. pars II.

b.

(b) Jo. Casp. Eischmid de ponder. & mensuris &c. pag. 74. & seq.

(c) Emmenolog pag. 38. & pag. 6.

(d) Traité des malad. de femmes Tom. I.

pag. 22.

(e) Prim. lin. Physiolog. §. 817. pag. 539.

(f) pag. 108.

(g) Rat. Medend. part. IV. Cap. VI. pag. 204.

(h) De mulier morbis Lib. I.

cap. 71. Charter. Tom. VII. pag. 771.

mentur. Vidit idem ille egregius autor (i), *casus fuisse abortuum, in quibus jurabant obstetrices, plus octo, vel decem libris evacuatum fuisse, cum tamen totum sordidarum mapparum acervum examinans, vix sesquilibrium evacuatam esse, existimare debuerit.*

Videtur ergo ex his omnibus, quae modo dicta sunt, concludi posse, per fluxum menstruum disponi sic uterum foeminae humanae, ut concipere possit, conceptum retinere, retentum alere. Dum enim vasa & sinus uterinae substantiae sic aperiuntur singulis mensibus, ut crassissimam sanguinis partem, rubram nempe, admittere & transmittere possint, aptiora redduntur, ut ovi humani tota superficies, cavo uteri applicata, emissis propaginibus vasculosis, huic uniri, & quasi irradicari possit. Periodum autem illam menstruum non posse facile explicari per plethoram universalem totius corporis, neque etiam per plethoram uteri solius. Donec ergo certiora noverimus de his, quae forte serior aetas docebit, contenti simus, uti certo cognitis; *obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis* (k). Per triginta, & ultra annos foemina humana generationi apta manet, & incipientis foecunditatis signum dant menstrua, finitae vero illorum cessatio. Cum autem in humano genere nullum certum anni tempus generationi destinatum sit, hinc fluore menstruo omni mense disponitur uterus, ut facilius concipere possit. In brutis, licet nil sanguinolenti prodire soleat, tamen circa consuetum generationis tempus de utero humores fluere incipiunt, ita ut pudenda madescant. Legitur & simiarum quandam speciem, humanae formae similiorem, inveniri, in qua foemellae menstruantur (l); cuius rei oculatum testem se asserit Kolbe (m); simulque notat, haec animalia binas mammas in pectoris anteriore parte gerere.

Ex ante dictis patuit, non ad plethoram tollendam, vel minuendam, institutum proprie esse menstruum fluxum, cum & in non plethoricis observetur, illum debito tempore contingere. Ubi autem extrema vasorum uterinorum, dilatata jam & aperta, sanguinem dimittunt, si aucta ejus copia in toto corpore plethoram fecerit, per vias has apertas jam major sanguinis quantitas exhibit, sicque plethora solvetur. Unde etiam ratio intelligitur, cur in otiosis, & opipare viventibus major copia menstruum prodeat, quam in illis mulieribus, quae duro labore parum victum sibi, & suis quaerere coguntur. Simul etiam inde constat, parum admodum fluxum sufficere, ut foecunda sit mulier, modo caeterum sana sit: si enim apta maneat uteri superficies interna, ut ovum humanum, tenellum embryonem continens, illi necti & ad crescere possit, foecunda poterit esse mulier. Huic aptitudini conducere videtur fluor menstruus, licet etiam parcius fuerit; & in raris casibus observatum, quasdam mulieres, licet nunquam menstruatae fuerint, foecundas fuisse; quarum exempla leguntur apud Schenkium (n).

(i) De Haen Rat. Medend. part. IV. Cap. VI. pag. 205.

(K) Cels. de Med.

Lib. I. in Praefat. pag. 20.

(l) Gassend. in vita Peiresc. Lib. V. pag. 169.

(m) Beschryving van deCaep de goede Hoop pag. 166.

(*n*), & alios: interim ex ante dictis constat, mulieres, nunquam menstrua passas, fere semper fuisse steriles: in raris illis casibus credibile videtur, uteri vasa sic disposita fuisse, ut pervia quidem fuerint, & nexui cum ovo humano apta, sed tamen non adeo patula, ut sanguinem transmittere potuerint. Saepe enim observatur, mulieribus, quae menstruis carent, stata periodo non sanguinem, sed tenuioris humoris aliquam copiam effluxisse. Forte & talis uteri conditio adest in foeminis lactantibus; quas aliquoties concepisse novi, licet menstrua non redissent post puerperium. Novimus per observata quotidiana, inter uterum & mammas notabile commercium esse; sic maturae virgini tumere incipiunt mammae, dum in utero ad prima menstrua dispositio nascitur: in puerperio, dum tertia die lochia minuuntur, imo quandoque integre cessant, mammae subito tumere incipiunt, & si lactet mulier, lochia redeunt, dum lac libere per papillas exit: si autem alienis uberibus nutriendum tradat infantem, detumescentibus mammis, alba exeunt per uterum, & deinde sanguinolenta denuo, ita ut, caeteris paribus, in non lactantibus locia & diutius & copiosius fluant. In nutricibus aliquoties observatur, menstruorum loco aliquid ferofi, albicantis, de utero fluere; quandoque & paullo post sanguis sequitur, magis dilatatis vasis; in aliis vero non. Videntur autem hoc tempore ad conceptum dispositae esse, si viro jungantur. Uti enim paullo ante dictum fuit ex *Galeno*; conceptus potissimum fit, quum menstrua novissime cesserunt; tunc enim aperta adhuc sunt illa vasa in uteri superficie interna, ita ut, non sanguinem, sed tenuiores humores, dimittant: idem contingere dicit incipientibus menstruis. Unde videtur in lactantibus, quae absque menstruorum reditu concipiunt, uterus sic dispositus esse in vasis suis, uti se habet, dum menstrua brevi prodibunt, vel dum cessare incipiunt; nempe, quod non penitus contracta vasa sint, sed sic tamen angustata, ut non sanguinem, sed tenuiores humores transmittere possint. An similis dispositio adfuit in raris illis casibus, quando mulieres, nunquam menstruatae, conceperunt?

Menstrui floris prodituri signa satis bene descriptis *Moschia* (*o*): Mammae tument; pondus circa pubem cum quadam prurigine sentiunt; pigrae fiunt; gravedinem in renibus percipiunt, aliquando & dolorem; frequentius oscitant, & totum corpus extendunt; ruborem in genis habent, non perseverantem; aliquando & fastidium patiuntur, & nauseam. Haec sunt symptomata maxime communia, quae praecedere solent, vel comitari, fluxum menstruum incipientem: pluribus tensi rigent in cervice tendines musculorum, saepe non sine molestia; aliis caput dolet.

Durat ille fluor menstruus plus minusve in diversis mulieribus, ita tamen, ut pluribus trium, vel quatuor dierum tempore absolvatur (*p*). Laudatur etiam, si sensim stillet, & absque interruptione fluere pergat, donec cesset penitus. Quandoque tamen contingit, ut per biduum vel triduum menstrua fluant, dein cessent per unum alterumve diem, & tunc redeant denuo; quod

b 2

in.

(*n*) Lib. IV. de conceptione observat. I. pag. 556.

(*o*) Spach. gynaec. pag. 2. N. 21. & pag. 20. Harmon. gynaec.

(*p*) Ibid. N. 18.

in fanis, foecundisque feminis observavi aliquoties; & etiam notatum fuit a *Celeb. Astruc*. (q). Hoc tamen molestiae percipiunt tales mulieres, ut denuo redeant illa symptomata, quae praecedere solent menstruorum eruptionem, praecipue capitis dolor, & molesta tensio circa nucham; donec de novo sanguis de utero prodeat.

Qualis autem sit ille sanguis, qui per menstruum fluorem exit, *Hippocratis* (r) auctoritate stabilitur, dum dicit: *Prodit autem sanguis, qualis e vitima, citoque concrevit, si mulier sana est.* Notum autem est, quod sanissima animalia pro sacrificiis eligerentur, & sanguinis fani, imprimis arteriosi, proprietas haec sit, ut statim concrevat.

Hanc sententiam confirmarunt & reliqui autores plurimi, qui optime scripserunt de mulierum sanitate, & morbis (s). Ubi vero humores per morbum degeneraverunt, tunc mirum non est, & sanguinem morbosum per menstrua evacuari; uti etiam, si ulcerosi quid in utero, vel in vagina fuerit. Pariter, si constricto uteri orificio, sanguis menstruus in cavo collectus retineatur, vel & vaginae rugis adhaeserit semiconcretus, calore loci, & aëris accesu, poterit putrescere satis cito, & tunc postea loco boni sanguinis liquamen putridum defluet. Similia & poterunt fieri, si munditiae minus studiosae mulieres nec indusia, nec lintea mutant, imprimis in calidioribus regionibus. Verum sponte patet, sanum, & purum sanguinem exivisse de vasis uterinis; sed postea corruptum esse.

Hinc simul facile apparet, quid sentiendum sit de omnibus illis noxis, quae sanguini menstruo, & menstruanti foeminae adscribuntur, uti & de philtris, aliisque superstitiosis remediis inde paratis. Scripserat *Columella* (t), ultimum remedium esse, aliis incassum tentatis, ad necandas erucas, hortis adeo noxias, si menstruas foemina, nudis pedibus, aperto sinu, & resolutis capillis, ter circumiret areolas, & sepem hortorum. Tunc enim;

— — — — — *mirabile visu!*

Non aliter quam decussa pluit arbore nimbus

Aut teretis mali, vel tectae cortice glandis,

Volvitur ad terram distorto corpore Campe.

Plurima alia similia apud autores hinc inde sparsim inveniuntur, & collecta legi possunt apud *Ludovicum Bonaciolum* (v), si operae pretium videatur. Melius superstitiosae hae nugae, quibus tamen mulierculae fidem habere solent, oblivioni tradentur perpetuae.

(q) *Traité des malad. des femm.* Tom. I. pag. 23.

(r) *De mulier. morb.* Lib. I. cap. 9. *Charter.* Tom. VII. pag. 735.

(s) *Mauriceau des malad. des femm. grosses* Tom. I. pag. 54. *De Graef de mulier. organ.*

134. &c. *Astruc traité des malad. des femm.* Tom. I. pag. 23. (t) *Rei rustic.*

autor. Tom. I. pag. 732. Lib. X. vers. 357. & seq. (u) *Ennead. mulieb.* Cap.

III. *Spach. gynaec.* pag. 115.

§. 1285. **S**I, posito corpore in conditione (1284.), hic sanguis retinetur, oritur plethora; tarditas; gravitas; pallor; dolor lumborum, inguinum; depravatae functiones omnes fere naturales, vitales, animales; quae facile deducuntur a vasis nimis pressis, liquido copiosiore, itagnante, suffocato.

Licet ad praecedentem paragraphum fuerit dictum, menstruum fluorem non produci a plethora universali, ut causa, tamen cum naturali lege in sanis mulieribus certa quantitas sanguinis sic exeat de corpore singulis mensibus, sponte patet, a retentis menstruis debere augeri sanguinis copiam in vasis; eo citius, vel serius, prout majori, minorive copia menstrua fluere solebant. Verum etiam probatum fuit, quod, licet purgatio menstrua vocari soleat, sanguis purus exeat de vasis uterinis, non vero aliquid noxium. Ubi ergo sanguinis boni copia per menstruum retentionem eo usque increvit, ut major jam sit, quam quae ferre possit illas mutationes, quae vitae inevitabiles accidunt, nisi inducantur morbi, tunc plethora adesse dicitur, uti pluribus ad §. 106. α. dictum fuit.

Tarditas, gravitas. Haec enim sunt plethorae effectus, uti §. 106. monitum fuit. *Gravitatis sensum in toto corpore* inter signa suppressionis menstruum recensuit Galenus (v); & Hippocrates (x) dixit; *molli carne praeditae mulieri, ubi sanguine corpus impletum fuerit, nisi ab ipso decesserit, carnibus impletis, & calefactis, dolor oboritur.* Sentiant enim in omnibus musculis corporis mollem, plenum, distendentem tumorem, una cum immobilitate quadam, sic ut manuum digitos vix claudere possint, uti antea in *Plethorae* diagnosi dictum fuit.

Pallor. Inter signa plethorae recensitus fuit color ruber in facie, oculis, labiis; imo & in valde plethoricis quandoque cutis totius corporis impenso rubet; adeoque mirum videtur, quod pallor sequatur menstruum suppressionem. Verum circa hanc rem notandum est, quod quandoque in pallidis virginibus supprimantur menses, in quibus non adest fere sanguis ruber; uti manifeste apparet, si ad deplenda vasa ipsis vena aperiatur: parva enim placentula rubra innatat copioso admodum sero. Prudentes autem Medici in suppressione mensium curanda admodum solliciti sunt, ut rite distinguant, an laborent morbo, quia menstrua supprimuntur, an vero ob morbum praegressum, vel praesentem careant fluore menstruo. In priori enim casu plethora sequitur, & rubent, in posteriori autem languent, totae pallidae, & cacochymicae.

Magna hinc etiam requiritur in curatione diversitas: plethora enim sanguinis missionem indicat; cacochymia saepe longa aliis remediis opus habet.

Sed & alia ratio est, cur pallor post menstruum suppressionem sequatur, licet

Tom. IV. pars II.

b 3

licet

(v) De locis affectis Lib. VI. cap. 5. Charter. Tom. VII. pag. 524.

(x) De mulier. morb. Lib. I. cap. 2. Ibid. pag. 729.

licet plethora adfuerit. Notum est, sanguinem sanum de vena eductum, sibi relictum in vase puro, secedere in duas partes, in serum nempe fluidum, & partem rubram concretam. Si omne serum effundatur, post paucas horas nova feri copia adest, deliquescente sensim parte rubra, quae sic fere integre in serum flavescens, vel ex flavo viridescens, solvi poterit. Vasa autem, per plethoram nimis distenta, perdunt partem virium suarum, per quas agunt in fluida contenta; hinc minus compinguntur, & densantur humores, & poterit vel in ipsis vasis pars rubra sensim in serum deliquescere, unde color ruber corporis sensim minuitur, & in pallorem mutatur. Accedit, quod si plethora adsit, naturaliter per uteri vasa dilatata exitum quaerens, nec exiens tamen, vasa uteri, & sinus dilatantur magis, & magis; unde dolor in utero & partibus vicinis, uti statim dicetur. Verum tunc idem continget, quod in gravidis metuebat Hippocrates (y); uti alia occasione ad §. 69. notavi. *Cum in utero gerat mulier, tota fit cum virore pallida (χλωρή), quod purus ipsius sanguis quotidie destillet, & ad foetum feratur, illique incrementum fiat, & pauciori in corpore sanguine existente, eam ex viridi pallidam esse, necesse est.*

Dolor lumborum, inguinum. Dum sinus uteri numerosi, & per totam ejus substantiam dispersi, turgent accumulato sanguine, vasa inter hos decurrentia necessario comprimuntur; unde vasa sanguinea vicinarum partium magis implentur, & impleta distrahuntur; hinc primo ponderis, & dein molesti doloris sensus, qui tam saepe menstruum fluorem praecedere solet. Si jam non exeat de utero sanguis, omnia haec mala augmentur (z). Pulcra habetur observatio, quae modo dicta confirmat. Violenta morte peribat mulier quinquagenaria, quae novendecim annis in conjugio vixerat sterilis. Menstrua prodibant, sed parca tantum copia, & illo tempore tumebat misera, & magnos in abdomine dolores patiebatur: post aliquot annos a prima menstruorum eruptione, naribus emungebat sanguinem, vel & expuebat. In cadavere inventum fuit, quod membrana, internam vaginæ superficiem tegens, occluserat orificium uteri, aequè firmiter ibi accreta, quam vaginæ. Haec membrana pertusa erat duobus parvis foraminulis, quorum diameter quartam partem lineae geometricae aequabat tantum. Collum vero uteri duplo longius erat solito, a distensione collecti sanguinis expansum, & tenue (a). Talem autem distractionem absque dolore, & molestia insigni non potuisse fieri, facile patet. Unde Hippocrates (b) dixit: *Quum menses latuerint, dolor detinet imum ventrem, illique pondus incumbere videtur, lumbi, & ilia dolent.* Similia habet alio in loco (c); sed ibi dicit, quod lumbi, & ilia immaniter doleant; dein addit: *si vero menses omnino non fluant, pro morbo crassi, lenti, & glutinosi redduntur;* adeoque apti, ut in vasis, & sinibus uteri stagnent, & corrumpantur; quae omnia mala pejora fiunt temporis mora. Unde, postquam duo, aut tres menses prodierunt, interdum ei per pudendum menstrua

con-

(y) De Mulier. morb. Lib. I. cap. 32. Charter. Tom. VII. pag. 748.

(z) Simson the System. of the VVomb. pag. 40.

(a) Acad. des Scienc. l'an 1704. hist. pag. 33.

(b) De Natur. mulieb. cap. 18. Charter. Tom. VII. pag. 689.

(c) De Mulier. morb. Lib. I. cap. 6. Ibid. pag. 732.

confertim erumpunt, & quae prodeunt, ut carunculae esse videntur, velut ex corruptione, & nigra sunt (d). Quod autem hoc factum fuerit ab accumulato sanguine vel in uteri cavo, vel in vasis, patet inde, quod talis mulier praegnans esse videatur, & in viri congressu doleat, ut putet quid incumbere; & pondus aliquod in ventre inest (e). Si vero diutius maneant suppressa menstrua, tunc suppurationem metuendam esse, monet (f). Id vero maxime accidit, si a febre exusti fuerint. Signa vero sunt, si purulenta fuerint; dolores enim ad imum ventrem irruunt, & pulsationes vehementes; neque contactum sustinet. Quod si melius habitura sit, menses ei per pudenda erumpunt, pusque, & sanguis fertur. Deinde addit, uteri ulcus metuendum esse; quod si magnum fuerit, infocunda manebit mulier, licet sanetur. Sin autem ex utero non exiverit illud corruptum, & purulentum, tunc circa lateris mollitudinem pus colligitur (g).

Haec sunt praecipua mala, quae contingunt ipsi utero, dum menstrua supprimuntur. Verum cum arteriae hypogastricae non tantum utero, sed & vicinis partibus dent ramos, hinc, impedito libero transitu per vasa uterina, vasa vicinarum partium magis urgentur, & distenduntur; unde nova nascuntur symptomata. Haec omnia pulcre habentur apud Hippocratem (h) qui sic dicit de menstruorum suppressione: *Quum autem agitated, & secretus sanguis non exeat foras, sed in uteros, uterique non hiarint, tum sane, diutius immorante sanguine, uteri incallescunt calorem reliquo corpori praebent. Quandoque etiam sanguinem in venas corporis transfundunt, ut & venae impletae doleant, & oedemata excitent. Nonnunquam vero ex eo claudicationis periculum impendet. Quin etiam interdum Vesicam obsident, premuntque, & claudunt, stranguriamque adferunt. Quandoque vero uteri, sanguine pleni existentes, aut ad coxendicem, aut ad lumbos procidunt, doloresque exhibent. Aliquando vero, ubi sanguis quinque, aut sex menses in utero immoratus est, putrescens, pus fit, & quibusdam pus per pudendum exit. Nonnullis etiam in inguine velut tuberculum oritur, ibique pus factum foras prodit. Similia his recenset alio in loco (i) Galenus.*

Verum a suppressis menstruis non tantum uterus, & vicinae utero partes male afficiuntur, quod facile deducitur a vasis nimis pressis, liquido copiosiori, stagnante, suffocato; sed & totum corpus inde turbatur, ita ut ab hac sola causa observentur.

Depravatae functiones omnes fere naturales, vitales animales. Alia occasione ad §. 1224. ex observatis Egregii Anatomici Tabarrani constitit, liberrimum esse commercium inter venas, & uteri cavum: inflatis enim venis, observavit, uteri, & vaginae cavum aëre repleti, & vicissim, per orificium vaginae insufflando, vidit, venas, utero, vaginae, atque ovarii dicatas, aëre turgentes attolli. Facillima ergo erit resorptio per venas

b 4

ute-

(d.) De Mulier. morb. Lib. I. cap. 6. Ibid. pag. 732.

(e) Ibidem.

(f) Ibid.

cap. 4. pag. 731.

(g) Ibid. cap. 5. pag. 732.

(h) De Natura pueri cap.

4. Charter. Tom. V. pag. 313.

(i) Comment. tert. in librum Hippocr. de ali-

mento. Charter. Tom. VI. pag. 270.

uterinas, si uterus sanus sit. Ideo videtur *Hippocrates* (k) testimonium fecunditatis a facili uteri resorptione sumfisse, dum dicit: *mulier si utero non concipiat, scire autem velis, an conceptura sit, vestibus obvolutam subter suffito: atqui si odor quidem ad nares, & os usque per corpus tibi pervadere videatur, ipsam nosce per se infœcundam non esse.* Hinc facile patet, si purulenti, vel stagnatione corrupti humores hic stabulentur, ab horum resorptione cachymiam pessimam induci posse, adeoque omnes functiones turbari: uti etiam per metastasin similium resorptorum ad varia corporis loca. Videtur & *Hippocrates* (l) hoc indicasse, dum agit de illis, quae contingunt, si *men- ses mulieri quidem prodeant; verum pauciores, quam conveniat, ferantur.* Monet enim sequentia: *Dolet alias, atque alias corpus, maximeque lumbos, & spinam, & inguina, manuumque, & pedum articulos. Neque haec simul dolent, sed vicissim, quocumque secretus sanguis, qui uteris inesse nequit, impetum fecerit, & quacumque parte decubuerit, tumor existit.*

Verum & alia ratio est, quae ab utero male affecto naturales, vitales, animales functiones turbari possint in corpore. Alia occasione, dum ad §. 701. de *Delirio Febrili* agebatur, probatum fuit, quod ab aliis partibus corporis affectis sic possit affici sensorium commune, ac si causa physica in ipso cerebro praeëxstitisset, cum tamen longe aliis in locis haereat origo mali. Hoc erat illud, quod *Helmontius* vocabat *actionem regiminis, qua una pars corporis paret alteri.* Patuit tunc simul, jam apud *Hippocratem* manifesta hujus actionis vestigia occurrere; & plurimis observatis tunc demonstratum fuit, quod revera partes quaedam corporis male affectae agant efficaciter in alias partes, licet dissitas; non, uti videtur, communicatione, sive propagatione materiae morbosae per vapores emissos ex parte prius affecta, uti in scholis explicari solebat, sed miro imperio quarundam partium corporis in alias. Simul tunc monitum fuit, sufficere Medicis, ut sciant, talia contingere in corpore humano, licet fateri debeant, se non intelligere modum, quo haec fiant. Magnum certe in arte usum habebit discere per fideles observationes, quatenus partes corporis in alias agant tali modo, vel patiantur. Quod & *Hippocrates* agnovit (m), uti ante dictum fuit. *Corpus autem ipsum sibi ipsi idem est, & ex eisdem constat. Etsi non eodem modo se habent ejus partes magnae, & parvae, itemque superiores, & inferiores. Si quis tamen interceptam corporis partem minimam male afficere velit, eam affectionem, qualiscumque tandem fuerit, totum corpus sentiet; propterea quod minima corporis pars eadem habet omnia, quaecumque & maxima. Eaque minima pars, quidquid tandem pertulerit, ad cognitionem, & gentilitatem refert (πρὸς τὴν ὁμοειδίαν), unaquaeque ad suam, sive bonum, sive malum id fuerit, ac propterea corpus ob minimae partis cognitionem tum dolet, tum oblectatur, quod in minima parte omnes insint, eaeque ad ea, quae sui sunt generis, singula transferunt, & omnia denunciant.*

Si jam consideretur, totum corpus adeo mutari circa pubertatis tempus, dum

(K) Aphor. 59. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 231.

(l) De Mulier. morb. Lib. I. cap. 7. Charter. Tom. VII. pag. 733.

(m) De locis in homine cap. 1. Charter. Tom. VII. pag. 358.

dum uterus mutari incipit; multos morbos minui, imo & integre cessare, dum prima prodeunt menstrua; totum cerebrum turbari miris modis in *furore uterino*, dum optime morata virgo, omni abjecto pudore, in venerem furibunda ruit, donec lassata viris, nondum fatiata, recedat; his certe & plura alia addi possunt, ut demonstretur illud imperium, quo uterus male affectus omnes corporis functiones mutare, & turbare possit. Unde *Helmonius* (n), dum observaverat, Asthma, & tussim produci ab utero, *actione regiminis*, modoque pene *influentiali*, ad nutum irae, tristitiae, pavoris &c.; dein addit sequentia; *Nec enim uterus vaporibus tenus, sed mero regiminis imperio totam regit mulierem. Cum sit peregrini hospitis instar, a corpore non nisi alimentaliter dependens, prout viscus ab arbore, cui innascitur. Caeterum uterus quadra vivit propria, nullumque sibi, praeter animi pathemata, hostem novit. Quapropter non servit animae; sed in importunum perturbationibus animum, non secus atque in corpus, furiendo saevit &c.*

Omnia autem haec, utero male affecto, ob fluorem menstruum suppressum contingere posse, docent *Hippocratis* observata. Dixit enim (o); *Menses non supprimi, utile: ex talibus comitiales morbi fiunt, ut arbitror: quibusdam ventris subductiones diuturnae; quibusdam autem haemorrhoides.* Quin imo alibi (p), de morbis muliebribus agens, dicit; *Morborum omnium uteri causae sunt.* Et paullo post subjungit, quod, suppressis menstruis, *pleni uteri coxendices contingunt, & ad coxendices, & inguina dolorem adferunt, ac tanquam pilae in ventre discurrunt, caputque dolore afficiunt, modo quidem altera parte, modo vero totum.* Similia his apud *Galenum* (q) leguntur de mensibus suppressis: *Signa sunt, gravitatis sensus in corpore, fastidium, dejecta cibi appetentia, horror inaequalis, alienorum quorundam cupiditas &c.; ac terram, aut extinctos carbones, aut quaedam hujusmodi edunt &c.; praeterea lumborum, & colli, & syncipitis dolor, & oculorum baseos, item febres ardentes, & urinae nigricantes, &c., quibusdam urinae supprimitur omnino, aut difficulter redditur &c.* Unde & *Celsus* (r) conclusit: *Quibus foeminis menstrua non proveniunt, necesse est, capitis acerbissimi dolores sint, vel quaelibet alia pars morbo infestetur.* Sic frequentissimum mensium obstructions comitans symptoma, dolorem capitis nempe, memorat, & uteri affecti in omnes corporis partes imperium agnoscit. Optime autem notavit *Celeberrimus Astruc* (s), non requiri gravem adeo laesionem in utero, ut turbentur omnia in hysterica puella; sed levem tantum mutationem uteri sufficere, a repletis v. g. vasis, vel & subito depletis, aliisque similibus minoribus causis; dum e contra cancrum ulcus, depascens uterum, praeter dolorem, non adeo turbat reliquas corporis partes, modo virosa talis ulceris sanies libere depluat, nec resorbeatur a venis.

Quam

(n) In Capitulo *Asthma, & Tussis* N. 13. 14. pag. 289., & in Capitulo de conceptis pag. 484. N. 18.

(o) Coac. Praenot. N. 522. Charter. Tom. VIII. pag. 252.

(p) De Natura pueri cap. 18. Charter. Tom. VII. pag. 376.

(q) De locis affect. Lib. VI. cap. 5. Charter. Tom. VII. pag. 524.

(r) Lib. II. cap. 7. pag. 59.

(s) Traité des malad. des femm. Tom. IV. pag. 62. 66.

Quam mira autem mala sequantur quandoque menstruorum suppressionem, sequens casus docet. Sedecim annorum puella post decimum quintum aetatis annum regulariter menstruata fuerat; subito perterrita, ob mortem inopinatam optimi patris, menstrui floris tempore, copiosum sanguinis fluxum cum animi deliquio, & tremoribus passa fuit. Postea se satis bene habuit usque ad proxime sequentem menstruorum periodum, quae vix apparuerunt; sequenti periodo nihil omnino prodiit; & tunc hystericus paroxysmus frequentius, validius, & manifeste convulsivus, accessit. Postea sanguis missus fuit, dein exhibitum vomitorium, quod & repetebatur post paucos dies; sed mox sequebatur deglutitio difficilis, & tandem omnino impossibilis; quae si tentaretur, mox convellebatur cum tremore miro, & reciprocis distensionibus thoracis, & abdominis; quae tandem finiebantur in tetanum universalem. Per integrum mensem vixit absque ullo cibo, & potu. Medicus vocatus cochlear Julapii antihysterici offerebat, quod deglutitum descendit ad duorum pollicum distantiam in oesophagum, ibi loci spasmodice contractum; mox sequebatur tetanus. Aliis remediis externis frustra adhibitis, tentavit, spongia ossi balaenae affixa aperire viam; quo bis facto, superatus fuit spasmus, & deglutire potuit aegra, absque molestia, solida aequae, ac fluida, quae offerebantur. Deglutitionis libertas mansit per tres circiter septimanas; verum omnia ingesta evomebat, exceptis cerasis, fragis, & mixtura quadam antihysterica, quae retinebantur a ventriculo. Quandoque una cum ingestis evomebat viridia. Alvus manebat stricta; hinc clysmata laxantia injiciebantur; secuta fuit copiosa evacuatio sanguinis per anum, ita ut bidui spatii binae exirent librae. Injecto clysmate vulnerario adstringente, sistebatur haec sanguinis evacuatio; sed brevi post redibat spasmus Oesophagi, subito increpescens adeo, ut nihil omnino deglutire posset; unde per quinquaginta, & quatuor dies cibo, & potu caruit omnino. Sepe toto hoc tempore afficiebatur tetano, validiore, quam antea, & cum sensuum abolitione, donec cessaret paroxysmus. Dum tentabatur, immissa spongia, uti antea feliciter successerat, aperire viam deglutiendis, violentus adeo sequebatur tetanus, ut mox moritura crederetur. Post abstinentiam per tres, quatuorve septimanas ab omni cibo, & potu, sequebatur coecitas, & paullo post surditas: tactu tamen distinguebat amicos, & proprio nomine compellabat. Post mensem rediit visus; dein & auditus, & perfecte quidem. Rediit & deglutitio, cerevisiam, & lactis serum potabat; sed sequebatur delirium, per unam, alteramve horam durans tantum: poma, & pyra cocta, & cruda manducare poterat, minime autem panem, vel alios cibos solidos. Si quid mandaret, & negaretur, vel aliqua tantum mora fieret, sequebatur semper tetanus. Postea perpetuo decumbere in lecto cogeatur; octavo quoque, vel decimo die tantum, ut lectus sterni posset, removebatur, sed simul ac moveretur corpus, tetani paroxysmus aderat, qui non cessabat, antequam in lectum reponeretur. Sequebantur dein duri circa aures tumores. Post aliquot menses eo usque profecerat, ut erecta in sedili manere potuerit per aliquot horas, & omnis generis vegetabilia comedere; sed fastidiebat omnino carnes, & iuscula.

Illo

Illo tempore, dum ab omni cibo, & potu abstinerebat, clysmata nutrientia fuerunt adhibita, semel de die, raro bis, sed & integros viginti quatuor dies ab his abstinendum fuit, cum levissimum etiam corporis motum validus tetanus sequeretur. Pulsus, abstinenciae tempore, erat plenus, fortis, aequalis, parum tardior naturali tamen, respiratio libera, urina sana. Tandem, postquam per biennium fere omnia haec mala tulerat, inter confabulandum cum amicis subito periit placida morte (t).

Plures alii, huic satis affines, casus in Historia Medica leguntur (u); aliquos similes ipse vidi; sed hunc casum imprimis elegi, ut constaret, omnes functiones naturales, vitales, animales vitiari posse ob menstrui fluoris suppressionem.

§. 1286. **A**B eodem autem sic accumulato mirae saepe parantur viae, raris secretionibus menstruis notae; dum per oculos, aures, nares, gingivas, vias salivae, oesophagum, alvum, vesicam, mammas, cutim, vulnera, ulcera exire viderint Medici.

Certum est per observationes fideles, & numerosas, quod sanguis, ob suppressionem menstruorum retentus, adeoque accumulatus in corpore, miras saepe inveniat vias, per quas exeat. Solet quidem plerumque hoc explicari, quod per plethoram distenta vasa rumpantur quandoque, vel & nimis dilatata, absque ruptura, per anastomosis sanguinem emittant. Sed tamen inde non patet evidenter, quare in plethora a suppressis mensibus nata hoc contingat frequentius, quam si ab aliis causis nimia copia sanguinis accumuletur in corpore. Ad §. 1284. dictum fuit, a sola plethora menstrui fluoris causam deduci non posse, cum sanguinis missiones non impendant, quo minus solito tempore menstrua prodeant. Eadem illa causa, quae aperit vasa uterina (quam me ignorare lubens fateor) si applicetur aliis corporis vasis, idem facere poterit. Illam autem causam, qualiscumque fuerit, in vasis ipsis esse, & non pendere a cordis impellentis vi, facile demonstratur. Licet enim cor regulariter agere pergat, in quibusdam arteriis observatur tamen quandoque motus perturbatio, quae saepe haemorrhagias praecedit, de qua re in morborum acutorum historia saepius dictum fuit. Sic pulsatio in ulcere percepta designat haemorrhagiam brevi secuturam, pulsatio in hypochondrio sinistro praecedit toties largam haemorrhagiam narium in sanis caeteroquin hominibus. Observaverat *Solano de Lucque*, dicrotum pulsum designare criticam narium haemorrhagiam in morbis. Hoc exemplo incitati Medici omni attentione observaverunt pulsantium arteriarum mutationem, ut inde eruerent signa Prognostica tam in sanitate, quam morbis. Sic *pulsus uterinus* dictus, qui menstruorum eruptionem praecedere solet, describitur (v). *Pulsus ille plerumque*

(t) Medical Essays and observat. Vol. V. part. 2. pag. 471. & seq.

(u) Act. Erudit. Ann. 1726. pag. 525. & seq.

(v) Recherch. sur le pouls par rapport aux crises pag. 95.

que est magis elevatus, & expansus, quam antea; simul est inaequalis, & dicrotus; licet illud dicrotum nec adeo frequenter, nec adeo distincte percipiatur, quam in pulsu nasali (qui narium haemorrhagiam praefagit), tamen est satis sensibile. Monet Anonymus auctor, illum pulsum uterinum facilius percipi, dum prima instant menstrua: uti etiam in annosis, dum deficere incipiunt. Hisce diebus nobilis virginis pulsum tangens, quae jam quadragesimum quintum aetatis annum superaverat, credebam, me percipere pulsum illum uterinum; unde rogavi, an menstruorum adesset tempus; respondit, se jam per tres menses illis caruisse. Vix domum redieram, quin literas miserit mihi, ut moneret, menstruum fluorem jam adesse, qui sequentibus diebus satis magna copia fluere pergebat, uti saepius hoc aetatis tempore solet contingere. Monet simul idem auctor, illum pulsum post primas menstruorum periodos non semper percipi, licet menstrua instant, cum in multis facillime prodeant, absque ullo fere signo.

Illum pulsum uterinum pariter se percepisse, testatur egregius Camus (x). Sed illud dicrotum in pulsu alio modo describit; credit enim, arteriam, tempore diafoles, non bis ferire digitum in eodem loco arteriae, sed successive in duobus punctis diversis.

Dictum fuit praecedenti paragrapho de miro illo regiminis imperio, quo uterus in alias partes corporis agit, etiam distas. Si ergo vasa uteri irritata non promoveant sanguinem menstruum usque in cavum uteri, ob maiorem resistantiam circa fines, an communicare possunt per regiminis imperium similem motum vasis aliarum partium corporis? Hippocrates (y) monuit, turbari sanguinem (αἷμα ταρασσεται), dum singulis mensibus cumulativum exire solet, & ideo dolorem fieri, si menses non prodeant. Quum autem agitur, & secretus sanguis minime foras, sed in uteros feratur, uterique non hiant, tum sane, diutius immorante sanguine, uteri incalescentes calorem reliquo corpori excitant. Dein alibi (z), ubi de incommodis agit, quae parciorem menstruationem sequuntur, notat, varias corporis partes inde affici; additque sequentia: Neque haec simul dolent, sed vicissim, quocumque secretus sanguis, qui uteris inesse nequit, impetum fecerit, & qua parte corporis decubuerit, tumor existit. Vidi puellam, cui circa menstruationis tempus tumor in nucha oriebatur ovi magnitudine, ruber, & dolens; si menstrua fluere, intra paucas horas evanescere totus. Celeb. Hoffmannus (a), antequam de haemorrhagiis agere incipit, monet, omnem haemorrhagiam, paullo graviolem, praecedere constrictionem spasticam vasorum per habitum corporis, cum alvo plerumque stricta, urina tenui, & pariori perspiratione: postea celerior, & vehementior arteriarum motus, & ad certam partem directus impetus consequitur. Verum, uti antea ad §. 1284. ex Hippocrate notatum fuit, mulieribus plerisque, quum menses apparituri sunt, uteri os sese magis, quam antea, contrahit. At, uti postea dicetur,

(x) Mémoire sur divers sujets de Médecine pag. 258.

(y) De Natura Pueri Cap. 3. Charter. Tom. V. pag. 312. 313.

(z) De Mulier. morb. Lib. I. Cap. VII. Charter. Tom. VII. pag. 733.

(a) Medicin. Ration. System. Tom. IV. part. 2. in Praefat.

cetur, ubi de *Partu difficili* agendum erit, dum os uteri incipit contrahi, & totus uterus successive similiter contrahitur; unde, si sanguis menstruus hoc motu non exprimitur in cavum uteri, tunc fit directio impetus ad aliam partem, & mirae quandoque sequuntur haemorrhagiae, per actionem sic dictam regiminis, qua uterum affectum in alias corporis partes agere posse, dictum fuit antea.

Neque Ars Medica caret exemplis, quae docent, actionem talem in distans, ut loquuntur scholae, revera obtinere: alia occasione, dum de sanguis sputo coercendo agebatur, ad §. 1200. notavi, quod validissima narium haemorrhagia cessaverit illico, dum linteum quadruplicatum, posca frigidissima madidum, toti obvolveretur scroto. Simile remedium in libro, qui *Galeno* adscribitur, legimus (*b*); ubi jubet, testes in aceto forti tenendos, ad sedandum nimium per nares sanguinis fluxum.

Superest, ut videatur, per quas partes corporis sanguis, suppresso fluore menstruo retentus, viam sibi quandoque paraverit. Verum quidem est, quod a plethora simplici in viris aliquando, sed raro tamen, periodica sanguinis evacuatio per cutim externam illaesam observata fuerit. Sic legitur apud *Marcellum Donatum* (*c*) mirus casus, ex *Benivenio* excerptus, de homine admodum robusto, triginta sex annorum, cui singulis mensibus ex iliis dextris libra circiter sanguinis exibat; dumque digitum apprimeret huic loco, & postea amoveret, simili impetu exibat sanguis, ac si ex secta vena efflueret; cessante hoc fluxu, nullus in cute integerrima distinguere poterat locum, unde sanguis manaverat. Singulis mensibus vena secta fuit, & dimidii anni spatio integre convaluit. Sed antea dictum fuit, licet plethora per sanguinis missionem tolleretur, tamen fluorem menstruum solitam servare periodum; unde sanguineae tales excretiones, per insolitas vias factae, ob suppressa menstrua, vix obediunt venae sectionibus, sed tunc curantur, si stato tempore per uterum denuo excernatur sanguis.

Frequentius contingit, superiores corporis partes urgeri a sanguine, dum solito tempore non exit per uteri vasa, uti alia occasione §. 1017., ubi de Apoplexia agebatur, dictum fuit; monente *Hippocrate*, capitis concussionem, & aurium sonitus praecedere menstruorum eruptionem, illaque prodire, si juxta spinam ardor consequatur, qui designat, aortae descendens ramos a sanguine magis incipere distendi. Sed & tunc per varias vias exire sanguinem, fuit observatum.

Per oculos. In virgine carnosa, calidae temperiei, & sanguine plena, dum sedecim annos natae nondum prodiissent menstrua, ex oculis inceperunt stillare frequenter sanguineae guttae, lacrymarum instar. Profuit sanguinis missio ex talo, quam menstrua purgatio paullo post secuta fuit (*d*).

Au-

(*b*) De Dynamidibus Lib. 2. Cap. 14. Charter. Tom. X. pag. 680.

(*c*) De Medic. Histor. mirab. Lib. 1. Cap. 2. pag. 11.

(*d*) Medic. observat. Exempl. Rat. Dodon. Cap. XV. pag. 27.

Aures. Per aures, & oculos, singulis mensibus exivisse sanguinis copiam in virgine religiosa, menstruis carente, legitur (e).

Nares. Quotidianae observationes docent, & in sanitate, & in morbis, vasa narium sic disposita esse; ut facile dilatentur, & dimittant sanguinem, sicque corpus liberent a copia nimia gravante, vel & simul cum sanguine noxium morbosum educant. Nulla autem haemorrhagia, & frequentior, & tutior occurrit in menstruis suppressis, illa quae per nares fit: unde *Hippocrates* (f) ex iisdem signis sperabat narium haemorrhagiam, & menstruorum eruptionem. Ideo alio in loco (g) dixit: *Mulieri, menstruis deficientibus, sanguinem ex naribus fluere, bonum.*

Gingivas, vias salivae. Et hoc observatum fuit; imo, dente molari evulso, postea singulis mensibus illa sanguinis copia, quae ex utero prodire solebat, per hunc locum evacuabatur (h); ubi & plura alia circa insolitas menstruorum vias habentur. Sanguis autem ille tunc per os evacuatur; sed etiam ore exspuitur, dum a pulmone, vitali viscere, venit. Majus autem inde periculum imminere, alia occasione ad §. 1198. §. 1., monitum fuit, & testimonio confirmatum *Hippocratis* (i), dicentis: *Quibusdam mulieribus, quum bimestres menses copiosi in uteris exstiterint, ubi intercepti fuerint, ad pulmones feruntur: his omnia contingunt, quae in tabe dicta sunt, nec superesse possunt.* Sed patuit ex dictis ad hunc locum, illud imprimis tunc metuendum esse, si in pulmone congestio fiat: ubi vero haemoptoe per anastomotin evacuabat hunc sanguinem, tunc per plures annos, absque sanitatis detrimento, sanguinis illa per pulmonem evacuatio tolerari potuit. Imo *Benedictus* (k) adeo versatus in his morbis, sequens axioma statuit: *si critice, & per transumptionem, Haemoptoica pulmoni supervenerit affectio, tuto non raro, & cum totius adjumento, res succedit.*

Oesophagum; & inde in ventriculum; imo, & ex ventriculo ipso; cum constet, numerosa, & satis facile dilatabilia esse ventriculi vasa: sanguis autem ibi collectus, vel per vomitum expelletur, vel per alvum. De suppressione mensium agens *Hippocrates* (l), dixit: *Vertuntur etiam ad vomitum, & quibusdam ad sedem &c.: Hanc autem viam minus mulieribus, quam virginibus, menstrua efficiunt.* E contra monet (m); *Mulieri, sanguinem vomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.* Vidit talem periodicum sanguinis vomitum *Stalpart van der VVielen* (n) in puella, quae parentibus ejus olim famulabatur, & cujusvis purgationis menstruae tempore magnam copiam sanguinis rejecit. *Puella autem nihil inde detrimenti sensit; sana namque permanebat, & alacris.*
Plu-

(e) Schenck. Observat. Medicin. Lib. IV. pag. 635.

(f) Praedict. Lib. I. N. 145. Charter. Tom. VIII. pag. 796.

(g) Aphor. 33. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 214.

(h) Schenck. Observat. Medic. Lib. IV. pag. 633.

(i) De Morb. mulier. Lib. I. Cap. IV. Charter. Tom. VII. pag. 731.

(k) Tabid. theat. pag. 107.

(l) De Mulier. morb. Lib. I. Cap. V. Charter. Tom. VII. pag. 732.

(m) Sect. V. Aphorism. 32. Charter. Tom. IX. pag. 233.

(n) Observat. rar. medic. Anat. chirurg. Tom. II. observ. 17. pag. 196.

Plures deinde citat auctores, qui similia observata memoriae reliquerunt: inter haec notabilis recensetur casus quadragenariae Matronae, cui talis vomitus Periodicus, loco fluoris menstrui per biennium suppressi, familiaris erat; dum autem a Chirurgo stiptica propinarentur, pessime inde se habuit. *Timaeus*, celebris Medicus, quaevis tentavit, ut suppressa revocaret menstrua, sed absque ullo fructu. Cum ergo facile ferret haec aegra cruentum vomitum, soli naturae rem commisit. *Duraverunt autem hi vomitus usque ad quadragesimum octavum annum, quo sponte desierunt, valetudine corporis deinde variis morbis tentata subinde, ut plerumque deficientibus per aetatem mensibus fieri solet.* Optime simul monet, tuto quidem tentari posse vasorum uterinorum reperationem, sed antequam hoc factum fuerit, periculosum esse talem cruentum vomitum compescere, cum mala symptomata, & mors ipsa, secuta fuerint perversam talem curandi methodum, uti pluribus probat exemplis.

Alvum. Ex ipso oesophago, & ventriculo, sanguinem in intestina venire, & dein per alvum exire posse, satis patet. Verum & ex vasis mesentericis in intestina derivari posse periodico tempore sanguinem, dum menstrua supprimuntur, dubium non est. Alia occasione, ad §. 719., ubi de diarrhoea febrili agebatur, citatus fuit ex *Galeno* (o) sequens textus: *At visa est quoque mulieribus, suppressis mensibus, huiusmodi per sedem sanguinis vacuatio fieri; ut & nonnullis per vomitum ob eandem causam. Verum & his quidem sincerus sanguis excernitur, similis ei, qui a maciata victima profunditur, modo per alvum inferiorem, modo per superiorem.*

Huc etiam refertur illa sanguinis evacuatio, quae per vasa haemorrhoidalia fit. Vicinia partium, & vasa similia, multum faciunt, ut per haemorrhoides sanguinis evacuatio fiat, dum menstrua supprimuntur; unde & *Hippocrates* (p), alioque in loco (q), dum recenset morbos, qui variis aetatibus contingunt, ante pubertatis tempus haemorrhoides non apparere monet, uti etiam non post annum quadragesimum secundum. Verum iisdem fere temporis limitibus fluor menstruus definitur. Testantur celebres Medici, in curanda mensium suppressione se mirum, & promptum effectum habuisse, ab Hirudinibus ad Haemorrhoides admotis (r). Plures novi mulieres, quibus singulis mensibus, & per haemorrhoides, & ex utero, sanguis fluit, uniusque copia alterius defectum pulcre supplet. Quin imo quidam voluerunt, Haemorrhoides non tantum in intestino recto, sed & circa uterum, deprehendi. Sic enim legitur: *Haemorrhoides quidem raro in mulieris sinu inveniuntur, sed frequentius in collo matricis, & ejus orificio, nasci solent* (s).

Vesicam. Dum *Galenus* (t) recenset symptomata, quae suppressionem menstruorum sequi solent, sic habet: *Ac praeterea lumborum, & colli, ac*
capitis,

(o) De loc. affect. Lib. V. Cap. ultimo. Charter. Tom. VII. pag. 503.

(p) Coac. Praenot. N. 522. Charter. Tom. VIII. pag. 883.

N. 512. pag. 882.

(r) Freind. Emmenolog. pag. 103.

(s) Harmon. gynaec. part. poster. Spach. pag. 33.

(t) De locis affect. Lib. VI. Cap. 5. Charter. Tom. VII. pag. 524.

(q) Ibidem

capitis dolor, & oculorum baseos, item febres ardentes, & urinae nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac si carniū recens maculatarum loturis fuliginem miscueris &c. Notum est, sanguinem, five ex renibus, ureteribusque, five ex vesica effluerit, profunde fuscum colorem, fere instar potus caffae, acquirere, dum urinae miscetur. Talis sanguinis evacuatio, menstruorum defectum supplens, observata legitur apud *Hollerium* (u); *Est quidam mictus sanguineus, criticus, & intervallis quibusdam motus, qualis fuit in Moniali muliere, cujus meminit Musa, quae singulis mensibus, suppressis menstruis, multum sanguinem emingebat.*

Mammæ. Cum tam manifestum commercium sit inter mammæ, & uterum, uti antea jam saepius monitum fuit, minus mirum videbitur, si suppressis menstruis sanguis in mammæ derivetur, & per papillas exeat. Dixit *Hippocrates* (v); *At conclusi uteri menses ad mammæ remittunt, & ad pectus adscendere cogunt.* Noverat *Paræus* (x) foeminam, cui singulis mensibus per mammæ exhibat sanguis menstruus, sic ut tribus, quatuorve mantilibus opus fuerit ad hunc sanguinem excipiendum. Dum quadragenaria mulier subita excandesceret ira, fluentibus menstruis, mox e papillis prorupit sanguis, & quidem adeo copiosus, ut reliquum corpus prolueret (y). Aliquot similes casus me vidisse, memini.

Per cutim. Quamvis enim vasa cutanea tenuiores tantum humores transmittant, tamen sic dilatari poterunt, ut & sanguinem fundant. Saepe observatum fuit, aestivis caloribus, per validos labores, sudorem expressum rubro colore maculasse indusia, omnium maxime circa axillas. *Mercatus* (z) testatur, quod jam ter viderit, per minimum manus digitum, & per annularem sinistrae manus singulis mensibus sanguinem profundi, non copiosum, in religiosa quadam foemina, cui natura menstruam purgationem per uterum denegaverat. Mirabile aliud exemplum propriis oculis vidit *Zacutus Lusitanus* (a) in virgine rustica, triginta & quatuor annorum, ad quam a binis medicinae studiosis adductus fuit, dum patiebatur periodicam sanguinis evacuationem, quae menstrui floris vices supplebat: vidit enim, e pedis sinistri pollicis parte interna pulposa, juxta unguem, emanare rivulum sanguinis meri morose, & lente super phialam aqua calida plenam. Per triduum, aut saepe quatrimum pergebat haec evacuatio, dein occluso foramine, rusticos labores exercebat absque molestia. Septies intra decennium affirmabat contigisse, ut minori solito copia sanguis per hunc locum efflueret, tuncque dolor capitis, aut febris supervenerant: tunc autem venae sectio, in altero pede, dextro nempe, instituta, remedio erat. Dum enim in sinistro pede, Medico sic jubente, vena secabatur, in pollice, & genu vehemens dolor excitabatur, & per annum minus feliciter contingebat solita haec sanguinis evacuatio.

Vul-

(u) Oper. Practic. Lib. I. cap. 52. pag. 436.

Cap. 20. Charter. Tom. VII. pag. 807.

24. Chap. 62. pag. 631.

pag. 342. Observat. 79.

(a) Oper. Tom. 2. pag. 494.

(v) De mulier. morb. Lib. 2.

(x) Oeuvres d'Ambr. Paré Liv.

(y) Stalpart van der VViel Observat. rar. part. I.

(z) De Mulier. affect. Lib. I. Cap. 7. pag. 469.

Vulnera. Testatur Paracelsus (b); quod viderit cuidam vulneratae sanguinem menstruum non per consueta loca, sed per vulneris sinum effluxisse. Verum hoc raro contingit: frequentius vero

Per ulcera. Satis notabilis casus legitur (c), quo hoc demonstratur. Sanae, robustae, puellae rusticae pes dexter distorquetur quinto decimo aetatis anno: simile infortunium contingit iterum, dum novemdecim annos habet; & tunc sordidum ulcus in loco affecto sequitur, quod trium septimanarum spatio sanatur: paullo post tota languere incipit; vigesimo anno prima prodeunt menstrua, sed parca valde copia. Cum pergeret languere, vena saphaena fecatur in dextro pede: paullo post ulcus in malleolo nascitur, quod per quinque annos duravit, & notabilis pars ossis calcis exivit de ulcere. Per hoc ulcus, singulis mensibus, binorum, triumve dierum spatio, exhibat sanguinis illa copia, quae per menstrua evacuari solet, & stata periodo ulcus fundebat sanguinem, intermedio autem tempore nihil omnino. Aliquot diebus ante hanc evacuationem validum patiebatur in pede dolorem, qui minuebatur, dum haemorrhagia rediret ex ulcere. Tandem separatis ossibus corruptis, ulcus consolidari incepit, totum corpus torosum magis, & validum reddebatur, tuncque naturali via fluor menstruus prodiit, simili copia, & totidem diebus, ac antea ex ulcere solebat exire. Postea sana vixit, regularem fluorem menstruum per solita loca habens, & nihil sanguinis amplius effluxit per ulcus, nondum integre clausum.

Sic patuit satis, sanguinem menstruum, dum per solita loca exitum non habet, per diversas corporis partes viam sibi facere. Credidit *Celeberrimus Ruyschius* (d), se habere rationem dubitandi, annon quandoque sanguis menstruus in cava corporis delapsus colligeretur. In cadavere enim menstruatae coagulatus sanguis leviter adhaerens cavi uteri lateribus inveniebatur, *quod tuba ejusdem lateris non solum erat conspersa, verum etiam ovarium, in cujus superficie coagulatus copiose, firmiterque adhaerebat.* Servavit hunc uterum in thesauris suis, cum ovario annexo, & sanguine coagulato, balsamo conditum, ut omnibus demonstrari posset. In reliquis casibus antea recensitis sanguis exibat de corpore, licet per vias alienas; hic in cavum corporis effusus corrumpereetur, quod adhuc longe periculosius foret.

Plures certe alii casus possent colligi, multos & mihi videre contigit, omnium maxime in juvenculis, dum circa primam eruptionem menstruum valido terrore, vel alio gravi animi affectu turbantur. Talis casus legitur (e) de puella, quae tertia menstruum periodo gravi lapsu sanguinem vomuit, dein suppressis mensibus vel integre, vel saltem paucissima copia se monstrantibus tantum, per viginti novem integros annos miserrimam vitam duxit, fre-

(b) Chirurg. Magn. part. I. Tractat. I. cap. II. pag. 8.

observat. Tom. III. N. 29. pag. 380.

centur. N. 85, pag. 80.

pag. 306.

(c) Medic. Essais and

(d) Observat. Anatom. Chirurg.

(e) Med. Essais and observat. Tom. II. N. 20.

frequentissimis haemorrhagiis obnoxia, per os, nares, aures, oculos, alvum, mammas, digitos manuum, & pedum circa unguium radices.

Unicum adhuc addam casum, quem propria Celeberrimi Boerhaevii manuscriptum, in scriniis post mortem repertum mihi concesserunt haeredes. Puellae decem annorum, ob luis suspicionem, datae fuerant pilulae Mercuriales, una cum decocto lignorum, satis felici cum successu. Post novem menses sensit dolorem tensivum in brachio dextro; eruperunt pustulae non paucae, in quibus pungentem dolorem percepit, & paullo post vivus sanguis profiliit ex pustulis; quo facto, omnes pustulae evanuerunt, nullo relicto vestigio; simul omnis dolor cessabat in brachio. Post mensem, dum duodecimum ingrediebatur annum, omnia eadem redierunt, sed excipiebat haec primus fluor menstruus, qui & rediit sequente mense post praegressam per pustulas brachii haemorrhagiam.

Ut in debitum ordinem redigerentur menstrua, adhibita fuerunt Emmenagoga, venae sectio in pede instituta, hoc cum effectu, ut absque brachii haemorrhagia praegressa, redirent menstrua loco, ordine, quantitate debitis. Cum autem rigida hyems foret, si digitus manus dextrae frigerent, mox ex illorum apicibus stillabat affatim sanguis absque ullo fissurae, vel pustulae vestigio. Calore foci, manicis, dein tempore verno cessit malum, & per quatuor menses fluor menstruus copia, & periodo solitis prodiit.

Deinde, posthabita circuitus menstrui lege, quotidie, vel & alternis diebus, quandoque omni octiduo per cutim digitorum brachii dextri guttatim stillabat sanguis, nec oculus detegere poterat in cute absterfa aperturam ullam, per quam sanguis exiverat. Contigit postea, ut dum mane ex digitis stillaverat sanguis, post meridiem vertigine corripereetur cum rubore faciei; mox larynx in tumorem extus conspicuum attollebatur cum suffocatione quasi hysterica: paullo post de colli parte anteriori plures fonticuli sanguinei promanarunt, & mox vertigo, rubor faciei, laryngis tumor una cum suffocationis sensu aberant.

Alio tempore inflabatur hypochondrium dextrum cum acerbo dolore, qui cessit, emplastro aromatico applicato. Venae sectione in pede instituta, antihysterics, emmenagogis, balneis adhibitis, remiserunt quidem haec mala; sed suppresso manente menstruo fluxu, quamvis fere corporis partem aggressa fuerunt.

De repente erubuit facies, mox larga aderat narium haemorrhagia, qua nondum cessante, intumuit larynx, & sanguine per colli anteriora exsudante detumuit denuo; una & eadem die ex brachio dextro, & sura pedis dextri sanguis stillabat; sub vespere spasmus per totum dextrum corporis latus aderant; mente tamen constante. Post oculi, labia, collum, manus, genua convellebantur alternatim, & ventriculus admodum intumescerebat: hora decima omnes illae turbae compositae erant: supererant tantum brachii dextri laxa immobilitas, & extensio impossibilis genu dextri. Manebat cardialgica Epigastrii inflatio, & sequebatur oculi sinistri (quae sola pars huius lateris afficiebatur) amaurosis.

Ten-

Tentatis variis remediis, restituta fuit brachio dextro mobilitas; sed venter non detumuit, nec crus extendi potuit, nec rediit oculo sinistro visus.

Post mensem circiter oculus sinister subito intumuit, paullo post lacrymae sanguineae affatim fluxerunt, nec tamen emendabatur amaurosis. Sequebatur dein fudor sanguinis ex cute nasi, quae saccum lacrymalem finistram tegit, post haemorrhagia narium, quam mox exceperunt sputa sanguinea, & sanguinis rivuli ex unguibus digitorum manus dextrae profilientes, & ex brachii latere, quod digitum minorem respicit. Sura dextra simul intumuit; verum ille tumor absque fudore cutis sanguineo evanuit. Post biduum, terrore percussae, sanguis ex oculo sinistro stillavit, uti etiam ex brachio, & manu dextris juxta decursum majorum venarum, sed non copiosus.

Emplastrum hystericum abdomini applicatum fuit, Emmenagoga, balnea, hystERICA anodynis mista adhibita: menstrua, per bimestre spatium suppressa, prodierunt, sed pauca copia, & detumuit abdomen.

Hic definit miri morbi historia in manuscripto. Patet inde, quam varia, & mirabilia mala sequi possint suppressionem menstruum, & simul confirmantur illa, quae ante dicta fuerunt de variis, & mirabilibus viis, per quas sanguis ille, naturaliter per uteri vasa evacuandus, exitum quaerit.

§. 1287. **V**EL & saepe labefactantur inde omnia viscera, oriturque partim a putredine concepta, partim a vasis laevis infinitum morborum genus (106).

Antea ad §. 1285. dictum fuit, omnes fere functiones, naturales, vitales, animales laedi a menstruum suppressione, partim a retento sanguine, qui naturali lege evacuari debebat, partim ab utero irritato, qui regiminis actione variis visceribus nocere potest, vel saltem illorum actionem turbare. Ex illis, quae praecedenti paragrapho dicta sunt, constitit, quam varios, & mirros morbos producere possit sanguis menstruus, dum non exit per consueta loca, sed per insolitas vias erumpit de corpore.

Verum tunc purus, & bonus sanguis exire observatur, qualis de victima fluit, ut *Hippocrates* dixit. Si autem vel in uteri substantia, vel in aliis visceribus congestus, mora corrumpi incipit, & acris fieri, longe pejora mala metuenda erunt. Postea ad §. 1290. patebit, stagnantem in uteri cavo sanguinem, si aer libere accedere non possit, diu incorruptum manere; tamen tandem longiori mora omnino degenerat, & pessima mala producere potest. Observatur toties, sanitatem languere in foeminis illo vitae tempore, quando fluor menstruus naturaliter cessare solet, quanto magis id continget, ubi menstrua praeternaturaliter supprimuntur. *Manningham* in utilissimo, quod scripsit, artis obstetricariae compendio (f) notat, quod plures mulieres inter annum quadragesimum quintum, & quinquagesimum moriantur, quam in quovis alio vitae stadio. Antea in Capitulo de Scirrbo monitum fuit, illo tempore

Scir.

Scirrhus, & Cancros frequentissime observari. Corrumpi autem per moram retentum sanguinem menstruum, *Hippocrates* (g) monuit: *Et postquam duo, aut tres menses praeterierint, interdum ei per pudendum menstrua confertim erumpunt, & quae prodeunt, velut carunculae esse videntur, velut ex corruptione, & nigra sunt.* Notat simul a corrupto tali, & acri sanguine ulcera in utero fieri cum vitae periculo, uti antea ad §. 1285. notatum fuit. Imo ex sola muliebrium mensium multitudine, si nempe non rite prodeant, multa mala alio in loco praefagit (h); *Lumborum distensio ex muliebrium mensium multitudine ad suppurationem tendit: & varie prodeuntes, viscosi, graecolentes, strangulatorii menses, ex praedictis ad suppurationem tendunt. Arbitror autem tales etiam aliquantum delirare.* Unde non inepte dixit *Helmontius* (i), de menstruo agens: *Primo peccat abundantia bona, dein superfluitate onerosa, mox privatur vita, & virus evadit.*

Quaenam mala metuenda sint a sola abundantia nimia sanguinis boni, & quomodo inde vasa nimis distracta rumpantur, antea ad §. 106. pluribus dictum fuit. Ubi autem stagnantibus humoribus per moram accedit major acrimonia, tunc & magis laedentur vasa, & difficiliore morbi sequuntur, sive in utero ipso, sive in aliis visceribus, per quae fluor menstruus retentus viam invenit, quandoque manente vasorum integritate, dilatatis tantum extremis, quandoque iisdem erosis, uti ante dictum fuit, quod multo pejus est. Unde etiam apparet ratio, quare *Hippocrates* (k) dixerit: *Morborum omnium uteri causae sunt.*

§. 1288. **C**ognoscitur hic morbus: 1. Ab aetate. 2. Incremento corporis jam perfecto. 3. Plethora. 4. Signis deinde morbi subsequenter.

1. Ad §. 1284. notatum fuit aetatis tempus, quo prima menstrua prodeunt, varium esse in diversis regionibus; imo vidi aliquoties in eadem familia magnam diversitatem adfuisse, dum quaedam biennio citius, quam sorores menstruantur, licet omnes optima fruerentur sanitate.

2. Quid de hac re sentiendum sit dictum fuit §. 1284.; tuncque patuit, fluorem menstruum non semper sequi perfectum jam corporis incrementum, sed saepius praecedere.

3. Quid de plethora tanquam sola, & unica menstrui floris causa sentiendum sit, pariter ad §. 1284. dictum fuit. Verum quidem est, quod circa menstruorum eruptionem saepe magis rubescant in facie, major appareat in oculis vivacitas. Frequentissimum indicium dant mammae turgentes, dum uterus se parat ad primam menstruorum eruptionem. Caeterum de

(g) De Mulier. morbis lib. I. cap. 6. Charter. Tom. VII. pag. 732. 733. (h) Coacar. Praenot. N. 324. Charter. Tom. VIII. pag. 870. (i) In capitulo Lunare tributum pag. 584. (k) De locis in homine cap. 18. Charter. Tom. VII. pag. 376.

de plethorae signis dictum fuit ad §. 106., quae si non adsunt, de plethora non est cogitandum. Quandoque enim contingit, menstrua non apparere solito tempore, vel si jam fluxerint, denuo cessare ob Cacochymiam lentam, pituitosam, frigidam: in talibus deficit sanguis ruber; genae, labia, gingivae pallent; vena secta, pauculum sanguinis rubelli concreti innatat copioso sero, quod quandoque mucosam visciditatem habet. In talibus puellis, si cura plethorae tentetur, omnia in pejus ruunt; emendanda enim est haec cacochymia. Uti enim ad §. 1285. monitum fuit, tales aegrae menstruis carent, quia morbo laborant, qui causa fuit, cur defierint menstrua, non vero effectus menstruorum deficientium.

4. Hic iterum magna attentione opus est, ut noxii errores in praxi vitentur. Circa illud tempus aetatis enim, quo menstrua prodire solent, virgo corripitur poterit aliis morbis, qui non pendent ab instante menstruatione, sed a longe aliis causis, & tamen omnia, quae contingunt hoc tempore, huic unicae causae tribui solent, non tantum a mulierculis, sed & quandoque a Medicis, minus saepe attentis ad singula, dum numerosa praxi obruuntur potius, quam occupantur. Novi, cogitatum fuisse de Emmenagogis validis exhibendis, dum susceptum variolarum contagium, una cum horrore, & levi febre, dolorem dorsi cum rubore faciei produxerat. Urgente matre aegrae, prudentior Medicus in consilium vocatus vix potuit obtinere viginti quatuor horarum moram, ut certior morbi Diagnosin haberi posset, antequam Emmenagoga adhiberentur.

Praeterea nimis saepe sollicitae matres, dum certum tempus aetatis adest, cogunt fere Medicos, ut omnia artis molimina adhibeant, a quibus menstruorum eruptio sperari potest.

Naturae tamen opus est sensim sic disponere uterum, ut menstruum sanguinem dimittat, dilatatis lente vasorum extremis: patuit autem ex antedictis, hoc vario aetatis tempore fieri in variis. Nunquam me poenituit, quod spectatorem egerim in simili casu, & astu medico, sed licito, utens talia dederim tantum, quae minime turbare poterant corpus, nec augere humorum motum, ut viderer aliquid agere, dum nihil agerem, sicque importunis me liberarem querelis.

Contigit enim saepius, ut dum per plures menses calidis stimulantibus remediis tentaverant menstrua educere, alios morbos produxerint, vel & frequentibus balneis sic debilitaverint uterina vasa, ut prodierint menstrua quidem, sed postea fluxerint nimia copia, & singulis fere septimanis redierint, non sine sanitatis detrimento, & sterilitatis metu.

Idem verum est de copia fluoris menstrui, quae non tanta est, ut multi crediderunt, prout antea monitum fuit; & diversa est in diversis mulieribus, sanis tamen, & foecundis, pro varia temperie, & vivendi genere.

Ubi ergo solitum aetatis tempus adest, mammae fororiari incipiunt, subitum corporis incrementum observatur, facies magis florida est: si tunc dolor lumborum, & spinae dorsi, tensio circa cervicem, & inguina, cum obtusi doloris sensu, percipiuntur, novimus, corpus muliebre disponi ad menstruorum eruptionem. Molli balneo, frictionibus crurum, & femorum,

lenioribus emmenagogis, incepta naturae molimina juvare tunc licet. In quibusdam, licet rarius, absque ulla molestia fluunt prima menstrua, & plerumque semel sic apertis uteri vasis sequentes periodi sine modo enarratis symptomatibus pergunt, vel saltem eadem leviora sunt, & minus frequentia.

§. 1289. **P**ro solutione requirit varia remedia respectu variae causae.

Curatio requirit, ut justo tempore, & debita copia fluor menstruus prodeat. Cum autem variae possint esse causae, diversa etiam medendi methodus postulatur. Adeoque nihil generale hic statui poterit, sed requiritur sedula indagatio causae, ob quam suppressio menstruorum fit, ut possit felix curatio fieri. Si enim decantatissima etiam darentur Emmenagoga, dum viae, per quas exire debet sanguis, clausae sunt (de qua re mox agetur), nocerent haec pessime, proderent nunquam. Si in pallida, Leucophlegmatica virgine omnes functiones langueant ob boni sanguinis defectum, frustra tentatur menstrui floriseductio, antequam prius sic roboretur flaccidum, & debile corpus, ut ex ingestis bonus sanguis vi viscerum, & vasorum confici possit. Si e contra vasa uterina nimis constricta difficulter sic dilatari possint in extremis suis, ut sanguinem transmittant, opposita requiritur medela; mollissimis enim remediis, externo, & interno usu adhibitis, vasorum resistentia minui debet: sic etiam de reliquis, de quibus ergo singulatim agendum erit.

§. 1290. **Q**uas inter naturalis, vel superveniens pudendorum concretio manum Chirurgi requirit, debito instrumento, debito vulnere viam facientis.

Licet debita sanguinis boni copia adsit, & vasa uterina debito tempore illum transmittant in cavum uteri, nisi exitus pateat per os uteri in vaginam, & ex hac extra corpus, menstrua supprimentur. Numerosa enim observata docuerunt, sic aliquando concrevisse pudenda, vel transversim posita in cavo vaginae membrana ita impeditum fuisse exitum, ut omnino nihil sanguinis effluere posset.

Haec autem concretio pudendorum quandoque *naturalis* est; si nempe a prima nativitate adfuerit; unde obstetrices monentur, ut in recens natis caute inquirant, an circa pudenda aliquod vitium observetur. Facile autem patet, tunc tantum posse detegi illam concretionem, quae in pudendi labiis obtinet, minime vero aliquod impedimentum, quod altiori loco in vagina, vel in ipso uteri ore adesset, cujus noxae vix observantur, antequam menstrui floris debitum tempus adsit.

Frequentius tamen talis concretio post morbos harum partium, excoriationes, inflammationes, ulcera &c. sequitur; & tunc *superveniens* vocatur.

Potest autem tale impedimentum adesse vel in orificio uteri, vel in vagina,

gina, vel & in utrisque, quod tamen raro contingit. Sub vaginae nomine etiam comprehenduntur pudenda, externa dicta.

Primo dicetur de impedimentis, quae uteri orificium claudunt, sic, ut menstrui floris sequatur suppressio.

Antiqui Medici has suppressorum menstruorum causas observaverunt. Sic enim apud Hippocratem (l) legitur: *Si uteri indurati (schirrosi) fuerint, os asperum redditur, & menses delitescunt.* Paulo post addit: *Et eorum osculum clauditur, neque concipit. Quum sic habuerit, si digito contigeris, os asperum deprehendes, neque digitum intromittit.* Similia repetit in sequentibus (m). Praeterea alio in loco (n) diserte mentionem facit membranae, orificium uteri obturantis. Sic autem habet: *Si genituram non recipiat, mensibus secundum naturam prodeuntibus, membrana ori uteri praetenditur, quod etiam aliis ex causis contingit. Id autem cognosces, si digito ad attrectandum immisso, obicem attigeris.* Verum quidem est, quod hoc loco dicat, in sterili tali muliere menstruum fluorem naturaliter prodire; sed non facile concipitur, quomodo menstrua exire possint, dum membrana uteri orificio praetenditur, quae impedit, ne genitura ab utero recipi possit. Hinc verosimile videtur in textu omissam fuisse particulam negativam *μη*.

Alio enim in loco (o) eadem repetit omnino, & in variis lectionibus (p) ad hunc textum notatur, ex Calvo, quosdam codices loco *ἐρχομένων* habere *μη ἐρχομένων*. Tunc autem textus satis facilis foret totius illius capituli, quod ita incipit: *Quod si diu non concipiat, non apparentibus mensibus &c.*

Deinde sequitur textus modo citatus, qui tunc sic legendus foret: *si mulier genituram non recipiat, mensibus non secundum naturam prodeuntibus &c.* In primo textu menstrua deficiebant omnino; in secundo non fluebant secundum naturam, forte parca tantum copia ex solis vaginae vasis, per quae quandoque etiam in gravidis sanguinem exire, antea monitum fuit. Quidquid sit de hujus textus emendatione, saltem hoc constat, Hippocratem mentionem fecisse membranae, quae praeternaturaliter orificium uteri occludebat.

Anatome confirmavit evidenter, quod tale floris menstrui impedimentum adfuerit, sicut videri poterit (q) in Academia Parisina, uti ad §. 1285, dictum fuit.

Celebris Chirurgiae Professor, Antonius Benevoli (r), insignem casum narrat, ubi felici errore catheterem tentans in vesicam introducere, ut ischuriam levaret, eundem in vaginam, & os uteri immisit, sicque puellam octodecim annorum, a suppressis mensibus tumidissimam, ex ipsis orci faucibus eripuit. Cum enim haec urinae suppressio orireretur inde, quod distensus admodum uterus comprimeret vesicae collum, non potuit, nisi difficul-

cul-

(l) De Natur. mulieb. cap. 37. Charter. Tom. VII. pag. 707. (m) Ibid. cap. 39. pag. 708. (n) Cap. 68. ibid. pag. 715. (o) De Mulier. morb. lib. I. cap. 20. Charter. Tom. VII. pag. 743. (p) Ibid. pag. 899. N. 129. (q) Académ. des Scienc. l'an 1704, hist. pag. 33. (r) Dissertazioni &c. e Osservazioni pag. 79. & seq.

ficulter, in vesicam introducere catheterem; quod, dum sequenti mane denuo tentaret, per integram horam non successit; unde mutato aegrae situ, conatus fuit illud perficere, licet minus distinguere posset in illo situ, annon catheter aberraret a via. Credebat tamen, se immisisse catheterem ad sphincterem vesicae usque: cumque & diuturnae morae impatiens, & aegram levare cupiens, parum fortius adigeret instrumentum, per catheterem exivit obscuri coloris liquor, faecum vini instar, quem habebat pro urina sanguinolenta. Noverat enim, paucas sanguinis guttas tingere posse simili colore urinam in vesica contentam. Cum autem magna copia talis colluviei (ad quantitatem triginta duarum librarum) evacuaretur per catheterem, vidit magno cum impetu exire urinam limpidam, sed non per catheterem, & inde novit, quod instrumentum hoc non pervenerit in cavum vesicae, sed penetraverit in cavum uteri: nullam enim in vagina invenerat resistentiam. Mox aegra ingens levamen sensit, & laeta narravit totam morbi sui historiam: nempe, quod nunquam menstrua ipsi prodierant, jamque a triennio sensim inceperat tumere abdomen; & quod singulis mensibus, certis quibusdam diebus, cum levis doloris sensu, auctus esset tumor abdominis, donec ad enormem illam magnitudinem pervenisset.

Sequenti mane, digito in vaginam immisso, invenit verum esse, quod crediderat, osque uteri dilatavit, ut libere effluere posset spissior materies, quae adhuc uteri cavo continebatur, hoc effectu, ut mensis spatio crassa prodirent cum membranis corruptis: hanc autem evacuationem promovit, dum uteri internam superficiem deterfit, injecto decocto herbarum vulnerariarum cum melle rosato. Postquam autem insigniter jam minuta erat illius materiae evacuatio, atque illa jam esset boni coloris, injecit vinum myrrhatum, sicque post binos menses sana haec puella in patriam abiit. Post octo tamen, vel decem annos rediit, quaedam hysterica symptomata patiens, quae inde credebantur ortum ducere, quod omni Medicorum diligentia non potuerit restitui menstruus fluor. Mirabatur hoc Egregius *Benevoli*, cum in tribus aliis puellis, quae menstruum suppressione laborabant, quia membrana claudens orificium vaginae exitum impendebat, dum dissecta hac membrana viam parasset collecto sanguini, rediret ordinata menstruum periodus. Optime autem notat, quod in priori casu, per integrum triennium morante in utero sanguine, sic mutata fuerit uteri interna superficies, ut vasorum uterinorum extrema aperiri non potuerint ita, ut menstruum sanguinem dimitterent.

Sponte patet, in tali casu nihil aliud superesse remedii, nisi ut prudentis Chirurgi manu pertundatur membrana, os uteri claudens, & dein sensim dilatetur, uti in hoc casu factum fuit. Dum os uteri connivebat, jussit *Hippocrates* (s) sequentia: *Copiosa calida lavato; & quae os emolliunt, apponito; immissoque specillo aperito; quod per digitum eodem modo facito.* Et alio in loco

co

(s) De Natura Muliebri cap. 39. Charter. Tom. VII. pag. 708.

cd (t) dicit: *Quum vero lota, & fota fuerit, os uteri specillo stanneo, aut plumbeo dilatato, simulque, si opus fuerit, dirigit, a tenui auspicatus; deinde crassiore, si admiserit, donec probe habere videatur. Specillum autem emolliente, quodcunque conducere videbitur, dissoluto, & liquido reddito, intingito. Specilla lata posteriore parte conficito &c.* Alibi (u) notat sequentia: *Quum mulier genituram excipere non potest, membranam uterorum osculo adnatam esse, omnino necesse est. Hanc autem videtur consumere voluisse per aeris florem, fel tauri &c.* Tutius certe pertunderetur talis membrana, cum ab acrioribus remediis laedi posset os uteri, adeo sensile. Imo paullo post (v) ipse Hippocrates monet: *Nihil acre adhibendum. Si enim os uterorum exulceratum fuerit, quum inflammatum fuerit, periculum est, ne prorsus sterilis fiat.*

Omnia autem facillime prodibunt menstrua, si vasis uterinis debito tempore dilatatis, & apertis, sanguis libere per uteri os molle, & facile cedens exstillet. Ad hoc autem requiritur, ut uteri os e directo vaginae sit positum, uti naturaliter fieri solet. Observatur quandoque, uti postea in partu difficili dicetur, os uteri a recto hoc situ declinare versus anteriora, posteriora, vel & laterales pelvis partes. A perverso hoc situ poterit nasci difficilior effluxus sanguinis menstrui, imo & integre supprimi, prout vel partim, vel integre os uteri partibus vicinis adpressum conniveat, vel obturetur omnino. Unde ab utero averso fluxum menstruum impediri, monuit Hippocrates (x). Et alibi (y), *Si uteri ad coxendicem decurrerint, tum menses non prodeunt, tum dolor ad imum ventrem, & ilia pervenit; ac si digito contigeris, os in coxendice deprehendes.* Monet etiam, quandoque uteros ad medios lumbos se convolvere (z). Et paullo post (a) subjungit; *At quibus osculum alio inclinat, & in coxendicem incumbit (haec enim etiam fiunt, uterumque purgari, & genituram suscipere, liberosque procreari prohibent) hanc odoratis fovere oportet, & post fomentum digito revellere, & a coxendice abducere, posteaque taedulis, & plumbea fistula dirigere; neque enim celeriter cogetur, ut dictum est.* Similia his pluribus in locis apud Hippocratem habentur. Fomenta mollia commendabat prae reliquis, & post horum usum suadebat, ut digito immisso ad naturalem situm redigeretur os uteri. Videtur etiam quandoque post emollientia adhibita usus fuisse acrioribus, ut horum vapore irritatus uterus contraheretur, sicque situm mutaret. Ita suadet (b); *Copiosa calida lavandum, & uteri fovendi, urinaque vetus infundenda, & fervesacienda, & supra pelvis cavitatem mulier, vestibis contecta, collocanda. Ubi autem urina refrixerit, massae ignitae in urinam injiciendae, & fomentum adhibendum, quoad se obtuse cernere, & animo deficere dicat.* Patet ergo, os uteri clausum, distortum, induratum posse esse causam suppressionis menstruum; uti etiam, si perverso situ orificii uteri impediatur liber exitus sanguinis men-

(t) De Infecundis cap. 8. Charter. Tom. VII. pag. 847. (u) Ibid. cap. XI. pag. 851. (v) Ibidem cap. XIII. pag. 853. (x) De locis in homine cap. 18. Charter. Tom. VII. pag. 376. (y) De Natura Muliebri cap. 8. Charter. Tom. VII. pag. 685. (z) De morbis Mulierum lib. 2. cap. 19. Ibid. p. 807. (a) Ibid. cap. 20. (b) Ibid. cap. 23. pag. 813.

menstrui in cavo uteri contenti. Simul etiam constat, has causas saepe satis difficulter indagari posse.

Frequentius occurrit concretio pudendorum, exitum impediens, vel & membrana, vaginae cavum dividens in duas partes, sic, ut sanguis ex utero delabens retineatur. Talis membrana praeternaturalis, licet etiam altiori loco haereat, a sanguine collecto incumbente distracta, descendit ad pudendi orificium usque, & oculis apparet. Sed & hymen, de quo inter Anatomicos multum disputatum fuit, angustat vaginae introitum; naturaliter tamen perforatus est, quod imprimis diductis partibus genitalibus apparet: tunc enim rima oblonga cernitur; si magis diducantur, foramen rotundum conspicitur; si sibi relinquuntur sensim remissae hae partes, hymen concidit, osculum angustatur in formam oblongam, clauditur in rimae speciem; quae omni diductione partium cessante dispareret. Hymenem talem in maturo Embryone invenit, & in infantibus junioribus, provectioribus, in nubilibus, & in virginibus viginti quinque circiter annorum *Celeberrimus Albinus (c)*; &, ut solet semper, accuratissime descripsit, & figuris illustravit. Naturaliter ergo hymen patulam satis viam relinquit sanguini menstruo exituro: verum quandoque observatum fuit degenerasse in membranam densam, quae nullam aperturam habet. Sic *Diemerbroëck (d)* testatur, se in publico theatro secuisse juvenculam viginti trium annorum, in qua illam membranam omnino continuam, nec uspiam pertusam, adeoque firmam invenit, ut cujuslibet fortissime arietantis viri impetum sine disruptione sustinere potuisset. Hae *Atretae*, sive imperforatae dicuntur; quales casus plures in Historia Medica leguntur. Verum non tantum circa orificium vaginae, sed & altiori in loco membrana talis praeternaturalis inventa fuit; qualis casus mirabilis apud *Ruysechium (e)* legitur. Gravida mulier intensissimos partus dolores patiebatur, ita ut clamoribus totam impleret viciniam, neque validissimis conatibus partum promoveri poterat. Vocatus *Ruysechius invenit membranam Hymenem, integram, valde crassam, & a foetus capite, exitum quaerente, foras extensam*. Discindebatur haec membrana forfice, & stylo excavato, ne caput infantis laederetur. Frustra tamen exspectabatur partus. Altera enim praeternaturalis membrana aderat, vulvam profundius claudens; qua pariter incisa, illico in lucem edebatur foetus, vivus, & robustus, superstiti matre, quae post aliquot septimanas optime convaleuit, & una cum prole pancreaticae vivebat, dum mirum hunc casum publico communicabat *Ruysechius*. Mirum est, duplici tali obstaculo non impeditam fuisse foecunditatem in hac muliere; de qua re dicendum erit in sequenti capitulo.

Facile patet, menstruorum suppressionem, a tali causa natam, non posse curari, nisi tollatur illud impedimentum Chirurghi manu. Tale impedimentum adesse cognoscitur, si debito aetatis tempore symptomata adsint fluoris menstrui instantis, nec tamen prodeat: si singulis mensibus eadem symptomata.

(c) Academ. Annot. Lib. IV. cap. X. pag. 49. & seq.

(d) Anat. Lib. I.

cap. 26. pag. 149.

(e) Observat. Anatom. Chirurg. Centur. Observ. 22.

pag. 21.

mata redeant, simulque uterus turgens magis magisque tumere abdomen faciat; si tumor ille inferiorem abdominis locum occupet, sphaericus, mollis, aequabilis; nec illum premendo ullus sentiatur motus infantis (*f*); si diu duraverit hoc malum, abdominis tumor adeo augetur, ut superet multum ventris molem, quae in gravida muliere adest paullo ante partum. Simul membrana talis a sanguine incumbente tensa in vagina protuberat, quandoque & extra vulvam prominet.

Virginem viginti annorum ob suppressa menstrua jam a multis mensibus valetudinariam, de hypogastrii ponderositate, & dolore intolerabili frequenter conquestam, curavit *Ruyfchius* (*g*) sola incisione cujusdam membranae pone membranam Hymenem sitae, & totam vulvam perfecte claudentis. Mirabatur autem, sanguinem, qui illico a sectione ad libras circiter quatuor maximo impetu erumpebat, neququam coagulatum, multo minus putrefactum, sed nigricantem fuisse. Alius casus legitur (*h*) de virgine viginti sex annorum circiter, cui nunquam menstruus fluor prodierat, sed acerbos dolores tumidi abdominis passa fuerat, auctos singulis tribus, quatuorve septimanis; tandem & tumor in vulva apparuit, quem quidam pro hernia, alii pro uteri prolapsu habuerunt. Dum dexterrimus, & peritissimus Chirurgus *Sannî* omnia sollicitè examinat, invenit tactu liquidum haerere pone hanc membranam, quam lanceola discidit, & mox magna sanguinis copia impetuose prorupit. Membrana illa pergameni habebat crassitiem, nec dolebat, dum discinderetur: evacuato sanguine, os uteri exploravit, quod altiori loco situm invenit, quam solet esse in illis, quae nunquam pepererunt, sed in reliquis naturaliter se habebat. Perfectè curata fuit haec virgo, & post aliquod tempus menstrua debito tempore, & copia fluxerunt: postea viro nupta foecunda fuit, & sana vixit. Sanguis autem, incisa membrana hac, erumpens, boni coloris erat, admodum fluidus, & nullum spirabat foetorem: dum in vase exceptus reponeretur, incepit rarefcere, & fermentari, ita ut transcenderet margines vasis, quamvis illi tribus digitis transversis eminent supra contentum in vase sanguinem. Plures in simili morbo tractaverat idem ille Chirurgus; sed in nulla invenerat membranam adeo densam, nec vaginam adeo exactè clausam.

Contingere etiam potest talis angustia vaginae, ut sanguis menstruus vel omnino non exire possit, vel saltem difficulter admodum; unde in hoc transitu grumescens viam arctam adhuc magis obturat. Dilatari tunc per artem vagina deberet; cuius satis mirum exemplum legitur (*i*) de muliere, cujus vagina per totam suam longitudinem adeo arcta erat, ut magna cum difficultate calamus scriptorium mediocris magnitudinis capere potuisset: unde matrimonium ante triennium jam contractum, cum consummari non potuisset, irritum secundum leges declarandum erat; jamque in procinctu erat

ter-

(*f*) Astruc Traité des maladies des femmes Tom. I. pag. 258.

Anatom. Chirurg. Centur. observ. 32. pag. 31.

(*g*) Observat.

lem Tom. V. pag. 424. & seq.

(*h*) Holl. Maatschapp. te Haerlem Tom. V. pag. 424. & seq.

(*i*) Benevoli dissertazioni &c. e osservazioni

pag. 86. & seq.

termini statuti finis. Causa hujus angustiae in vagina cognita nulla erat. Simul vagina dura adeo erat, ut callosa videretur. Egregius *Benevoli* per aliquot dies fomenta emollientissima applicuit, deinde per totam longitudinem vaginae induxit pessarium ex *radice gentianae* paratum (qua solent Chirurghi uti ad dilatanda fistularum orificia); sensim autem adhibebat crassiora, donec sic dilataretur vagina, ut introduci posset medulla interior, quae in trunco frumenti Turcici continetur; pessarium inde factum, ab affluentibus humoribus turgens, majorem faciebat dilatationem; augebatur successive talis pessarii crassities; ultimo spongia, rite praeparata, in eisdem adhibebatur usus, quae potenter dilatare valet, injecto simul vino myrrhato ad sanandas leves excoriationes, quae forte a pessariis illis dilatantibus oriri potuissent. Redeunti aegrae in patriam suavit, ut subinde repeteret spongiae applicationem, ut stabilis servaretur vaginae dilatatio. Post longum tempus spongiae usum intermisit, literisque datis ad *Benevoli* mandavit, se obtinuisse, quod speraverat.

Similis casus in *Academia Parisina* (k) legitur; sed qui absque artis auxilio sanatus fuit. Foeminae, quae decimo sexto aetatis anno nupserat, vagina erat adeo angusta, ut vix calamum admitteret. Dolorem tensivum in utero sentiebat menstruorum tempore, quae libere non fluebant; unde credebatur vaginam adhuc angustiores esse prope uterum, quam circa exterius orificium. Frustra tentaverat juvenis, & validus maritus viam parare: nihil tentari posse, crediderat Chirurgus. Post undecim annos gravida invenitur, licet vagina aequae arcta foret, ac ante. Omnes de partu futuro desperabant. Verum circa quintum graviditatis mensem sponte vagina incepit dilatari, atque circa finem, instante partu, debitam amplitudinem acquisivit, & mulier felicissime peperit.

Docent bini hi casus, magna prudentia opus esse, antequam statuatur, matrimonii consummationem impossibilem esse ob nimiam angustiam partium genitalium in muliere.

§. 1291. **C**Aeterum, ubi a stagnante liquido, huic conciliabitur fluor. 1. Fotu, & frictu pedum. 2. Apertura venae in pede, & sanguine misso. 3. Purgantibus Uterinis datis. 4. Emmenagogis. 5. Emplastris, fotibus, linimentis, vaporibus, calore. 6. Ipsa vasa a plethora debilitata roborando per Chalybeata, & Astringentia.

Agendum nunc erit de illis remediis, per quae effici possit, ut menstruus fluor, morbose suppressus, denuo solita periodo prodeat. Cum autem antea patuerit, in variis regionibus, vario aetatis tempore, prodire non tantum, sed etiam in eadem regione observari saepe notabilem diversitatem, imo & in eadem familia; hinc prudentia opus est, ne tota sanitas turbetur importunis auxiliis, dum nondum uterus paratus est, ut menstruum sanguinem

(k) L'an 1712. hist. pag. 48.

dimittat: hoc autem naturae, non artis opus esse, antea pluribus demonstratum fuit. Si vel minimum de hac re dubium superfit, mollissimis tantum remediis locus erit; quae nempe sanguinem reddunt meabilem, & vasa ad facilem dilatationem disponunt. Urgere enim, & motum augere per calida, & acria remedia, quae in classe Emmenagogorum recensentur, dum nondum dispositae sunt viae non caret periculo. Vidi aliquoties haemoptoën, validasque narium haemorrhagias secutas fuisse; imo & per alia corporis loca exivisse sanguinem, dum ad prima pubertatis signa a mulierculis dabantur acria Emmenagoga virginibus: saepe tunc contingit, ut difficulter, & longo tempore possit obtineri debita menstruorum per solita loca excretio.

Alterum, quod hic notandum est, menstruum fluorem esse evacuationem sanguineam, adeoque supponere talem in corpore sanguinis copiam, ut absque sanitatis detrimento possit minui. Saepius autem menstrua deficiunt in illis, quae chlorosi, sive pallido dicto virginum morbo, laborant in quo sanguis ruber deficit. Si talibus aegris per venae sectionem dematur pauculum sanguinis, quod adhuc adest, tanto magis languent, & tanto difficilius curantur. Prius ergo in his viscerum, & vasorum robur restituendum est, ut ex ingestis bonus sanguis conficiatur, antequam sperari possit, ut debito ordine menstrua prodeant. Quomodo autem, & per quae remedia, hoc obtineri possit, dictum fuit antea ad §. 28. & 47., & adhuc quaedam dicenda erunt ad numerum sextum hujus paragraphi.

Ubi ergo pallent labia, gingivae, oculi, loca sub oculis laxa, inflata tument, totum corpus molle, frigidum, tumidulum est, ad minimum corporis motum anhelant, hebetes, & adiaphorae quasi ad omnia, languent, & frigent, virgines de Emmenagogis cogitandum non est, antequam per bonam medendi methodum restituta fuerit sanitas. Si vero floridus adsit in vultu color, calor aequabilis sit ad extrema usque, & signa, ante recensita adsint, quae docent, urgeri vasa uterina, nec aperiri tamen, tunc locum habent illa auxilia, quae in hac paragrapho commendantur.

Stagnat autem, vel stagnare incipit, in vasis distentis uteri liquidum, vel quia illud minus meabile est, vel quia vasa nimis resistunt dilatationi requisitae, vel & quandoque utrumque vitium concurrit. Tunc Medici prudenter tentant sequentia.

1. De his omnibus dictum fuit in *Capitulo de obstructione*, ubi simul etiam de derivantibus, attrahentibus, & propellentibus actum fuit. Cum autem pedes, & crura ab iliaceis arteriis externis sua vasa accipiant, uterus ab hypogastricis non tantum, sed ab iliaceis externis etiam, & variis inter se anastomosibus communicent (uti *tabulis Eustachianis* (1) videri potest), facile patet, quare per balnea laxatis pedum vasis, & dein per frictiones accelerato motu in iisdem, major copia sanguinis derivetur versus aortam, ubi in Iliacas dividitur, adeoque & magis tunc urgeantur uteri vasa; sicque sperari possit, illorum extrema ita dilatari posse, ut menstruum fluorem dimittant.

Si-

Simul notandum est, practicis observatis, constare calorem pedum prodesse menstruantibus, frigus autem nocere; imo quandoque subito menstrua supprimi, si admodum frigescent pedes; quod saepius observavi; praecipue si pavimento marmoreo frigido pedibus insistant diu. Solent enim ab hac causa sola, contractis spasmodice intestinis, dolores colici oriri molestissimi, in quibus magnum levamen sentitur, si pedes incaluerint, imprimis per frictiones. Omnia enim abdominis viscera male afficiuntur, dum pedes intense frigent; adeoque mirum non est, & uteri vasa stringi, sicque suppressi fluxum menstruum.

Balnea ergo haec, & frictiones pedum profunt, frigus impediendo, & calorem revocando, ac augendo in extremi corporis inferioribus; dum simul motum sanguinis accelerant, & copiam humorum augent in pedibus, cruribusque. Cum autem extrema inferiora accipiant sanguinem ab Iliacis externis arteriis, uterus vero praecipue ab arteriis hypogastricis; hinc videtur sequi tanto minus urgeri vasa uterina, quanto plus tument, & implentur vasa pedum, ac crurum. Adeoque, si post balnea pedum, ac fomenta adhibita, & per frictiones aucto motu per arterias Ilicas, posset impedi, vel minui trajectio sanguinis per arteriam cruralem, augetur subito impetus, & copia sanguinis per uterina vasa moti, sicque possent removeri obstacula, quae aliis resisterent remediis.

Pulcrum talis methodi exemplum legitur (m). Egregius apud Edinburgenses Medicus, *Archibal Hamilton*, vocatur ad curandam virginem, cui circa vigesimum aetatis annum suppressa erant menstrua per septem fere menses: causa fuerat, quod fluxus menstrui tempore se exposuisset imprudenter frigori. Antea satis commoda sanitate fruebatur. Nullo Medici consilio usa fuerat; pauca tantum muliercularum suavis remedia adhibuerat absque ullo levamine. Color incipiebat pallidior fieri; appetitus, & digestio depravabantur; languor, nausea, & vomitum aderant; pulsus erat tardus, & languidus; lassitudo magna impendebat solitum corporis exercitium. Caeterum nullo unquam pectoris morbo laboraverat, neque dolebant, aut tuebant pudenda.

Duodecim diebus ante solitam menstruorum periodum exponebantur vespere pudenda vaporis aquae tepidae quotidie: post decem dies dabatur purgans aloëticum, a quo alvus quater evacuata fuit. Sequenti die, hora septima vespertina, splenium applicabatur cruralibus arteriis illo in loco, cui solet applicari premens cochlea (*tourniquet*) in extirpatione femoris: fascia circumducta premebatur arteria cruralis a splenio; sed non tam valide, ut mortificationis periculum foret, ob impeditum influxum sanguinis arteriosi in partes inferiores. Eodem tempore vaporis aquae tepidae exponebatur aegra.

Intentio Medici fuerat praesens manere, ut effectum observaret sedulo, sed subito vocatus ad alium aegrum, absuit per viginti horae minuta: dein rediens, invenit pulsum utcumque celeriore: post mediam horam elapsam incepit sentire pondus, & plenitudinem in regione uteri, & languere. Cum vero,

(m) *Essais and observat. Phys. and liter. Tom. II. pag. 453. & seq.*

vero, nec in capite nec in pectore molestiam sentiret, relicta fuit ligatura, & cardiaci remedii cochlear datum fuit. Sesequi horae spatio post primam applicationem ligaturae comprimentis prodierunt menstrua. Cum autem pedes parum stupefcerent, relaxabatur ligatura; nec tamen removebantur splenia, nisi sequenti mane, dum menstrua fluere pergebant absque molestia; & continuaverunt per integrum triduum. Postea autem solita periodo menstrua prodierunt, & integra rediit sanitas.

An simile quid indicare voluit *Aegineta* (n), dum jubet, ubi statum mensium tempus propinquum est, vinculis constringere inferiores partes per tres, vel quatuor dies? Verum, cum instat purgationis tempus, tunc voluit ligaturas solvi, & *myrrham*, *castoreum*, aliaque Emmenagoga dari. In sequenti quidem capite (o) ligaturas commendat ad compescendam nimiam uteri haemorrhagiam, sed non in solis artubus inferioribus, verum & circa axillas, & circa inguina. Forte tunc molliorem tantum per vincula compressionem volebat, ut venis pressis sanguis non tanta copia rediret ad cor; quod magnum usum habet in haemorrhagiis sanandis, uti antea saepius dictum fuit. Ad menstrua autem provocanda solas partes inferiores ligandas suavit, neque tamen valida constrictio potuit fuisse, cum per tres, vel quatuor dies manere deberet ligatura. Verum minuta venarum amplitudine per fascias in extremis inferioribus, arteriae iliacae externae minus facile depleri poterant in venas turgidas, & plenas; adeoque plus urgeri debebant vasa uterina toto illo tempore, quo ligaturae manebant applicatae.

2. Cum in suppressione mensium retineatur ille sanguis, qui singulis periodis evacuari solebat, augebitur ejus copia, & quidem eo plus, quo major sanguinis quantitas per uterina vasa exire solebat: antea enim dictum fuit, magnam varietatem hic observari in variis foeminis. Ad minuendam ergo plethoram, a retentis mensibus natam, conducet sanguinis missio. Unde etiam, quando provectiore aetate cessant menses naturaliter, venae sectionem, & frequentius repetitam quidem, consulunt multi. Tamen hoc non universaliter verum esse videtur: si enim sensim minuatur fluor menstruus copia, & periodorum intervalla prolongentur, neque plethorae signa adsint, tunc sanguinis missione opus non erit. Non enim adest menstruorum suppressio, sed cessatio naturalis, quae turbari non debet. Si autem circa quadragesimum quintum annum subito supprimantur menstrua, quae haecenus solitam periodum servaverant, a valido v. g. animi affectu; si tensio, & obtusus dolor circa lumbos, inguina, pubem adsint, tunc venae sectio proderit.

Ut autem certo indicetur venae sectio in mensium suppressione, debent adesse signa plethorae; si enim menstrua defecerint ob boni sanguinis inopiam, in exhaustis per morbos praegressos corporibus repletio indicatur, non evacuatio. Ubi autem ipsa plethora degeneraverit in cacochymiam, neque tunc venae sectio requiritur semper, sed aliae potius evacuationes, quae non minuunt boni sanguinis copiam, sed vitiosos humores e corpore educunt,
vel

(n) Lib. III. cap. 61. pag. 52. Versa.

(o) Ibidem.

vel illos sic mutant, ut denuo sanorum humorum indolem acquirant; de qua re ad sextum numerum in hac paragrapho agetur. Monuerat *Manningham* (p) sequentia: *Hydops in ventre a menstuis, magna ex parte, vel omnino, deficientibus plerumque oritur.* Si ergo *Hydrops* jam natus esset ab hac causa, sanguinis evacuatio non conducere: licet quandoque prodesse potuisset in ipsa mensium suppressione, quae secuti hydropis causa fuit. Satis bene hoc notavit *Helmontius* in loco antea citato (q), ubi de hac re agit, dicens; *Nam primo peccat abundantia bona, dein superfluitate onerosa, mox privatur vita, & virus evadit.* Unde concludit sequentia; *Peccatur ergo a scholis, per venae sectiones, dum virgines ex parte menstrui palpitationem sentientes, succurrere satagunt, sine distinctione.* Nam quanquam menstruum primi gradus, per phlebotomiam revulsum, palpitationes sedet: in tertio tamen menstrui gradu exitiale remedium praedixi archiatri nostris. Imo addit, quod virgines repente extinctas viderit, propter phlebotomiam, se invito institutam.

In initio ergo ad solvendam plethoram sanguinis missio utilis erit; serius autem, ubi plethorae successit cacochymia, nonnisi magna cum cautela. Poteritque hic locum habere monitum illud *Celsi* (r) de venae sectione (cujus alia occasione ad §. 890. 1. mentionem feci); quod nempe inutilis sit, cum jam spatio ipso materia vel exhausta est, vel corpus corrumpit, ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum.

Ad minuendam vero sanguinis boni copiam, pertusio cujuscunque in corpore venae sufficeret: tamen videmus, omnes fere Medicos suadere, ut venae sectio in pede instituat. *Galenus* (s) hoc absolute jussit: *Nam plenitudines a suppressis mensibus ortas, omnino per crura evacuabis, sive venam scacare oportet, sive scarificare.* Sectae enim in cubito venae mulierum revellere purgationem assolent. Simul monet, non esse prorogandam in his evacuationem; & si angustas venas haberent, praeferebat scarificationes; quas & menses provocare monuit. Idem affirmavit *Oribasius* (t), scarificationes laudans in suppressione menstruum: *Statutum autem purgationis tempus expectare oportet, tuncque, quum nihil, vel parum sponte fluxerit, eatenus detrahente hoc auxilio uti debemus, quatenus usus postularit.* Videtur autem per haec indicare tantum voluisse, scarificationibus talem copiam sanguinis demendam esse, qualis post suppressa, vel multum imminuta, menstrua maneret in corpore superabundans. Verum & ad promovendum menstruum fluorem prodesse scarificationes, docent illa, quae mox sequuntur: *Quibusdam etiam mulieribus, ut de more menstruae purgationes iterum redirent, hoc auxilium maxime contulit; nam continua in inferiores partes sanguinis eductio, inclinationem, viamque, ipsi praebet.*

Post circulationem sanguinis cognitam, clarius intelligitur utilitas venae sectio.

(p) *Artis Obstet. Compend.* pag. 50.

col. 2.

(r) *Lib. II. cap. 10.* pag. 80.

nae sectionem cap. 11. *Charter. Tom. X.* pag. 440.

Hirund. &c. Cap. xx. Ibid. pag. 458.

(q) In capitulo *Lunare tributum* pag. 584.

(s) De curandi ratione per ve-

(t) De Cucurb. scarific.

sectionis in pede, ad menstrua provocanda, non quidem in omni suppressione menstruum, sed saepe tamen. Si tensio, & ponderis sensus circa pubem, & inguina adsint, & lumborum dolor, circa tempus periodi menstruae, novimus, vasa uteri repleti, distendi, nec tamen ultima extrema arteriarum, in cavum uteri hiantium, satis aperiri, ut distendentem sanguinem transmittant. Si ergo post balnea, imprimis vaporis, laxentur haec vasa, & simul tunc augeatur motus per vasa impleta, spes est, resistantiam circa fines vasorum superari posse ita, ut menstrua prodeant cum levamine omnium molestiarum. Ad numerum primum hujus paragraphi dictum fuit de compressione arteriarum cruralium facta, & quidem hac spe, ut sanguis per arterias iliacas motus, non potens libere per arterias cruales transire, urgeret fortius vasa uterina, sicque resistantiam circa fines illorum superare posset. Per venae sectionem autem in pede acceleratur motus sanguinis, & liberior redditur per arteriam cruralem illius lateris, in quo vena aperta fuit; adeoque minus urgentur vasa uterina; & inde a quibusdam conclusum fuit, sanguinis missionem in pede minuere quidem sanguinis copiam, sed caeterum potius nocere, quam prodesse, in provocandis menstruis suppressis.

Considerandum autem est (vide §. 106. 8.), per ipsam plethoram majora vasa distendi, secretiones per minora vasa mutari, venas comprimi, extrema vasorum arteriosorum orificia a turgentibus majoribus ramis arteriosis claudi, hinc liberam circulationem suffocari. Dum ergo vasa uterina sic distenta sunt, se contrahere non possunt, nec promovere contentum sanguinem; unde omnia hic ad stagnationem disponuntur. Simul ac aperta vena in pede sanguis celerius, & majori copia, pellitur in cruralem arteriam, uterina vasa minus urgentur, minus distenduntur; hinc arteriae se contrahere incipient, sanguinemque promovebunt in venas, quae liberrime se evacuare poterunt in venas iliacas, jam minus plenas. Libera redibit hinc circulatio per uteri substantiam, arteriarum ultima extrema facile dilatabuntur, & restituetur menstruus fluor, antea suppressus, sive a plethora totius corporis, sive a plethora solius uteri; uti antea ad §. 1284. dictum fuit.

Notum est, in valde plethoricis motum sanguinis fere supprimi; unde, vasis sanguineis turgidis, hebetes, obliviosi, torpidi, apparent. Simul ac larga sanguinis missione solvitur haec plenitudo, motus redit per vasa; pulsus, antea suppressus, evadit validus, & acceleratur; vires corporis, torpore excusso, crescunt subito; circulatio humorum per omnia vasa redditur liberrima. Si haec applicentur utero, in suis vasis distento a sanguine accumulato, qui per extrema promoveri nequit, patebit ratio utilitatis, quam in tali casu a venae sectione in pede instituta expectare licet.

3. Si a plethora totius corporis suppressi fuerint menses, tunc post sanguinis missionem purgantia, antiphlogistica dicta, quae solvunt, & evacuant humores, absque augmento motus circulatorii, conducerent; qualia ex *ramandis*, *foliis senae*, *cremore*, & *crystallis tartari* &c., parantur; de quorum usu in cura morborum acutorum saepius dictum fuit.

Verum purgantia uterina solent plerumque vocari illa, quae una cum vi cathartica omne lentum mucosum fundunt, attenuant, & simul calefa-

ciunt, ac amarore bilis defectum suppleant, aut ejus inertiam corrigunt. Haec autem imprimis locum habent, dum post mensium suppressionem virgines in mucosam frigidam lentam cacochymiam vergunt, vel etiam, ubi menstruis carent, quia cacochymicae sunt. Simul solent tunc primae viae viscosa saburra gravari, quae solvi prius, dein expelli de corpore debet; & solent plerumque praemitti usui remediorum, quae ad sextum numerum hujus paragraphi laudantur. Monuerat Hippocrates (u); Si vero menses omnino non prodeant, pro morbo crassi, lenti, & glutinosi redduntur. Imprimis igitur ventrem sursum; ac deorsum purgare oportet. Per ipsos enim concussus, qui ab his remediis excitantur in corpore, spes est, menstruum fluorem promoveri posse, dum simul omne lentum, & glutinosum funditur. Etiam alibi (v) post vaporis balneum utero applicatum suadet, alvum subducere medicamentis deorsum purgantibus; cum hac tamen cautela, ne fiat superpurgatio, quae nimia evacuatione debilitaret.

Ob hanc causam inter purgantia uterina ad hunc numerum in *Materia Medica* recensentur *myrrha*, *gummi ammoniacum*, *bdellium* &c.: quae leviter tantum alvum movent, & non nisi in majori dosi hunc effectum praestant, dum simul fragrantia aromatica, nervis adeo amica, totum tractum primarum viarum replent, flatus, saepe in tali casu adeo molestos, discutunt, & languentem horum viscerum actionem grato, non nimis calefaciente, stimulo excitant.

Primum locum fere inter purgantia uterina occupat *Aloë*, quam ventriculum roborare omnes affirmaverunt Medici, dum tamen simul alvum subducit. Unde Celsus (x), dum purgantia remedia recenset, dicit: *Sed medicamenta stomachum fere laedunt. Ideoque omnibus cathartici aloë miscenda est.* Hoc remedium datum refracta dosi, & saepius ad grana tria, vel quatuor, vel & mistum cum modo laudatis gummi aromaticis, egregium in suppressis mensibus usum praestat, uti & in retenta per haemorrhoides consueta sanguinis evacuatione. *Aloë* omnia Elixiria, proprietatis dicta, ingreditur, quae additis *croco*, & *myrrha*, quandoque & aliis remediis, in officinis proflare solent. His similis compositio, *massa pilularum Ruffi* dicta, ubique in usu est, quae ex *aloë*, *croco*, *myrrha* conficitur; unde & Elixirium proprietatis ficcum a quibusdam vocatur. Omnia haec solent tali exhiberi dosi, ut leniter tantum alvum subducant absque virium debilitatione.

Mirum forte videri posset, quod inter purgantia uterina recenseantur *Bryonia*, & *Colocynthis*; quae merito acerrimis purgantibus adnumerantur. Sed & haec minuta dosi adduntur tantum lenioribus remediis uterinis, vel exhibentur sic praeparata, ut nocere non possint. Sic in succo *Bryoniae* subfudens faecula alba laudatur a quibusdam Medicis, quam aliquando in aliis morbis dedi ad grana triginta, sequente unica tantum alvi subductione. Aquas, dictas hystericas in quibusdam Dispensatoriis, ingreditur *Bryoniae* radix;

(u) De mulier. mc.

I. cap. 6. Charter. Tom. VII. pag. 732.

(v) De locis in hom.

p. 18. Ibid. 377.

(x) Lib. II. cap. 12. pag. 84.

radix; verum hae vel destillatione parantur, & tunc amarities, ac vis purgans in extracto manent, & tuto usurpari potest aqua spirituosa, quae alembicum transcendit; vel si sola infusione conficiantur haec remedia, tunc guttatim solent praescribi, ut vis solvens hujus plantae, adeo laudata ab omnibus, efficaciam praestare possit absque catharsi; quae adeo valida est in majori quantitate, ut dura messorum ilia hanc ferre possent tantum. Sic & in *Dispensatorio Viennensi* ex succo radicum *Bryoniae*, *artemisia*, *ruta*, *sabina*, aliisque uterinis remediis dictis, addito vino generoso, destillatur aqua *Bryoniae composita*; quae tuto adhiberi potest, & alvum non movet.

Idem verum est de amarissima *Colocynthide*, quae, dum in pulverem teritur in officinis, quandoque adstantes purgat, si diutius in aëre his pulvisculis plenumorati fuerint. Solet & unguentis admisceri, quae abdomini illinuntur, ut alvus moveatur. Arabes Medici frequenter utebantur *Colocynthide*; sed ex ejus pulvere, addita mucilagine *gummi arabici*, parabant massam, unde formabantur rotulae, quae *Trochisci Albandal* vocantur in officinis: sic molli hac mucilagine conabantur minuere metuendam *Colocynthidis* acrimoniam. Quandoque jusserunt, ut trochisci illi denuo in pulverem comminuerentur; qui mucilagine *gummi arabici* iterum impastabatur; imo hoc repetebant in tertiam vicem usque.

Raro hodie sola *Colocynthis* adhibetur, ut purgetur alvus; sed solet aliis purgantibus unum, alterumve granum addi, ut efficacius agant, imprimis in talibus hominibus, quorum alvus segnius movetur a catharticiis remediis. Ob hanc rationem ingreditur plures compositiones purgantes officinarum, *Confectionem Hamech*, *Extractum Catholicum*, *Pilulas Cochiae* &c.

Cum autem in teneris virginibus ab acrioribus purgantibus remediis abstinendum esse, prudentia suadeat, patet satis, *Colocynthidem* inter purgantia uterina vix locum habere posse.

Sed alium insignem usum habet hoc remedium, si nempe octava grani pars detur omni trihorio, vel quadrihorio; tunc enim non purgat, sed in corporibus languidis, & pituitosis mira satis praestat, dum leniori stimulo calorem, & motum auget. Commode exhiberi poterit, si *myrrhae*, *galbano*, & similibus hic laudatis, addatur *Colocynthidis* pulvisculus. Olim remedium arcanum circumferebatur, quod nil erat, nisi tinctura *Colocynthidis*, spiritu vini parata, additis *Caryophyllis aromaticis*, ut minus cognosci posset, ex quibus constaret *tinctura aurea* (sic enim vocabatur); quae multis profuit, ubi nempe frigida, lenta cacoehymia menstrui floris suppressionem fecerat.

4. Generale admodum Emmenagogorum nomen est, & non omnia remedia, hoc nomine donata, conveniunt omnibus; unde magna hic prudentia, & delectu opus est. Pleraque remedia, quae laudari solent ad hunc usum, calida, & aromatica sunt; imo quaedam ex his non nisi cum cautela adhiberi possunt. *Marum* fragrantissimum aroma spirat, sed summopere calidum, ita ut ignis fere instar nares feriat; hinc plethoricis, calidae temperiei virginibus nocere posset; in frigidioribus quidem toleratur, sed cum aqua infundi hujus plantae folia debent, ut acre illud aroma diluatur. *Sabina* inter omnes fere herbas cognitae maximam copiam olei essentialis largitur, satis

acris, aromatici; ita ut *Celeb. Hoffmannus* (y), hac herba, per vesicam, (ut vocant) cum aqua destillata, potuerit ex singulis libris uncias fere tres olei stillatitii elicere, saltem ex duabus libris, destillatione rite peracta, quinque uncias talis olei obtinuit. Simul aliis observatis constitit, *Sabinae* infusum, vel decoctum, si sanguini recens misso effundatur, magnam ipsi fluiditatem conciliare, & rubedinem intensam (z). Cum autem plantarum aroma in oleis stillatitiis haereat concentratum, facile patet, quantum stimulum *Sabina* corpori applicare possit, dum simul vi sanguinem solvendi pollet. Cum scelestae mulieres quandoque hac planta, & ejus oleo stillatio abusus fuerint, ut abortum facerent, hinc in quibusdam locis lege cautum est, ne petentibus detur haec herba, vel aqua ejus stillatitia, aut oleum, nisi ex praescripto Medici. Huic plantae, odore, sapore, & viribus medicatis, satis similis est *Thuya*, semper virens pariter arbulcula. *Artemisia*, *Cardiaca*, longe leniorem efficaciam habent: imo *Sambuci* flores gratam spirant fragrantiam quidem, sed refrigerant potius; unde in calidis morbis, tam interno, quam externo, usu, toties adhibentur. Reliqua medicamenta, in *Materia Medica* ad hunc numerum recensita, aromatica quidem sunt, non tamen comparanda cum calidissimis illis, de quibus statim dictum fuit.

Unde patet, laudata Emmenagoga non posse indiscriminatim adhiberi, sed prudentem Medicum in singulis aegris perpendere debere, quatenus ex his tuto dari possint; & si indicatio Medica doceat, urgentia remedia in suppressione mensium exhibenda esse, a lenioribus incipere, sensimque ad aciora pergere, suadet prudentia; optimum videtur, si una cum his calidioribus remediis, humectantia, emollientia, lenientia, dentur; qualis methodus laudata fuit ad §. 75., ubi agebatur de cura morborum, qui glutinosa spontaneo originem debent. Illud autem videtur & voluisse *Celeberrimus horum Aphorismorum auctor*, dum in *Materia Medica* commendat stimulantia, quae ad §. 75. n. 5. laudantur; sed simul his addit, quae ad §. 54. n. 4. recensentur; ubi ad curam morborum viscerum fortium, & rigidorum laudantur, & recensentur, humectantia, lenientia, & demulcentia, remedia.

Hujus methodi vestigia etiam apud *Hippocratem* habentur; acria enim remedia commendavit, sed simul addidit mollia (a). In mensibus autem, si quidem sanguis erumpat. (satis est); sin minus, cantharides quatuor, resedis pedibus, alis, & capite, bibat, poconiaeque nigrae grana quinque, & sepiae ova, linique semen, ex vino. Quod si dolor, sique stranguria, detinuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat: Imo si non prodeant menses, haec repetenda voluit, jussitque, ut purgatione mercurialem edat, & polypos coctos, cibisque mollibus utatur: similia alio in loco (b) habet; ubi & medicamentum, ex cantharide confectum, apponi jussit ad uteros; postero vero die adipem anserinum; & paullo post bis de die calida lavari praecipit.

Ex

(y) Observat. physic. chemic. pag. 8. (z) Schvvencke Haematol. pag. 187.

(a) De Natura Mulier Cap. 8. Charter. Tom. VII. pag. 685.

(b) Ibid. Cap. 18. pag. 689.

Ex his, & pluribus *Galen*i, aliorumque Veterum Medicorum locis satis constat, novum non esse, si acria remedia ad curationem suppressionis menstruum adhibeantur, sed & simul patet, quod & in victu, & in curatione mollia, diluentia, demulcentia simul propinaverint.

Postquam vis electrica morbis curandis adhiberi coepit, observatum fuit, mensium fluorem ab hac auctiorem fieri, quam antea unquam fuerat; imo & antequam menstrua prodirent, & dum cessarent, fluorem album experta fuit mulier, a quo tota vita fuerat libera (c). Verum vis electrica, fulminis instar, uno momento penetrat per omnia; hinc & vasa aperiuntur, & humorum celeritas augetur.

Cum autem & a majori lentore stagnare possint liquida in vasis, hinc clari Medici magnam spem posuerunt in talibus remediis, quae una cum stimulo vim solventem haberent. *Celeberrimus Mead* (d) ad hunc scopum commendavit inter alia mercurium sexies sublimatum. Prae reliquis omnibus autem laudavit *Helleborum nigrum*; quem vix unquam spem fefellisse, meminerat. Dabat autem tincturae Hellebori nigri cochleare minimum, ex aquae tepidae haustulo, bis de die. *Et illud quidem notabile observavit, quod quotiescumque aut propter malam conformationem partium, aut alia quacumque de causa sine effectu datum esset hoc medicamentum, sanguis per alias vias propulsus fuerit. Unde clarissime constat, quanta vi sanguinem propellendi possit ista medicina.*

Alii laudaverunt alia, sed fere semper talia, quae vel aucto humorum motu, vel solvendi virtute, vel utrisque simul suum praestarent effectum. Si autem vires expellentes excitantur stimulantibus remediis, antequam fluxile reddatur illud, quod exire debet, & emissaria, per quae eliminari debet, aperta fuerint, a calidis Emmenagogis exasperantur omnia mala, & quandoque periculosa haemorrhagia per alias corporis partes sequuntur, pertinaciter constrictis manentibus uteri vasis. Unde hic locum habet salutare illud *Hippocratis* (e) monitum, cujus alia occasione meminimus ad numerum 13. §. 605.; *Corpora, si quis purgare voluerit, meabilia (ῥυπαρά) facere oportet.* In hac re diligentes fuerunt Veteres Medici, & conabantur vasis faciliorem dilatabilitatem conciliare, antequam darent stimulantia Emmenagoga, vel saltem his addebant emollientia, uti patebit sequenti numero.

5. Quantum boni exspectaverit *Hippocrates*, in promovendo fluore menstruo, a faciliore dilatabilitate vasorum uteri, patet inde, quod conjugium suaserit virginibus, & integram sanitatem promiserit, si conciperent. Notum est, vasa uterina graviditatis tempore adeo dilatari sensim, ut calami amplitudinem, imo majorem etiam, acquirant illa, quae in utero non gravido nequidem oculis apparebant. Unde etiam toties contingit, ut post puerperium redeant menstrua longe copiosiora; cum vasa, graviditatis tempore adeo dilatata, nondum pristinum robur acquisiverint. Recenset *Hip-*

pocrates

(c) De Haen Rat. Medend. part. 3. pag. 241. (d) Monit. & praecept. Medic. pag. 246. 247. (e) Aphor. 12. Sect. I. Charter. Tom. IX. pag. 38.

Tom. IV. pars II.

pocrates (f) molesta Symptomata, quibus viro maturae virgines afficiuntur, cum sanguis in uteros confluit, velut effluxurus, & tamen effluvium non habet: deinde dicit; Ego vero impero, virgines, his pathematis affectas, quam citissime viro jungi. Si enim conceperint, sanae evadunt. Observatum fuit, uti postea in graviditatis morbis dicetur, uterum in animalibus, post coitum dissectis, leviter quasi inflammatum apparuisse, dum rubebant loca, quae antea pallida fuerant reperta; adeoque magis dilatata erant vasa, cum sanguinem rubrum admitterent. In alio loco (g), postquam varia suaserat ad tollendam mensium suppressionem, addit ultimo; Morbo autem liberabitur, ubi conceperit. Majorem adhuc effectum speravit, si peperit mulier (h); De mulierum morbis sic enuncio; mulierem, quae non peperit, gravius, & celerius a mensibus, quam partum expertam, aegrotare. Quum enim pepererit, ei venulae ad menstrua sunt meabiliores (εὐρωτέρα καὶ φλέβια.) Meabiles autem ipsas faciunt lochia; quae purgatio quaedam est &c. His ita constitutis, quum mulier puerperii purgamenta experta fuerit, minus laboriose menstruis purgatur. Imo, cum vasa illa, jam tantam dilatationem passa graviditatis tempore, facilius distendi possint, minus dolebit mulier, partum experta, a menstruis retentis. Quod si mulieri, quae jam peperit, affectio aliqua oboriatur, ita ut procedentes menses rite repurgari nequeant, ea facilius, quam si haud peperisset, laborem feret. Assueti namque sunt uteri, & corpus, ut impleatur, idoneum, nimirum utero gerenti, simulque magna est in corpore amplitudo.

Cum autem non omnibus virginibus possit dari consilium de matrimonio ineundo, hinc omnia molimina artis adhibentur, ut vasa uterina cedant facilius, & sanguinem, quo distenduntur, dimittant per extrema orificia. In his operosus admodum fuit *Hippocrates*, ut calore blando, humectante foveret haec loca. Sic (i) aquam calidam ad uteros, & ambientia loca asfunderet, eosque, ac crura excalescere, jussit (k). Totum corpus, ac praesertim uteros, leniter foveri, & bis de die calida lavari, praecepit. Alibi (l), calida lavare, crebroque toto corpore infidere, interdumque ad umbilicum usque fovere, intermissione vero facta, ea, a quibus repurgetur, neque mordeatur, in subditio apponere, mandavit. Dum autem reliquum corpus non indigeret medela, sed uteri per se morbum haberent, solos uteros fovebat balneo vaporis, sic directo per arundinem, ut calentis aquae, non nimium fervidae tamen, ascendens vapor in uteri cavum venire posset (m); simulque methodum, & cautelas necessarias describit. Addit tamen & huic vaporis allii fragrantiam, ut emollitam uteri internam superficiem leniter stimulet tantum; monet enim, non debere conteri allia, dum aquae infunduntur; ex contritis enim, uti notum est, penetrabilis halitus quaquaversum diffunditur, ita ut adstantium oculi lacrymentur illico. Alio in loco suadet (n), ut ventri applicentur pelles agninae calidae, lana sua adhuc

(f) De virginum affectibus. Charter. Tom. VII. pag. 679. 680.

(g) De Natur. Mulieb. Cap. VIII. Ibid. pag. 685. (h) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap.

I. Ibidem pag. 728. 729. (i) De Mulier. Morb. Lib. 2. Cap. 27. Ibid. pag. 816.

(k) Ibid. Cap. 28. (l) Ibid. Cap. 37. pag. 820. (m) Ibid. Cap. 20. pag. 808.

(n) De Superfoetatione Cap. XVII. Ibidem pag. 869.

adhuc rectae; & similia plura hinc inde passim laudat. Plura artis molimina, ut emolliantur vasa uterina, ad promovendum fluorem menstruum, collecta legi possunt (o) apud *Moschionem*, ubi balneis, fotibus, inunctionibus, pessariis, frictionibus, cucurbitulis curam aggreditur retentionis menstruum, vel quando cum dolore, & stranguria purgantur. Pessaria autem in virginibus vix locum habent, ne vis aliqua pudoris claustro inferatur. In Materia Medica ad hunc numerum *Emplastra, fomenta, unguenta, linimenta, vapores* recensentur, quae emolliendo, lubricando, solvendo, stimulando, calefaciendo inservire poterunt, prout diversa indicatio Medica postulat.

6. Antea, ubi ad §. 25. de causis nimiae debilitatis fibrarum solidarum corporis agebatur, dictum fuit, nimiam distractionem fibrarum, & vasorum talem laxationem producere. Sed & ad §. 106. inter effecta plethorae nimia dilatatio vasorum fuit recensita. Adeoque, si vasa, nata ob mensium suppressionem plethora, nimis distenta fuerint, & diu, merito talis debilitas praevideatur, five in vasis uterinis, five & in reliquis corporis vasis, unde chalybeata, & adstringentia remedia tunc usum habent, uti dictum fuit ad numerum quartum §. 28. Accedit, quod corporis habitus in mulieribus laxior soleat esse naturaliter; unde roborantia remedia optime ferunt. Monuit illud *Hippocrates* (p), dum dicit; *Mulieres autem siccioris victus ratione sic uti oportet. Sicca namque cibaria ad muliebrium carnum molliem magis sunt idonea, & meraciores potus ad uteros, & foetus nutritionem meliores existunt.* Veritatem moniti hujus *Hippocratici* quotidie vident Medici in illis locis, ubi, pessimo more, tepidis aquosis potibus indulgent mulieres, imprimis, si simul sedentariam vitam degunt. Molles, flaccidae, inertes vivunt, vix foecundae, & si conceperint, frequenter abortum patiuntur. Sapiens *Lycurgus* (q) *Corpora virginum cursu, luctu, discorum, & telorum jactu, exercuit, ut & foetus radix, validum in valentibus exordium sumens, germinaret melius, atque illae, strenue partus excipientes, bene, & facile adversus puerperii decertarent labores.* Sapienter sic futurae progeniei curam gerebat Legislator, cum molles, & delicatulae, licet robustis, & validis jungantur viris, debilem, & morbosam prolem in lucem edant.

Verum & chalybeata, & roborantia locum habent in pallido virginum morbo; in quo totum corpus tumet leucophlegmaticum, & loco boni sanguinis mucosus iners humor per vasa fluit; in illis deficiunt menstrua, quia deest sanguis, & omnia languent in corpore. Tunc ferri limatura, una cum aromaticis, & roborantibus, in vino infusa, si ter de die talis vini medicati uncia detur, pulcherrime prodest. Usui hujus remedii solet praemitti lene purgans, ut primae viae liberentur ab omni sorde glutinosa; dum v. g. per triduum sumunt mane jejuna quindecim, aut viginti grana *massae pilularum Ruffi*, vel similis officinalis compositi. Mirus, & saluberrimus tunc sequitur effectus: intra paucos dies enim tumor albus corporis incipit

(o) N. 126. Apud Spach. pag. 11. & Ibid. Harmon. Gynaec. part. poster. Cap. 2. p. 20.

(p) De Salub. victus ratione textu 24. Charter. Tom. VI. pag. 233.

(q) Plutarch. Tom. I. pag. 47.

incipit subfidere, labia, & gingivae, quae antea pallescebant, incipiunt subrubescere, color roseus genis redit; dumque antea ad minimum corporis motum anhelae torperent desides, sensim redit pristina alacritas, & intra tres, quatuorve septimanas omnes corporis functiones restituuntur. Adest tunc bonus sanguis, & menstrua brevi post prodeunt sponte, & debita periodo redeunt; modo velint, renatis per talis remedii usum viribus, corpus movere. Si enim sanatae jam denuo tepidis aquosis potibus indulgeant, sedentariamque vitam ducant, in pristinum morbum recident quam certissime. Saepius mihi contigit, ut ter, imo quater, eandem curationem repetere debuerim biennii spatio, antequam resipiscences monitis obedirent: quod nisi fiat, tandem iners ille languor nullis cedit amplius auxiliis, & postquam hebetes, obliviosae, torpentes per plures menses morbosam traxerunt vitam, pereunt lethargo.

In tali casu profunt haec remedia, & nocet venae sectio; dum pauculum illud rubri sanguinis, quod adhuc per vasa fluit, demit de corpore. Ubi autem color ruber in labiis, gingivis, oculorum canthis apparet, una cum calore totius corporis, & venis turgentibus, simulque fluoris menstrui suppressio adest, tunc nocerent talia vina medicata certissime, uti & omnia Emmenagoga calida, & motum augentia. Adest enim tunc copia sanguinis, & quidem nimia: hinc venae sectio in pede, balnea, fomenta &c., quae uteri vasa, nimis resistentia, laxant, locum habent. Videri possunt & illa, quae §. 1083. de cura *Epilepsiae*, natae ab interceptione illorum, quae olim excerni solebant, dicta fuerunt.

Ex quibus omnibus apparet, prudentem delectum remediorum Emmenagogorum requiri quam maxime.

Caeterum talis vini medicati formula in *Materia Medica* ad §. 1250 habetur. Interim hoc monendum credo, nimis parvam copiam vini adscriptam fuisse. Librae sex vini Rhenani loco librarum duarum sumantur, ne nimis meracum fiat remedium, &, hoc facto, sufficiet adhuc unciam hujus vini medicati sumere ter de die. Tutius enim haec dantur minori dosi, longiori tempore continuanda.

§. 1292. **S**Ublata his morbi scaturigine, solent omnia fere mala (1285. 1286. 1287.) sponte evanescere. Vel curantur ex natura, & cura ejus morbi, cujus imaginem referunt quam proxime: quod facile ex antedictis fit.


Antea, ad numeros in textu citatos, recensita fuerunt plura mala, quae a sola suppressione menstruorum nasci, observatum fuit. Pleraque ex his solent sponte evanescere, dum fluor menstruus, copia debita, & solita periodo, redit. Sed & simul notatum fuit, depravari ab hac causa posse fere omnes functiones naturales, vitales, animales: si ergo diuturna fuerit obstructio mensium, possunt superesse postea mala, quae peculiarem medelam requirunt, licet menstrua debito ordine redierint. Sic pariter, dum sanguis men-

menstruus per insolitas vias exit de corpore, potest superesse debilitas vasorum in illis locis, per quae exivit, postquam naturali lege per vasa uterina inceperit excerni. Verum ex illis, quae ad §. 1287. dicta fuerunt, constat, saepe labefactari ab hac causa omnia viscera; unde & a vasorum laesione, aut humorum degeneratione varia infinitum morborum genus nasci poterit; qui, restituto jam fluore menstruo, supersunt, & curationem poscunt, quae saepe facilis non est. Omnium talium malorum curationem hic tradere supervacaneum foret, cum de plerisque antea jam actum fuerit. Commode autem reduci poterunt ad naturam, & curam illorum morborum, quorum imaginem quam proxime referunt.

Sic v. g. ad §. 1286. dictum fuit, interceptos menses quandoque ad pulmonem ferri, & haemoptoën inde nasci. Si quid mali inde contraxerit pulmo, facile patet, illam tunc conducere medelam, quae in *Capitulo de Phthisi* laudata fuit. Monitum fuit pariter eodem paragrapho, a suppressis mensibus dura tubercula in mammis gigni, quae curam scirrhi requirunt. Monuerat *Hippocrates* (r), si menses prodeant quidem, sed pauciores, quam conveniant, ferantur, inter alia mala etiam contingere, quod sequitur; *Dolent alias atque, alias corpus, maximeque lumbos, & spinam, & inguina, manuumque, & pedum articulos. Neque haec simul dolent, sed vicissim, quocumque secretus sanguis, qui uteris inesse nequit, impetum fecerit, & qua parte corporis decubuerit, tumor existit &c.*: paullo post addit, quod quandoque claudam reddiderit, aut aliquas partes impotentes effecerit, si sanguis, prae rigore, & cibi fastidio, quemcumque in locum irruperit, circa nervum concretionem habuerit. Facile patet, curam talium malorum vel ad Paralyfis, vel ad Morborum Articularium medelam spectare. Idem & de reliquis verum est.

(r) De Mulier. Morb. Lib. I. cap. 7. Charter. Tom. VII. pag. 733. 734.





MORBI GRAVIDARUM.

§. 1293. **P**ostquam gravida est foemina, plurimis afficitur malis ex sola graviditate oriundis.

Facile patet, hic tantum agi de illis morbis, qui a graviditate, tanquam causa, pendent; non autem de illis, qui graviditatis tempore contingunt quidem, verum aliis causis originem debent. Gravidæ enim quibuscumque aliis morbis sunt obnoxiae.

Patet ex Physiologicis, insignem, & subitam mutationem fieri in utero, tubis uteri, & ovariis, illo tempore, dum veneris oestro percita mulier foecundo maris semine impletur, & concipit (s). Plura etiam observata docent, solito majorem in coitu voluptatem percipere mulieres, dum impraegnantur. Unde & haec mutatio in organis muliebribus, generationi dicatis, conceptionis tempore major creditur merito, quam si coitus absque impraegnatione sequente peragatur.

Antea autem ad §. 1285. dictum fuit de mirabili illo imperio regiminis (sic dicto ab *Helmontio*,) quo uterus affectus, a leviori etiam causa, functiones vitales, animales, naturales, turbare possit, & variis quidem, ac miris modis. *Hippocrates* jam notaverat, similia conceptus tempore contingere (t). Sic enim habet: *Liquido autem constat harum rerum peritis, quod mulier, ubi concepit, statim inhorrescit, & incalescit, ac dentibus stridet, & articulum, reliquumque corpus convulsio prehendit, & uterum torpor, idque iis, quae purae sunt, accidit.* Videtur autem per puras hic intelligere sanas, alacres, & Venerem appetentes foeminas, quarum uterus purus est, nec mucosis humoribus, aut fluore, albo dicto, madescit. Statim enim addit sequentia: *Quae vero crassae, & mucosae, patiuntur, pleraeque harum mulierum illud non sentiunt.* Deinde prudenter subjungit: *Ac sane quantum illae mihi ita indicarunt, tantum etiam me scire profiteor.* Medicus enim de his nihil novisse potest, nisi ex sola mulierum relatione. Certum autem est, dari tales mulieres, quae mucosae, frigidae, ad Venerem torpidae, fluore albo laborantes, vix ullum in coitu oblectamentum percipiunt, & tamen quandoque impraegnantur, licet nihil perceperint illorum, quae modo dicta sunt. Interim plerumque contingit, ut miram mutationem sentiant foeminae illo tempore, dum impraegnantur; pluresque novi honestas matronas, quae aliquoties pepererant, & accurate conceptionis, ac partus futuri tempus ex his signis notaverant.

Con-

(s) Vide Boerhav. Instit. Medic. §. 668. & seq.

(t) De Carnibus Cap. VIII. Charter. Tom. V. pag. 309.

Confirmat hoc Hippocrates (u), dum testatur, quod meretrices publicae, quae saepius haec expertae sunt, ubi cum viro congressae sunt, noscant, quando conceperint, moxque conceptum perdant, quo postea jam perduto, velut caro excidit &c. Ex similibus signis fere statuit de foecunditate mulieris, dum pessariis genitalia leviter irritarentur, uti alio in loco (v) habet; Si cui mulieri a pessariis non admodum vehementibus dolores ad articulos pervenerint, & dentium stridor detinuerit, tenebrosa vertigine laboraverit, & oscitaverit, huic concipiendi major spes adest, quam cui nihil horum contingat.

Neque haec signa, quae ipso conceptus tempore a mulieribus percipiuntur, sola graviditatis indicia sunt; plura enim alia observantur, quae diutius persistere solent. Sic enim Hippocrates (x) habet: Praegnantem mulierem, si non alio, hocce cognosces: oculi ei contracti, & magis cavi cernuntur, & oculorum candidum albedinis naturam non habet, sed lividius apparet. Quae utero gerunt, in facie ephelidem habent, & ubi consipere coeperunt, vinum odio habent, cibos averfantur, cardiogmo vexantur, ac salivant. Plura quandoque alia signa apparent in gravidis mulieribus, & in variis diversa: frequentissime tamen occurrit ciborum fastidium cum nausea. Et videtur Hippocrates (y) praecipuum graviditatis signum inde deduxisse, dum dicit; Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre succedente, ciborum fastidia (nauseae) ipsi accidant, hanc gravidam esse, ratione dicito. Cum enim a pravis humoribus, in ventriculo, aut vicinis visceribus haerentibus, fastidium tale nasci posset in non gravidis mulieribus, hinc addidit prudenter Hippocrates, si nec horror, nec febris succedat; quae natam nauseam a tali causa sequi solent, nisi per vomitum, vel alvi evacuationem haec saburra expellatur.

In quibusdam gravidis illud fastidium universale est, ita ut ad quaevis oblata edulia nauseent; in pluribus contingit, ut ab hoc, illove cibo tantum abhorreant, dum reliquos facile ferunt, vicissimque quosdam cibos, vel potus impense desiderant, quos antea vix curabant. Multas matronas vidi, quae ex hoc solo signo se gravidas noverant, licet nullum aliud adhuc adesset graviditatis indicium. Quandoque, statim ac impraegnatae sunt foeminae, dolore molesto dentium cruciantur: in aliis vidi dolentissimam otalgiam, & hemicraniam frequentem, cui vix erant obnoxiae, dum non erant gravidae. Ingens talium symptomatum, quae vel in ipso graviditatis initio contingunt, est diversitas: haec videri possunt apud illos, qui de graviditate, & arte obstetricia scripserunt, Mauriceau (z), & alios passim: singula enim haec enumerare operosum foret potius, quam utile. Sufficit notasse, per ipsam graviditatem plures functiones laedi, & turbari, in corpore muliebri.

Verum eadem illae functionum laesiones pro graviditatis signis habentur: notandum tamen est, magna hic prudentia opus esse Medico, ne facile graviditatem vel affirmet, vel neget, nisi ex certissimis, & omni exceptione maioribus indiciis; v. g. si motus infantis in utero, manu abdomini imposi-

ta,

(u) De Carnibus Cap. VIII. Charter. Tom. V. pag. 308. (v) De infoecundis Cap. VI. Charter. Tom. VII. pag. 846. (x) Ibidem. (y) Aphor. 61. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 232. (z) Traité des Malad. des Femm. grosses Tom. 1. pag. 67. & seq.

ta, distinctissime sentiatur: peritissimi enim decepti fuerunt toties; nunquam forte magis periclitatur fama Medici, quam ubi agitur de graviditate determinanda: undique fraudes, undique saepe infidiae struuntur incautis. Dum ultimum supplicium ob crimina metuunt, in carceribus detentae, scelestae mulieres, graviditatem simulant saepius, & iudices a Medicis petunt, ut renuncient, an vera, an ficta sit graviditas. Si vel minimum dubium superfit, prudens Medicus differendum supplicium suadebit, donec certius de graviditate constet, ne forte insons foetus una cum scelestae matre pereat. Hoc autem aliquoties contigisse, licet & Chirurghi, & Obstetrices, post examen institutum, renunciaissent iudicibus, fictam esse graviditatem, Historia Medica docet, & apud *Mauriceau* (a) tristes tales casus leguntur.

Quandoque & hydropicae mulieres, praeter omnem opinionem, gravidae inventae fuerunt; nec sine abortus periculo valida Emetica, & Cathartica, quae toties profunt in hoc morbo curando, potuerunt adhiberi. Antea, ubi de hydrope agebatur, plures tales casus memorati fuerunt. *Mauriceau* (b) viderat Chirurghi uxorem, quae per novem annos laboraverat ascite tantae molis, ut ultra triginta pintas aquae tumidum abdomen continere iudicaret; tamen morbi tempore peperit quatuor infantes vivos, & sanos: testatur autem, dum in ultimo partu obstetriciam illi adhibuerat manum, ventrem edita prole non plus detumuisse visum, quam si ovum Gallinae ex abdomine prodisset; unde facile intelligitur, quantus fuerit ventris tumor.

Contigit mihi, ut curarem in caelibatu viventem, quae, pietatem astute simulans, ab omnibus intacta virgo credebatur. Ascitide laborabat satis valido per septem jam menses, dum meum petebat consilium; neque ullam poteram habere graviditatis suspicionem. Purgantibus hydragogis feliciter curata fuit quidem; verum ipsa me monuit, aliquid excidisse ex pudendis, dum latrinae insideret, alvum exoneratura. In rem statim inquirens, inveni abortum, qui trimestris videbatur. Fornicationis crimen fatebatur illico; sed non difficulter mihi persuasit, se graviditatem ignorasse, cum per tres, vel quatuor menses jam intumisset abdomen, antequam concepisset.

Saepius autem contingit, ut furtiva Venere gravidae tentent imponere Medicis, dum hydropem simulant, hac spe, ut validis remediis datis perdant conceptum foetum. Quandoque & Emmenagoga validiora anxie petunt, morbosam mensium obstructionem culpantes. In his magna cautela opus est. Examen obstetricis, an os uteri clausum sit, anterior abdominis pars supra pubem tumeat, mammae magis turgere incipiant, eludunt facile, dum illibatam virginitatem per omnia sacra affirmant; imo probos Medicos pessime exceptos a potentibus familiis novi, dum simile quid suspicati fuissent. Soleo in tali casu, magno apparatu, innocua dare remedia, nullo modo indicando, quid suspicer. Hoc modo impedio, ne alios Medicos forte decipiant, &, dum me deceptum credunt, tempus labitur, justaeque suspicionis causae magis, & magis augentur. Omnes enim, qui de graviditatis

signis

(a) Traité des Malad. de Femm. grosses Tom. I. pag. 71.

(b) Ibid. 73.

signis scripserunt, quamvis longo artis obstetriciae usu celebres fuerint, unanimi ore fatentur, primis praecipue mensibus, signa graviditatis satis incerta esse. *Avenzoar*, celebris inter Arabes Medicus, in propria uxore se deceptum, fatetur (c).

Quandoque & contingit, ut provectioris aetatis mulieres, & jam accedentes ad illud vitae stadium, quo menstruus fluor cessare solet, bona fide credant, se gravidas esse; cum & similes molestias sentiant, ac in gravidis obtinere solent, & putent, solito tempore se motum foetus sentire; unde omnia ad futurum partum parant. *Sydenhamus* (d) hoc aliquoties observaverat, & monet Medicos, ut caute tales tumores abdominis distinguant ab hydropo, neque temere graviditatem affirmant, licet & mammae turgeant, & lac exstillent, & obstetricum testimonia confirmant, gravidam esse mulierem, & motum foetus sentiant. Observavit enim, quod *tandem venter, pari, quo increverat, gradu, sensim detumescens, spem vanam eluserit*. Flatibus hunc ventris tumorem tribuit, & monet, quod talis tumor *viduas ut plurimum exerceat, vel etiam mulieres, quae non nisi provectiores aetate nupsissent*.

Novi hoc contigisse nobili matronae, quae, quatuordecim jam prolium mater, per octennium parere cessaverat, & firmiter credebat, se gravidam esse, cum omnes illas molestias, quas toties experta fuerat, sentiret denuo: imo succensebat omnibus, quae aliquod dubium movere audebant: sensim per quinque menses increvit abdomen, postea sensim detumuit, & per plures annos sana vixit. Adeo autem aegre ferebat, se deceptam fuisse, ut per integrum annum domi pertinaciter latuerit, metuens, ne rideretur ab omnibus.

Vidi & aliam, quae vigesimo quinto aetatis anno filium pepererat, sterilis dein per integros viginti annos, quadragesimo sexto anno peperit secundum filium, licet plurimi vana spe prolis deceptam crederent. Hinc apparet, magna prudentia opus esse, in determinanda graviditate; nam non tantum in provectioris aetatis mulieribus, sed & in junioribus, similia contigerunt. *Deusignius*, circa medium elapsi saeculi celebris apud *Groningenses* Medicus, acris in controversiis Medicis autor, in literis ad *Thomam Bartholinum* datis (e) agens de similibus casibus, testatur sequentia: *Similem juveniculam ante biennium hic ipse sub cura mea habui, quae omnia ad partum jam jam imminenti, ut putabat ipsa, pararat; at cujus spes omnis in flatu evanuit*.

Plura his similia apud probatos auctores inveniuntur passim.

(c) *Traité des Malad. des Femm. grosses* Tom. I. pag. 73.

(d) *Tractat. de hydropo* pag. 611.

(e) *Thom. Barthol. Epistol. Med. Centur. IV. pag. 132. 133.*

§. 1294. **Q**Uorum nonnulla oriuntur ex sanguine menstruo secerni impedito ob clausum uterum, & foetu tamen non potente hactenus in sui incrementum eum absumere.

In muliere non gravida sanguis menstruus stata periodo excernitur, uti praecedenti capitulo dictum fuit: ubi vero impraegnata est mulier, menstrua cessant, & praecipuum graviditatis signum inde deducitur. Cum autem, postquam menstrua cessarunt, sensim denuo distendantur, & impleantur vasa uterina, pro futura nempe fluxus menstrui periodo, hinc credidit Hippocrates (f), vasis illis jam plenis difficulter concipere posse mulierem. Quare si eo sanguine (menstruo nempe) vacuetur mulier, in ventre concipit; si vero eo plena fuerit, minime. Uteris enim, & venis sanguine vacuis, mulieres in se foetus concipiunt. Hae namque mulieres post menstruam purgationem utero concipiunt. Quamvis autem naturaliter in gravidis cessent menstrua, tamen & quibusdam contingit, ut primis mensibus graviditatis adhuc prodeant, superflite foetu; sed plerumque pariori copia tantum. Antea monitum fuit, in quibusdam mulieribus sanguinem menstruum non tantum ex uteri cavo, sed & ex vaginae vasis prodire. Imo satis multas vidi, quae, dum menstrua solito quidem tempore, sed minuta copia, prodirent, se per mensem jam gravidas esse assererent; & tempus partus satis exacte huic computo responderebat.

Neque penitus impossibile videtur, antequam embryo, suis membranis inclusus, undique cavo uteri nexus fuit, menstruum sanguinem exire posse; imprimis si os uteri clausum non fuerit exacte: sed & tunc simul apparet, conceptum jam embryonem facile cum sanguine exeunte abripi posse, sicque spem graviditatis tolli. Hinc, nisi vasa, in superficiem internam uterihiantia, impraegnata jam muliere, sic resistent, ut non amplius sanguinem dimittant dilatata, parvulus embryo, nondum mole sua implens uteri cavum, elueretur inde, si os uteri cederet, vel undique illum alluens sanguis extravasatus, mora corrumpendus, impediret necessariam utero accretionem, & acrior redditus, tenerum illud nascentis hominis rudimentum destrueret brevi.

Docuerunt observationes certae, in ovariis, & in tubis Fallopiianis conceptos Embryones crevisse in justam magnitudinem, uti postea dicitur. An tunc, cavo uteri manente libero per totum infelicitis graviditatis tempus, menstrua fluere pergerent?

Videntur saltem omnia phaenomena docere, constringi uterum conceptus tempore: uteri os clauditur, & menstrua non redeunt. Inde conceptus facti signum Hippocrates (g) statuit: Quod si mulier se genituram concepisse noverit, primo tempore ne virum adeat, sed quiescat. Noscet autem, si vir emisisse se dixerit, mulier vero propter siccitatem ignoret. Retentionem enim immissi in uteri cavum feminis, saltem pro aliquo tempore, ad conceptum necessarium esse, credidit; unde mox addit sequentia, quod si rursus eodem die

uterus.

(f) De Natur. Pueri Cap. 3. Charter. Tom. V. pag. 313.

(g) De Infecundis Cap. 9. Charter. Tom. VII. pag. 849.

uterus genituram reddiderit, humidus erit, & si humidus fuerit, rursus cum viro misceatur, quoad concipiat. Postquam autem concepit mulier, os uteri clauditur, uti Hippocrates (h) monuit: Qui utero gerunt, iis os uteri connivet. In commentario ad hunc Aphorismum Galenus (i) pro maximo graviditatis indicio habet clausuram oris uteri, si digito immisso obstetrix illud potuerit attingere; quandoque enim in graviditatis initio altius haeret. In illis autem mulieribus, quae nunquam pepererunt, os uteri exactius clauditur, minus in illis, quae jam pepererunt. Neque solam oris uteri clausuram notat Galenus (k); sed sic habet, *nam ubi primum uterus intra se semen concepit, universam capacitatem suam contrahit, osque claudit.* Cum autem morbosum os uteri tumere posset, inflammatum nempe, vel scirrhum, hinc requiritur, ut os uteri clausum sit non tantum, sed & molle, si graviditatis signum inde colligatur. Unde Hippocrates alio in Aphorismo (l) dixit; *Quibus os uteri durum est, his os uteri connivere necesse est.* Unde Galenus maluisset, hunc Aphorismum immediate sequi priorem.

Cum autem considerarent Medici, in gravidis retineri illum sanguinem, qui singulis mensibus exibat de utero, neque primo graviditatis tempore tantam esse molem tenelli Embryonis, ut illum retentum in suos absumere usus posset, hinc non sine ratione cogitabant, plethoram metuendam esse primis mensibus, & huic adscribebant illas molestias, quae in gravidis mulieribus observabantur, de quibus paullo post dicetur. In praecedenti Capitulo pluribus demonstratum fuit, minorem longe copiam sanguinis excerni in sanis, & robustis mulieribus per menstrua, ac quidem credi solet.

Verum & aliud notari meretur, retentum illum in gravidis sanguinem non servire adeo ipsi Embryoni, quam utero; & ab hoc sanguine uterino fecerni quidem tenuiores humores, usibus Embryonis destinatos, sed nihil rubri sanguinis ad Embryonem venire primo graviditatis tempore. Examinaui plures tales Embryones minimos, una cum membranis, & placenta excussos, nec potui aliquid rubri detegere in ipso Embryonis corpusculo, nec in membranis, nec in placenta, quae in principio, uti notum est, totam Chorii superficiem fere tegit. Uterus autem, totus vasculosus, sensim distenditur, ita ut parva ejus cavitas in non gravidis sic dilatetur sensim, ut foetum cum secundinis, & aquam intra membranas collectam continere possit. Cum autem in non gravidis uteri substantia compacta, & carnosa cavum contineat exiguum, crediderunt multi, uterum extenuari, dum distenditur, & quidem eadem proportionem, qua cavum uteri augetur, minui substantiae crassitiem. Haec erat sententia Galeni (m), ubi de uteri diversitate ex aetate agit: *Rursus igitur in principio conceptus crassus; cum prope tempus parienti accedit, magnus quidem, sed tenuis; crassitudo enim in longitudinem extensa absumitur; in reliquo vero intercedente tempore, pro ratione magnitudinis, crassitiem habet.* Pluribus demonstrari posset, si operae pretium foret;

(h) Sect. V. Aphor. 51. Charter. Tom. IX. pag. 224.

(i) Ibidem pag. 225.

(k) Ibidem. (l) Ibidem Aphor. 51. pag. 228.

(m) De uteri dissect. Cap. 8. Charter.

Tom. IV. pag. 280.

foret, veteres Medicos uterum majorum animalium potius vidisse, quam uterum humanum, & applicuisse illa, quae in brutis viderant, humanis mulieribus. Sic illa divisio cavitatis uteri in dextram, & sinistram, quae in bicorni brutorum utero locum habet, male tribuitur utero humano. Unde sponte cadunt omnes illae praedictiones de sexu foetus, dum mares in dextris, foeminas in sinistris, locari putabant. Sed & brutorum uteri membranacei, & tenues sunt, ita ut foetus utero contenti, membranis integris manentibus, & utero illaeso, videri possint, uterus humanus longe alterius indolis est.

Mauriceau (n) pertinaciter Veterum sententiam *Galen*i imprimis, de tenuityte uteri gravidi tuetur, & pluribus nititur firmare auctoritatibus; indignatur, celebres Anatomicos, & plures alios, statuisse, uterum gravidum, naturae miraculo quodam, incrassari tanto plus, quanto magis distenditur. Imo provocat ad ocularem inspectionem illos, qui falsam hanc opinionem tuentur. Voluit idem obtinere in utero, quod observatur in vesica urinaria, quae, vacua dum est, crassa apparet, dum autem urina collecta distenditur, membranacea est, & tenuis. Fatetur quidem, in cadaveribus mulierum, subito post partum mortuarum, uterum crassitie sua duos digitos transversos circiter aequavisse, sed hoc tribuit contractioni uteri jam evacuati. Nec negat, in cadaveribus gravidarum, absque exclusione foetus mortuarum, uteri substantiam crassam inventam fuisse; sed hoc praeternaturale esse voluit, & ab inflammatione, ac affluxione humorum ad uterum, factum fuisse, post dolores partus diuturnos, & frustraneos.

Unde conclusit, non posse demonstrari uteri crassitiem, tanquam naturalem, nisi in cadavere mulieris, quae partui proxima, utero pleno, nulla causa alterato, mortua fuit. Cum autem raro talis casus contingat, suadet, ut interea inspiciatur uterus ovillus impraegnatus, qui manifeste tenuis, & membranaceus apparet.

Triste sic videmus exemplum, optimos viros, dum praeconceptam opinionem mordicus tueri volunt, nequidem propriis oculis quandoque fidem habere. Caeterum hanc opinionem solide refutavit celebris in arte obstetricia autor (o). Quod autem *Mauriceau* volebat videre, ut conviceretur de crassitie uteri gravidi, obtigit (p) Celeberrimo *Littre*, ut spectaret substantiam nempe uteri, octo circiter lineas crassam, in cadavere mulieris, quae, octavo graviditatis mense, ex lapsu, subito perierat. Similem crassitiem uteri in muliere, quatuor horis post partum mortua, vidit *Mery* (q). Ex quibus patet, uterum vacuum non apparere crassum, quia contractus jam est, ut *Mauriceau* voluit; uterus enim plenus similem substantiae crassitiem demonstravit. Pulcre autem notat *Deventer* (r), crassitiem uteri in causa esse, ne post partum fundus inverteretur tam facile, & per patulum uteri orificium exiens prolapsus faceret, imprimis dum placenta educitur. Si enim uterus

ce-

(n) Traité des malad. de Femm. gross. Tom. I. pag. 20. & seq.

(o) Deventer Novum lumen &c. Cap. VIII. pag. 29. & seq.

(p) Acad. des scienc. 1701. Mem. pag. 385.

(q) Ibid. 1706. Hist. pag. 27.

(r) Novum lumen &c. Cap. 23. pag. 30.

tenuis, & membranaceus foret, talis prolapsus uteri vix caveri posset. Testatur autem *Deventer*, adeo longaevo usu artis obstetricandi clarus, illud rarissime contingere, & tantum, si scilicet insigniter fuerit tenuis, tunc quidem circa manum complicatur instar lintei madidi, neque tam cito tum, facilisque contractio est; quod mihi non arridet; quin potius mallet, eum consuetam servare formam, & statim a partu rite contrahi, & circa manum nondum retractam claudi, quod multo pauciora symptomata tunc extimescenda sint. De illa autem flacciditate uteri, & quidnam inde metuendum sit, postea dicitur, ubi de *Morbis Puerperii* agetur.

Uti saepius contingere solet, dum in oppositas sententias acri studio ruunt eruditi homines, quidam dixerunt, uterum gravidum attenuari, dum distenditur; alii, multo crassiores reddi, quam ante erat. Certe uterus in virginibus, & mulieribus nunquam gravidis solidam, firmam substantiam habet, digitum auricularem crassitie aequantem, quandoque & superantem: hinc si talis uterus impraegnatus, & prope partum adeo distentus, pristinam crassitiem retineat, multum corporeae molis ipsi accessisse debuit, ut absque attenuatione laterum cavum ejus adeo potuerit distendi. Omnia haec dum considerabat, amicitia, affinitate, & communi studio mihi conjunctissimus auctor (s), statuit, quod, si non plerumque, crebro equidem pristina fere ipsi crassities maneat. Uterus gravidus, cujus historiam adeo accurate descripsit, & pulcherrima Icone (t), ad uterum in liquore suspensum a perito chalcographo facta, demonstravit, videtur naturalem uteri non gravidi crassitiem non multum excedere; unde merito statuit, in gravidis uteri substantiam nonnunquam augeri, nonnunquam manere eandem, & inter rarissima computandum esse, si quandoque extenuari contigerit. Cum autem indubitatum sit, & in pulcherrima Icone tam bene exprimatur, vasa uterina non in eodem plano, sed per varias contignationes inter lamellatam uteri substantiam decurrere, simulque graviditatis tempore eadem haec vasa insigniter dilatari, sanguine repleta, patet facile, attenuationem uteri graviditatis tempore secundum naturam locum habere non posse; sed morbosam fuisse, si observata fuerit. Simul apparet, quo majori copia sanguinis distenta fuerint vasa uterina, adeoque magis dilatata, eo crassiores reddi uteri gravidi substantiam; unde ratio diversae crassitiei in variis subjectis intelligitur. Quantae autem capacitatis vasa hic reperiantur, quam ampli sint sinus uterini, sanguine pleni, & cum chorio, ac placenta communicantes, apud eundem auctorem (u) videri potest, qui omnia, quae uterum gravidum spectant, optima fide scripsit, nihilque affirmavit, quod non mihi, & aliis exactissime demonstraverit.

Si videantur pulcherrimae Icones uteri gravidi, quas deinde edidit *Celeberrimus Albinus*, cui ars nostra tantum debet, patebit similiter, quam ampla vasa uteri substantiam occupent graviditatis tempore; unde & uterum spongiae, sanguine plenae, in gravidis comparavit *De Graaf* (v), & miratus est, quod
post

(s) Noortvvyk uteri human. gravid. Anat. & Histor. pag. 111.

(t) Ibidem pag. 205. (u) Ibid. pag. 10.

(v) De Mulierum organis Cap. VIII. pag. 104. 105.

post partum uterus sic contrahatur, ut sedecim dierum spatio ad pristinam redeat magnitudinem, per lochiorum fluxum evacuato sanguine, qui uteri vasa distendebat in gravidis.

In puerperis defunctis tamen invenit adhuc satis patula haec vasa, dum per siphonem liquorem in Arterias Hypogastricas, aut Spermaticas infunderet, qui non minus, quam flatus, in uteri capacitatem erumpebat.

Ex omnibus his patet, sanguinem menstruum, qui in gravidis naturali lege retinetur, non absumi in foetus incrementum tantum, sed etiam distendendis, ac replendis simul uteri vasis impendi. Non levis momenti est haec observatio in tractandis gravidarum morbis, uti postea patebit.

Quam pulcre haec quadrant Hippocratis (x) doctrinae! Ubi enim mulier ultro gerit, paullatim a toto corpore sanguis in uteros deferitur, & in orbem id, quod in utero est, circumstans, ipsum auget. Alio autem in loco (y), dum explicat, quare mulier non laboret, deficientibus mensstruis dum utero gerit, dicit: quod sanguis, singulis mensibus exire solitus cumulate, non agitur, sed sensim paullatim quotidie in uteros sine dolore secedat; ex quo augetur, quod intro in uteris continetur. Singulis autem diebus, & non semel per mensem, idcirco deferitur, quod genitura, quae in uteris continetur, semper aliquid e corpore, pro virium ratione, trahit, ad eundemque modum etiam spiratio habet. Ac primo quidem parva est spiratio, & paucus sanguis ex matre fertur; quum vero amplior fit spiratio, plus quoque sanguinis attrahit, & majore copia in uteros descendit.

Ovum ergo humanum, uteri concavae superficiei undique contiguum non tantum, sed & accretum, fovetur perpetuo calore sanguinis rubri copiosi, in uteri ambientis substantia contenti; sicque incubatus in proprio mulieris corpore fit, quem ovipara animalia extra corpus suum perficiunt tantum. Unde apparet, quam pulcrum usum habeat sanguis, antea singulis mensibus exire solitus, nunc retentus in vasis uterinis, illaque sensim magis dilatata replens. Harvaeus (z) praecipuum nascentis embryonis opus sanguini rubro tribuit; imo & existere prius, quam cor & vasa, atque in ipso nascentibus vitam primo incipere, & morientibus ultimo terminari, voluit. Inde spiritus vitalis, calorque natus caeteris omnibus advenit; in quo Medicorum calidum innatum, sive implantatum primo emicat, & lar familiaris, sive focus perennis hospitatur; unde perpetuo in universum corpus, singulasque ejus partes vita promanat, nutritio, incrementum, auxilium, & solamen, proveniunt &c. In quo calor primo (tanquam in fonte) & praecipue abundat, vigetque, & a quo reliquae omnes totius corporis partes calore influente foveantur, & vitam obtinent. Quippe calor, sanguinem comitatus, totum corpus irrigat, fovet, & conservat.

Notum est, pulli primordium, in ovo foecundato latens, per longum tempus manere posse absque ullo vitae, aut incrementi indicio. Debitus adhibeatur caloris gradus sive per gallinae incubatum, sive alio quocumque modo,

(x) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 23. Charter. Tom. VII. pag. 744.

(y) De Natura Pueri Cap. 3. Charter. Tom. VI. pag. 312.

(z) De generat. animal. Exercitat. 51. pag. 199. & seq.

motus, vita, incrementum sequuntur statim, & quidem adeo celere, ut viginti dierum spatio omnes ante sensus fugiens minutissima molecula pulium jam exhibeat perfectum, qui propria vi fracto putaminis carcere exit. Videtur calidi sanguinis copiosi, per uterina vasa moti, circumfusio non leve emolumentum praestare nascenti Embryoni humano.

§. 1295. **A**lia ex ipsa mole, motuque foetus, atque secundinarum, & aquarum, vim exercentium in partes hasce sensiles admodum.

Uterus gravidus suo fundo adscendit in abdomen, reliqua viscera premit, & ex situ suo naturali removet tanto plus, quo majus spatium in abdomine occupat: primis duobus, vel tribus mensibus graviditatis parum adhuc molestiae uterus, sua mole auctus, facere poterit; sed sequentibus mensibus ad partum usque multa quandoque parat incommoda. In cadavere mulieris, sexto graviditatis mense in aquam delapsae, & suffocatae inventum fuit: fundum uteri ventriculum tangere (*a*); sed inter uteri tumentis partem anteriorem, & peritoneum nihil de intestinis, nec de omento inveniebatur; omnia enim haec viscera, ad latera utrimque remota conspiciebantur; unde uteri superficies peritoneo anterieus erat contigua. Hinc intelligitur ratio, quare motus foetus in utero, manu abdomini imposita, facile sentiatur. Verum etiam uteri pars postica incumbibat ossi sacro, & vertebriis lumborum, absque ullo viscere interposito (*b*). Uteri fundo ventriculus, & in aliis cadaveribus gravidarum inventus fuit incumbere, omentum, & pars magna intestinorum sursum, ac retrorsum versus diaphragma haerebant compressa. Similia de mirabili mutatione situs viscerum in gravidis etiam apud alios auctores leguntur (*c*). Patet ergo, vim quandoque inferri visceribus, dum a tumente utero ad latera removentur, ita ut hinc inde comprimantur intestina, sicque difficilior ingestorum transitus per tenuia, accumulatio faecum in crassis sequantur: ab eadem causa bilis in duodenum exitus redditur difficilior, unde toties leves icteri in gravidis observantur, qui post partum plerumque cessant, nisi retenta bilis in vesica fellea jam majorem spissitudinem acquisiverit, vel in calculosas concreciones concreverit, quae non facile per angustias ductus transire possunt. Rarius tamen hoc contingit, nisi in illis, quae jam ante graviditatem in hos morbos vergebant: plerumque enim gravidarum icteri faciles sunt. A diversa hac compressione viscerum plura certe symptomata oriri poterunt tempore graviditatis. An ideo Hippocrates (*d*) dixit: *Si nosse velis, an mulier conceperit, dormiturae aquam mulsam potui dato. Quod si tormina habuerit circa ventrem, concepit, sin minus, non concepit?* In commentario ad hunc locum Galenus (*e*) notat, quod crudam aquam mulsam

e 2

de-

(*a*) Denys over het ampt der vroedmeesters &c. pag. 54.

(*b*) Ibidem pag. 56-62.

(*c*) Levret L'art des accouchem. &c. pag. 57.

(*d*) Sect. V. Aphorism. XII.

Charter. Tom. IX. pag. 219.

(*e*) Ibid. pag. 220.

dederit *Hippocrates*, quia flatulentia ejus ad hanc Diagnosin opus habebat. Videtur autem tentasse hanc Diagnosin primis graviditatis mensibus, cum circa quartum mensem, quandoque citius, aut serius, foetus motum gravis mulier sentire soleat (f); quod certius habetur impraegnationis signum, quam tormina ventris post mulsam epotam. Diserte autem addit *Galenus* (g), tormina illa fieri in mulieribus, quae conceperunt (*διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ μήτρας στενοχωρίαν*) propter angustiam loci, quae a matrice (tumente) fit.

Ab hac causa alvum adstrictam gravidarum deduxit *Mauriceau* (h), uti & alii plures. Sed & intelligitur inde, quare vomitu molesto laborent quaedam mulieres circa finem graviditatis, illae nempe quibus uterus ascendit altius, & ventriculum premit, sicque irritat, vel saltem ejus distensionem ab ingestis impedit. Si, uti paullo ante dictum fuit, uterus in abdomen assurgens sexto graviditatis mense jam tangebatur ventriculum, ultimo graviditatis mense compressisse, & arctasse illum, facile creditur. Talis autem vomitus cura sperari non potest, nisi a depletionem uteri per partum. Unicum solamen est, si parum simul comedant, & bibant, sed frequenter, ut sic nutriantur, absque eo quod ventriculus distendatur (i). Si jam a sola mole uteri distenti tot incommoda oriri possint, facile patet, haec multum augeri, dum foetus valide se mover in utero, & vicinis impingit visceribus.

Spes tamen est, mutatum viscerum situm, depleto utero, restituendum brevi in naturalem: hoc autem plerumque contingere solet, nec semper tamen. Notaverat jam *Casparus Baubinus* (k), de omento agens, sequentia: *Nonnullis post partum circa ventris medium collectum remanet, ita ut non leves saepe dolores perferant.* Omentum, satis magnae molis in hominibus, intestinis superincumbit liberum, illa fovet, humectat, oblinat, dumque binis lamellis, supra se invicem mobilibus, constat, facile cedit, & situm mutat: nam in animalibus, post partum dissectis, omentum sub ventriculo collectum quasi apparet; sed vacuo ventriculo profundius descendit versus inferiora. Dum autem uteri gravidi fundus supra ossa pubis prominere incipit, elevat intestina, ac omentum, & ad latera haec sensim detrudat. Videtur autem quandoque omentum ab utero assurgente convolvi, & complicari: si jam vel ab uteri compressionem, vel ab alia quacumque causa siccescat omentum, concretio lamellarum omenti metuenda erit, nec depleto per partum utero poterit evolvi, ut pristinum locum occupet. Viderat aliquoties *Ruyschius* (l) tumores duros, & oblongos, post partum in abdomine remanentes, & fatetur, diu se ancipitem haesisse, quid de his statueret, donec in dissectione cadaveris rem detegeret. Vidit enim *omentum duos fere digitos crassum, tres digitos latum, spithamam cum dimidia longum, & in substantiam adipo-carnosam degeneratum, atque insuper scirrhosum.* Massa autem illa, uti figura expressit, adhaerebat superius fundo ventriculi, inferius uteri fundo: admodum videtur cre-

(f) *Mauriceau Traité des malad. des femmes grosses* Tom. I. pag. 92. statim citato.

(h) Tom. I. 124.

(i) Ibidem 130.

(g) In loco

(k) Theat.

Anatom. Lib. I. pag. 79. Cap. 12.

(l) *Observ. Anatom. chirurg. Cent.*

observat. 63. pag. 59.

credibile, fundum uteri elevatum ad ventriculum usque pressisse omentum, & cum illo concrevisse; post partum vero uterum contractum accretum omentum secum detraxisse, sicque tumorem talem oblongum in abdomine produxisse. Viderat, & contrectaverat in viventibus plures tales tumores *Ruyfchius*, quorum nonnulli transversim positi erant, alii situm obliquum obtinebant. Notat pariter, *mulieres eos tumores, sine magno, imo aliquando sine ullo dolore, licet non sine aliquo incommodo, per plures annos gestasse.*

Antea, ubi de hydropse agebatur, pluribus observatis constitit, quam miro modo quandoque omentum degenerare possit, & difficillimos morbos producere.

Quando sensim, & directe ascendit uterus, mutatur quidem viscerum abdominalium situs, sed lente, & minori vi. Ubi autem fundus uteri gravidus in dextrum, aut sinistrum latus inclinat, inaequalior fit compressio, & multa posunt sequi mala. Mirus talis casus, a Clarissimo *Littre* observatus, legitur (m), ubi uterus gravidus, vitio ligamentorum in dextrum latus semper declinans, hepar sursum contra diaphragma presserat, ejus situm, & figuram mutaverat, pectoris cavum minuerat, palpitationes cordis produxerat, &c. Primus infans adeo magnae molis fuit, ut non potuerit excludi, sed mortuus frustilatum debuerit extrahi. Postea adhuc binos infantes feliciter peperit, sed semper uterus in latus dextrum inclinabat graviditatis toto tempore.

Cum autem observatis, uti dictum fuit, constet, inter uterum gravidum, ac tumentem, & vertebrae dorsii nihil interponi, poterit & sic premi ab incumbente utero descendens secundum vertebrarum corpora aortae truncus, ut sanguis, corde pulsus, difficilior versus inferiora tendere possit, & hinc superiora magis impleantur. Verum antea, ubi de apoplexia agebatur, ad §. 1010. 3. γ. monitum fuit, quod ab utero gravido, comprimente vicina, impetus, & copia sanguinis versus caput augeri possit, & quidem non sine periculo; quod & tunc confirmabatur *Hippocratis* textu ibi citato, dicentis: *Uterum gerentibus capitis dolores cum sopore, & gravitate oborientes, mali: fortassis autem & his convulsivum quid pati contingit.* Simul notabatur ibidem, *αἷς ἐπιπόρως* non simpliciter gravidas, sed partui vicinas vocari; tunc enim a tumente quam maxime utero majus discrimen compressionis vasorum adest.

§. 1296. **A** Priori (1294.) videtur pendere Nausea, Vomitus, prostratus appetitus, vel idem depravatus plane, animi deliquia, vertigines, dolores summi stomachi, pectinis, inguinum, renum, mammarum, torpor, gravitas, dyspnoea, abortus.

Recensentur hoc paragrapho praecipua symptomata, quae graviditatem comitari solent; non quidem, quod cuncta in omnibus gravidis adsint, sed plura, vel pauciora ex his occurrant in diversis mulieribus gravidis: omnia autem haec mala solent tribui eidem causae, nempe sanguinis copiae nimiae, a

re.

(m) Académ. des sciences l'an. 1709. pag. 32.

Tom. IV. Pars II.

retentis menstribus natae, dum foetus hunc sanguinem nondum potest in sui incrementum absumere, uti ad §. 1294. dictum fuit.

Verum tunc monitum fuit, non tantam sanguinis copiam per menstrua excerni, ac quidem vulgo creditur, & notabilem ejusdem partem infumi, ut uterina vasa, mole aucta, impleta maneat. Unde merito dubium nascitur, an soli plethorae in gravidis haec symptomata tribui possint.

Certe plethora habet sua signa, quibus distinguitur, de quibus dictum fuit ad §. 106. An illa inveniuntur in omnibus gravidis, quae aliqua saltem ex symptomatibus hic recensitis patiuntur? Ad §. 1293. inter signa graviditatis recensebatur, si oculi magis contracti, & cavi cernerentur, & oculorum album lividum appareret. Sed haec non sunt plethorae signa; in hac enim oculi potius prominent, & vasa rubra in albo oculorum apparent. In multis gravidis faciem magis pallidam, & contractam inveni, attamen graviditatis molesta satis symptomata aderant.

Praeterea pleraeque mulieres impraegnantur post menstruum fluorem finitum: unde peritae matronae tempus futuri partus computare solent, dum initium graviditatis ponunt decimo quarto die post initium ultimi floris menstrui, & eventus toties confirmavit, justum satis fuisse hunc calculum. Verum hoc tempore nondum potest adesse plethora a retentis menstribus. Interim saepius vidi, nauseam, & vomitum in ipso graviditatis initio adfuisse. Probe memini, formosam virginem, vegeto nuptam juveni, sequenti post nuptias die vomuisse, nauseasse, & postea insolita quaedam appetuisse. Indignabatur omnino, dum festivo in convivio ab omnibus salutaretur gravis. Post novem menses, exacto computo absolutos, sanum, robustum infantem peperit. In alia muliere, satis robusta, mox a conceptu dolebat ventriculus, & dorsum immaniter; fiebat meticulosissima, & cogebatur perpetuo decumbere; ructus, & flatus fere perpetui; lassitudo corporis summa; sensus omnes erant torpidi, facies pallida, mortuae fere similis. In miserrimo hoc statu manebat usque in quintum graviditatis mensem: tunc incepit vomere, vires redierunt, surgebat de lecto, & reliquum graviditatis tempus satis commode absolvebatur. Saepius peperit misera haec mulier, sed semper easdem molestias ferre debuit, licet plures, & periti Medici omnem adhiberent operam, ut illi succurrerent. Tentata fuit Venae sectio, & alia plurima; sed incassum.

Scio quidem, opponi posse, quod raro tales casus observentur, sed saltem hoc inde concludi potest, symptomata tempore graviditatis observata non semper habere plethoram pro causa. Praeterea satis obvium est, mulieres nauseare quandoque, cibos quosdam fastidire, quibus antea delectabantur, insolitos appetere, atque, dum antea similia expertae fuerant, dubitare de graviditate, anxie expectantes solitam menstrui floris periodum, quae si non sequatur, tunc certo credere se gravidas esse, & ab illo tempore, quo haec symptomata observaverant, impraegnationis initium computare. Certe & in his casibus, qui rari non sunt, plethora non potest dici causa horum symptomatum, cum nondum adsit, & axioma illud in scholis omnibus admittatur, quod nullus effectus possit prior esse sua causa. Uteri, & vicinarum

uteri

uteri partium, quae ad generationem spectant, insignis mutatio ipso impregnationis tempore, & postea, videtur potius causa esse illorum symptomatum, quae graviditatem comitantur, imprimis, cum ex ante dictis constiterit illud regiminis imperium, quo uterus in alias corporis partes agit.

Nausea, vomitus, prostratus appetitus. Adeo familiare hoc malum gravidis est, ut plurimae hoc patienter ferant, & vix medelam poscant; praecipue, cum saepius idem jam expertae noverint, procedente graviditate has molestias sensim minui, & tandem penitus cessare. Raro enim durant ultra tertium mensem. Quibusdam quidem circa finem graviditatis vomitus, & nausea adsunt ob uterum assurgentem, & ventriculum jam sexto graviditatis mense tangentem, uti dictum fuit: verum hic imprimis agitur de illa nausea, & vomitu, quae primis diebus graviditatis jam incipiunt (*n*). Simul monet Auctor idem, non produci haec per colluviam pravorum humorum in ventriculo, adeoque nec requiri evacuantia, quae in primo hoc graviditatis stadio vix tuto possunt adhiberi, praecipue si validiora fuerint. Videri possunt & illa, quae in *Capitulo de nausea* ad §. 642. N. 5. de hac re habentur. Tamen negari nequit, quod si diu durent haec, vel continuo urgeant, laedantur functiones viscerum chylopoieticorum sic, ut horreant miserae ab omni cibo, & potu, & in ventriculo, ac primis viis quandoque colligatur faburra vitiosorum humorum, quae expelli debet, imprimis si ructus nidorosi, os amarescens, lingua sordida talis mali indicium dederint. Lene purgans, imprimis ex *rhabarbaro*, solet tunc insigniter prodesse (*o*); validiora enim semper caute vitantur. Hanc methodum omnes optimi auctores, qui de gravidarum morbis scripserunt, commendaverunt; *Hippocrate* etiam consentiente (*p*), qui sic habet; *Praegnantibus medicamentis purgandae sunt, si humor turgeat, quadrimestres, & ad septimum usque mensem; sed haec minus. Minoribus autem, aut grandioribus foetibus cavendae sunt purgationes.* Patet ergo, quod *Hippocrates* non commendaverit purgationem ad nauseas, & vomitus, quae primo graviditatis stadio contingunt, tertioque mense cessare solent, & quandoque citius; sed tantum in illo casu, ubi copia pravorum humorum adesset. Prioribus autem mensibus, quia majus tunc abortus periculum est, his abstinendum jussit; uti etiam ultimis mensibus, ne per tormina, quae saepius a purgantibus fiunt, excitarentur partus dolores, & ante tempus excluderetur foetus, nondum omnino maturus. Cum autem alio in loco (*q*) monuerit sequentia; *Mulieri utero gerenti, si alvus multoties fluat, abortionis periculum est;* concludi potest, quod leniora tantum purgantia adhibuerit.

Semel vidi, verso jam foetu, & utero ad inferiora descendente, nauseam, & vomitum rediisse, quae vix jam poterant attribui uteri ascendentis fundo, ventriculum prementi. Vini Hispanici pauculum cum pane biscocto datum profuit statim fere; quod & a *Mauriceau* (*r*) laudatur; qui parvam quoque

(*n*) Mauriceau Traité des malad. des femm. grosses. Tom. I. pag. 128. 129.

(*o*) Ibid. pag. 131. (*p*) Sect. IV. Aphor. I. Charter. Tom. IX. pag. 130.

(*q*) Sect. V. Aphorism. 34. Ibid. pag. 214.

(*r*) In loco modo citato.

copiam spiritus vini dedit in similem usum. Si calidae temperiei, & plethorica foret gravida, tutum non foret calidioribus his uti, nisi prius per sanguinis missionem plenitudo haec imminuta foret. Caeterum vina illa oleosa, meraca, si dentur parca copia, multum levaminis adferunt. Hippocrates (s) statuit, quod *meraciores potus ad uteros, & foetus nutritionem meliores existunt.*

Ubi autem nausea perpetua, & vix tolerabilis amplius, affligebat gravidas, quibus genus nervosum admodum mobile erat, tunc aliquot guttulis laudani liquidi datis illam saepius feliciter sedavi. Vide illa, quae ad §. 644. 5. habentur.

Depravatus plane. Cum adeo varius sit ille appetitus depravatus, Graecis *χώρα* vel & *χίρτα* (t) dicitur, eo quod pica avis & alas diversi coloris, & variatam admodum vocem habeat. Malacia etiam vocatur illud symptoma, quod non tantum in gravidis, sed & in virginibus aliquoties observatur. Appetitus ille depravatus quandoque absurda quaevis desiderat. Sic Hippocrates (u) notavit, praegnantem quandoque terram aut carbones concupiscere, & comedere, & in foetus capite signum tunc apparere, ubi editus fuit. Numerosa in Historia Medica habentur depravati gravidarum appetitus exempla, dum murorum calcem, lateres, lanam, aliaque multa clam devorarent. Contingit etiam saepius, ut in quosdam cibos acerrimo appetitu ferantur, & stupendam horum manducent copiam. Vidit Tulpus (v) mulierem, quae *impraegnata delectabatur tam impense halecibus salitis, ut ante partum comederit mille, & quadringentos; attamen sine ventriculi offensa, ulloque sanitatis dispendio.* Computo subducto, patet, quod quotidie quinque comederit haleces, qui gratum quidem dant ferculum, verum a robusto homine vix ferri possent tanta copia. Sed & infans eodem delectabatur appetitu, *ut cum necdum posset verbis, expetierit tamen ejulatu haleces.* Ubique satis in more est, ut gravidis concedantur illa, quae petunt, nisi omnino fuerint abscondita, & certo nocitura; quocumque etiam redimi debeant pretio. Unde sequens axioma practicum statuit Manningham (x): *Si alimenta, quae apprimè appetunt gravidae, optima, & ad nutritionem maxime idonea non sint, omnino tamen anteponenda sunt illis alimentis, quae fugiunt, & oderunt.* Neque semper illa ciborum, vel potuum desideria per totum graviditatis tempus durant, ut in muliere illa, quae tot devoraverat haleces; sed saepius vidi, quod satis cito evanuerint, & denuo redierint quandoque. Sic optimam matronam novi, quae sobria semper, per unum, alterumve diem incepit vinum appetere quam maxime; pudibunda tamen cum esset, noluit vinum petere majori copia, quam solebat: maritus, rem subolfaciens, callide subministravit occasionem facilem, ut clam omnibus huic desiderio satisfacere posset: facta est postea, nunquam aliquid gratius sibi contingere potuisse, & licet satis largam copiam vini hausisset, optime se habuit.

Animi

(s) De salubr. vict. rat. textu 24. Charter. Tom. VI. pag. 233. (t) Moschion apud Spach. pag. 3. N. 28. (u) De superfoetatione Cap. VI. Charter. Tom. VII. pag. 863. (v) Observat. Medic. Lib. 2. Cap. 24. pag. 132. (x) Ari. Obsteric. Compend. pag. 65.

Animi deliquia; quae saepius tempore graviditatis contingunt; imprimis in tenerioribus, & delicatioribus foeminis: quandoque & validam nauseam haec sequi solent, sed brevi evanida, si fragrans acetum, odorum vinum, vel spiritus leniter aromatici naribus supponantur, additis quandoque & blandis antihysteriis remediis, de quibus postea ad §. 1300. dicetur. A motu foetus in utero validiori, uti etiam dum genibus incumbunt diutius, quandoque leviter animo linquuntur. Praeterea, utero, & foetu jam multum auctis mole, magna copia sanguinis in uteri substantia continetur, ac in placentae vasis; verum & turgens uterus quandoque premit venas iliacas, arterias minus, cum firmiores sint; unde magna copia sanguinis in pelvi, & sub pelvi continetur, quae ad cor non redit, vel saltem non omnis; unde cordis vires minuuntur. Si vero mutetur uteri situs, decumbendo in lecto, vel alio quocumque modo, liberantur quandoque venae compressae, & copia sanguinis ad cor venit, illudque per aliquot momenta fere obruit; unde & cordis palpitatio, & instans quasi jamjam animi deliquium sequitur; donec sanguis ille denuo aequabiliter per omnia vasa distributus fuerit; tunc enim omnia haec cessant.

Vertigines. A vertigine, quamvis levissimus cerebri morbus sit, omnes etiam graviores capitis morbi incipere, & dum curantur, pro ultimo symptomate vertiginem relinquere solent: frequenter animi deliquia praecedunt, vel comitatur, & frequentissime nauseam, etiam in sanissimis paullo ante hominibus, si subito in gyrum corpus agant, mari vehantur, ex alto loco deorsum spectent, &c.: Hinc a levibus satis causis vertigo nasci poterit. A plethora, si nimis turgeant encephali vasa, vertigo sequitur, vasorum depletionem sananda; & vulgo solet in gravidis haec causa accusari, quae quandoque, sed non semper, locum habet; cum & eadem causae, quae animi deliquia, nauseam, vomitum producant, etiam vertiginem faciant, adeoque & simili medela indigeant.

Dolores summi stomachi. Cum acrimonia acida morsum ventriculi, & faevos intestinorum dolores toties producat (vide §. 63.), ab eadem causa & in gravidis mulieribus hoc poterit contingere, si cibis, & potibus acidis, aut cito acescentibus delectentur; imprimis, cum ob frequentem nauseam debilitata coctione prima haec difficilius subigantur, adeoque suam sequantur indolem; unde *Manningham* (y) monet sequentia; *Mulieres gravidae, quibus acescere, sive ardorem solet pati stomachus, ab acidis fructibus immaturis, saccharoque abstineant; vel etiam vinum fugiant; nam vinum, ut alimenta in stomacho acescant, efficit, ipsumque est acidum.* Acidi absorbentia terrea, ut *lapis cancrorum*, & similia, satis feliciter hoc malum tollunt: *Vina Hispanica*, & alia oleosa, ut *Tockaviense*, &c., non adeo facile acescunt; quae ergo prae aliis usurpari poterunt. Omnium autem maxime sensibilis pars videtur esse orificium superius ventriculi, quod ab acidis, vel aliis acris irritatum quam maxime dolet.

No-

(y) Art. Obstetric. Compend. pag. 66.

Notum est, si quis vinum acidum ingesserit, vix molestiam sentiet; verum si eructaverit, vel in rheda vectus concutiat, ita ut contenta ventriculi, jam acriora reddita, alluant orificium ventriculi superius, solet cardialgia sequi. Si jam consideretur, a tumente utero ventriculus premi, & quandoque ejus situm mutari, intelligetur ratio, quare ventriculi dolor a graviditate, ut causa, produci possit. Plura observata docuerunt, quandoque pertinacem dolorem ventriculi fieri, dum tumores scirrhusi ventriculo adhaerentes, vel & in ejus substantia nati, premendo, vel & pondere suo distrahendo agunt. Aliquoties vidi, mulieres, his doloribus obnoxias, post quartum graviditatis mensem ab illis omnino liberari, qui post partum redibant aequae molesti. An in his tumens uterus sustinet scirrhusos tales tumores, ita ut ventriculus minus laedatur? non videtur improbabile. Plenam tamen certitudinem non habeo, cum non contigerit mihi occasio, ut ullum cadaver illarum, in quibus hoc observaveram, aperire potuerim.

An vero similis dolor non tantum a pressione, vel mutato situ ventriculi oritur, verum & per consensum, quo uterus ipse diffitas corporis partes afficere potest, quae actio regiminis dicitur, uti antea monitum fuit? Videtur *Hippocrates* (x) tale quid indicasse. Ubi enim recensuit, quae graviditatis tempore contingunt, uti & illa, quae fiunt, dum partus instat, subjungit; *Toto vero intermedio tempore oris ventriculi dolore subinde premitur, ob ventrem undique complectentem foetum, maxime vero ob uterum.* Dum autem partus tempore uterus molestum jam onus excutere nititur, cardialgia prius affici, notat *Hippocrates* (a), & pro signo jamjam instantis partus habet, dicens; *Quae in partu os ventriculi praedoluerunt, paullo post ejiciunt.* Non enim hic loquitur de cardialgia, quae graviditatis tempore adfuit, sed de illa, quae corripit, dum partus dolores jam adsunt.

Pectinis, inguinum, renum. Si consideretur mutatio situs viscerum abdominalium per assurgentem uterum gravidum, mirum non videbitur, varios nasci posse dolores a quarundam partium distractione, vel & compressione; praecipue, si praeternaturalis aliqua concretio viscera abdominalia inter se, vel cum vicinis partibus univerit.

Verum quidem est, quod superior pars uteri, quae fundus dici solet, in gravidis expandatur imprimis: invenit *Noortwyk* (b) in cadavere mulieris, quinto graviditatis mense mortuae, quod sequitur; *Supremum uteri laqueare insigniter expansum erat; ita ut tubae Falloppianae, quae in non gravidis naturaliter lateribus summi uteri inseruntur, demissiori longe loco haerent: nempe quarta pars globi supra parallelam earundem insertionem protuberabat.* Idem & obtinet in ligamentis uteri, teretibus dictis, sive rotundis, quae a fundi uteri lateribus, ubi tubae Falloppianae utero committuntur, orta, ita duplicatam peritonaei versus inguina utrimque descendunt, dein extra abdominis cavitatem prodeunt, oblique supra pubis ossa versus pinguedinem, ibi copiosam,

ex-

(x) De Mulier. Morb. Lib. I. cap. 32. Charter. Tom. VII. pag. 749.

(a) Coacar. Praenot. N. 54. Charter. Tom. VIII. pag. 884.

(b) Uter. human. grav. anat. pag. 7. pag. 71.

excurrunt, & in ea prope Clitoridem in multas partes divisa terminantur, ac evanescunt (c). Sic impeditur nimia quidem illorum distractio, attamen, magis magisque adscendente uteri fundo, videntur plus elongari; & in quibusdam gravidis dolor molestus excitatur praecise illo in loco, ubi supra pubem haec ligamenta desinunt; cum autem vasculosa sint, & haec vasa in gravidis magis repleta observentur, forte & inde dolor nascitur (d). Adest autem ille dolor plerumque in uno latere tantum, & credidit celebris ille in arte obstetricia auctor, vasa ligamentorum teretium ideo infarciri, quia placenta, utero accreta, locum, unde enascitur ligamentum teres, occupat. Unde credidit, hoc in utroque loco fieri non posse, nisi in gemellis, si singuli suam placentam habeant.

Saepe hos dolores in gravidis observavi hisce locis, plerumque post aliquod tempus, absque noxa relicta, evanidos. Verum & similes dolores in cruribus, ac femoribus quandoque patiuntur gravidae, quae ab hac causa non videntur pendere. Illos dolores autem potius in prima graviditate contingere, observavit *Mauriceau* (e); quibus, quiete in lecto, & venae sectione, si opus foret, medelam facere solebat. Sponte autem patet, omnia haec mala multum augeri posse, dum foetus valide movetur in utero. *Hippocrates* dixit (f) de muliere, gravida partui proxima; *Tum maxime lumbis dolet; nam & lumbi a foetu percutiuntur.*

Mammarum. Antea, ubi de virginum morbis agebatur, dictum fuit de manifesto illo commercio, quod inter mammas, & uterum intercedit: etiam inter signa graviditatis mammarum tumor numerabatur, qui, si mollis sit, & potius tensionis utcumque molestae sensum faciat, quam dolorem, nullam medelam poscit: pro bono enim signo habetur & *Hippocrates*, uti postea dicetur, abortum praesagebat, si subito flaccescerent mammae in gravidis; & e contra optimam spem fovebat, si denuo turgidae redderentur. Cum autem, uterum humanum binis constare cavis, crederet, quorum dextrum mares, sinistram puellas foveret; hinc abortus futuri sexum cognosci posse, credebatur, prout dextra, vel sinistra mamma flaccesceret. Mollis frictio fomentum ex hydrogala, in qua sapo Venetus dissolvitur, satis feliciter has molestias tollere solent; praecipue, si serosi quid sublactei ex papillis effluat. *Mauriceau* (g) pariter monuit, naturae hoc committendum esse; damnavit omnia repercutientia, & cavendum iussit, ne vestibus arctius adstrictis turgentes mammae premerentur; inde enim merito pessima metuebat mala.

Torpor, gravitas, dyspnoea. Molestum, quamvis carum, onus gravat totum corpus, & quandoque adeo debiles reddit, ut vix artus movere possint ultimo graviditatis tempore, praecipue si molliter educatae fuerint, & toto graviditatis tempore inertes torpuerint otio. Rusticae mulieri gravidae minor molestia, quae

In-

(c) De Graaf de Mulier. organ. pag. 147. 148. (d) Levret l'art des accouch. pag. 33.
 (e) Traité des malad. des femm. gross. Tom. I. pag. 134. (f) De Mulier.
 morb. Lib. I. cap. 32. Charter. Tom. VII. pag. 749. (g) Traité de malad. des
 femm. gross. Tom. I. pag. 137.

*Instanti cum plena tument quoque viscera partu,
Aequat humum rastris, segetem nascentibus herbis
Liberat, in longos religat sarmenta mamplos.
Et duri patiens ita ruris, amansque laborum est,
Inter ut agrestes operas enixa, marito
Progeniem referat, quam non peperisse, sed agris
Invenisse putes (b).*

Totam quandoque familiam vidi desolatam, dum metuebant, ne ob torporem, & debilitatem matris unquam felix succederet partus. Ubi tamen veri partus dolores urgere ceperunt, omnis torpor cedebat, vires, antea superessae, redibant illico, & faustum sequebatur puerperium. Licet omnes calida cardiaca stimulantia poscerent, ut vires scilicet erigerentur, nihil tale dedi, cum nocitura praeviderem.

Dyspnoea autem imprimis circa finem graviditatis observatur, cum repleto adeo abdomine & diaphragma libere descendere nequeat, & muscoli abdominales adeo distracti minus valide agant.

Abortus, sic dictus, quod non sit tempestive ortus, vocatur foetus ante terminum ex utero exclusio: adeoque, stricte loquendo, potest abortus in primo impraegnationis exordio contingere, hinc & ὁμοτοκίαν alii dixerunt, immaturum partum: Attici, Galeno (i) teste, vocabant ἀμβλωσιν: Hippocrates autem ἀπορροπὴν, deperditionem vocare solebat; quia intempestivi tales foetus vel prodeunt jam mortui, vel si adhuc vixerint, brevi pereunt. Cum autem ante septimum mensem expulsus foetus raro, vel nunquam superstes maneat, hinc tales sub abortus nomine comprehendere solent Medici: cum vero plurima exempla habeantur foetuum septimestrium, qui diu non tantum supervixerunt, sed & ad bonam senectutem pervenerunt, hinc tales partus non vocantur amplius abortus, sed simpliciter tantum praematuri. Cum autem primo impraegnationis tempore ovum humanum nondum uteri superficiei nexum sit, si tunc elabatur de utero, vix ullo indicio cognosci poterit talis embryonis deperditio; unde & a multis abortus nomen tunc vix mereri creditur. Hinc plerumque a primi mensis fine usque ad septimum mensem absolutum mulier abortiri dicitur, si foetum perdat. Cumque toto hoc temporis intervallo embryo utero nexus sit, illa separatio ab utero, cujus vasa jam aucta mole, & sanguine plena sunt, fieri nequit fere, nisi ante abortum, vel & ipso abortus tempore sanguis majori, minorive copia de utero exeat.

Forte hinc vocari posset abortus *sanguinolenta foetus immaturi expulsio*.

Possunt enim satis commode in abortu tria temporis stadia distinguere. *Primum* est, quando nexus placentae cum utero incipit solvi. Notum est, ovum humanum adhaerere omnium firmissime utero in illo loco, ubi placenta est, & magna uteri vasa cum placenta communicare, quae nexu hoc soluto sangui-

nem

(b) Vanier Praed. Rust. Lib. 2. pag. 47.
text. 2. pag. 356.

(i) Comment. I. in Lib. VI. Epidemic.

nem fundunt, qui copia auctus chorii nexum, longe debiliorem, cum utero tollit magis magisque, donec per os uteri exire incipiat: & hoc vocatur *secundum* stadium abortus. *Tertium* stadium dicitur, ubi foetus immaturus ex utero prodit.

Si jam in memoriam revocentur illa symptomata, quae primis graviditatis mensibus adesse solent, patebit facile, saepe metuendum esse, ne tener ille nexus foetus cum utero destruat. Soli per vomitum abdominis concussus producere possunt hoc malum; imprimis, si non tantum nausea, & vomituritio, sed validus, & frequens vomitus adsit; qui, uti dictum fuit ad §. 652. agnoscit pro causa non tantum fibrarum muscularium, faucium, oesophagi, stomachi, intestinorum convulsionem, sed etiam diaphragmatis, & musculorum abdominalium; unde tunc omnia contenta abdomine visceri apremuntur, & concutiuntur. Augetur hoc discrimen, si vasa corporis multo sanguine turgeant eodem tempore.

Inde etiam patet ratio, quare circa tertium mensem abortus frequentius contingat; quia nempe debilior adhuc est nexus foetus cum utero, & in sanguineae temperii foeminis, quibus antea copiosa solebant fluere menstrua, vasa uterina multo sanguine turgent.

Sequitur jam, ut consideremus, qua methodo, & per quae remedia haec symptomata, si non omnino tolli, saltem minui, & leniri possint. Patebit autem statim, ad hunc scopum obtinendum prudentia opus esse.

§. 1297. **Q**uae proinde pendentia ab una causa eodem remedio, sanguinis missione, tolli solent.

Cum inter praecipua graviditatis signa menstruorum cessatio habeatur, hinc solebant incipientis graviditatis molestiae retento huic sanguini adscribi a plurimis; adeoque concludebant, nullum praesentius remedium haberi posse, quam si per venae sectionem tolleretur sanguis, a cujus nimia copia nasci omnia haec mala, credebant. Verum ex antedictis patuit, non in omnibus mulieribus tantam evacuari menstrui sanguinis copiam, ut ab hujus retentione, statim in graviditatis initio, mali quid metuendum sit. Praeterea patuit, multa ex illis symptomatibus, quae inter signa graviditatis solent haberi, jam adesse, antequam a retentis menstruis copia sanguinis aucta fuerit: solent enim saepe mulieres concipere primis diebus, postquam cessaverint menstrua, & in pluribus statim nausea, vomituritio, & appetitus rerum insolitarum observatur. Neque facile deduci posse videntur haec gravidarum symptomata a sola copia sanguinis aucta, cum in plethoricis eadem non observentur. Verum etiam demonstratum fuit, sanguinem hunc retentum impendi replendis uteri mole crescentis vasis; atque ob hanc causam non statim abundare, licet a tenello Embryone non possit absorberi totus.

Quam maxime autem hic videtur considerandum naturae institutum, cui ministrare Medicum oportet, non imperare. In sana, & vegeta muliere debito tempore fluunt menstrua; cessant, si impraegnatur. Si semper cum periculo

iculo retineretur in corpore gravidæ ille sanguis, adorandus Creator alias substituisset vias, per quas exire posset, & illæ gravidæ, quæ sanguinis missionem non admitterent, graviores paterentur molestias. Nunquam tota vita sanguis missus fuit uxori meae propriae; nunquam tamen abortivit, & sex proles sanas peperit felicissime, atque a puerperiis cito restituta fuit semper. In plurimis aliis idem observavi; & hinc merito concludere possum, sanguinis illam missionem in omnibus gravidis necessariam non esse; imo nec semper utilem, & quandoque noxiam.

Longe tamen absum ab illa sententia, nunquam venam secandam esse in gravidis: vidi plures, quæ sanguinis missione opus habebant five ob nimiam plenitudinem, five ob subitam rarefactionem sanguinis. Illæ, quæ singulis mensibus copioso sanguine diffuunt, dum non sunt gravidæ, opiparo utuntur victu, & corpus parum movent, sæpe nimio sanguine turgent, plethoricae primo, vel secundo graviditatis mense; nec unquam dubitavi, talibus venæ sectionem suadere, simul ac signa plethoræ observarem; probe gnarus, caeteroquin abortus periculum imminere. In aliis, per iracundiam validam vidi omnia vasa illico turgere repleta, faciem rubram tensam, oculos rubro sanguine suffusos, & his venæ sectio profuit. Hoc tantum monitum volo, ne pro generali regula habeatur, sanguinem tempore graviditatis mittendum esse, & omnes molestias, omnia mala, quæ sequuntur, merito attribui hujus remedii neglectui. In quibusdam locis hæc opinio inoluit, imprimis in nobilibus familiis, ter venam secandam esse tempore graviditatis; in initio nempe, circa medium, & prope finem, nulla habita ratione temperiei, & habitus corporis. Vidi, hoc factum fuisse in tenellis pallidis foeminis, & licet languerent inde pessime toto graviditatis tempore, debiles, languidos, infirmos parerent foetus, & per integros menses affigerentur lecto, antequam post puerperium prodire possent in publicum, vix tamen, & apud paucas tantum impetrare potui, ut imposterum idem non tentaretur. Medici ipsi, famæ suæ nimis consulentes, huic torrenti vix se audebant opponere: probe gnari enim erant, si quid sinistri contingeret postea, illud unice attribuentum fore omissæ venæ sectioni; e contra, si more solito sanguis mitteretur, liberos ab omni culpa pronunciandos, quidquid etiam postea fieret.

Interim optimorum Medicorum gravis auctoritas suadet, caute hic procedendum esse. Dixerat Hippocrates (k): *Mulier utero gerens vena secta abortit, eoque magis, si foetus grandior fuerit.* Et Galenus assentitur Hippocrati, præcipue, ubi jam adultior foetus majori copia nutrimenti indiget. Praeterea, dum in partu placenta educitur, magna sanguinis copia exire solet, & lochia per plures dies pergunt deplere vasa uterina. An ergo conducet paullo ante partum per venæ sectionem minuere adhuc sanguinis copiam? Novi quidem, quod dicatur, sic impediri, ne copia tanta sanguinis ex utero fluat, dum placenta educitur: sed ne quidem verosimilis est hæc sententia. Magna enim adeo vasa ex utero ad placentam veniunt, ut necessario, post nexum hunc solutum, undatim sanguis effluere debeat; quem uterus se contrahens, dum

vacu-

(k) Aphor. 31. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 213.

vacuus est, urget. Imo nisi hoc fieret, pessima sequerentur mala, uti postea demonstrabitur in capitulo *de morbis puerperii*.

Fatendum est, non omnino, & absolute verum esse hunc *Hippocratis* aphorismum: nam quotidiana observata docent, abortum non semper sequi, si gravidæ mulieri vena secetur. Unde *Celsus* (l) prudenter limitavit *Hippocratis* sententiam. Dum enim de venae sectione agit, monet, in pueris, & senibus, & gravidis vetustatem Medicam hac abstinuisse: *Siquidem antiqui, primam ultimamque aetatem sustinere non posse hoc auxilii genus, judicabant, persuaserantque sibi, mulierem gravidam, quae ita curata esset, abortum esse facturam*. Postea vero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debet. Interest enim, non quae aetas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quae vires sint. Haec ergo docebunt Medicum, quid agendum sit in gravidis; neque facile tunc errare poterit. Si enim langueat pallida mulier gravis, a sanguinis missione abstinere omnino; contra si rubescat, caleat, venae turgeant, caput doleat, narium stillicidium adsit, tensionem circa lumbos, pelvim, inguina, sentiat venam secabit, ut abortum a nimia vasorum plenitudine metuendum caveat; semper tamen & tunc memor erit illorum, quae *Celsus* (m) prudentissime monuit: *Mulier praegnant post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quidquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus ejiciendum est: cum praecipua in hoc ars sit, quae non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires aestimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora sustineat*.

Videtur tamen ex toto contextu *Celsi* patere, quod tantum disputaverit, an liceat in morbis sanguinem mittere gravidis mulieribus; non an in gravidis & sanis illud fieri debeat. Cum autem *Hippocrates* abortum expectaverit in gravidis a sanguinis missione, quae tamen saepe adeo necessaria est in morbis acutis, hinc forte statuit in Aphorismo precedenti (n); *Mulierem utero gerentem morbo quodam acuto corripit, lethale*. Periculosius decumbere gravidas talibus morbis, nemo dubitat, praecipue cum & foetus ratio habenda sit in curatione, uti optime *Galenus* (o) in Commentario ad hunc textum notat. Dum enim minori copia, & longiori intervallo cibaria exhibentur aegrotanti matri, periculum est, ne alimenti penuria pereat foetus. Si autem plus ciborum, & crebro magis exhibeatur, metus est, ne intempestivo cibo aucta febre, gravis occidatur. Tamen non semper perire gravidas, dum morbo acuto corripiuntur, vel ex ipso *Hippocrate* (p) demonstrari potest. Mulier enim illa, quae in littore, trimestri, foetu gravis decumbebat febre acuta, cum obmutescencia, delirio, convulsione, insomniis, urinis tenuibus non bene coloratis, aliisque malis symptomatibus, tamen a morbo evasit, decimo-

quarto

(l) Lib. 2. Cap. X. pag. 77. (m) Ibidem pag. 78. (n) Aphor. 3. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 213. (o) Ibidem. (p) Epidemic. Lib. I. aegrot. XIII. Charter. Tom. IX. pag. 115.

quarto die judicata. Unde & *Celsus* (q) hanc Prognosin limitavit, dicens: *Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur.*

Vidi quandoque Medicos meticulosos fuisse ob hos Aphorismos *Hippocratis* in curandis gravidarum morbis acutis, & sanguinis missione abstinuisse, vel saltem illam nec satis larga copia, nec repetitis vicibus tentare ausos fuisse, licet morbus hoc remedium posceret. Tuto tamen, & cum optimo eventu hoc factum fuisse, propriis experimentis novi. In muliere sex menses gravida acutam pleuritidem tribus venae sectionibus, intra nocturnum spatium institutis, curavi feliciter, quae postea debito tempore sanam prolem peperit quam felicissime. In alia, circa ultimum graviditatis terminum acuta febre cum dolore intenso lateris sinistri decumbente, bis venam secui: viginti quatuor horis post secundam venae sectionem sanam puellam enixa est, & feliciter a morbo, atque a puerperio convaluit. Similes casus, ubi gravidis, morbo acuto laborantibus, feliciter vena secta fuit, apud *Forestum* (r) habentur, & alios.

Ex his, ut puto, satis constat, quid de *Hippocratis* Aphorismo, prohibente venae sectionem in gravidis, sentiendum sit. In morbis acutis gravidarum illam quandoque requiri, & cum successu fuisse administratam, certis, & numerosis observatis confirmatur. Verum inde concludi nequit, in gravidis & sanis mulieribus sanguinis missionem semper esse utilem.

Ubi signa plethorae adsunt, & largo menstruum fluxui assuetae sunt mulieres, omnes conveniunt, sanguinis missionem non solum utilem esse, sed & necessariam; sin minus, *Mauriceau* (s) ne quidem illam laudat, dum sanguis ex vagina, menstruum more, fluit in gravidis. *La Motte* (t), qui candidè adeo narrat illa, quae observavit, admittit venae sectionem tantum in gravidis, si *admodum plethoricae* fuerint: adhibet tamen etiam, si absurda appetant, bona alimenta fastidiant omnino, nauseant, vomant, debilitatem sentiant, aliquid sanguinis de vulva fluat. Verum ex antedictis constitit, haec symptomata non posse semper adscribi nimiae copiae sanguinis, adeoque non semper requirere venae sectionem.

Concludit autem, si gravida bene valeat, sanguinis missionem non tantum inutilem, sed & noxiam esse.

§. 1298. **I**N qua tamen instituenda locus, tempus, copiaque maxime advertenda.

Locus. Cum venae sectio instituatur primis graviditatis mensibus tantum hoc scopo, ut minuatur nimia sanguinis quantitas, illud semper obtineri poterit, quocumque in loco aperiatur vena. Cum autem, uti ad §. 1291. dictum

(q) Lib. VI. Cap. 6. pag. 55.

(r) Lib. 2. Tom. I. pag. 59. & seq. Stalp. van der Wielen observat. rar. Cent. prim. num. 33. part. I. pag. 132. & observ. 65. pag. 277. & seq.

(s) Traité des malad. des femm. gross. livr. I. chap. XX. pag. 156. 157.

(t) Traité des accouchem. liv. I. chap. XV. pag. 64. & seq.

tum fuit, ad promovendum fluorem menstruum venae sectio in pede instituta usum habeat, & ideo ab omnibus commendetur, sponte patet, quare damnetur in gravidis, cum abortus periculum foret, si vasa uterina sanguinem dimittere inciperent. Hinc omnium autorum consensu sanguinis missio in brachio fit graviditatis tempore. Quamvis autem impetus, & copia humorum deriventur versus inferiores corporis partes per venae sectionem in pede institutam, tamen videtur sanguis facilius tunc transire per arteriam iliacam externam, quae non dat utero adeo copiosos ramos, & minus urgeri iliacam internam, quae utero prospicit. Frequentes observationes docuerunt, scelestas mulieres, dum menstruum suppressionem simulabant, tentasse frustra venae sectionem in pede, ut clandestini amoris fructum perderent. Interim tutissima semper incedendum via est, & merito ex brachio facta sanguinis missio praefertur, dum nimia sanguinis congestio circa vasa uteri metuitur. *Danda est autem opera, ut quam maxime procul a locis, in quibus dolores fieri, & sanguis colligi solet, sectiones faciamus. Sic enim minime magna mutatio repente continget, & translata consuetudine efficiet, ut ne amplius in eundem locum colligatur (u).*

Tempus. Si morbus acutus inflammatorius sanguinis missionem postulet, quovis graviditatis tempore vena secatur, uti praecedenti paragrapho dictum fuit. Verum, cum hic agatur de illa sanguinis evacuatione, per quam abortus periculum a nimia plenitudine cavetur, & emendantur molesta symptomata, graviditatis initium comitari solita, facile patet, primis mensibus praecipue venae sectionem locum habere. Post tertium enim mensem nausea, vomitus, & reliqua graviditatis symptomata minuuntur; imo integre cessant aliquando. Praeterea post hoc tempus uteri moles crevit, & vasa ejus copiosiori sanguine indigent, ut repleantur, simulque foetus mole auctus pluri indiget nutrimento. In plethoricis, & quae copiosa menstrua habere solent, quandoque post primam cessationem menstruum opus est venae sectione; frequentius tamen post secundam periodum in tali casu instituitur; si signa doceant, sanguinem abundare in corpore, & urgere vasa uterina, nona, vel decima septimana post impraegnationem: abortus enim hoc graviditatis tempore saepius contingunt, rarius quarto mense, & post illum finitum rarissime, nisi a morbo valido, vel vi externa, ut lapsu, percussione abdominis, aut & a validis animi affectibus, a quibus summopere cavendum est. Si nimiae plenitudinis signa recurrant denuo, eadem ratio suadet, repetendam esse sanguinis missionem: neque tales casus mihi frequenter contigerunt in praxi, ubi pluribus venae sectionibus opus fuit. Quosdam tamen vidi, lautissime vivere solitas, sanguineae temperiei, & ob levissimam quamvis causam irascentes, quibus quatuor, imo quinque vicibus venam tundere opus erat, ut caveretur abortus. Prudens Medicus ex signis plethorae facile determinare poterit, quando depletionem opus erit.

Copia requiritur talis, quae minuendae plenitudini sufficit, nec tamen vi-

res

(u) Hippocr. de Off. natura Cap. V. Charter. Tom. IV. pag. 3.
Tom. IV. Pars II.

res debilitat. Hoc dum fit, post sanguinis missionem alacriores se sentiunt; si larga nimis copia detrahatur, languent. Cautè hinc monuit *Manningham* (v), etiam in morbis gravidarum, qui venae sectionem requirunt, cavendum esse, ne copia sanguinis larga uno tempore mittatur; quoniam effectus idem, si interpositis intervallis fiat, plerumque sequatur, & iis incommodis, quae temere effuso sanguine oriuntur, difficile sit mederi. Felicior semper ars Medica est in tollendo, quod superest, quam in restituendo, quod deest. Parum enim valent potiones cardiacae ad vires, intempestive effuso sanguine, reficiendas (x). Unde egregius ille vir hanc cautelam commendavit: *Quandocunque sanguinem mitti jusseris (in rebus praesertim dubiis) digito aegrotantis venae continuo ab incisa vena admoto observandum, fortiores, an languidiores (effluente sanguine) fiant ictus, (idque ex sola uncia permissa sedula observatione dignoscatur).* Si fortiores fiant ictus, tuto potes pergere; sin minus, vel si languidiores fiunt, incommodis afficietur maximis aegrotans, nisi statim desinatur. Non absimile monitum dederat *Celsus* (y), dicens: *Vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie aestimatur.*

§. 1299. **T**UM victus tenuis, motus ordinatus, potus levis admodum profunt.

Victus tenuis. Omnia viscera abdominalia, quae ingestos cibos retinere, & mutare in chylum debent, a tumente utero moventur loco, & quandoque comprimuntur, dum procedente graviditate augetur uteri moles. In initio graviditatis molesta saepe adest nausea, quae ventriculi actionem turbat omnino. Hinc patet facile, victum tenuem tunc requiri ex eupeptis; jusculis nempe, teneris animalium juniorum carnibus, piscibus fluviatilibus, ovis recentibus, oleribus mollibus, pane bene fermentato. Praestat & saepius repetitis vicibus nutrimenta exhibere, quam ciborum copia gravare ventriculum. Opima pingua, & illa cibaria, quae ex farinosis non fermentatis parantur vitanda; consuetudinis tamen semper ratio habenda est in gravidarum victu, cum consuetos cibos facilius ferant; neque semper pertinaciter oblectandum est, si quaedam admodum desiderent edulia, licet minus salubria viderentur. Videantur & illa, quae §. 599. & 602. dicta sunt.

Contra hanc diaetae regulam saepe peccatur, dum meracissimis jusculis, aliisque ferculis, quae parva sub mole multum nutrimenti continent, conantur gravidas implere, etiam invitas, nimis saepe sollicitae matres. Credunt enim, omnem curam adhibendam esse, ut non tantum gravida, verum & foetus alatur. Sed a similibus copia ingesta gravatur ventriculus, non nutritur corpus.

In condimentis autem aromata calefacientia, & acria omnia vitanda sunt, vel saltem, si his diu assueta fuerit mulier, parca manu tantum adhibenda.

(v) Artis obstetric. Compend. pag. 91.

(y) Lib. 2. Cap. X. pag. 78.

(x) Ibid. pag. 92.

da. Blanda enim humorum maternorum indoles maxime conducit tenero foetui.

Motus ordinatus. Antea dictum fuit, quam feliciter rusticae mulieres parere soleant, quae vix solitos intermittunt labores, antequam partus dolores sentiant. Verum hoc in molliter educatis minime conducere. Optime prodest ambulatio, praecipue in aëre puro, sereno, rusticano, absque delassatione tamen. Vectio in rheda, nisi sic loris suspensa fuerit, ut nullum validae, & subitae concussionis periculum adsit, minus tuta est. Hinc itinera gravidis non conducunt, partim ob viarum asperitatem, partim ob subitum metum, quo percelli solent, si quid sinistri contigerit. Ascensus autem per acclivia, cum nimis delasset, & descensus per declivia, cum vix sine lapsus periculo a gravidis perfici possit, vitandi sunt. Imprimis damnantur saltationes validae, aut diuturnae, a quibus toties periculosa haemorrhagia, & abortus contigerunt. Pariter caveri debent omnes nixus validi, elevando pondera, removendo obstacula, & alia his similia. Vidi optimam matronam abortivisse, dum gravida biennem filium, in terram delapsum, levare subito conabatur.

Potus levis. Aqua pura illis, quae assuetae sunt, optimus potus est. Nec unquam observare potui, cerevisiam nocuisse illis, quae hanc potare solebant. Pauculum vini tuto miscetur aquae pro potu communi. In fine prandii aliquid vini generosi mollis, cum pane tosto, vel biscocto, solet facile concedi; praecipue, si ventriculus langueat, uti saepius in initio graviditatis contingit. In temperie calida sanguinea majori sub cautela haec concedi solent.

Frigidi autem valde potus, imprimis per glaciem gelidissimi redditi, si bibantur a gravidis, *exinde colicam passionem saepe patiuntur, & abortionem faciunt* (2).

§. 1300. **I**nterim Cardiaca aromatica, una cum lenissimis antihystericis, vel & blandis subacidis, summi usus sunt, & efficaciae.

Languent plus, minusve plurimae gravidae, praecipue primis graviditatis mensibus: illae vero, quae mobile admodum genus nervosum habent, saepius & passionibus hystericis corripuntur. Unde Medici vix de aliis remediis cogitaverunt, nisi de talibus, quae hunc languorem grata sua fragrantia tollere possent, & debiles nimis fibras solidas roborarent, simulque inordinatos generis nervosi motus compescerent. *Cinamomum*, quod inter aromata principem locum obtinet, hinc adeo laudatur: habet enim amabilem fragrantiam, simulque vim roborantem satis manifestam. Sed & ideo Cinamomi pulvis, infusum cum vino paratum, & tinctura, praeferuntur reliquis ex hoc *aromate*

(2) Manningham Art. obstetric. compend. pag. 65.

mate praeparatis, quae aromatica fragrante vi pollent quidem, sed roborante efficacia carent; qualia sunt *oleum essentielle Cinnamomi*, *aqua stillatitia*, vel *& spiritus Cinamomi*, quae omnia sunt fragrantissima quidem, sed tota vis roborans in residuo post destillationem Cinnamomo manet, nec una cum volatili fragrantia per alembicum transcendit. Magnum & hic usum habent *Cortices Arantiorum*, & *Citreorum*, qui mire reficiunt fragranti halitu, & gratum simul amarorem, ventriculo amicum, possident; quod imprimis in corticibus arantiorum obtinet. Sed & horum succi grato acido sapore oblectant, & deletum appetitum feliciter restaurant, dum cibi his succis condiuntur; simulque omni resistunt putredini. Ob eandem rationem *Ribesiorum* succus, cum saccharo in *Sapam*, sive *Rob* coctus, roborans *Cydoniorum* pulpa, succus *Berberissae* acidus, & subausterus commendantur gravidis. Varias in *Materia Medica* ad hunc numerum reperiuntur formulae, ad quarum normam plures similes concinnari poterunt, magis, minusve aromaticae, pro diversa nempe mulieris gravidae temperie.

Affectibus autem hystericeis coercendis *Castorei* virosus odor, *Succinum*, horum tincturae, & alia plura similia commendantur; sed parca dosi tantum, cum eadem haec & inter medicamenta Emmenagoga numerentur.

§. 1301. **A**B incremento foetus oriri videntur eadem fere, quae enumerata (1296.), tum Difficultas urinae, & alvi, Haemorroïdes, Varices, Inflatio pedum, Uterinorumque labiorum, lapsus proclivis.

Antea notatum fuit, non omnia graviditatis symptomata liquido intelligi, aut explicari posse ex menstruorum retentione; nec a mole foetus, secundarum, & aquarum, quae saltem in graviditatis initio satis parva est. Unde etiam observatur, plura symptomata, quae incipientem graviditatem comitantur, minui multum, imo integre cessare quandoque post tertium, vel quartum mensem. Illae autem molestiae, quae a mole aucta uteri, foetum continentis, fiunt, potius augentur ad finem graviditatis usque. Si enim, uti ad §. 1295. dictum fuit, in muliere, sexto mense graviditatis mortua, uteri fundus inventus fuerit tangere fundum ventriculi, & intestina sursum, ac ad latera removisse, ita ut inter uterum, & spinam dorsi nihil locaretur, anteriorque uteri tumentis superficies nudum peritoneum tangeret; patet facile, & reliquis tribus ultimis graviditatis mensibus hanc viscerum pressionem augeri adhuc debere una cum uteri extensione. Diaphragmatis motus sic minus facilis redditur, & quandoque illud irritatum tetano riget, sicque verum asthma spasmodicum fit, quod per vices redit, imprimis si ventriculus simul vel ab ingestis, vel a flatibus turgat. Vidi hoc in gravida, quae post partum statim liberabatur molesto hoc malo.

Multum tamen levantur hae molestiae, dum sensim crescit uteri gravidi moles; sicque lente, & aequabiliter mutatur viscerum situs. At contingit aliquando, uteri fundum non assurgere recta, sed ad unum, alterumve latus declinare, uti in sequenti Capitulo demonstrabitur; tunc minus aequabilis erit illa

illa pressio tumentis uteri, & possunt augeri molestiae. An tale quid indicare voluit *Hippocrates* (a), dum dixit: *Praegnantibus hypochondrii dolor malum*. Saepius alia occasione monitum fuit, *Hippocratem*, ubi in singulari numero ponit hoc verbum, semper intellexisse hypochondrium dextrum. Si jam uteri fundus in dextram partem obliquatus assurgat, intestinorum molem premet versus hepatis concavam partem, in qua vesicula fellis, ductus biliaris, venae portae truncus &c. haerent; unde patet facile, plurima mala fieri posse, quae indicantur metuenda ob dolorem dextri hypochondrii in gravidis.

Difficultas urinae. Agitur hic de illa urinae difficultate, quae ab incremento foetus, & uteri mole aucta producitur, ac praecipue ultimis graviditatis mensibus observari solet. Potest enim graviditatis tempore ab aliis causis, quae ad graviditatem non spectant, urinae difficultas nasci. Vidi sic in muliere triginta annorum, tertio graviditatis mense, subito molestissimam dysuriam absque ulla causa praegressa: post aliquot horas incepit dolere, & tumere pudendi pars superior circa meatum urinarium: vena secta fuit, molissima remedia externo, & interno usu adhibita; unde levamen quidem sensit, sed dolor ille, qui circa meatum urinarium fuerat, per abdomen dispergebatur; sexto die vix poterat decumbere; sed perpetuo erecta sedere cogebatur. Simul dolorem validum sensit circa renem finistrum; urina nunc facilius, nunc difficilior profuebat; dolor manebat circa renem, nunc mitior, nunc magis acer; & sex septimanis elapsis, purum aequale album pus eminxit, cum levamine subito doloris circa renem; perrexit diu urinam purulentam emittere; finito quinto mense graviditatis foetum mortuum excludibat. Postea renuit sumere illa, quae renali ulceri curando idonea consulebantur: pus in urina minuebatur copia quidem, sed incepit emaciari, tussive purulenta exspuere, & tabe pulmonari sensim confecta periit.

His similes morbi possunt gravidis contingere; sed etiam ab ipsa mole uteri gravidi potest impediri libera urinae excretio. Vesica enim utero incumbit (b). Hinc mole auctus potest vesicam comprimere ita, ut non satis distendi possit; adeoque frequenter cogetur urinam dimittere gravida: si autem collum vesicae comprimatur, impeditur liber urinae exitus, & pars urinae, diu manens in vesica, mora acrior reddita, irritat perpetuo, sicque molestam stranguriam facit, quod praecipue ultimis graviditatis mensibus contingere solet; dum quandoque vesica sic deprimitur, ut angulum faciat cum suo collo. Observavit hoc *Mauriceau* (c) in gravida, quae tribus ultimis mensibus frequenter, & tanto cum dolore urinam exprimebat, ac si calculo, vel ulcere colli vesicae laboraret; post partum autem omnia haec mala cessabant statim.

Idem contingere quandoque quarto, & quinto graviditatis mense, notavit egre-

(a) Coac. Praenot. N. 523. Charter. Tom. VIII. pag. 883.

(b) Mauric. traité des malad. des femm. gross. liv. I. chap. XV. pag. 138.

(c) Ibid. pag. 139.

egregius de arte obstetricia auctor *Brudenell Exton* (d), dum uterus gravidus totum pelvis cavum implet, nec adhuc multum supra pubis ossa eminet fundo suo. Imprimis autem hoc fiet in illis mulieribus, quibus uteri collum profundius in vaginam descendit; uti fieri solet in his, quae uteri prolapsum habuerunt sive integrum, sive incipientem tantum: licet enim uterus non promineat extra vulvam, sed vaginam repleat, tamen sic comprimit collum vesicae, ut urina excerni nequeat. Talis casus legitur (e), ubi nec catheter poterat in vesicam deduci, sed, reducto utero prolapso, sponte excernebatur ingens quantitas urinae, qua vesica distendebatur.

Omniū maxime haec urinae difficultas videtur fieri in gravidis, quarum uterus, propendulo maxime abdomine, supra ossa pubis antrorsum delapsus, efficit, ut vesica cum suo collo angulum faciat, sicque impediatur libera urinae excretio, & simul difficilis admodum reddatur catheteris in vesicam introductio. Observatum fuit, vesicam in gravidis, a tali suppressione urinae distentam, tumores produxisse in inguinibus, & in peritoneo, veram nempe vesicae herniam, de qua videri potest *Academia Chirurgica Parisina* (f), ubi tales casus habentur, in gravidis mulieribus observati. An simile quid indicat sequens *Hippocratis* locus (g)? *Interdum etiam, ubi mulier vasorum vacuationem passa fuerit, ac praeterea laborarit, uteri conversi ad vesicae osculum procumbunt, & stranguriam inducunt. Nullum autem aliud habet malum, & curata brevi convalescit, nonnunquam etiam sponte.*

Et Alvi. Ab assurgente utero gravido intestina omnia sursum, & ad latera recedunt, ac plus, minusve comprimuntur, cum minuatur cavum abdominis. Cum autem in intestinis tenuibus contenta sint molliora, & magis liquida, non tam facile transitus horum per cavum intestinorum impeditur. In crassis vero intestinis exsucca magis materia haeret, & resorpto per vasa absorbentia liquidiori, magis magisque redditur arida, donec expellatur per anum. Coli jam intestini finis, uti notum est, antequam desinit in rectum, elevatur sursum, incurvatur, dein iterum recta descendit in pelvim, & vocatur tunc intestinum rectum. Verum uteri turgentis moles hunc imprimis locum premit, ubi sponte sua, etiam in non gravidis, fit remora faecibus alvinis; adeoque patet, quare toties stricta fiat alvus graviditatis tempore. Cavendum tamen est, ne nimis diu moretur alvus, quia faeces alvinae magis magisque exsiccantur, mole augentur, & indurantur; unde non possunt ano expelli postea, nisi summa vi; quod quandoque abortui causam dedit. Si autem pars tantum induratarum faecum alvo exprimatur, sensim reliqua accumulantur, omnia crassa intestina implentur faecibus, & intestinum imprimis rectum dilatatur quandoque in saccum ingentem, uti inventum fuit in cadavere juvenis quindecim annorum (h), qui diu laboraverat alvo stricta, ita ut intra viginti dies semel tantum alvum deponeret. Simul notatur in eodem loco, pluribus con-

(d) *System. of midwifery* pag. 144.

(f) *Tom. 2. pag. 23. & seq.*

Tom. VII. pag. 735.
pag. 48.

(e) *Levret sur les polypes* pag. 112. 113.

(g) *De Mulier. morb. Lib. I. Cap. X. Charter.*

(h) *Acadēm. des scienc. 1750. in 4. Histor.*

contigisse, ut digitis, vel & instrumentis educi debuerint ficcissimae, & induratae faeces, si per longum tempus alvus stricta fuisset.

Neque tantum intestinum rectum sic dilatatur a faecibus retentis, sed & secundum totam longitudinem coli talis dilatatio contingere poterit. Vocatus fui ad mulierem Anglam olim, quae sanissima felici, & satis facili partu excluserat prolem sanam, nec quid mali primis diebus puerperii passa fuerat. Nono autem post partum die, licet alvum quater deposuisset hoc intervallo, incepit conqueri de obtuso dolore, & pondere circa os sacrum, una cum tenesmo, sed irritato, deponendi alvum; clysmata injecta fuerunt, sed redibant illico; olei copia data fuit; emollientissima decocta cum melle, linimenta ano, & vicinis partibus adhibita fuerunt, tandem sensim descendit massa indurata, & anus incepit parum aperiri, ut instrumentis scalpendo quasi minui potuerit moles utcunque, tandemque post summas angustias, & dolores, per integrum biduum toleratos, expressa moles faecum induratarum fuit, quae foetus maturi caput aequabat, si non superabat. Absque dilaceratione ani tanta moles transire non poterat, tamen ope peritissimi Chirurghi a tanto malo perfecte convaluit.

Patet facile, hanc faecum congeriem graviditatis tempore collectam fuisse, nec haesisse in intestino recto, vel coli fine, quia partum impedivisset; sed altius, & post puerperium, sensim dilatato colo, descendisse. Simul notandum est, talem faecum congeriem posse distendere intestinum crassum, & tamen non ita exacte implere ejus cavum, quin subducere se possit liquidior, & mollior faex stercoracea, quae postea in reliquo tractu intestini in scibala figurata mutatur, & absque molestia per alvum exit.

Unde auctores (i), qui de cura gravidarum scripserunt, sollicitè monent, cavendum summopere esse, ne stricta nimis alvus sit graviditatis tempore. Cum autem purgantium frequens usus non conveniat gravidis, hinc clysmata emollientia, & lubricantia commendantur; praecipue si syringae ope injiciantur: tunc enim altius penetrant, quam si vesica adhibeatur ad hunc usum. Suppositoria pariter laudantur, quae suo stimulo non tantum intestinum rectum, sed & colon incitant ad contractionem, per quam retentae faeces loco moventur; imprimis, si per clyisma emolliens, & oleosum intestinum lubricatum fuerit, & durae faeces emollitae sint, tunc enim facilius descendunt, & minori molimine per anum exprimentur. Adeo autem magni momenti hanc rem esse credidit egregius ille auctor, ut noluerit Medicum fidere gravidae, vel illius custodis relationi, sed ut ipse inspiciat faecum copiam, nec cesset ab his remediis, donec molliora alvi excrementa prodierint.

Haemorrhoides. Tumentem uterum venas Iliacas premere, sicque difficiliorem facere reditum sanguinis venosi a partibus inferioribus, antea jam monitum fuit; hinc sequitur, venas magis tumere, imo etiam arterias, cum difficilius sanguinem suum in venas nimis plenas evacuent. Haec ratio est, quare toties occurrant haemorrhoides tempore graviditatis; omnium maxime in illis, quae antea solebant haemorrhoides pati: semel enim dilatata haec
vasa

(i) Brudenell Exton pag. 146. 147.

vasa a leviori etiam sanguinis praepondio magis tument. Augetur autem haec causa a faecibus durioribus, circa finem intestini coli collectis, vasa comprimentibus, uti etiam a mole uteri tumentis, prementis eadem haec intestini loca. Imo & in collo matricis, & circa ejus orificium observatum fuit, vasa instar haemorrhoidum tumere, uti alia occasione ad §. 1286. dictum fuit.

Varices. Ab eadem causa tumores varicosi in tibiis, & femoribus oriuntur, tumentibus admodum venis, & nodosis circa loca, ubi valvulae haerent. Tumores illi varicosi post somnum solent minui, cum in horizontali corporis positura uteri gravidi moles minus premat venas iliacas: ob hanc rem etiam consulitur gravidis, ut de die aliquoties lecticae incumbant, cruribus in situ horizontali positis, ut sic facilius sanguis venosus ad cor redire possit. Interim hoc cavendum est, ne mutato situ corporis, subito sanguis venosus, in venis tumentibus collectus, ad cor redeat; quod inde opprimeretur; unde animi deliquium metuendum foret, uti ad §. 1296. dictum fuit. A varicibus hoc imprimis metuendum est, ne diu distractae venae omne perdant robur (vide §. 25. 3.), & tandem ruptae periculosam producant Haemorrhagiam: stagnans autem sanguis in varicibus mora acrior reddi posset, & venarum tunicas erodere; quod si non fiat graviditatis tempore, contingit quandoque diu post in mulieribus, quae saepius pepererunt, in quibus aliquoties vidi tumores varicosos, pollicem amplitudine superantes, qui tandem improvise rumpebantur, cum profusa haemorrhagia, & dein in ulcera, molestae satis curae, degenerabant. Post partum, depleto utero, & contracto, causa distensionis venarum cessat; hinc brevi ad pristinam magnitudinem redeunt; nisi adeo distentae fuerint, ut vim contractilem omnino amiserint. Ut hoc caveatur, decubitus juvat, ac matutino tempore mollis frictio, & postea, ut spleniis impositis tumentibus venis fascia circumducatur, quae non comprimatur fortiter, sed firmet tantum laxas venas, & fulciat, ne nimis distendi possint. Ab inferioribus autem incipiendo fascia circumduci debet versus superiorem partem; & simul sit satis lata, ut pressio fiat aequabilior.

Inflatio pedum, uterinorumque labiorum. Antea ad §. 1228. & 1229. ubi de causa hydropis agebatur, probatum fuit, compressionem venarum majorum producere hydropem; unde mirum non est, si, compressis venis iliacis, anasarca occupet pedes, crura, femora, imo & labia uterina. Si talis uteri gravidi, vel & venarum iliacarum situs fuerit, ut una magis comprimat, quam altera, tumor talis hydropicus in alterutro latere tantum observatur.

Tumores autem illi oedematosi artuum inferiorum non adeo infasti omnis sunt, & post partum, sublata causa, feliciter evanescere solent; praecipue, si blanda frictione stagnans lymphæ in motum reducat. Saepius aucto urinae profluvio, quandoque & diarrhoea aquosa, aut sudoribus dissipantur hi tumores; quo facto, flaccidae partes fascia circumducta firman-
tur; sicque intra paucos dies totum hoc superari solet.

Testa.

Testatur *La Motte* (k), quod nunquam viderit perire gravidam, nec puerperam, licet ingentes tales tumores oedematosi adfuissent, nisi hi pro causa habuissent ingentem sanguinis jacturam, vel simul convulsiones, aut alia symptomata extraordinaria adessent.

Cum enim talis tumor a compressione venarum oriatur, post decubitum, & somnum minui soleat, & praecipue ultimis graviditatis mensibus contingat, sublata post partum hac causa, facilis cura sperari potest. Longe aliud obtinet, si post evacuationes nimias sanguinis nascatur hydrops (vide §. 1229.) Post partum enim, dum secedit placenta, & per lochia postea exit sanguis, augetur tunc causa hydropis, non vero minuitur.

Plus metuendum videtur, si labia pudendi tumeant oedematosa, ne exitum foetus impediant: verum cedunt satis facile tumores tales oedematosi & vidi, foeminam, cui hae partes tuebant immaniter, nec ullam admittere volebat medelam, peperisse feliciter, licet obstetrix, magnitudine tumoris territa, desperaret omnino.

Neque tamen adeo difficilis huic malo medela foret; leviter enim scarificando tumentia vulvae labia, effluit lymphæ, & tumor brevi minuitur. Felici cum successu applicatur & vesicatorium, sic, ut partim tumentis vulvae labio, partim vicinae femoris parti haereat (l).

Anceps autem discrimen imminet, si una cum febre inflammatorius tumor occupet vulvae labia, praecipue instante jam partu. Plerumque enim interiora vulvae simul tunc inflammata sunt, & post partum omnes sic affectas perire observatum fuit a peritissimis in arte obstetricia magistris.

Notum est, inflammatas partes, si premantur, vel ruditer tractentur, cito fieri gangraenosas: hoc ergo jure metuendum erit, dum caput infantis, partus tempore, partes has inflammatas premit, imo & quandoque dilacerat tumidas.

Lapsus proclivis. Naturaliter in gravidis abdomen antrorsum prominet, & quidem tanto magis, quo partui propiores sunt: ideo coguntur, trunco corporis retrorsum inclinato, incedere, ut centrum gravitatis totius corporis sustineatur. Carnosae magis, caeteris paribus, in foeminis nates, & os sacrum magis retrorsum vergens favent aequilibrio corporis servando in gravidis: interim, si vel levissime pedem impingant obstaculo, cadunt pronae: optandum hinc foret, ut scipione uterentur inter ambulandum; sic facilius caveretur lapsus. Simul monendae sunt, ut calceis latis, & humilibus utantur, & quantum fieri poterit, scalarum adscensum, & descensum vitent, vel saltem tunc lente, & caute incedant. A lapsu enim gravidæ periculum profusae uteri haemorrhagiae, & abortus metuendum est.

Cum autem omnes modo enumeratae molestiae fiant ab augmento foetus, & uteri mole aucta, patet satis, graviores has esse debere, si uterus geminos foetus contineat, vel & plures, quod rarius contingit. Unde etiam

Man.

(k) Traité des accouchemens livre I. observ. XLII. pag. 79 - 82.

(l) Levret l'art des accouchem. pag. 202.

Mauriceau (m) monet, omnes illas, quae gemellos utero gerunt, habere crura admodum tumida ultimis graviditatis mensibus: imo alibi (n), femora simul tumere, asserit, & vulvae labia. Statuit autem, hoc cognosci posse, si gravidæ abdomen ab utroque latere tumeat, & in medio lineam magis depressam monstrat; simul, & eodem momento motus diversos in utroque abdominis latere percipiat; qui etiam frequentiores esse solent, dum, uno ex gemellis moto, alter incitatur: quamvis enim peculiaribus membranis inclusi fuerint, vicini tamen sunt sibi invicem. His signis si simul accederet tumor magnus artuum inferiorum, & labiorum vulvae, tunc egregius ille auctor credebat, certissime constare, quod talis mulier binos, aut plures foetus utero gestaret.

Merito quidem suspicari licet, gemellos adesse, si omnia haec signa adsint, sed certo illud affirmare, tutum non videtur. Vidi enim toties fefellisse eventum, licet & obstetrices, & gravidæ firmissime persuasae fuerint de futuro gemellorum partu. *Bartholinus* (o) observavit sequentia: *Tumor enim saepe major in simplici foetu, quam gemellis; quod saepe observavi, sive quod copia humiditatum ibi major sit, sive quod foetus simplex nonnunquam gemellos vel aequet, vel superet. Duplicem in abdomine lineam aliqui pro indicio habent, gestari gemellos utero; sed in uxore mea id non successisse, animadverti &c. sane non paucas gravidas novi, quae in hoc signo falsae fuerunt, uniusque foetus diversum, & validum motum sentientes. Singulare experimentum adfertur, ultimis nempe mensibus tibias, & pedes inflari. Quod verum deprehendimus in omni gestatione, etiam simplicis foetus.* Magni hujus Viri monitis assentior omnino, cum & propriis observatis edoctus fuero, illum verissima dixisse.

Qualis autem sexus futurus sit foetus, nullum habetur certum indicium. Praecipua collegit *Moschion* (p) a veteribus tradita. Marem in utero latere credebant, si foetus cito, & fortiter γυμνασικῶς se moveret, si gravida bene colorata esset, si dextra mamma major foret: foeminam gestari e contra putabant, si tardius, & segnius moveretur foetus, ipsa gravida decolor foret, & infirma, sinistra mamma turgeret. Quid de his *Moschion* senserit, non patet evidenter, cum in fine hujus textus lacuna sit; quam in margine conati fuerunt supplere, ὅμως ἂν αἰεὶ ἀληθὴν εἶναι; sicque testatus fuisset, haec non semper vera esse.

Notum est, uti antea jam monitum fuit, veteres Medicos credidisse, uterum habere binas cavitates distinctas, quarum dextra maribus, sinistra foeminis recipiendis dicata foret. Ex hac autem falsa opinione ortum duxerunt plurima de sexu foetus praesagia. Si nempe dextra, vel sinistra mamma major foret, si gravida genibus incumbens dextrum, vel sinistrum pedem prius attolleret, dum surgit, & plura his similia. Quidam ex Lunae Phasibus hoc determinare voluerunt. Omnia haec collecta legi poterunt apud *Mauriceau*

(m) Traité sur les malad. des femm. gross. liv. I. chap. XVII. Tom. I. pag. 145.

(n) Ibid. chap. VIII. pag. 104.

(o) Epistol. Med. Centur. IV. Tom. 4. pag. 142.

(p) Spachii gynaec. pag. 3. N. 26. & pag. 20. in fine.

riceau (q), qui omnia haec praesagia erronea esse probat, & statuit, impossibile esse, ut quid certi de sexu foetus in utero statuatur. Unicum hoc excipit, quod nempe quaedam foeminae, saepius partum expertae, observaverint, se quaedam appetere, dum mares gestant, quae fastidiunt potius, si foeminini sexus fuerit foetus; vel aliud quid diversi observaverint graviditatis tempore in vario sexu. Novi matronam, quae potum cassae appetebat, dum marem gestaret, fastidiebat, si puellam utero gereret, & ex hoc solo signo praesagium dabat, nec fallebatur.

Callidum consilium dedit *Mauriceau* (r), ut nempe obstetrix expiscaretur, quem sexum avide desideraret familia, & hoc cognito, semper contrarium praediceret. Si vera dixit, scientiam mirabuntur parentes, dum omnium votis oppositam sententiam tueri ausa fuerit. Sin minus, voti compotes facti facile condonabunt falsum praesagium.

§. 1302. **Q**Uibus quidem auxilium ferri potest aliquando remedio V. S. (1297.), vel & situ corporis pro tempore mutato, tum etiam fasciis, similibusque, atque tandem linimentis lenibus.

Agitur jam, quomodo illae molestiae, praecedenti paragrapho enumeratae, minui possint, si omnino tolli nequeant. Debet enim foetus crescere, debet uteri moles augeri, & vasa ejus, longe ampliora reddita, debent manere sanguine plena, atque idem de placentae, utero accretae, vasis verum est. Venae sectio laudatur tanquam proficua in hoc statu, si non semper, saltem *aliquando*. Verum, uti antea ex *Hippocrate* monitum fuit, in gravidis magna pars sanguinis circa uterum colligitur, hinc & saepe decolores fiunt, dum reliqua vasa corporis minori sanguinis copia implentur. An ergo proderit tunc minuere copiam? vix certe videtur. Non enim hic agitur de plethoricis, nec de gravidis morbo acuto inflammatorio laborantibus, qui sanguinis missionem poscit. In tali enim casu, uti antea dictum fuit, quovis graviditatis tempore venae sectio locum habet. Vidi aliquoties gravidas, adeo plethoricas, ut licet uterus, & foetus jam multum aucti fuissent mole, tamen tota facies turgeret, & ruberet, venae tumidae essent, & pulsus tangeretur plenus. Nemo prudens dubitare poterit, talibus conducere sanguinis missionem, & praecipue, si hoc contingat, instante jam partus tempore: merito enim tunc metuitur, ne validis in partu nixibus sic impleantur vasa encephali, ut omnes functiones supprimerentur, vel & ruptis vasis lethalis apoplexia, & convulsiones sequerentur, vel & periculosa, ruptis pulmonum vasis, haemoptoe. Vidi talia infortunia, dum Medicorum monita flocci faciebant sciolae mulierculae. Hoc tantum credo, in sana muliere ipsam graviditatem non poscere sanguinis missionem, & male statui, partum inde reddi faciliorem, ac caveri plu-

(q) Traité des malad. des femm. gross. liv. I. chap. VIII. Tom. I. pag. 98. & seq.
(r) Ibid. pag. 102.

plures puerperii morbos. Conceptus, foetus, & uteri incrementum, partus ipse naturae solius opus sunt, quod temere nunquam turbare debet Medicus.

Peritissimi in arte obstetricia magistri eadem monuerunt. Sic *Mauriceau* (s), dum agit de minuendis graviditatis molestiis a varicibus, dolore, & tumore crurum, & femorum, haemorrhoidibus &c., laudat venae sectionem in brachio, *si in reliquo corpore signa plenitudinis, & abundantiae sanguinis adfuerint*. Alio in loco (t) damnat illam consuetudinem mittendi sanguinem, instante partus tempore, nisi alia necessitas illud postulet, & post septimum mensem a venae sectione abstinendum, suadet. *La Motte* (u) pro regula generali statuit: *si gravida se bene habeat, venae sectio non tantum est inutilis, sed noxia*. Plethoricis se venam secuisse, monet, & in graviditatis initio illis, quae nausea, vomitu, lassitudine, animi deliquio molestabantur; imprimis vero, si levem quandam uteri haemorrhagiam paterentur. Recenset autem casum, ubi mulieri sanguineae temperiei, & satis repletae, noluit venam secare, licet illud enixe peteret, quia sanissima erat, nec ulla graviditatis incommoda senserat. Frustra monebat, quod primam graviditatem, & felicem secutum partum sustinuerat, absque ulla venae sectione; coactus fuit, ut venam aperiret. Cum autem post iter longinquum, reduce marito, statim concepisset, satis exacte potuit computari terminus graviditatis, per duodecim dies ad minimum adhuc remotus: nocte autem sequente post venae sectionem peperit infantem, qui non credebatur adhuc penitus maturus, & fere desperabatur, illum superstitem esse posse. Tamen evasit, & ad adultam pervenit aetatem. Similem casum in eodem loco memorat, & inde concludit, se magis magisque confirmari in hac sententia, *quod nunquam suadenda sit venae sectio gravidis, nisi evidens adsit necessitas*. Simul statuit, consuetudinem venam secandi gravidis circa medium graviditatis tempus esse ridiculam, & perniciosam.

Situ corporis pro tempore mutato. Ut minuatur pressio tumentis uteri in venas Iliacas, & facilius reditus concilietur sanguini in venis varicosis retento. Hoc autem fit decubitu vario in lecto, lectica &c., uti praecedenti paragrapho dictum fuit. Sic & difficili urinae excretioni ut succurratur, suadet *Mauriceau* (v), ut gravida propriis manibus tumens abdomen elevet, dum urinam emittet, vel fascia lata, ad hunc usum adaptata, sustineat ventris pondus, ne vesica comprimatur. Aliis profuit, si prono potius corpore vesicam evacuare tentarent: sic enim efficitur, ut pondus viscerum abdominalium minus premat uteri fundum. Octavo mense gravem ventris molem fasciis diligenter sustinere, jubet & *Moschion* (x), qui hoc mense imprimis gravidas se molestius habere monet. Si variis his situs mutationibus tentatis, non sequatur urinae secretio, tunc cathetere in vesicam immisso educenda est. Cum autem in mulieribus urethra brevior sit, & rectior, hinc & simi-

(s) Lib. I. Cap. XVII. & XVIII. pag. 144. & seq. (t) Lib. I. Cap. XXVII. pag. 198.
 (u) Traité des accouch. liv. I. chap. XV. pag. 64. & seq.
 (v) Liv. I. chap. XV. pag. 139. (x) Spach. gynaecc. pag. 3. n. 34.

simili cathetere solent uti Chirurghi, qualem *Mauriceau* (*γ*) delineavit. Verum considerandum hic est, per ipsam uteri tumentis pressionem mutari vesicae situm, ita ut ejus collum cum urethra angulum faciat; quod imprimis fit, quando in abdomine propendulo totus uteri fundus antrorsum supra ossa pubis prominet, uti praecedenti paragrapho dictum fuit. In tali casu dexterimus apud Batavos olim artis obstetriciae magister (*z*) prudenter incurvo cathetere opus esse monet, qualis in virili sexu solet adhiberi, si nempe mutato situ corporis urina non prodeat. Tunc jussit, ut genibus divaricatis incumberet gravida, capite dimisso, quantum fieri potest: binisque digitis a retro vaginae immixtis, conabatur uterum ab ossibus pubis remove, & curvum catheterem urethrae immittebat hoc modo, ut curvaturae convexitas respiceret intestinum rectum, cavitas vero ossa pubis: si sentiret adhuc resistantiam, pergebat digitis remove uterum ab ossibus pubis, & tunc catheter penetrabat in cavum vesicae: simul ac vero incipiebat effluere urina, circumvertebat gravidam corpus, ut supina decumberet, sed capite demissiori. Ultimis enim graviditatis mensibus priorem illum molestem situm diu ferre nequeunt absque animi deliquio. Simul tunc curabat, propendulum abdomen parum elevari, donec omnis urina efflueret. Relinquebat autem catheterem in vesica per biduum, ut vesica ultra modum distenta sensim contrahi, & vires suas recuperare posset. Hoc enim nisi fiat, sequenti die saepe deberet repeti eadem haec operatio, quod nimis molestem foret. Omnium maximas molestias se expertum, fatetur (*a*), dum partus tempore sic ab infantis capite premebatur collum vesicae, ut nec gutta urinae exiret, nec catheter ullo modo introduci posset. Tunc nihil superest, nisi ut tam cito, quam fieri poterit, rumpantur aquae; sic enim detumescit uteri moles, & vesica se exonerat. Mirum satis casum ibi recenset, ubi ruptis membranis octo librae aquae effluxerunt, & mox sequebatur urinae copiosae effluxus.

Quomodo alvo nimis strictae succurrendum sit, & varices fasciis firmandi, dictum fuit praecedenti paragrapho.

Haemorrhoides autem mollissimis foveri debent remediis, si doleant. Pelvim, cui insident alvum exoneraturae, replere solent calido emollienti decocto, addito lacte: mollissimis inunguntur linimentis, qualis formula in *Materia Medica* ad hunc numerum habetur. Cum autem in partu caput infantis premat, & complanet intestinum rectum, ad crepaturam usque quandoque tument haemorrhoides, & partus dolores plurimum augendo faciunt, ut puerpera ultimos nixus prae doloris metu supprimat, sicque foetus exclusio retardetur.

Si ergo circa finem graviditatis multum tumeant, per sanguiifugas applicatas evacuari possunt. Cum autem saepe contingat, ut sanguis in his tumoribus diu retentus grumescat, tunc potius lanceola sunt aperiendae. Cum autem post partum sponte soleant detumescere haemorrhoides, apertura non ten-

(*γ*) *Livr. 2. Cap. XXXIII. pag. 365.*
&c. Cap. IV. pag. 128. & seq.

(*z*) *Denys over het Ampt der Vroetmeesters*
 (*a*) *Ibid. pag. 138.*

tentatur, nisi iustus metus sit, partum tumentibus haemorrhoidibus retardari posse.

§. 1303. **I**nter periculosissimos vero gravidarum morbos habetur fluor uterini sanguinis.

Semper suspectus in gravidis est fluxus sanguinis de utero, licet non semper aequale periculum habeat, uti postea dicitur. Si autem subito, & undatim effluat, merito pro periculosissimo gravidarum morbo habetur, nec minus discrimen foetui in utero contento adfert. Antea dictum fuit, uterum gravidum distendi sensim magis magisque, ut cavo suo continere possit foetum cum secundinis, & aquis, quibus foetus innatat: nec tamen uteri distenti crassities minuitur, sed vasa ejus successive plus distenta sanguine implentur; unde magna copia sanguinis in substantia uteri continetur. Sic autem connectitur ovum humanum uteri cavo, ut naturaliter nec gutta sanguinis exeat de utero. Verum simul, ac ille nexus solvitur a quacunque causa, & imprimis, si placenta separari incipit, ex vasis dilatatis sanguis exit, & quidem subito saepe, ac ingenti copia; unde metuenda sunt animi deliquium, convulsiones ab inanitione vasorum, & mors. Simul tunc & foetui certa perniciēs imminet, cum nec a matre humores suscipere possit per venas umbilicales, nec tradere possit illi per arteriam umbilicalem suum sanguinem, perficiendum in corpore materno.

Erectus incessus foeminae humanae, & consuetudo menstrua sanguinis ex vasis uterinis exeuntis videntur esse causae, quare abortus in his frequentiores sint, quam in brutis (*b*); uti etiam, cum vasa uteri, & placentae sanguine copioso distendantur. Placenta autem citius necitur utero, fortius adhaeret, & mole major est, quam in brutis; caeteroquin adhuc frequentiores forent abortus.

Patet simul, haemorrhagiam uterinam tunc imprimis esse periculosissimam, quando omnia vasa uteri sunt maxime distenta, id est, ultimo graviditatis tempore. Unde pro axioma practico ponitur sequens regula: *Quo partui propior est mulier, eo periculosior est haemorrhagia uterina* (*c*). Hinc plurimae servantur ex illis, quibus secundo, tertio, vel quarto mense contingit haemorrhagia uterina. Verum his mensibus praecipue observantur abortus, rarius sequentibus: celebris, & in arte obstetricia adeo versatus, Puzos (*d*) testatur, multiplici experientia sibi constituisse, raro ex uteri haemorrhagia periisse gravidas, si quartum, vel quintum graviditatis mensem non superaverint, nisi alius morbus periculosus simul adsit, vel necessarium artis auxilium defuerit. Longe pejorem metuebat eventum, si septimo, octavo, vel nono mense idem contingeret; licet enim plerumque minus valida foret haemorrhagia.

(*b*) Medic. Essais Tom. 2. N. XI. pag. 233. 234.

(*c*) Mauriceau traité des malad. des femm. gross. livr. I. chap. 21. Tom. I. pag. 159. & 535.

(*d*) Académ. de chirurg. Tom. I. pag. 361.

rhagia ante partum, quam in aliis abortibus, tamen plurimae ex his non diu post partum moriebantur.

Non tamen credendum est, uteri haemorrhagias primis mensibus carere omni periculo. Quandoque enim post paucos dies redeunt, si vel secundinae, vel grumus sanguinis, excusso foetu, in utero manserit. Talis casus legitur (e) de muliere, quae tertio mense abortiverat, remanente placenta in utero; nullum primo sequebatur malum symptoma; octo diebus elapsis, tam valida sequebatur haemorrhagia, ut de vita metuerent, qui assistebant. Placentae portio ex uteri orificio eminebat: qua apprehensa, prudenti manu, & aegrae reviviscentis nixibus, integra sequebatur placenta: statim cessabat haemorrhagia; & aegra satis cito ex tanto periculo convaluit.

Abortuum placentae difficilius educuntur, quam in foetu maturo, quia tener funiculus umbilicalis etiam a levi tractione rumpitur, & placenta major in minoribus foetibus largiori superficie utero adhaeret (f).

Bis vidi, a grumo concreti sanguinis post trimestrem abortum in utero retento febrim acutam continuam putridam secutam fuisse: una ex his decima quarta morbi die, altera die decima septima periit.

Ex abortu mulier prima die corripiebatur febre ardente, cum perpetuis alvi dejectionibus, & aliis malis symptomatibus; periit septima die (g). In hac aegra graviditatis tempus non expressit Hippocrates; sed in altera (h) notat, quod ad quintum mensem ex abortu febris prehenderit, cum pessimis pariter symptomatibus, inter quae & perpetuum alvi fluxum, & urinas paucas, tenues, subnigras recenset. Et haec periit septimo die phrenitica.

Notum autem est post haemorrhagiam uterinam abortum frequenter sequi. Quam funestus autem metuendus sit exitus, dum scelestae mulieres abortivis remediis sumtis foetum perdere conantur, alio in loco (i) legitur: Cui-dam, quae circa vigesimum aetatis annum pharmacum, abortum promovens, potavit, dolor accidit, biliosorum multorum, pallidorum, & porraceorum vomitus. Quum bibisset, eam convulsio invadebat, & linguam mandebat. Quarto die ad eam accessi, ipsi lingua erat magna, nigra, oculorum alba rubescebant; insomnis erat. Quarto die sub noctem mortua est. Eandem morbi historiam videtur postea adhuc repetiisse Hippocrates (k); sed addidit, quod ultronee medicamentum abortivum sumserit trigesimo post impraegnationem die; simul legitur, quod nigra vomuerit. Reliqua omnia conveniunt cum priori.

Acriter invehitur Magister amorum (l) in hoc scelus;

— sine

(e) Académ. de Chirurg. Tom. I. pag. 360.

pag. 239.

(f) Medic. Essais Tom. 2. N. XI.

(g) Hippocr. Epidem. 3. aegrot. X. Charter. Tom. IX. pag. 248.

(h) Ibid. aegrot. XI. pag. 250.

(i) Epidem. V. textu XXXIII. Charter.

Tom. IX. pag. 345.

(k) Epidemic. VII. aegrot. 82 Charter. Tom. IX.

pag. 583.

(l) Ovid. amor. Lib. 2. Eleg. XIV. pag. 329. 330.

— — — — Sine crescere nata.
 Est pretium parvae non leve vita morae.
 Vestra quid effoditis subiectis viscera telis;
 Et nondum natis dira venena datis? &c.
 Hoc neque in Armeniis tigres fecere latebris:
 Perdere nec foetus ausa leaena suos.
 At tenerae faciunt, sed non impune, puellae.
 Saepe, suos utero quae necat, ipsa perit.
 Ipsa perit, ferturque toro resoluta capillos:
 Et clamant, MERITO, qui modo cumque vident.

Propriae vitae periculum saltem horreant illae, quas homicidii crimen non terret; optime enim Tertullianus dixit (m): *Etiam conceptum in utero, dum adhuc sanguis in hominem delabitur, dissolvere non licet: Homicidii festinatio est, prohibere nasci: nec refert, natam quis eripiat animam, aut nascentem disturbet. Homo est & qui futurus est.*

Ex his etiam patet ratio, quare Hippocrates (n) monuerit sequentia. *Quae abortiunt, magis periclitantur. Abortiones enim graviores sunt, quam partus. Non enim citra violentiam embryo corrumpitur sive medicamento, sive potu, vel cibo, vel subditiis, vel re alia quapiam. Violentia autem malum est. Hoc enim casu periculum est, uteros ulcerari, aut inflammari. Hoc autem est periculosum.*

Observavit Mauriceau (o), tunc imprimis periclitari gravidas, si decumbentes febre continua, quae ut plurimum de remittentium genere esse solet, abortum patiantur; omnium maxime, si pectus simul afficiatur. Plures vidit, & doluit sic periisse, non ita diu post abortum. Credidit optimus Vir, huc spectare Hippocratis (p) praesagium: *Si mulier utero gerens morbum non cognatum (congenerem) habeat, in puerperii purgatione perit.* Forte adhuc magis quadrat alter locus (q), ubi sequentia leguntur: *Quae uteros gerentes a febris corripuntur, & vehementer citra manifestam causam extenuantur, pariunt difficulter, & periculose, aut abortientes periclitantur.* Merito ergo periculum praesagitur; nec tamen certa perniciēs semper imminet. Gravidas acutis morbis decumbentes plures curavi, & ab aliis curatas novi; imo memini, me tractasse puellam quindecim annorum, ex furtivo concubitu jam in quartum mensem gravidam, quae medio variolarum, satis numerosarum, decursu abortum passa fuit, & tamen feliciter evasit.

Nec tantum ille metus, ne gravida per uteri haemorrhagiam pereat, sanguine exhausta; sed & si emerferit, poterit facile in morbos chronicos diffici.

(m) Mauriceau liv. I. chapit. XXIV. pag. 191.

Cap. LXXI. Charter. Tom. VII. pag. 771.

(p) De Nat. Puer. Cap. V. Charter. Tom. V. pag. 315.

(q) Aphor. 55. sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 228.

(n) De Mulier. Morb. Lib. I.

(o) Loco modo citato pag. 196.

ficiles ex copiosa sanguinis, & subita jactura incidere in Cachexiam (§. 1168.), Hydropem, (1229.), aliave plura. Vidi mulierem, quae post validissimam uteri haemorrhagiam frequentia, & diuturna animi deliquia patiebatur: cum autem praeter omnem fere spem evasisset, & suo tempore peperisset infantem, sed debilem, & paucis diebus tantum superstitem, non potuit de lecto surgere, quin statim adesset valida cordis palpitatio cum summa anxietate: misera per duodecim annos lecto affixa mansit, caeterum satis sana, modo quiesceret. Credibile admodum videtur, in longis illis, & frequentibus animi deliquiis stagnantem circa cor, & majora vasa sanguinem in polypum concrevisse, qui accelerato per motum corporis venoso sanguini obstaculum faceret statim.

Accedit etiam, quod post abortum, si secundinae manserint, aut sanguis concretus retineatur, plurima, & molesta mala sequi possint. *Hippocrates* (r) dixit: *Dolores ex Iliis ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex abortu, neque valde purgata muliere, perniciosi sunt.* Videtur ibi uteri purgationem a retentis, & per lochia post abortum intellexisse.

Apparet, ex dictis satis probari, quod fluor uterini sanguinis pro periculossimo gravidarum morbo merito habeatur.

§. 1304. **Q**ui fere ex eo, quod placenta ab utero soluta, & arteriis plenis sanguine distendente, uteroque distento, saepe pleno rivo arteriosus cruor emanet.

Naturaliter ovum humanum adhaeret tota sua superficie uteri cavo, sicque impedit, ne quid ex vasis uterinis exire possit, & partus tempore, dum foetus exit, vix quid sanguinis, vel parum tantum prodit, licet chorii nexus cum utero hinc inde forte solvatur, dum foetus excluditur. Verum simul ac nexus placentae cum utero solvitur, sanguis magna copia exit, & non prius. Antea jam saepius dictum fuit, graviditatis tempore uteri vasa augeri continuo, hinc admodum ampla esse, dum partus instat; adeoque, dum placenta separatur ab utero, patula amplorum vasorum orificia sanguinem contentum liberrime effundere poterunt. Cum ergo in gravidis pleno rivo exit sanguis, merito creditur, placentam ab utero separatam esse vel in totum, vel pro parte saltem. Periculosior autem longetalis haemorrhagia est, quia in gravidis uterus plenus manet, cum post partum,educta placenta, uterus vacuus se contrahat, sicque vasorum capacitatem minuat, adeoque & haemorrhagiam. Verum, cum & absque separatione placentae sanguis de gravidarum vulva exire possit, hinc prudenter in textu dicitur, quod fluor uterini sanguinis in gravidis fere pendeat a placenta ab utero soluta: possunt enim esse & aliae causae, licet longearius occurrant. Sic notat *Mauriceau* (s); si uterus gravidus a vi externa findatur, ingens uteri haemorrhagia sequetur, licet placentae cum utero

Tom. IV. pars II.

g

nexus

(r) Coac. Praenot. N. 515. Charter. Tom. VIII. pag. 882.

(s) Traité des malad. des femm. gross. liv. I. chap. XXI. Tom. I. pag. 169.

nexus manserit integer. Tale malum suspicari licet ex cognitione violentae causae praegressae; sed certo non potest sciri, nisi post mortem in cadavere. Nullam autem tunc spem superesse credidit, licet vel sponte, vel per artem partus statim sequeretur, quia uterus adeo insigniter laesus non tam facile se contrahere posset; & semper tunc metuenda est uteri inflammatio, tam gravem offensam secutura, quae toties lethalis observatur.

Rarius longe est, & quod semel tantum vidit *La Motte* (1), quando haemorrhagia uterina fit a ruptura vasorum, quae in chorda umbilicali continentur. Adsisiebat parturienti, in qua partum naturalem exspectabat. Aquae formabantur; at dum jamjam rumpendae erant, vidit manum suam paucis sanguine tingi, & ut solet saepe fieri, inde concludebat, partum brevi secuturum. Paullo post rumpebantur aquae, & caput infantis se offerebat, sed simul copia sanguinis prodibat, quae augebatur ad singulos parturientis dolores. Non dubitabat, hanc haemorrhagiam fieri ob placentae ab utero solutionem, nec poterat vertere infantem, ut partum acceleraret, extrahendo per pedes, quia caput in pelvi haerebat jam, & nixus parturientis validi nimis erant, ac continui. Animosa tamen puerpera, non ignara imminentis periculi, validis nixibus partum sic promovit, ut brevi in lucem prodiret puella, debilis admodum, cujus collo funis umbilicalis tribus vicibus circumvolutus fecerat partum tardiores, & difficilem. Feliciter evasit puerpera, & postea adhuc septies peperit absque eo, quod aliquid infortunati contingeret.

Simul ac infans prodierat, cessabat omnis haemorrhagia, & examinando funem umbilicalem, apparuit, quod unus ex nodis varicosis, qui in vena umbilicali toties observantur, excoriatione quasi apertus, sanguinem profuderat; quod facile ab attritu circumvolutionum chordae umbilicalis circa collum ad se mutuo contingere potuit. Patet simul, veram hujus haemorrhagiae causam non potuisse cognosci ante partum absolutum, & ruptis jam membranis, vix suspicari illud potuit optimus ille Chirurgus, cum nunquam tale quid vidisset, & frequentissima haemorrhagiae uterinae causa sit solutio placentae ab utero; ad quam videtur spectare sequens *Hippocratis* (2) prognosis; *Si cui parturienti ante foetum multus sanguinolentus citra dolorem fluxus prodeat, periculum est, ne foetus mortuus exeat, aut minime vitalis edatur.* In casu modo enarrato augebatur fluxus sanguinis dolorum tempore; verum ubi placenta integre, vel pro parte separata est, tunc potius augebitur haemorrhagia in dolorum intervallis. Dicit enim *Hippocrates* ὁδὸν, dum partus dolores jam adsunt, & ante foetum, cujus exclusio jamjam exspectatur, ac monet, citra dolorem hoc fieri. Dolorum enim tempore, dum partus instat, caput infantis replet uteri orificium dilatatum; remittentibus doloribus illud minus urget, & hinc sanguini effluxu liberior via conceditur. An inde diagnosi haberi posset, dubium videtur. Si enim doloris tempore caput infantis nondum eo usque descenderit,

(1) *Traité des accouchemens* liv. 3. Chap. VIII. observat. CCXI. pag. 296.

(2) *De superfœtatione* cap. V. *Charter*, Tom. VII. pag. 863.

rit, ut repleat uteri orificium, poterit & dolorum tempore augeri uteri haemorrhagia, quae separatae placentae effectus est. In utroque casu praecipua spes est in eo, ut per partum uterus cito evacuetur, seque contrahere possit, uti postea dicitur.

Cum autem, uti antea dictum fuit, ovum humanum tota sui superficie nectatur utero, poterit forte & sanguis exire, si in alio quovis loco nexus chorii cum utero solvatur. In illo quidem loco, ubi placenta accrescit, vasa magna sanguinea adsunt, sed nec reliqua chorii pars vasis caret. Dum per ramum arteriae iliacaе materiam ceraceam immisit in uterum gravidum toties laudatus Noortwyk (vv), vidit illam in vasa placentae, & chorii profunde penetrasse. Dum integrum ovum humanum ab utero, cui nexum erat, suspensa manu separare conabatur, vidit chorion per veram cellulosa substantiam utero nexum esse, qui nexus tamen levissima vi solvebatur (x). Sed Eandem hanc cellulosa separanti vasa occurrebant numerosa per totum ambitum, ex chorio in uterum porrecta, impleta. Accuratus examen docuit, internam matricis superficiem poros habere mediocris magnitudinis multos, aliquantulum tamen ab invicem distantes (vasorum orificia); quibus proportionatae dimensionis canales extra chorion emergentes, per dictam cellulosa progressi, inosculabantur, sic, ut vas responderet vasi, & communis materiae cylindrus utrumque impleret. Vasa haec alia majora, alia minora erant, in universum talia, ut tenuiorem, crassioremve aciculam, quaedam etiam caput aciculae maximae facile admisissent. Rursus nonnulla recto tramite uterum subibant, nonnulla postquam brevi prius spatio juxta uteri superficiem reflexa processerant: erantque ultima haec non rotunda, sed compressa quasi, & complanata. Omnium etiam memoratorum vasorum cum matrice unio levissima vi solvebatur. Malui ipsis uti Auctoris verbis, quibus haec observata describit, quorum oculatum testem me fuisse, gaudeo.

Sic passim ovum utero haesisse vidit, sed circa placentam nexus ille erat utcumque validior, vasa erant numerosiora, quibus extra placentam emergentibus, atque in uterinos poros insertis, manifesta oculis communicatio patebat inter uteri, & placentae vasa: & haec iterum variam diametrum monstrabant, in genere non multum ampliora, quam quae circa chorion descripta, pariterque tenerrima (y).

Ex his sequi videretur, non esse metuendam profusorem haemorrhagiam, dum placenta ab utero solvitur, quam si alio in loco chorion ab utero fecederet. Sed ad radicem placentae, ubi haec per orbem supra chorion terminatur, cellulosa illa in ligamentosas lacinias collecta nexum denuo parum firmiorem exhibebat; hic vasa copiosissima, capacissima, adeo insignia, ut eorum quaedam digitum pueri potuissent recipere; veri venosi sinus, molliissimis, tenuissimisque tunicis conflat; breves, ex quibus mox rami intra placentam immergebantur, longe minores, magna parte admodum exiles: quod patuit, dum in sinus tales, excussa, quam continebant materie, introspiceret postea. Rami hi

g 2

ex

(vv) Uter. human. gravid. Anat. pag. 11. (x) Ibid. pag. 9.

(y) Ibid. pag. 10.

ex fundo sinuum, qua placentae innascebantur, procedebant ea utcumque ratione, uti vena cava, hepatis innata, intra hujus substantiam ramos dimittit (z). Inde patet simul, quare profusa haemorrhagia sequi possit, licet placenta pro maxima sui parte adhuc utero adhaereat, si tantum limbus orbicularis incipiat separari, ubi maxima illa vasa sunt, arachnoideae fere tenuitatis, & adeo mollia, ac tenera, ut vix tangi possint, quin diffuant; unde mirum non est, si in secundinis, quas obstetricis manus eduxit, aut evanuerint collapsa, aut contrectando detrita fuerint (a).

Dubitari ergo nequit de immediata communicatione vasorum uterinorum cum ovi vasis, cum ovum per totum ambitum utero adnexum sit vasorum ope, ita ut directum commercium arteriarum uterinarum notabilium cum ovi vasis manifeste demonstretur. Per haec vasa directe sanguis matris ad chorion pervenit, & videtur ab hoc sanguine separari liquor amnii, qui foetum ambit undique. Observavit enim *Leuret (b)*, dum gravidae, lue venerea laboranti, frictiones mercuriales fuerant adhibitae, ita ut foetus simul sanaretur a foedo hoc malo, tunc aquam amnii Mercurii contenti signa dare: plumbeum enim tunc colorem habet, & cupro rubro affricta illud dealbat, & quidem tanto plus, quanto major copia argenti vivi per frictiones corpori matris applicata fuerat.

Videtur etiam ex dictis intelligi, quare levis quantitas sanguinis observetur partus tempore, dum aquae formatae, ut obstetrices dicere solent, os uteri jam multum dilatarunt, & extra illud prominent. Solet autem hoc merito haberi pro partus brevi secuturi omine. Non possunt enim membranae prominere, quin plura vasa, quae chorion utero neceiebant, rumpantur, & aliquid sanguinis effundant; quo linthea, & obstetricis manus tinguntur. Nec magna tunc copia sanguinis effundi potest, quia tenerrima haec vasa rupta mox collabuntur, & aquae tumentes os uteri replent omnino; quibus ruptis, mox caput infantis sequitur, & orificium obturat. Solet quidem hoc adscribi violentae dilatationi oris uteri, per quam illud plus, minusve dilaceraretur; verum talis dilaceratio, ut vasa rumpantur, non semper fit, & si contingat, tunc imprimis deberet fieri, dum caput infantis transit; & tamen constat, aliquid sanguinolenti jam observari saepius, antequam aquae rumpantur, quae sensim magis tumentes, successive molle, & facile cedens uteri os dilatant. Unde videtur prior causa magis probabilis esse.

Illae autem, quae de nexu ovi cum utero per vasa fuerunt dictae, confirmantur & aliis magnorum virorum observatis. Sic *Celeberrimus Simson (c)* testatur, se examinasse uterum mulieris, subito mortuae septimo, graviditatis mense. Dum separabat placentam, protraherat ejus processus, longitudine *medii pollicis ad minimum; erant autem numero multi, ex tota placentae superficie surgentes; quidam ex illis calamus anserinum aequabant crassitie; imo ex omni chorii ambitu surgebant filamenta fibrosa, capillaceae tenuitatis, quae pe-*

(z) Uter. human. gravid. pag. 10.

(a) Ibidem pag. 11.

(b) L'art des

accouchem. N. 265. 266. pag. 43. 44.

(c) An Inquiry how far the vital

and animal actions &c. In Praefat. pag. 9.

netrabant in poros uterinos. Dum autem extrahebat illos placentae processus, (frangebantur), statimque contrahabantur, & referebant granulata superficiem mori arboris fructus. Vidit & Celeberrimus Albinus (d) in illa parte uteri gravidi, cui placenta adjuncta est, arterias tortuosas, non ramosas, & creberrimas: ruptae autem videbantur, quia placenta abscesserat ab utero. Postea perquisivit in alio utero, cui placenta integre adhaerebat, tunc invenit easdem sanguine plenas, & placentae se inferentes: unde dubium non erat, quin ad placentam pertinerent, sanguinemque in eam impellerent. Notandum autem est, quod data opera nihil mutaverat neque premendo, neque inflando, neque replendo, aliove modo. Adeoque omnia in situ, & nexu naturali apparebant. Merentur videri accuratissimae Tabulae uteri gravidi, quas summus ille Anatomicus edidit.

Certum ergo est, uteri cum ovo commercium per vasa, & his ruptis quacumque de causa, sequi poterit haemorrhagia uterina, quae longe profusior erit, si placentae ambitus ab uteri nexu solvatur; vasa enim & magna, & numerosa ex utero in placentam veniunt in hoc loco. Verum & fieri potest, ut vasa rumpantur, quae ex utero in placentam derivantur, & nihil tamen sanguinis utero exeat. Notavit hoc Celeberrimus Albinus (e), & sic descripsit: Parturienti illi, cujus uterum aliquot tabulis persecutus sum, Placenta abscesserat, multo sanguine interjecto coagulato inter eam, & uterum. Tota autem marginis circumferentia nihil quidquam abscesserat, eoque, ne sanguis proflueret, prohibebatur. In tali casu tamen metus est, ne sanguis, inter placentam, & uterum ex vasis ruptis effluens, copia auctus tandem & separet limbi orbicularis placentae nexum cum utero, & inde sequatur profusa haemorrhagia, uti dictum fuit ad §. 1296. Placenta enim utero non insinuatur per ultimas capillares vasorum suorum extremitates (f). Impedit hoc membrana vera, superextensa non tantum convexae superficiei placentae, quae uterum tangit, sed & sulcos placentae ingrediens, simili fere modo, uti pia mater sulcis cerebri se insinuat. Nec haec membrana sanguinis in superficie convexa placentae collecti progenies esse potest: nam in placenta recentissima, adhuc a matre calente, & fumante, eandem invenit (g).

§. 1305. **C**Ognoscitur ex orificio uteri laxato, sanguinis fluxu magno, citato, admodum debilitante, vivo, vel grumoso, dolente.

Cum adeo periculosus sit hic gravidarum morbus, operae pretium erit novisse signa, non tantum, quando jam adest haemorrhagia, verum etiam, dum futura metuitur.

Notandum tamen est, non omnem uteri haemorrhagiam aequè periculosam esse, & quandoque de vulva sanguinem exire, qui non ex utero venit.

Obser-

Tom. IV. pars II.

§ 3

(d) Academ. annot. Lib. I. Cap. IX. pag. 34. & seq. (e) Ibid. pag. 36.
(f) Noortvvyk de utero gravido pag. 14. (g) Ibid. pag. 21.

Observaverunt omnes, qui de morbis gravidarum scripserunt, quibusdam mulieribus familiare esse, ut sanguinis aliqua copia prodeat primis graviditatis mensibus, & quidem simili periodo, qua menstrua iisdem, non gravidis, prodire solebant. Aliquibus ad quartum graviditatis mensem usque hoc contingit. *Mauriceau* (*b*) noverat mulierem, cui ad sextum mensem usque, dum gravis erat, fluor menstruus solita periodo redibat; sed minori tamen copia, & debito tempore sanos pariebat infantes; quorum quinque superstites erant. Nec metuebat quid mali, si paucus fluere sanguis, absque dolore, & certa periodo, ac simul os uteri foret clausum: tunc enim noscitur, non fluere sanguinem ex uteri cavo, sed ex vasis vaginae, vel externae superficiei colli uteri. De hac re dictum fuit capitulo praecedenti, ubi de fluore menstruo agebatur. Optime hoc monuit *Celeberrimus Hoffmannus* (*i*): *Saepe fit, ut, quae sanguine abundant foeminae, secundo, & tertio graviditatis mense sanguineum experiantur fluxum, citra dolores, & spasmos in regione lumbari, & abdomine, citra debilitatem, & praecedentem horrorem, aut rigorem partium extremarum. Hoc autem in casu sanguis non ex uteri cavitate, sed potius ex vasculis vaginae uterinae cum euphoria profluit.*

Quamvis autem certis observatis, levem talem haemorrhagiam contigisse absque noxa, constet, & admodum verosimile videatur, tunc tantum evacuari illud, quod, repletis sufficienter uteri incrementis vasis, & foetu nutrito, superabundat; tamen tutius credidit *Mauriceau* (*k*), plethoram solvere in gravidis per sanguinis missionem, quam totam hanc rem naturae committere. Constat, *Hippocratem* (*l*) pronunciasse sequentia: *Mulierem foetum bimestrem, aut trimestrem utero gerenti, si menses quamprimum singulis mensibus prodeant, eam tum tenuem, tum debilem reddi necesse esse. Interdum etiam his diebus, quam diu menses prodierint, febris corripit. Quumque fluunt, & ubi effluxerint, pallescit, quantumvis parce fluant. Apparet hoc ex textu evidenter, quod non agatur hic de gravis plethorica, sed quae pallescebat, si vel parcam jacturam sanguinis pateretur; & certe in tali casu hoc noceret: quia sic non tollitur superfluum, sed diminuitur necessarium; adeoque & matri, & foetui damnosa est talis haemorrhagia. Praeterea manifeste patet ex illis, quae sequuntur, quod loquatur de sanguine, qui ex ipso utero venit. His uteri plus aequo debescunt, & incrementum foetus dimittunt. Et paullo post: Si autem uteri plus aequo debescant, sanguinem singulis mensibus, sicut prodire consuevit, effluere sinunt, & quod in utero continetur, tenue, & debile fit. Et hoc sensu videtur intelligendus esse Hippocratis aphorismus, (*m*); Si mulieri utero gerenti purgationes prodeant, impossibile, foetum sanum esse. Pulcre autem notat *Galenus* (*n*) in commentario ad hunc textum, cum purgationes plurali numero enuncientur, & verbum prodeunt adjungatur, non agi hic de paucis sanguine excreto, neque semel, sed saepe,*

&

(b) Traité des malad. de. femm. gross. livr. I. chap. XX pag. 155.

ration. & system. Tom. IV. part. 3. Cap. 9. pag. 623.

cita o pag. 157.

pag. 744.

(i) De mulier. morb. Lib. I. Cap. XXIII. Charter. Tom. VII.

(m) 60. Sect. V. Charter, Tom. IX. pag. 232.

(i) Medic.

(k) In loco modo

(l) Ibidem.

(n) Ibidem.

& multum erumpente. *Qui namque semel, aut bis paucus excernitur (sanguis), in multis citra ullam foetus laesionem conspicitur.* Deinde addit sequentia: *At excretio, quae gravidis accidit, ex cervicis uteri venis fieri videtur. Nam interne in ipso cavo uteri suspenditur chorion, quare nihil per illa in muliebrem sinum excerni potest.* Simul inde patet, nunquam melius intelligi posse *Hippocratis Aphorismos*, quam dum aliis locis parallelis ejusdem Auctoris illustrantur.

Diagnosif ergo periculosaef Haemorrhagiae defumitur ex copia magna, doloribus lumborum, & abdominis, (qui tamen & in menstruantibus mulieribus saepe adfunt) & quandoque parca copia sanguinis prodit in initio; quam mox sequetur ingens uteri haemorrhagia; dum magis magisque placenta ab utero secedit, vel & plura vasa, chorion utero neſtentia, solvuntur. Praecipuum autem signum est, si uteri orificium laxatum fuerit, & dehifcat, quod naturaliter in gravidis sic connivet, ut fere claufum fit, dum parvum hiatum opplet mucosa gelatinosa materies. Nullum dubium superesse poterit, si pleno rivo sanguis exeat, vel & grumi concreti cruoris, una cum dolore ventris, & lumborum, ac sequente magna debilitate: grumi autem illi sanguinis concreſcunt vel in ipso utero, dum sanguis ruptis vasis effusus ſtagnat per aliquod tempus, ante quam cohaerens cum utero chorion ſeparetur ad orificium uteri, usque, ſicque sanguis libere exire poſſit, adhuc fluidus: vel etiam grumi illi in vagina ex coagulato ſanguine fiunt, dum compressis ad ſe mutuo ſemoribus sanguinis effluxum minuire ſatagunt: concretus talis sanguis tunc a mulierculis adſtantibus pro *mola*, aut *ſaſſo conceptu* toties haberi ſolet, cum magnam ſatis molem in vagina acquirere poſſint, non vero in uteri cavo, quod a foetu, & ſecundinis impletum eſt.

Verum, dum jam profuſa talis uteri haemorrhagia adefſt, ſero cognofcitur, & plerumque abortus ſequitur; unde magnae utilitatis erit, noſcere & illa ſigna, quae nondum praefentem, ſed futuram uteri haemorrhagiam praefagiunt, ut nempe idonea medela praecaveri poſſit.

Sponte patet, tunc metuendum eſſe hoc malum, ſi cauſae praeeſſerint, a quibus illud produci ſaepius obſervatum fuit; de quibus dicetur ſequenti paragrapho.

De commercio illo, quod mammas inter, & uterum intercedit, jam ſaepius dictum fuit; dum uteri vafa implentur magis circa primam menſtruorum eruptionem, turgent mammae; in gravidis, intumeſcente utero, & mammae tument. Ideo *Hippocrates* (o) dixit: *Mulieri utero gerenti ſi mammae dērepente extenuentur, ipſa abortit.* Metus enim eſt, ne tunc uteri vafa, ſoluta a nexu cum placenta, & chorio, ſimili modo collabantur, quod abſque illorum inanitione vix fieri poterit; adeoque abortus timendus eſt, & cum illo uteri haemorrhagia. Experientia ſaepius confirmavit *Hippocratis* hanc Prognofin. In ſequenti aphoriſmo idem teſtatur, ſi gemellos in utero

G 4

gerat

(o) Aphor. XXXVII. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 217.

gerat mulier, & una ex mammis gracilis evadat, tunc unum ex gemellis abortiens perdit. Cum autem, uti antea dictum fuit, veteres Medici crediderint, uterum humanum binas habere cavitates, quarum dextra mares, sinistra foeminas contineret, hinc & sexum futuri abortus determinari posse, credidit *Hippocrates*, prout vel dextra, vel sinistra mamma extenuaretur. Sed & alio in loco de statu foetus in utero ex mammis praesagium sumit (p); *Mulieri utero gerenti si lac copiosum e mammis effluat, foetum imbecillum significat. Quod si solidae mammae fuerint, saniores foetus significat.*

Quamvis autem subitam mammarum extenuationem pro absoluto signo futuri abortus habuerit *Hippocrates*, tamen non omnem spem servandi foetus abjecisse videtur, dum mammae extenuantur. Dicit enim (q): *Quae foetus corrupturae sunt, iis mammae extenuantur. Quod si iterum durae evaserint, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, neque (foetus) corrumpunt.*

Videtur ergo, nisi subito concidant mammae, adhuc medelae locus esse, licet extenuentur.

Ventris, & lumborum dolorem pariter pro signo abortus futuri *Hippocrates* (r) habuit: *Si mulier utero gerens ventrem, & lumbos doleat, metendum est, ne abortione foetum excludat, ruptis membranis eum continentibus.* Semper in gravidis lumborum dolores, nisi partus instet, suspecti sunt, si diutius durent; praecipue, si per intervalla redeant, & versus abdominis inferiora terminentur; tunc enim sunt veri parturientium dolores, per quos immaturus foetus excluditur, & saepe abortum periculosa uteri haemorrhagia praecedit.

Dein & hoc praecipue notandum est, quod facile redeat uteri haemorrhagia, licet omnino cessasse videatur: nam, uti optime notavit versatissimus in arte obstetricia *Puzos* (s), non videtur illa pars placentae, quae separata haemorrhagiam uteri fecerat, facile agglutinari utero, ut firmiter haereat denuo, sed haemorrhagia potius sistitur, dum sanguis concretus in vasis hiulcis, sic se accommodat illorum diametro, ut sanguini effluxuro obicem ponat: grumi illi si postea exciderint, redit haemorrhagia uteri, & plerumque profusior, ac copiosior. Unde patet, quare tanta cautela opus sit, & tam diuturna in gravidis mulieribus, quae hoc infortunium passae fuerunt.

§. 1306. **C**Ausa hujus affectus animi vehementes, motus corporis nimii, hysterica, & emmenagoga male applicata, percussio inferioris partis abdominis.

Causae illae, a quibus uteri haemorrhagia fieri observatur, variae sunt; quaedam enim tales sunt, ut etiam in sanis, & robustis mulieribus illam producere possint, qualis est v. g. valida abdominis percussio, & vehementi-

(p) Ibid. aphor. LII. Charter. ibid. pag. 225.

(q) Ibid. aphor. LIII. pag. 226.

(r) De mulier morb. lib. I. Cap. XXV. Charter. Tom. VII. pag. 745.

(s) Académ. de chirurg. Tom. 1. pag. 362. 363.

tissimi animi motus: aliae, minus noxae, tamen in quibusdam gravidis periculosaе sunt, utpote magis dispositis ad uteri haemorrhagiam, & abortum. Deinde & peculiaris ipsius uteri dispositio inter causas merito numeratur. Tandem & ipse foetus in causa esse potest. Quae omnia singulatim considerari merentur, ut pateat melius, quid ars hic possit, & quanam medela conveniat. Causae autem, quae hoc numero recensentur, etiam in gravidis, caeterum optime se habentibus, noxae semper sunt, & periculosaе; sed longe magis, si ad hunc morbum dispositae fuerint, in quibus & a levioribus causis idem metuendum est malum.

Affectus animi vehementes. Quam mirae, & quam subitae fiant mutationes in corpore humano per validos animi affectus, antea jam saepius dictum fuit (vide §. 104. 611. 629. 1062. 1093. 1181. 1200.): hinc illa non repetam. Sufficit hic notasse, quod omnia vasa corporis in subito metu contrahantur; per iracundiam omnes humores rarefiant, & plena vasa turgant; per summam moestitiam supremus belli dux concidit mortuus, dum paullo ante mille inter mortis pericula intrepidus versabatur: Spartana mater inter ipsos amplexus reducis filii, quem in acie caesum putabat, mortua corruit prae nimio, & subito gaudio. Si jam consideretur, tam subitos motus, validas adeo concussionem &c., applicari teneris illis vasis, quae chorion, & placentam nectunt utero, nemini mirum videri poterit, cur toties haemorrhagia uterina in gravidis post validos animi affectus sequatur. Foemina triginta annorum robusta, & procerae staturae versabatur fere quotidie in foro, ubi & rixis quotidianis, & iracundiae indulgere solita erat satis. Cum jam termino graviditatis proxima esset, subita excandescit ira, dum vicina mulier puerum ejus quinquennem percuteret. Mox, aliquid insoliti sentiens in corpore, praedixit, se inde morituram. Post aliquot dies subito profusa uteri haemorrhagia sequitur; unde convulsa periit, antequam quid tentari posset, ut servaretur. In cadavere inveniebantur bini foetus masculi sanguine nigro coagulato tecti undique, quo & uterus plenus erat, ob rupturam placentae, & vasorum ejus (1).

Plures alios casus egregius auctor recenset, qui docent, quantum validi animi affectus nocere possint gravidis. Multos & ipse vidi, nec credo, ullum Medicum esse, quin similia observaverit. Hunc autem casum ideo selegi, quia in sana, robusta muliere rixis quotidianis, & habituali iracundiae assueta, tantum mali brevis ille furor producere potuit. Idem a metu, gaudio inopinato &c., metuendum est; & plura exempla in Historia Medica habentur. Hinc discere possunt gravidae, quantum cavere debeant ab animi affectibus; uti & adstantes, quantam curam adhiberi oporteat, ne imprudentia sua praegnantem irriter, inopinato nuncio, bono, vel malo, illas percellant. Novi gravidam, quae placidissime dormiverat, dum in vicinia periculosum erat incendium: sollicita mater, mane accurrens, gratulabatur filiae, quod blandus somnus omnem timorem arcuisset. Mox incipit tremere misera toto corpore, & angī, simulque totus lectus jam inundabatur sanguine,

(1) Peu pratique des accouchemens liv. 1. Chap. VIII, pag. 70.

guine, sequente animi deliquio, & convulsionibus: tamen a periculosa hac uteri haemorrhagia convaluit: sed foetum quadrimestrem abortiens perdidit.

Motus corporis nimii. Frequens satis uteri haemorrhagiae, & abortus causa, quae tamen caveri posset a gravidis, modo vellent. Moderatus corporis motus prodest graviditatis tempore, praecipue ambulatio; imo videmus, rusticas mulieres facile ferre solitos labores, dum gravidae sunt, modo non nimis fatigentur, nec valido corporis nixu illos perficiant.

Notum est, per motum muscularem accelerari motum sanguinis venosi versus cor, adeoque & augeri velocitatem circulationis per vasa corporis (vide §. 99.) Verum §. 100. inter effectus velocioris circulationis numerantur & sequentia. Major nempe vis pulsus sanguinis in vasa excipientia, vasorum, sanguinisque attritus validus ad se mutuo, calor major, acrior indoles humorum. Si jam hi effectus conferantur cum tenera structura vasorum, quae chorion, & placentam utero nectunt, sponte patebit, a nimio corporis motu metuendam esse horum vasorum rupturam, quam sequetur uteri haemorrhagia.

Patet hinc, quanto se exponant periculo gravidae, dum choreis ducendis iudulent, itinera suscipiunt, nixum validum edunt, pondera elevant &c. succussus solus carpenti, praesertim si celeriter vehantur in viis asperis, toties haemorrhagiam uteri fecit, & abortum: illudque discrimen tanto majus est, quanto viciniore sunt partui. Unde patet, quam periculosum consilium sit suadere gravidis, ut rheda vehantur ultimo graviditatis mense, hac spe nempe, ut foetus descendat citius per hos concussus, & partus reddatur felicius. Vidi aliquas, quae ridebant prudens consilium, dum post validos motus nihil mali illis contigisset statim; sed quaedam ex his post aliquot horas, aliae post unum, alterumve diem, periculosam expertae fuerunt uteri haemorrhagiam.

Doluit *Mauriceau* (u), hoc contigisse propriae sorori, quae ultimo graviditatis mense, in genua prolapsa, tumente abdomine humo impegerat, & cum non multum incommodi per unum, alterumve diem perciperet, neglexit quietem corporis adeo necessariam; at tertio die subito sensit validos abdominis dolores, mox sequente valida uteri haemorrhagia, qua periit. Aliquibus enim vasis ruptis, quae chorion utero nectunt, sanguis effunditur sensim, qui collectus magis magisque chorion ab utero separat; sic pluribus vasis ruptis tandem undatim sanguis utero exit.

Notum nimis est, scelestas mulieres, ut foetum perdant, validos adhibere concussus corporis. Cantatrici, quae conceperat, jussit *Hippocrates* (vv) ut in terram desiliat; quum jam septies exiliisset, genitura in terram defluxit, & fiebat somitus. Deinde descripsit ovum humanum, in cujus membrana contentus humor pellucebat. In membrana autem fibrae albae, & tenues inesse videbantur, cum ichore crasso, & rubro obvolutae, & circa membranam exterius fugit.

(u) Traité des malad. de femm. gross. liv. I. chap. 21. pag. 162.

(vv) De Natura Pueri Cap. 2. Charter. Tom. V. pag. 312.

Sugillationes. In minoribus abortibus, una cum membranis integris exeuntibus, chorion totum filamentis hirtum apparet, quae placentae rudimentum sunt: sed cruenta illa, sugillatorum instar, vestigia, & ichor crassus, ac ruber, qui involvebat fibras illas albas, & tenues, docere videntur, ovum jam nexum fuisse utero. An autem tantum sex dierum conceptus fuerit, dubium videtur, cum illo graviditatis tempore ovum forte nondum utero nexum sit, neque vasa uteri adeo dilatata, ut sanguinem dimittant: Narrat autem *Hippocrates* (x), hanc cantatricem cum viris versatam fuisse, & audivisse ab aliis mulierculis, si quando mulier conceptura sit, genituram intus manere, neque foras egredi. Hinc facile potuit contigisse, quod diutius jam gravis fuerit, praecipue cum genitura illa, post septimum saltum prodiens, comparetur ovo crudo, cui undique externa testa ablata est.

Quomodo autem illud *Hippocratis* consilium possit conciliari cum ejus juramento, quod severe prohibet, ne Medici pessum abortivum mulieri exhibeant, non adeo facile patet. Quidam voluerunt, hunc de *natura pueri* librum non ab *Hippocrate*, sed a *Polybo* scriptum fuisse: alii contendunt, genituram sic excussam fuisse tantum, sed non embryonem formatum; de qua re videri poterit *Meibomius* (y). Certe optime *Tertullianus* in *Apologético* dixit: *Nobis, homicidio semel interdicto, etiam conceptum uteri, dum adhuc sanguis in hominem delabitur, dissolvere non licet.*

In genere ergo statui potest, validos corporis in gravidis concussus semper metuendos esse, adeoque sollicitè vitandos. Interim quandoque hi a talibus causis contingunt, quae non semper vitari possunt. Sic vidi a sternutatione valida, & frequenti, in coryza incipiente, haemorrhagiam uterinam contigisse.

Unde, dum catharri regnant epidemice, monendae sunt gravidae, ut, si vel levissimam coryzam sentiant, nares frequenter foveant aqua, & lacte tepidis. Longe frequentius nocuit valida tussis, quae omnium molestissima est, ultimis graviditatis mensibus, dum tumidum abdomen impedit liberum diaphragmatis motum (z). Mollissimis remediis, & imprimis diacodiatis, occurrendum illico violentae tussi. Quamvis autem & concussus per vomitum factus periculo non careat, tamen abortus, & haemorrhagia uterina frequentius a valida tussi contingunt (a).

Hysterica, & Emmenagoga, male applicata. Lenissima antihysterica, & cardiaca moderata gravidis prodesse, antea ad §. 1300. dictum fuit. Noxia tantum hic damnantur illa remedia, quae ab effectu suo *Emmenagoga* dicuntur, de quibus §. 1291. actum est. Cauti semper in hac re debent esse Medici, ne decipiantur a scelestis mulieribus, quae foetum perdere tentant,

ut

(x) De natura pueri cap. 2. Charter. Tom. V. pag. 11.

(y) Hippoc. Jusjurand. cap. XV. pag. 144.

(z) Mauric. Traité des malad. des femm. gross. liv. I. chap. XVI. pag. 141.

(a) Levret l'art. des accouch. pag. 195.

ut tegant ignominiam, imprimis graviditatis initio, dum nondum aucta abdominis moles certam graviditatem monstrat. Semper imprimis suspectas tales habui, quae bene coloratae cum forent, de mensium suppressione conquererentur, simulque valida remedia petebant, asserentes, firmum adeo corporis robur esse, ut a lenioribus nihil boni sperare liceret. In tali casu dedi innocua remedia, quae corpus nullo modo turbare poterant; quo astu Medico obtinui saepius, ut vana spe lactatae, tumente utero, tandem fateantur, se gravidas esse, neque amplius de perdendo foetu, sed de occultando partu cogitarent.

Omnia enim fere illa remedia, quae Emmenagogorum nomen merentur, acria sunt; sed *Hippocrates* (b) monuit; *Sunt autem, quae si acre quiddam, aut amarum praeter consuetudinem ederint, aut biberint, foetus perdunt, tenello adhuc puello intus existente. Si quid enim puero praeter consuetudinem accidat, atque si parvulus adhuc fuerit, moritur.* Sed mortuo foetu inevitabilis est abortus, quem haemorrhagia uteri comitari solet.

Omnia autem acria, quae vel uterum ipsum, vel vicinas utero partes afficiunt, & in contractionem validam stimulant, merito adnumerantur causis haemorrhagiae uterinae. Notum est, clysmata leniter stimulantia, uti & suppositoria adhiberi in parturientibus, non tantum, ut crassae faeces educantur, verum etiam hoc effectum, ut dolores excitentur, si segnes nimis fuerint: ideo purgantia acriora in gravidis vitantur semper, cum non tantum molesta abdominis tormina, sed & tenesmus circa intestinum rectum faciant; qui, teste *Hippocrate* (c) si mulieri utero gerenti oboriatur, abortum efficit. Rationem addit in Commentario *Galenus* (d); quod tali contentione, & molesta sollicitatione cum totum corpus, tum prae caeteris uterus, recto intestino coalescens, laboret.

Idem a vehementi stranguria metuendum esse, ob eandem rationem patet.

Percussio inferioris partis abdominis. Uterus enim, contento foetu turgens, anteriorem abdominis partem occupat; unde motus foetus in utero, applicata manu, facile sentiri potest. Tali vi illata, non tantum nexus chorii, & placentae cum utero destrui potest, sed & ipse uterus findi; uti ex ante dictis patet. Haec est ratio, quare lapsus gravidis adeo periculosus sit; praecipue si pronus fuerit, cum fere semper tunc prominulum abdomen humo impingat. Unde etiam sacris legibus (e) severa statuitur poena illi, qui gravidae mulieris abdomen percusserit.

Verum, uti paullo ante dictum fuit, praeter causas modo enarratas, potest in utero ipso adesse talis dispositio, ut a levioribus etiam causis sequatur uteri haemorrhagia, & abortus; imo & quandoque, licet nulla notabilis causa praegressa fuerit. Talis autem dispositio quandoque utero communis est cum reliquo corpore, aliquando utero soli peculiaris. Sic in ci-

vita-

(b) De mulier. morb. Lib. I. Cap. XXIV. pag. 745. Charter. Tom. VII.

(c) Sect. VII. aphor. 27. Charter. Tom. IX. pag. 304.

(d) Ibidem pag 305.

(e) Exod. cap. 21.

vitatibus Austro appositis Hippocrates monet (f); corpora ut plurimum imbecilliora esse, addit: Mulieres morbis, & fluxionibus obnoxiae sunt; deinde multae ex morbo, non natura, steriles sunt, & frequenter abortiunt. Ita & alibi dixit (g): Quae praeter naturam tenues utero gerunt, abortiunt bimestria, antequam crassiores evaserint.

Similia his alio in loco leguntur (h); ubi ab hac causa menstruum, & bimestrem foetum perdi monet: quidam etiam legerunt το' σῶμα loco το' σῶμα (i); ita ut sensus foret, in tali casu non increassandum esse os uteri, sed totum corpus. Sic enim cum aphorismo modo citato textus ille convenit. Confirmatur hoc praeterea, quod mox subjungat sequentia (k); Quod si praeter naturam crassior evaserit, utero non concipit. Omentum enim crassius incumbens utero comprimit, neque genituram suscipere finit. Ubi manifeste macilentiae nimiae opponitur obesitas, quam attenuandam jubet, cum aliter praegnantem effici nequeant (l).

Sed & peculiaris ipsius uteri dispositio, reliquo corpore se bene habente, potest esse hujus mali causa. Apud Hippocratem (m) sic legitur: Quae vero mediocriter corpulentae foetus bimestres, & trimestres abortiunt sine manifesta causa, illis uteri acetabula mucore plena sunt, neque prae pondere foetum continere possunt, sed abrumpuntur. Diagnosin autem talis morbi (n) habet: Hoc autem modo noveris. Humida fit, & mucosum, glutinosumque defluit, neque mordet: & ubi a fluxu purgari desierit, cum mensibus per duos, aut tres dies muci ex utero procedunt. Sic frigidam, & mucosam uteri dispositionem descripsit, sive fluorem album simplicem, ubi nulla adhuc adest acrimonia, quae mordere posset.

Alio in loco (o) monet, quasdam mulieres facile concipere, sed foetum perdere tertio, vel quarto mense, nulla causa accedente: Si uteri aut natura, aut ulceribus in his subortis, laeves fuerint. Si namque laeves fuerint, interdum foetum continentes membranae, minus, quam conveniat, adhaerent.

Praeterea patuit ex ante dictis, crescente foetu, uteri magnitudinem augeri pariter, ut illum continere possit. Hippocrates (p) videtur observasse hanc abortus causam, si uterus non cresceret. Sic autem habet: Si vero concipiat quidem, sed foetus bimestres eodem exacle tempore corrumpat; neque prius, neque posterius; idque ei bis, vel ter eodem contingat modo; aut etiam, si longioris temporis foetum eodem modo corrumpat, hujus uteri in majorem molem non crescunt, foetu in eis augefcente, & bimestre, vel trimestre spatium excedente. Sed hic quidem augefciit, uteri vero nihil increfciunt, propterea sa-

ne

(f) De aëre, locis, & aquis text. 9. & 10. Charter. Tom. VI. pag. 190.

(g) Aphor. 44. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 221.

(h) De natura muliebri Cap. 19. Charter. Tom. VII. pag. 690.

(i) Ibid. pag. 895.

(k) Ibid. pag. 690.

(l) Sect. V. aphor. 46. Charter. Tom. IX. cap. 222.

(m) Ibid. aphor. 45.

(n) De natur. mulieb. Cap. XVII. Charter. Tom. VII. pag. 689.

(o) De mulier. morb. Lib. I. Cap. XXI. Charter. Tom VII. pag. 743.

(p) De infocundis, Cap. XVIII, ibid, pag. 857.

nae multae eodem tempore foetum corrumpunt. Vidi plures tales casus, & imprimis mirabar, sanissimam matronam, absque ulla causa manifesta, circa finem quinti mensis abortum pati saepius, nec unquam maturum parere foetum, licet a peritissimis Medicis omnis adhiberetur cura.

Unde non immerito, postquam varias causas, quibus foetus corrumpi potest, recensuit Hippocrates (q), addit sequentia: *Sed & ipsi uteri naturas habent, quibus abortionem faciunt, quum flatulenti, densi, magni, parvi existunt, aliisque similibus afficiuntur.* Testatur celebris artis obstetriciae magister, se invenisse in quibusdam mulieribus uterum adeo calidum, ut foetus ab immodico hoc calore periret, & exsiccatus induresceret: praecipue hoc observavit in quadam muliere, cujus uteri interna superficies tangebatur ficca, & aspera, cum tanto simul calore, ut manui immissae molestus esset, neque diu tolerari posset: foetus mortuus erat, exsiccatus, & durus: placenta parva, arida, arctissime cohaerens, ita ut difficulter potuerit ab utero separari. Notat simul, eandem mulierem plures foetus perdidisse ob nimium hunc uteri calorem (r).

Certe satis apta videtur distributio causarum, quae abortum faciunt, in duas classes, uti apud Duretum (s) legitur: *Abortionis omnes causae tam intra natae, quam extrinsecus incidentes, revocantur ad duplicem impotentiam; unam gerendi foetum, alteram nutriendi.*

Praeterea si foetus, antequam partui maturus est, a quacumque demum causa hoc contigerit, moriatur, inde poterit haemorrhagia uteri cum expulsionem foetus mortui sequi. Quamvis rari quidam casus contigerint, ut foetus mortuus per plures menses, imo per annos, in utero maneret, tamen ut plurimum inutile illud pondus brevi post expelli solet. Verum simul ac primum illud hominis rudimentum vita donatur, jam ad mortem aptum est: nec requiruntur adeo validae causae, ut tenellus embryo in utero materno pereat. Constans enim observatio est, quod major pars pereat hominum, dum origini suae propiores sunt. Plerumque enim, cum admodum sint exigui, imbecilles existunt. Quin & grandiusculi foetus etiam corrumpuntur. Quare mulieres mirari non oportet, quod nolentes, foetum corrumpant. Nam cautione, & scientia multa opus est, ut in utero foetum perferant, & enutriant, eoque in partu liberentur (t).

Adfunt praeterea causae haemorrhagiae uterinae, quae ad foetum spectant; sed quae nec certo cognosci, nec tolli, nec caveri possunt, licet cognitae forent. Observaverunt artis obstetriciae magistri (u), funiculum umbilicalem, si brevior fuerit solito, vel si, quamvis longior fuerit, collo, aut artubus circumvolvatur, quod tunc per motus foetus periculum fit, ne placenta ab utero separetur, & sequatur haemorrhagia uteri. Talis casus legi-

(q) De mulier. morb. Lib. I. Cap. XXIV. Ibid. pag. 745.

(r) Peu pratique des accouch. liv. 2. chap. 17. pag. 535.

(s) In coac. Hippoc. pag. 442.

(t) Hippoc. de mulier. morb. lib. I. cap. 25. Charter. Tom. VII. pag. 745.

(u) Mauric. traité des malad. des femm. gross. Tom. I. pag. 159.

legitur (vv), & notum est, saepius contingere difficilem partum, uti postea dicetur, ab eadem hac causa, dum foetus proprio funiculo umbilicali illaqueatus, per validos etiam puerperae nixus expelli nequit. Placenta uteri plerumque fundo adhaerere solet, quandoque & lateribus; raro accrescit uteri collo: quod ubi contigerit, vitari nequit haemorrhagia uteri circa finem graviditatis (x). Vidi bis in eadem nobili matrona partum infantis mortui, qui in omnibus bene constitutus erat, sed chorda umbilicalis in media longitudine nodo fortiter constrictus erat, sicque omne commercium inter matrem, & foetum interceptum fuerat. Videtur funis umbilicalis casu ansam fecisse, per quam totum corpus foetus transivit, & postea motu, ac pondere suo nodum inceptum sic constrinxit, ut vasa umbilicalia comprimerentur penitus; dum enim evolvebatur ille nodus, complanata apparuit tota pars funis umbilicalis, quae nodo intercepta fuerat. Vivos infantes pepererat ante bina haec infortunia, & post haec etiam.

Patet hinc, miras, & latentes causas haemorrhagiae uterinae dari, quae nulla humana prudentia vitari possunt. Sequitur jam consideratio illorum, quae requiruntur, ut a tanto periculo eripiatur gravida, dum sanguis ex utero fluit.

§. 1307. **R**emedia, quies animi, corporisque, aër frigidus modice, venae sectio, adstringentia, opiata.

Quies animi, corporisque. De hac re unanimis est apud omnes consensus. Cum enim, uti praecedenti paragrapho dictum fuit, corporis motus nimii, & validi animi affectus causae frequentes sint uterinae haemorrhagiae, sponte patet, quietem esse summopere necessariam, ne per patula uteri vasa exeat omnis omnino sanguis, & inevitabilis mors sequatur. Vestes hinc statim solvendae sunt, ne vasa externa ullo modo premantur, sicque augeatur copia sanguinis moti per vasa interiora. Postea curandum, ut horizontaliter decumbant; sic enim praecavetur, quantum fieri potest, animi deliquium.

Aër frigidus modice. Saepe ob ingentem sanguinis jacturam totae pallent, & frigent; tuncque minuitur, vel & cessat omnino quandoque haemorrhagia; simul ac vero stragulis obruuntur, vel calidis linteis foventur extrema corporis, mox denuo recrudescit. Tota enim spes in eo imprimis est, ut dum minima vita superest, tempus detur hiulcis vasis, ut se contrahant, vel & grumoso sanguine obturentur. Unde laudatur, si non in molli lecto, sed in culcitra, pilis equinis farta, decumbant. Ob eandem causam nullis cardiacis refocillandae sunt, licet summopere debiles animi deliquium metuant; vel si quaedam adhibeantur, debent lenissima esse tantum, nec spirituosae. *Citri* fragrantia, *melissae*, *florum tiliae*, *rosarum sambuci*, & similium

(vv) Acad. des scienc. 1701. Mém. 118.

(x) Levret l'art des accouchemens pag. 39.

lium odor, ut & aquarum stillatitiarum, quae ex his parantur, sufficiunt. Quomodo autem aëris calor temperari possit, antea ad numerum secundum §. 605. dictum fuit. Toties observatum fuit, vulneratos milites, omni fere sanguine exhausto, dum inter cadavera sub dio relinquebantur, postea convaluisse, qui officiosa magis cura periissent. Alia occasione ad §. 161. dictum fuit, evasisse rusticum, qui discissa arteria axillari, pro mortuo depositus fuerat. Quantum autem frigidae aquae usus ad compescendas haemorrhagias conducatur, antea ad §. 1200. N. 2. pluribus demonstratum fuit. Apud Hyppocratem (y) ad haemorrhagiam uterinam leguntur sequentia: *Spongiam madefactam admoveo, & linteum laeve, molle, derafum, aqua frigida imbutum, ventri injicito, frigidaque aqua perfundito, lectumque a pedibus altiore facito, ac ita sternito.* Similia & apud Moschionem (z) habentur: *Oportet autem eas, cum curari ceperint, jacere in cubiculo parvo, & obscuro, & mediocriter refrigerato, & firmo. Inferiores pedes altiores capite habeant cum omni silentio, & quiete corporis: omnis vero motus fluxum provocat: ita ut pedes contortos supra invicem habeant; & spongas magnas in aqua frigida, vel posca intinctas, partibus ipsis applicare, hoc est pectori (forte pectini, cum in graeco textu legatur κόσις), renibus, & ad inguina, ita ut frequentius etiam mutantur, ne temperie corporis calefiant. Extrema etiam universa strictius tenere, & fasciis ligare oportet, aut aqua frigida submittere faciem, etiam de aqua recenti fomentare, omneque corpus ejus ventilare flabellis.* Imo & frigidum eodem in loco commendatur balneum ex decocto adstringentium plantarum. Cum autem requirat illud corporis motum, satis patet, adhiberi vix potuisse, nisi haemorrhagia jam multum minuta foret, vel fere cessaret; unde potius roborando serviret cavendae recidivae, quam compescendae validae haemorrhagiae: saltem hoc inde patet, quod ab aëre modice frigido, & totius corporis refrigeratione emolumentum expectaverint jam olim Medici: unde & aqua frigida cum paucis succo Citri solet dari pro potu, & juscula, dum exhibentur, egelida tantum.

Venae sectio. Quae tamen vix usum habebit, dum soluto placentae nexu, undatim ex utero sanguis fluit. Minuta enim sanguinis copia non impedit, quo minus ille, qui superest, effluat per vasa magna, & patula, adeoque citius ex inanitione convulsio, & mors sequatur. Venae sectio in cavenda uteri haemorrhagia multum prodest, si post lapsum gravidæ metuitur futura: merito etiam adhibetur, dum, paucis vasis solutis, parcior copia sanguinis ex utero prodit: sic enim, una cum quiete corporis, & mentis, quandoque cavetur haemorrhagiae augmentum, & impeditur abortus. Dum carpebat Medicos Helmontius (a), quod in retentis, & in profluis mensibus venam tunderent, dixit; *Simile fortassis fuerit, si nimis petulantem equum tendinis laesione claudicare fecerint.* Si enim ab hoc discrimine evaserint gravidæ, semper metuendum, ne ob tantam sanguinis jacturam in cachexiam, & hydropem incidant.

Ad-

(y) De mulier. morb. Lib. 2. Cap. 4. Charter. Tom. VII. pag. 797.

(z) Spach. gynaec. pag. 16. & Harmon. gynaec. part. post Cap. 2. XX. pag. 3.

(a) In capitulo de conceptis N. 23. pag. 487.

Adstringentia. Quid sperari possit ad adstringentibus remediis, dum vasis hiantibus, quae sanguinem copiosum fundunt, immediate nequeunt applicari, dictum fuit ad numerum secundum §. 1200. ubi de haemoptoe agebatur. Verum ex uteri vasis fluit sanguis, quibus stiptica applicari nequeunt. Adeoque omnia, quae tunc dicta fuerunt, etiam haemorrhagiae uterinae attribui possunt.

Novi quidem, Pessaria, ex adstringentibus remediis parata, ab *Hippocrate*, & ab aliis postea Medicis laudari: verum in vagina haerent, nec per os uteri adigi possunt; hinc nec ab his certum sperari potest auxilium. Dum autem obturatur per haec vagina, sanguis non adeo libere effluens, grumescit non tantum in vagina, sed & quandoque in ipso uteri orificio; sicque potest nasci aliqua haemorrhagiae mora; sed & simul, dum vasa hiantia pergunt sanguinem fundere, ille, inter chorion, & uteri superficiem accumulatus, magis & magis chorion separabit ab utero; adeoque plura vasa rumpet: hinc, dum paullo post grumus cruoris, in uteri orificio haerens, exprimitur, redit intensior uteri haemorrhagia, quae minuta credebatur, dum obturata per pessarium vagina, parum, vel nihil foras exit. Accedit, quod grumus in orificio haerens uterum irriter, & nixum parturientium excitet; unde mortis periculum foetui imminet, si nimis immaturus fuerit; de qua re adhuc in sequentibus paragraphis dicendum erit, ubi patebit, artis magistros in diversas abivisse sententias, dum quidam volebant, expulsionem foetus omni modo promovendam esse, ut a tanto discrimine eripiat mater; alii vero majori circumspectione utendum jubebant. Certum est, quod si, uti ex *Moschione* modo dictum fuit, quieta jaceat mulier, femoribus supra se mutuo positis, sic comprimi posset externum vulvae orificium, ut sanguis in vagina concrevere in grumum possit, habeaturque illud, quod a pessariis fere sperari potest. Si tamen quis illa adhibere vellet, suadendum videtur, ut ab acrioribus stipticis abstineat, neque nimis profunde in vaginam immittantur, ne laedatur, irriterur uteri orificium, quod satis sensibile est.

Opiata. Ab horum usu forte plus sperari poterit. Antea dictum fuit ad secundum numerum §. 1200., stipticorum actionem longe feliciter succedere in brutis, quam in hominibus; cum nempe bruta periculum ignorent, homines vero inde perturbentur; si vero, opio dato, illa perturbatio tollatur, tunc & hominibus aequae prodesse. Omnes Medici noverunt, quantum perturbentur gravidae, dum pro se, & foetu metuunt, simul ac percipiunt adesse uteri haemorrhagiam; adeoque ob hanc causam conducerent opiata.

Verum & experimenta, capta in ranis, videntur convincere, opium retardare motum sanguinis circulatorium. *Celeberrimus Alston* in pulcherrima dissertatione (b) de opio, in ranis hoc tentavit, ut detegeret, an ab opio mutaretur sanguis, vel ejus motus per vasa. Notum est, per microscopia sanguinis circulum optime videri posse in membrana pellucida, quae in hoc animali digitos pedum nectit. Postquam per tubum exiguum vitreum aliquot

Tom. IV. pars II.

h

gut-

(b) Medic. Essays and observ. Tom. V. part. I. N. XIII. pag. 153.

guttulas solutionis opii in aqua factae instillaverat in ranae ventriculum, & postea microscopio adaptaverat, nemo praesentium observavit ullam mutationem in consistentia, aut colore sanguinis rubri, & feri; nulla apparebat mutatio in magnitudine, figura, aut colore globulorum rubrorum; sed velocitas motus sanguinis per vasa miro mutabatur modo, ita ut dimidio minor esset: nondum elapsa media hora, gradatim increfcebat motus sanguinis per vasa, & solitus redibat ranae vigor una cum solita sanguinis moti celeritate. Dimittebatur rana per mediam horam in aquam puram, ut reficeretur. Deinde alia dosis opii in ventriculum infundebatur, & exponebatur microscopio: tardius longe movebatur sanguis per vasa, quam in priori experimento, & gradatim minuta celeritate, tandem omnino stagnavit, primo in vasis minoribus, deinde in majoribus: & intra horae quadrantem circiter rana exspiravit. Licet autem velocitas sanguinis minueretur, pulsus tamen frequentia sensibilibiter non decrefcebat. Imo, licet motus progressivus sanguinis cessaret, pulsus tamen percipiebatur ex motu quodam undulatorio, per quem tempore diastoles cordis tantum retrogredebatur sanguis, quantum progressus fuerat tempore systoles; donec tandem omnino mortua videretur rana. Caeterum in visceribus nullum observabatur vitium; ventriculus tantum plenus erat muco gelatinoso, parum tincto ab opii colore.

Haec autem experimenta frequenter fuerunt repetita, & semper cum simili successu. Una tamen ex ranis sic occisis revixit omnino, ubi in vase servabatur, tali modo, ut vel in sicco, vel in aqua posset esse, si revivisceret.

Haec etiam confirmantur plurimis experimentis a Celeberrimo *VVbytt* institutis (c); ubi & alia multa habentur pulcherrima, quae probant, opium & in cordis vim muscularem suam exercere efficaciam.

Cum autem in validis haemorrhagiis prodest, ut vita debilissima maneat, uti antea saepius monitum fuit, patet ratio, quare opiata etiam hoc respectu prosint. In *Materia Medica* ad hunc numerum talis formula habetur, in qua tria grana opii in sex unciiis aquae diluuntur, & cochleatim exhibetur omni quadrante horae, donec inceperit leniri malum: adduntur deinde haec: *Si medicamento hujusmodi superabile sit. Simul admiscantur lapis haematites, bolus armena, sanguis draconis*; quae a virtute adstringente laudantur. Quantum ab his possit expectari, antea dictum fuit.

Proderunt etiam ligaturae artuum, sed tales, ut venae premantur, sicque retineatur sanguis in his; arteriae vero non debent comprimi, quae profundius plerumque locantur: hoc obtineri poterit, si moderata ligaturarum adstrictio fiat. Scopus enim est tantum, ut aliqua copia sanguinis retineatur collecta in artubus, ne omnis effluat per uteri vasa, & ideo arteriae debent liberae manere. De hac re ad §. 743. dictum fuit, ubi de compescenda nimia narium haemorrhagia agebatur. Praeterea notari debet, quod si comprimerentur arteriae artuum inferiorum, tunc augeretur impetus, & copia sanguinis per vasa uteri, adeoque & haemorrhagia. Ad §. 1291. enim dictum fuit, quandoque resti-

(c) *Essays and observat. Physic. and Liter. Tom. 2. pag. 280. & seq.*

restitutum fuisse suppressum sanguinis menstrui fluxum, dum comprimeretur magna in femore arteria, & simul eodem tempore per balnea laxabantur uteri vasa.

Ubi autem uteri haemorrhagia incipit minui sive collapsis vasis, sive thrombis sanguinis obturantibus vasorum hiantium orificia, non simul, & semel laxandae sunt omnes ligaturae, sed una post alteram. Metuendum enim foret, ne sanguis in artubus collectus subito ad cor rediret, illudque obrueret, cum saepe magna debilitas adsit, vel etiam irritaret in validiorem, ac frequentiore contractionem; unde merito metuendum foret haemorrhagiae augmentum. Solo interim juscule vitulinae carnis, e gelido tantum, saepius dato, sed parca copia simul, repleantur exhausta vasa. *Louverus (d)* a Medico fide dignissimo accepit, quod adolescenti sedecim annorum per biduum magna sanguinis copia continuo eruperit, neque ulla arte potuerit cohiberi; unde jusculis tentaverunt illum reficere, quae avidè assumfit; & tandem res eo devenit, ut, massa sanguinis fere tota effluxa, quidquid jam efflueret, dilutum & pallidum, sanguinis neque naturam, neque speciem prae se ferret, ipsi juscule, quod toties hauserat, quam sanguini, similis, atque eadem forma per diem unum, & alterum duravit hic aqueus fluxus, constante interim cordi motu suo, donec, fluxu tandem consopito, juvenis paulatim integrae sanitati restitutus est, & exinde in virum robustum, & quadratum excrevit. Cum ergo tale juscule, in debili per tantam haemorrhagiam corpore vix mutatum, per vasa fluere potuerit, & vitam sustinere, quamvis debilem, patet, in uteri haemorrhagia valida vitae periculum adesse quidem, & spem in angusto positam, non autem certam desperationem, modo caveatur a Cardiacis stimulantibus, quae amici, & adstantes urgere solent in tanta debilitate. Unica enim fere spes consistit in vita debili. Hac methodo servavi aliquot gravidas, quae nulla arte servari posse videbantur.

§. 1308. **S**I his nihil proficitur, Infans methodo optima, pro situ ejus mutata, illico educendus, uterusque ab foetu, placenta, grumoso cruore integre liberandus erit.

Cum in partu naturali observaretur, simulac placenta ab uteri cohaesione solvitur, sequi satis largam haemorrhagiam, quae tamen per uteri, jam vacui, contractionem sistitur, hinc mirum non est, omnes in voto habuisse, ut in periculosa uteri haemorrhagia cavum uteri evacuari posset: si enim abortus, uti toties primis graviditatis mensibus fit, sequitur, brevi solet minui haemorrhagia, & tandem cessare, contracto nempe utero. *Hippocrates (e)* monuerat: *In fluore muliebri, si convulsio, aut animi defectio superveniat, malum.* Et alibi (f) pessima pariter praesagia habet, ac imprimis diras con-

h 2

vul-

(d) De corde Cap. II. pag. 70.

(e) Aphor. 56. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 229.

(f) De mulier. morb. Lib. II. Charter. Tom. VII. pag. 794. 795.

vulSIONES metuit: Magni pedum digiti contrahuntur, & ad suras femora semper contendit, lumborum ingentes dolores, & manuum ad motum impotentia. His ita contingentibus, tum a claviculis ad jugula, ad malas, & linguam tetani fieri consueverunt. Et ex his paullo post in posteriora a tendinibus juxta spinam ad lumbos; sicque per violentiam pereunt. Pessima talia cum ab uteri haemorrhagia metuenda forent, hinc optimi etiam in arte obstetricia magistri suaserunt, ut in tanto discrimine fieret uteri evacuatio; imo in hac sola unicam spem posuerunt salutis. *Mauriceau* (g), si valida adsit uteri haemorrhagia, festinato opus esse, dixit, & manu obstetricantis arreptum pedibus infantem educi, jussit; propriaeque sororis tristem casum refert, quae ultimo graviditatis mense periit, dum serius educeretur foetus, postquam jam omnem fere sanguinem perdiderat. Plures alios casus recenset gravidarum, quas una cum foetibus servaverat tempestiva educatione. In eadem sententia est *van Deventer* (h), jubens, statim educendum esse foetum, si a placentae separatione periculosa adsit uteri haemorrhagia, & quidem quocumque tempore, sive ante, sive post septimum mensem. Interim certum est, hoc non posse fieri, nisi dilatetur os uteri, quod quandoque difficulter, & nonnisi vi adhibita, fieri poterit: sequenti autem capitulo patebit, non sine periculo violentam oris uteri dilatationem perfici posse: solet enim sequi periculosa admodum uteri inflammatio. Fatetur *Mauriceau* (i), quod, si orificium uteri fuerit molle, tenue, & aequabile, tunc facilius evaderent, & contra, si idem durum, crassum, & inaequabile foret, perirent. Facile apparet ratio, quia nempe major vis debebat inferri uteri orificio, ut digitis Chirurghi dilatari posset, ad excludendum foetum.

Haec fuit ratio, quare alii statuerunt, non debere fieri educationem foetus, si illa fieri nequeat absque violenta dilatatione oris uteri (K); sed tunc tantum prodesse, dum os uteri apertum facile admittit digitos obstetricantis Chirurghi: refertur, & ibi infelix casus, ubi, educto foetu, non minuebatur haemorrhagia, sed augebatur, donec misera mulier, exhausto omni sanguine, expiraret. Postea adhuc alio in loco (l) idem inculcat, & certam mortem praedicat, si ad educendum foetum vis debeat inferri ori uteri. Quinimo magni in arte obstetricia nominis *Levret* (m) statuit, ne quidem tactu explorandam esse gravidam, si uteri haemorrhagia adsit, & nondum inceperint partus dolores, neque adsit terminus solitus graviditatis. Ubi autem ipso partus jam incepti tempore haemorrhagia uteri profusa se manifestat, tunc membranas aquam continentes cito rumpendas monet: aquis enim evacuatis uterus se contrahere in minus spatium poterit, & haemorrhagia minuetur.

Media hic via, & prudentissime quidem, incessit celeberrimus in arte obstetrici-

(g) De. malad. des femm. gross. Liv. I. chap. XXI. Tom. I. pag. 161. &c.

(h) Nov. Lum. obstetric. Cap. XXXIII. pag. 145.

(i) Livr. I. chap. 21.

pag. 170.

(K) Peu pratique des accouchem. Livr. II. chap. I. pag. 272.

& seq.

(l) Ibid. chap. XV. pag. 576.

(m) L'art des accouchem.

chap. VII. pag. 75.

tricia *Puzos* (n). Cum enim videret, periculosam esse adeo educationem foetus, quae violenta dilatatione oris uteri fit, licet saepe brevi temporis spatio absolvatur, & festinandum hic esse credant omnes, ut uterus vacuus se contrahere possit; cum simul observasset, haemorrhagiam uteri, si partus tempore contingeret, minui, si dolores parturientis augerentur, conclusit, hos dolores augendos esse, vel excitandos, si nondum adessent. Conducere, imo & quandoque omnino necessariam esse foetus exclusionem, ut sistatur haemorrhagia, agnoscit; sed simul judicat, hoc tentandum esse tali methodo, quae ad partum naturalem propius accedit.

In partu naturali, dum foetus ingreditur capite suo orificium uteri, in tantum uterus contrahitur, in quantum caput progreditur, & caput infantis, os uteri dilatatum replens, impedit liberum effluxum sanguinis, simulque uterus se contrahens apprimat valide totam suam superficiem internam contentis in cavo suo; unde vasa hiantia comprimuntur; dum vero, ruptis membranis, effluunt aquae, magis contrahitur uterus, adeoque vasa sua angustat, & propria vi, una cum puerperae conatibus, valide apprimatur superficies cava uteri foetui; unde & haemorrhagia minuetur.

Verum lento modo procedere solet partus naturalis, & posset perire per validam haemorrhagiam gravida, antequam caput infantis orificium uteri dilataret, sic, ut per conatus parturientis illud ingredi posset, & rumpebantur aquae. Haec fuit causa, quare subitam foetus exclusionem suaserunt multi.

At constitit observatis, posse accelerari partum naturalem, dum digitis leniter, & sensim diducitur os uteri, simili fere modo, ac in partu naturali per nixus parturientis dilatatur. In haemorrhagia uteri ejus orificium plus, minusve hiat, sanguine calido effluente madescit, thrombis cruoris quandoque transpressis magis patulum redditur; unde plerumque & lenes dolores adsunt, sed nimis inertes ob debilitatem ab haemorrhagia natam, & ideo augeri debent; quod fit, si unus, vel plures digiti immittantur uteri orificio; quibus gradatim, & leniter dilatatur, subinde & interposito quodam intervallo: tunc augentur dolores, membranae aquam continentes turgent, quae statim rumpendae, ut detur major facilitas contractioni uteri, jam parte contentorum liberati, minuitur haemorrhagia, & partus brevi sequitur, matre, & foetu plerumque salvis: dum ambo periissent lentore partus simpliciter naturalis, vel in summo fuissent periculo, si subita dilatatione oris uteri foetus eductus fuisset manu Chirurghi.

Hac methodo dilatatur digitis uteri orificium, sed leniter, & per interval-
la; excitantur dolores partus, vel augentur, si jam adsint; datur tempus,
& occasio, ut uterus se gradatim contrahat. Ubi vero subito, & majori vi
dilatatur os uteri, ut foetus eductio fiat, periculum sequentis inflammationis
imminet, & vix sperari potest, ut educto foetu uterus habeat adhuc vim se
subito contrahendi; cum, ob vires per praegressam haemorrhagiam multum

Tom. IV. pars II.

h 3

im-

(n) Académ. de chirurg. Tom. I. pag. 358. & seq.

imminutas, omnia flaccida collabantur; & haec videtur esse ratio, quare plures pereant post educationem foetus, pergente haemorrhagia, vel, si hoc discrimen superaverint, ob vim adhibitam inflammato utero, acutissima febre, diris symptomatibus stipata, corripuntur, & paucissimae evadunt.

Pulcherrimis observatis *Celeberrimus Puzos* utilitatem hujus methodi probat, quam merito praefert educationi foetus; quae tamen quandoque necessaria est, si caput infantis non respondeat uteri orificio, sed situs praeternaturalis sit. Verum notat simul, sensim tentatam oris uteri dilatationem facere, ut minori cum molestia per pedes educi possit infans, si necessitas id postulet.

Simul optime monet, haemorrhagias uteri, post sextum, vel septimum mensem si contingerint, fere semper redire, licet optima medela, & debitae cautelae adhibeantur. Credit enim, si placenta ab utero pro parte separata fuerit, haemorrhagiam cessare, non quod nova unio separatae placentae cum utero facta sit, sed quia thrombi sanguinis coagulati vasa patula obturant, qui levi de causa elabi possunt, unde haemorrhagiae recidiva metuitur. Tamen uteri Gravidam indagator (o) putat, se invenisse in propria uxore, quod placenta, pro parte soluta ab utero, denuo illi firmissime accreverit. Sanissima enim haec, quarto mense gravida, dum per gradus descenderet, cespitante pede perterrita, non lapsa, fuit; nec unquam ante a majoribus etiam terroribus minimum passa fuit incommodum: post aliquot dies nocte urinam emittit, & mox se ad somnum, componit. Mane invenit urinam admisto sanguine profunde tinctam, & in lecto maculam subflavescentem, pedalis fere magnitudinis, nonnihil glutinosam, atque in ambitu zona angusta sanguinea cinctam. Abortus metuebatur; sed idoneis remediis, & quiete factum fuit, ut reliquos graviditatis menses sana peregerit; & ipso, quem signaverat, die puellam peperit sanissimam, torosam, ad oculum ante genitis omnibus robustiorem. Verum placenta, cujus majori, minorive secessui ab utero illa sanguinis fluidi profusio verosimiliter imputari poterat, jam adeo arcte accreta erat, ut non nisi iterato obstetricantis manus conamine solvi potuerit: prodiit autem in uno latere multum lacerata: postea accurato examine apparuit membrana tenuis, subpellucida, omnino homogenea, placentam tegens, exceptis solummodo locis vulneratis, ad quorum limbos facile distinguendo termino definebat.

Ex quibus videtur constare, placentam pro parte separatam, posse denuo firmiter utero uniri, neque tunc adeo metuendum esse, ne uteri haemorrhagia redeat.

(r) Noortvvyk de utero gravido pag. 27. 28.

§. 1309. **N**Eque refert, quoniam gestationis tempore id acciderit, cum melius sit perire, vel aliter periturum foetum, salva matre, quam perire certo utrosque.

Haec erat olim sententia *Mauriceau* (p), in haemorrhagia uteri educendum esse foetum quantocyus, licet per tres tantum menses, imo & minori adhuc tempore gravida foret. Verum hoc graviditatis tempore os uteri magis connivet, saepe & altius locatur, ut non adeo commode tangi possit digito, & multo minus aperiri sic, ut foetus educi possit, qui etiam cum mole minor sit, difficilius prehendi, nec ob corpusculi mollitiem digitis firmiter teneri poterit. Fatetur tamen *Mauriceau* (q), si orificium uteri non satis apertum fuerit, melius committi totum opus naturae; sed hoc graviditatis tempore raro, si unquam, contingit, ut patulum sit ita os uteri, ut absque vi plures digiti introduci possent. Alia difficultas est, quod certus nemo esse possit de mole foetus circa tertium mensem: ingens diversitas in abortibus, quoad magnitudinem, animadvertitur, licet graviditatis menses tres tantum numerent gravidae, & circa hoc tempus frequentius contingant abortus. Nec mirum hoc apparebit, si consideretur, embryonem, qui vivere incepit tantum, esse jam mortalem. Verum non statim expellitur de corpore materno embryo, licet mortuus fuerit; unde poterit tertio mense, vel citius haemorrhagia uteri nasci, licet parvulus, mollis, & post mortem fere diffluens, embryo in utero contineatur, qui digitis obstetricantis prehendi non posset. Candide fatetur *Mauriceau* (r), se observasse in mulieribus, quae tertium graviditatis mensem numerabant, abortum apud magnitudinem tantum, quandoque maximi digiti longitudinem habuisse, & numerosis observatis hoc quotidie confirmatur. Verum quidem est, male computari potuisse graviditatis initium; sed illum calculi errorem adeo frequentem fuisse etiam in mulieribus, saepius graviditatem expertis, vix verosimile videtur.

Hinc in haemorrhagiis uteri, quae primis graviditatis mensibus contingunt, ob rationes dictas non videtur commendari posse foetus eductio. Omnes enim fatentur, rarius perire ex abortu mulieres hoc graviditatis tempore. Plures servatas vidi illis auxiliis, quae §. 1307. laudata fuerunt, quamvis, ob profusam haemorrhagiam convulsae, jamjam moriturae ab adstantibus crederentur.

Longe magis periculosam esse uteri haemorrhagiam sequentibus graviditatis mensibus, apud omnes in confesso est, cum uteri vasa magis magisque dilatentur: neque tamen tunc & matris, & foetus servandi certa desperatio. Foemina sana, quinque menses gravida, de scalis delabatur in pavementum lapideum; mox sequitur ingens haemorrhagia uteri, & quidem tanta, ut statim advolans, cum in vicinia habitarem, invenerim totum pavementum sanguine

h 4

(p) Liv. I. chap. XXI. pag. 171.
IV. pag. 80.

(q) Ibid. pag. 172.

(r) Ibid. chap.

guine inundatum. Mox in lectum reposita in animi deliquium labitur. Peritus in arte obstetricia Chirurgus vocatus nil tentare audebat, cum mox exspiraturam crederet. Diligenter usus fui laudata §. 1307. methodo, & cum adstantes adamussim exsequerentur omnia, quae suadebam, a tanto periculo evasit non tantum, sed & debito tempore peperit infantem sanum.

Similem haemorrhagiam in alia muliere, quae sexto graviditatis mense lectum ingredi volens, divaricatis cruribus in durum obstaculum impegerat, eodem cum successu, & eadem methodo curavi.

Neque etiam immaturos foetus certo perire debere, constat exemplo *Fortunii Liceti* (s), cujus mater gravida, succussibus in molesto itinere, & gravis tempestatis terrore, abortum passa fuit, credens, se non multum a septimo graviditatis mense abesse: recens natus non superabat palmae manus magnitudinem. Pater Medicus tamen non desperabat de conservando filio, & tenerum corpusculum fovit in furno tepido, simili fere artificio, ac Aegyptii ova tractare solent, ut absque incubatu gallinae pulli excludantur; nutricem instruxit, quomodo alere deberet tenellum, & sollicitudinis suae praemium hoc nactus fuit, ut non tantum adolesceret, sed multis operibus eruditus clarus octogesimum fere aetatis annum attingeret, dum moreretur.

Ex quibus omnibus concludere licet, non desperandum esse in gravissimis etiam casibus, neque semper adhibendam esse educationem foetus ad salvandam matrem, sed praefarendam esse methodum, quam *Celeberrimus Puzos* monstravit, quae minus periculosa est, & felicibus successibus commendata.

(s) Baillet jugem. des scavants Tom. V. part. I. pag. 239.





PARTUS DIFFICILIS.

§. 1310. **P**artus difficilis fit vitio Matris, Infantisve.

Proprie loquendo, nullus partus absolute facilis dici potest, postquam peccati poenam statuit *Hevae* Deus: *Multiplicabo aerumnas tuas, & conceptus tuos: in dolore paries filios* (1). Dolores ergo semper adsunt, graviores, & diuturniores quidem in his, leviores, & breviores in aliis; tamen naturalis partus sine dolore nunquam est. Contingere potest, ut, licet valida doloris adsit causa, tamen non sentiatur; sed tunc monuit *Hippocrates* (uti ad §. 1. dictum fuit; *Qui aliqua parte corporis dolentes ut plurimum dolorem non sentiunt, illis mens laborat* (2). Quandoque enim accidit, ut convulsae, vel apoplecticae jam, foetum enitantur parturientes mulieres, dum doloris sensu carent; sed non ideo partus tunc facilis dici poterit, cum pessima quaeque metuenda sint. Unde merito damnavit *Hippocrates* (3) partum citra dolorem, tanquam periculosum.

Dum haec considerantur, patet, non adeo facile esse adaequatam definitionem dare partus difficilis, cum naturaliter nunquam sine molestia, & dolore partus contingat. Difficile enim videtur limitem noscere, qui distinguat partum facilem ab alio, qui jam difficilis nomen meretur, licet inter difficiliore nonnumquam numerari possit. De his enim tantum per comparisonem judicari potest. Quaedam enim mulieres facilius, aliae difficilius pariunt: imo in eadem muliere partus quandoque facilior est praecedenti, quandoque difficilior, uti toties observatur. *Hippocrates* (4), postquam dixerat, mulierem facile parere, si foetus capite prodeat, difficile autem, si transversim, vel per pedes exitum molietur, subjungit sequentia: *Ex puerperis autem maxime laborant primiparae, quod dolores nondum expertae fuerint*, (διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν πόνων); & dolent quidem toto corpore, maxime autem lumbis, & coxendicibus, nam coxendices ipsis diducuntur. Quae vero magis partus expertae sunt, minus dolent primiparis. At quae multoties pepererunt, omnium minime dolent. Quamvis enim facilitatem, & difficultatem partus a vario situ foetus deduxerit, tamen difficultatem partus in primiparis agnovit absolute, absque respectu ad diversum foetus in utero situm.

Sole-

(1) Genes. Cap. III. vers. 16.

(2) Aphor. 6. Sect. 2. Charter. Tom. IX. pag. 47.

(3) Coac. Praenot. N. 538. Charter. Tom. VIII. pag. 884.

(4) De Natura Pueri Cap. XI. Charter. Tom. V. pag. 324.

Solebat a multis definiri partus difficilis, quod sit *exclusio foetus cum magna molestia, una cum periculo matris, & foetus, vel utriusque*. Verum pleraeque puerperae difficulter pariunt, quamvis non tantum discrimen matri, aut foetui immineat. *Mauriceau* (y) divisit puerperium in legitimum, five naturale, & illegitimum, five contra naturam. Quatuor autem conditiones posuit, ut legitimum, & naturale dici possit: ut nempe fiat debito graviditatis termino, prompte, & sine gravibus accidentibus; ut foetus prodeat vivus, & bono situ. Si una ex his conditionibus desit, tunc non esse vocandum puerperium legitimum, & naturale, dixit, sed contra naturam potius, & quidem eo magis, quo plures ex his conditionibus adsint. Certum tamen est, in primiparis raro partum prompte contingere, licet omnia se naturaliter habeant. Imo, licet vulgus credat, felix esse puerperium, quod cito absolvitur, & parientes nil magis desiderant, tamen rerum gnari aliter judicant (z). Raro quidem nocet infanti praeceps partus, sed saepius infaustus est matri, & quandoque funestus: periculum enim est, ne mox post partum pereat immani haemorrhagia: praeterea partes, per quas transire debet nascens infans, in lentiori partu sensim dilatantur, & cedunt; in praecipiti partu saepe dilacerantur; unde plurima mala metuenda sunt.

Interim praeter partum naturalem, & contra naturam alio in loco *Mauriceau* (a) memorat & partum laboriosum, in quo parturiens, ac infans, licet bono in situ fuerit, plus solito pati debent; difficilem autem partum ad laboriosum reduxit.

Cum *Mauriceau* (b) ad legitimum, & naturalem partum statuerit requiri, ut debito graviditatis termino fiat, & ille plerumque nono graviditatis mense finito statui soleat, novimus, quo tempore expectandus sit partus. Simul autem patet, non tam facile exactum calculum hic haberi posse, cum non omnes foeminae noverint praecise conceptionis tempus, & plures se tantum gravidas suspicentur, dum observant, menstruum fluorem cessare; imo & quibusdam jam gravidis quandoque aliquid sanguinis menstrui solito tempore prodeat: unde omnes, qui de puerperio scripserunt, fatentur, illum terminum varium saepe esse, dum non tantum nono, sed decimo mense graviditatis absoluto, imo adhuc serius, partum naturalem contigisse, asserunt. Sic legitur (c); *Foeminam bonis, atque honestis moribus, non ambigua pudicitia, in undecimo mense post mariti mortem peperisse; factumque esse negotium propter rationem temporis, quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam decemviri, in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo, scripssissent. Sed divum Hadrianum, causa cognita, decrevisse, in undecimo quoque mense partum edi posse. Idque ipsum ejus rei decretum nos legimus: in eo acretio Hadrianus id statuere se dicit, requisitis veterum Philosophorum, & Medicorum sententiis*. Plures casus recenset *La Motte* (d), ob candorem suum, & optimam fidem celebris, qui docent, terminum

gra-

(y) Livr. 2. chap. II. pag. 202.

(z) Levrier l'art des accouch. pag. 93.

(a) Ibid. chap. X. pag. 259.

(b) In loco modo citato.

(c) Aul. Gellii

noct. Attic. Lib. III. Cap. XVI. pag. 103.

(d) Traité des accouch. &c. Liv.

I. Cap. XXVIII. pag. 121. &c.

graviditatis quandoque & limites a *Divo Hadriano* statutos excedere. Putat autem, hoc imprimis tunc contingere, si debilior foetus ad debitam nutritionem, & incrementum indigeat diuturniori in utero materno mora. Mirabilior longe casus legitur (e) de muliere, quae sex septimanis nupta incepit solita graviditatis incommoda pati: menstrua tamen non cessabant: circa medium quinti mensis sensit infantis motum, & turgebant mammae; octavo mense ex papillis aliquot guttae lactis spissi, rubelli exhibant; noni mensis initio crura tumebant, & venae fiebant varicosae; undecimo mense aderant validi dorfi, & ventris dolores; vocata obstetrix nullam ad partum dispositionem inveniebat; sequenti die tres circiter librae aquae rubellae effluerunt; dolores illi manserunt per triduum, mensium parca copia prodiit, dolores cessabant, & optime se habebat, manente abdomine tumido; & mammae admodum turgebant.

Peritissimos Medicos, ac Chirurgos consulebat, & Celeberrimum etiam *Winstlov*, qui in vicinia rusticabatur: omnes affirmabant, illam gravidam esse.

Decimo octavo mirae illius graviditatis mense menstruus fluor, haecenus ruber, in album mutatus est, & solita semper periodo rediit; motum infantis se sentire, testabatur: peritissimus tamen Chirurgus, abdomen tangens, nullum infantis motum percepit, sed ventrem tensum tympani instar invenit. Per sedecim adhuc menses in eodem statu mansit, nisi quod crura detumuerint, venis tamen manentibus varicosis. Trigesimo quinto mense peperit infantem masculum, qui per triduum vixit: mater autem ex puerperio surrexit sana. Infans, & placenta solitam habebant molem. Eadem haec foemina paullo post puerperium denuo omnia graviditatis signa habuit; & credit, se motum infantis sentire in tumido enormiter abdomine, quod jam per quinque annos, & octo menses gestat, caeterum sana, & ad solitos apta labores.

Sed & quibusdam mulieribus familiare est, ante novem menses absolutos parere: vidit *La Motte* (f) juvenulam, quae septem a matrimonio mensibus filium pepererat, dubitante marito de conjugis castitate: a primo post absolutum puerperium congressu impraegnata, peperit denuo filium septimestrem: ambo tamen adoleverunt, & militiae nomen dederunt. Filiae ejusdem mulieris pariter septimo mense pepererunt. Unde videtur, in hac familia gentilitium fuisse morem, ut septimo mense partum excluderent. Similis & alter casus ibidem legitur.

Unde statuit *Mauriceau* (g), tunc partum sequi, quando uterus majorem extensionem non patitur; quod vel ab utero ipso pendere potest, uti praecedenti capitulo dictum fuit, vel etiam a velociori, aut tardiori incremento foetus, uterum replentis. Ob hanc rationem credit, mulieres, quae gemellos

(e) Académ. des scienc. l'an 1753. in 4. Hist. pag. 139. & seq.

(f) Traité des accouch. Liv. I. chap. 28. pag. 122.

(g) Liv. II. chap. 2. pag. 204. 205.

los in utero gerunt, citius parere, cum magis distendatur uterus, & frequentiori foetuum motu magis irritetur. Septimestres autem partus adeo parum vitales habuit, ut dicat, se nullos vidisse, qui plus quam per quindecim dies vixerint. Observata autem *La Motte*, ac aliorum contrarium docent; & memini, me aliquot vidisse adolescentes sanos, ac robustos, de quibus certus esse poteram, quod septimo mense nati fuerint. Verum tamen est, quod plerumque debiles sint, & minoris molis. Si foetus, palmam manus magnitudine aequans, educari potuerit, ut ad octogesimum annum vitam produxerit, multo magis id de septimestri partu sperari poterit. Neque soli *Liceto* (vide §. 1309.) haec fortuna contigit, ut potuerit educari praeter omnem spem; recentior enim observatio, & magis mira idem docet. Quinto graviditatis mense excludebatur foetus, vivus quidem, sed pusillus, & debilis admodum: non plorabat, & vix respirare videbatur, oculi clausi erant, membra flaccida, & pendula; leves quidam motus, & calor corpusculi testantur vitam soli: mollibus tectus linteis, blando fovebatur calore, guttatim dabatur pauculum lactis tepidi, quod deglutiit; mansit in eodem praecise statu per quatuor integros menses, levissimos tantum motus faciens; nullum edebat planctum, nullum excrementum deposuit. Post quatuor hos menses absolutos incepit plorare, excrementa deponere, corpus movere, ubera ducere, & crescere, simili modo, ac alii infantes, & tam feliciter quidem, ut circa decimum sextum a nativitate mensem coetaneos robore superaret (*h*). Jure mirabatur egregius auctor, quod praecox ille fructus vixerit vitam foetus toto illo tempore, quod deerat justae maturitati.

Videtur autem tota graviditatis historia docere, quod foetus magis magisque perficiatur in utero, & majus robur acquirat, adeoque non patet ratio, quare octimestris foetus debiliior, & minus vivax foret, quam septimestris, ut *Hippocrates* voluit, quem plurimi alii secuti sunt: verum quidem est, certa observata semper praevalere in Medicina, quantumcunque ratiocinium etiam videatur probare oppositam sententiam; sic *Peu* (*i*) testatur, plurimos infantes septimo mense prodire robustos, & vegetos, octavo autem mense ut plurimum debiles, & vix vitales: contrariam tamen sententiam ex multiplici observatione tuetur *Mauriceau* (*K*). Videri potest de his *Drelincurtius* (*l*), qui videtur satis bene probasse, quod octimestris foetus, si casu, vel morbo exeat, periculose habeat, si autem sponte prodeat, aequae possit vivere, ac septimestris.

Cum ergo ex ante dictis satis constet, terminum graviditatis satis incertum esse, non tantum in diversis, verum etiam in eadem muliere, dicendum erit de illis signis, quae partum brevi futurum designant, uti & de illis, quae actu parturire gravidam docent, & ex quibus indiciis, partum facilem, aut difficilem futurum, cognoscere possit Medicus.

Ali-

(*h*) Brouzet Essai sur l'éducation medic. &c. pag. 37. & seq. in notis.

(*i*) La Pratiq. des Accouchem. Liv. I. chap. 9. pag. 95.

(*K*) Loco modo citato.

(*l*) In Opuscul. pag. 120.

Aliquot ante partum diebus tumor ventris descendit, detumescendo superiori parte abdominis, dolor insolitus lumborum percipitur, urina frequentius, sed difficiliter, dimittitur, mucosus ex vagina humor fluit (m). Haec signa quidem iustam dant suspicionem, quod partus tempus appropinquet; verum non dant certam cognitionem. Illo enim tempore, dum vertitur infans, qui antea capite versus superiora locabatur, plura ex his signis observantur. Illa foetus versio solet frequenter octavo graviditatis mense contingere, quandoque citius, aut serius; & partum tunc jam instare, creditur. Saepius se hoc vidisse, testatur *Mauriceau* (n), & praecipue in Chirurgi uxore, quae octavo mense, dum vertebatur infans, credebatur certissime, se parituram, dum magnos sentiebat in abdomine dolores; unde omnia necessaria disponebat. Verum post integrum mensem adhuc gestavit infantem, & dein feliciter peperit: idem & in propria uxore, & in aliis pluribus observavi. Unde, dum similia signa observantur, non temere praedicendum est, certo partum instare.

Tunc autem scimus, parturire gravidam, si dolor in lumbis adsit, non continuus, sed per intervalla recurrens; qui dolor, per latera abdominis pergens, versus pubem terminatur, cum tenesmi deprimentis quasi sensu; hi veri dolores ab obstetricibus solent vocari; spurii vero, si solum abdomen doleat, vel in abdomine orti versus lumbos recurrant: partum enim non promovent spurii illi dolores; imo potius retardant, & si molesti admodum fuerint, opiatis tolli debent, tuncque sequuntur veri partus dolores; uti & in propria uxore, ac aliis plurimis, observavi. Pulsus tunc fit frequentior, & elevatur magis; respiratio difficilior videtur, dum ad singulos dolores puerperae nixum facientes inhibent animam. Omnia autem haec, instante jam partu, fiunt validiora, dum dolores validi se invicem proxime sequuntur. Dixerat *Hippocrates* (o); *Affero autem, mulierem, ubi pariet, crebrum spiritum omittere &c. Tum vero potissimum crebro respirat, ubi partui proxima est, tuncque maxime lumbis dolet; nam & lumbi a foetu percutiuntur.* Omnia haec signa collegit *Mauriceau* (p); qui simul addit, pudenda tunc tumescere, monetque, saepe tunc vomere parturientes; quod signum non esse malum, uti vulgo creditur, sed proxime instantis partus indicium, testatur; quod & frequenter vidi; & *Manningham* (q) confirmat, dicens: *Vomitur vero inter puerperae labores, si supra modum non sint, nunquam non utiles sunt.* Narrat *La Motte* (r), quod adstiterit parturienti, quae ad singulos partus dolores vomebat, & inde pessime agebatur, dum in praecedentibus puerperiis nunquam simile quid experta fuisset. Cum se accingeret, ut miserae hunc metum tolleretur, ultimus dolor aderat, qui sanum infantem expellebat. Multiplici edoctus experimento, vomitum quidem pro signo instantis jam par-

(m) *Mauric. traité des malad. des femm. gross. Tom. I. Liv. II. chap. 2. pag. 211. 212.*

(n) *Ibid. chap. V. pag. 235.*

(o) *De Morb. Mulier. Lib. I. Cap. 32. Character. Tom. VII. pag. 749.*

(p) *In loco modo citato pag. 212.*

(q) *Art. obstetric. compend. pag. 42.*

(r) *Traité des accouchem, chap. XXV. pag. 114.*

partus habuit, monuit tamen prudenter Chirurgos obstetricantes, ne facile, vel ex hoc, vel aliis signis, absolute felicem partum praesagiant, cum praeter omnem spem quandoque adversa contingant, absque cognita evidenti causa. Certe de vomitu, qui partus tempore contingit, *Manningham* (s) monuit sequentia: *Violentis doloribus subito deficientibus, si superveniat vomitus, metuendum est, ne laceretur uterus.*

Notavit & *Mauriceau* (t), instante jam partu, totum corpus tremere puerperis, praecipue tamen crura, & femora, sed absque frigore, & calente toto corpore: tremor autem ille non est mali ominis, sed potius naturalis. In sacris enim literis legitur (u), Deum *Moyse* dixisse: *Hodie incipiam mittere terrorem, atque formidinem tuam in populos, qui habitant sub omni coelo; ut audito nomine tuo, paveant, & in morem parturientium contremiscant, & dolore teneantur.* Solet tunc simul adesse, vel paullo post sequi, ut humores ex utero fluentes sanguine tingantur, quod merito habetur pro signo, brevi partum finiendum esse; neque leve illud sanguinis effluvium fit a laceratione oris uteri, sed potius a separatione chorii ab utero, dum aquae prominere incipiunt, uti in praecedenti Capitulo de gravidarum morbis dictum fuit (v). Summopere autem necessarium est, ut bene distinguatur, an veris partus doloribus laboret gravida, an non. Monuerat enim sollicite *Manningham* (x): *Infans, se subvertens, in supremo gestationis mense, motu insolito falsos saepe dolores ciēt, qui etiam nixus mature nimis afferunt.* Minus peritae enim obstetrices urgent quandoque gravidas, ut validis nixibus juvent dolores, qui oriuntur a versione infantis, nondum ad partum maturi; imprimis, si simul os uteri apertum jam tangant. *Mauriceau* (y) recenset talem casum: vocabatur ad gravidam, quae se parturire credebat; idem adfirmantibus binis, quae aderant, obstetricibus: tactu explorans, invenit os uteri hians ad pollicis latitudinem, tangebatur caput infantis tectum membranis, quae flaccidae adhaerebant capiti, nullo modo tensae, aut turgentes: licet per sex dies tormina ventris habuisset, spurios nempe dolores, & os uteri hiaret, tamen nullam adesse ad partum dispositionem, dixit *Mauriceau*, ac leni clysmate applicato, una cum tepore lecti, cessaverunt illi dolores, & per integrum mensem gravida haec potuit alacriter rebus suis domesticis vacare; tuncque felix infantis vivi partus sequebatur. Unde merito conclusit, omnia partus instantis signa esse incerta, nisi adsint dolores veri, qui ex lumbis incipientes versus pubem tendentes desinunt, cum tenesmi sensu; simulque aquae formari incipiant; id est, digito percipiantur membranae, aqua inter has, & caput infantis collecta turgidae, prominentes per apertum os uteri, illudque replentes. Solam enim oris uteri aperturam fallax dare instantis partus signum, tanquam axioma in arte obstetrica posuit *Manningham* (z), dicens: *Apertio oris*

(s) Art. obstetric. compend. pag. 15.

(t) In loco modo citato pag. 212. 213.

(u) Deuteron. Cap. 2. vers. 25.

(v) Mauric. traité des malad. des femmes

gross. Tom. I. pag. 213.

(x) Art. obstetric. comp. pag. 14.

(y) Loco modo citato pag. 214.

(z) Loco modo citato.

oris uteri mulieris gravidæ non semper parturitionis est signum certum; nonnunquam enim orificium adeo patefactum in quibusdam invenitur, ut digitum inferri sinat, mense ante partum.

Postquam jam per signa certa constitit, partum instare, optime monet modo laudatus auctor (a): In principio doloris quaerendus est foetus, & uteri situs; ut nempe praesagium haberi possit de facilitate, vel difficultate futuri, partus atque etiam mature adhiberi possint illa artis obstetriciae auxilia, quae malum infantis in utero, vel & ipsius orificii uteri situm mutare, & emendare poterunt. Plurimae enim perierunt puerperae, quae servari potuissent, si statim haec exploratio facta fuisset. De hac negligentia, vel imperitia obstetricum passim apud artis obstetriciae scriptores inveniuntur querelae.

Praecipua signa, ex quibus felicem partum augurari solent obstetricantes (b), sunt sequentia: Si uteri infima pars in pelvim illapsa fuerit, ita ut in limine vaginae facile tangi possit: Si os uteri tenue, molle, lateque patulum sit, & per aperturam oris uteri deprehendatur, infantem capite ad exclusionem praevio, sive prono ferri, neque brachio, neque funiculo umbilicali intercedente, si simul aquae in latitudinem se complacent, nonnisi facilis, celerque partus expectandus est.

Omnia haec signa sane bona sunt: sed tamen ex his nondum certi sumus de aliis obstaculis, quae latere possunt: circumvolutio funis umbilicalis circa collum, vel alia membra infantis potest partum difficilem reddere: ita etiam hydrocephalon, tumens nimis abdomen, monstrosa figura, &c. Unde omnia rite ad felicem partum disposita esse, ex his quidem concludi potest; sed tamen absoluta certitudo facilis, & felicitis partus haberi non potest; hinc semper aliqua cautela in hoc praesagio opus erit.

Partus difficilis autem praevидetur, si contraria praecedentibus signis observentur: Os uteri altius, parum, aut omnino non apertum, praecacutum, crassum, atque durum, aut humores in longitudinem coarctatos. Tunc enim membranae aquis distentae non efficient planum, vel subrotundum tumorem, sed farciminis instar elongabuntur: si autem ex his signis difficilis partus praevideatur, nunquam hoc parturienti indicandum, sed amicis, ac adstantibus tantum, & prudenter quidem.

Patet satis ex dictis, obstacula, quae partum difficilem reddunt, pendere vel a matre, vel a foetu, vel quandoque ab utrisque; & tunc solent difficillimi partus sequi. Haec autem jam seorsim considerata veniunt.

§. 1311. **V**itio Matris, deficientibus viribus ad expellendum, vel partibus ipsis naturalibus male se habentibus.

Cum homo, proportionem habita ad reliquas partes corporis, caput majus habeat, quam reliqua animalia, ideo & foemina humana difficilius parit, ac

va-

(a) Art. obstetric. compend. pag. 15.

(b) Deventer novum lumen obstetric. Cap. 18. pag. 62. 63.

validiori indiget nixu; ad quem requiruntur debitae vires. Solet quidem dici, quod sanus, & robustus foetus suis conaminibus matris parturientis nixus adjuvet, ut in dias luminis auras erumpat citius: si autem omnia rite considerentur, patet satis, parum, aut nihil foetum hic juvare posse: motu membrorum suorum, & dilatatione oris uteri per caput ingrediens facta, uterum irritat, & matris nixus excitat, per quos solos propellitur ex utero. Qui enim vel semel parturientem mulierem vidit, novit, quanto labore, quanta vi agat puerpera, dum foetus nascitur: animam retinet, omnes muscoli fere corporis rigent, pedibus fulcro sustentatis firmo, manibus adstantes, vel obvia quaeque firmissimeprehendit, muscoli abdominis, dorsi, colli rigent, facies rubicunda inflata turget, &, ut uno verbo dicatur, omnes vires totius corporis agunt, ut excludatur foetus, qui partus tempore pati, non vero agere videtur, &, si ageret, pauculum illud virium, quas tenellum corpusculum habet, nullo modo augere posset adeo validos parturientis matris conatus.

Novi, *Harvaeum* (c) statuisse, in viviparorum partu praecipuam nascendi causam foetui deberi. *Molimini, inquam, ejus, non autem ponderi, ut Fabricius voluit, &c.* Ipse foetus prono capite uteri claustra aggreditur, eademque propriis viribus recludit, & in lucem elucatur. Credebat autem, sententiam suam inde praecipue confirmari, quod in oviparis foetus ipse, non autem mater corticem ovi effringeret, idemque contingeret in infectis pluribus, & piscium ovis. Sed in Anatome comparata opus est magna cautela, ne facile credamus, in humano corpore semper eodem modo contingere illa, quae in aliis animalibus observantur. Oviparorum ova, a matre deposita, si foecunda fuerint, blando tantum tepore indigent, siue mater fovendo per incubatum hunc praebeat, siue alio quocumque modo ille producat; uti hodie nimis notum est. Praeterea pullus durum jam rostrum habet, solidas ungulas, validosque pro ratione molis motus exercere aptus est: simul ac enim ex ovi claustro prodiit, currit alacriter. Nascens homo fletu suo alienam, qua statim indiget, opem poscit, nec unquam uteri claustrum suis viribus aperire poterit. An obtusa capitis foetus figura, ejusque moles aptum dabit instrumentum, quo dilatari posset uteri orificium, quod jam dilatatum esse debet, antequam caput foetus illud ingredi possit? Nixus materni, validaque uteri contractio, dum urgent dilatari jam inceptum uteri orificium, membranas humore plenas deprimunt in locum nimis resistentem; sicque formantur aquae, os uteri sensim magis dilatantes, capite foetus nondum ingresso uteri orificium. Ruptis membranis, aquis effluentibus, in partu naturali caput foetus illabatur, non vero suis viribus exit foetus, sed validissimi tunc sequuntur parientis nixus, qui partum absolvunt; quibus minime opus fuisset, si proprio conamine in lucem prodire potuisset foetus.

Conatus fuit *Harvaeus* (d) stabilire sententiam suam observatis: testatur autem sequentia: *Mulier quaedam apud nos (compertum narro,) sub vespere mor-*

(c) De generatione animal. pag. 366, 367.

(d) Ibid. 368.

mortua, in conclavi sola relicta est: mane autem sequenti, inter femora ejus repertus est infans, qui proprio nisu exitum sibi comparaverat. De fide hujus observationis nullus dubito, cum & similia apud alios auctores legantur, & ipse talia contigisse probe noverim; sed minime videtur ex hac observatione concludi posse, quod proprio nisu exitum sibi fecerit infans. Notum est nimis, quam dubia sint mortis absolutae signa; neque mirum foret, si misera haec, pro mortua derelicta, revixerit denuo, & post novum pariendi conatum foetum excluferit, omnique destituta auxilio perierit.

Sed & ipse uterus, propria contractione sua, foetum, qui videtur partui proximus fuisse, exprimere potuit. Vidit *De Graaf* (e) in cuniculis dissectis uterum motu undoso, ac peristaltico quasi agitari, & propria sua vi foetus exprimere. Licet autem *Harvaeus* foetus viribus partum adscriberet, dissimulare non potuit tamen, excludi quandoque foetus morbosos, & languidos, & quandoque ante debitum tempus prodire in lucem; verum tunc dixit, *non tam partus fit, quam abortio, foetusque ejicitur potius, quam paritur* (f). Solito tamen suo candore fatetur, quod uterus etiam huic operi auxiliares manus ferat, & probat exemplo mulieris, cui uterus prolapsus ad genua usque pendebat, capitis humani magnitudinem excedens; atque in ima sui parte dehiscens, madorem, & saniem (tanquam locus ulcerosus foret) profudit. Deinde addit sequentia (g): *Ego re inspecta (tactu enim non explorabam) cancerum, aut carcinoma uteri jam affore metuebam, ideoque ligaturam, & abscissionem meditabar; & incerea consului, ut blandis fotibus dolorem leniret.* Nocte vero sequenti ex eodem tumore infans *Spithamae* longitudine, perfecte formatus, sed mortuus protruditur, & postridie ad me defertur. In hoc casu manifeste patet, nec matris nixus in pendulum extra vulvam uterum agere potuisse, ne foetum mortuum aliquid ad partum contribuisse; qui ergo soli uteri contractioni tribuendus est. Uterus ergo sua vi ad partum contribuit; & fatetur *Harvaeus* (h), quod non tantum in homine, sed etiam in aliis animalibus (utpote cane, ove, & jumentis) liceat observare, hunc connixum non esse uteri, aut ventris solius actionem, sed totius quoque corporis conatum. Agnovit ergo & maternos nixus, tanquam partus causam; attamen paullo post (i) difficillimum partum solis robusti infantis viribus tribuit. Mulier enim, quae, post difficilem, & laboriosum partum, integrum vaginae ambitum interiorem laceratum, atque excoriatum habuit, ut postea vaginae latera prorsus inter se concreverint, unde nec virili membro, nec specillo quidem ingressus patuit, neque menstruorum fluxui egressus, gravida tamen facta fuit, & instante partu, miseris dum torqueretur modis, omnem spem pariendi abjecit, maritoque, & amicis valedixit moritura. Cum ecce inopinato, robusti admodum foetus summo conamine totus ille tractus dirumpitur, fitque insperatus partus; & validus infans sibi, matrique suae salutis auctor existit, viamque apertam aliis post nascendis reliquit. Idoneis enim remediis adhibitis,

mater.

(e) De Mulier. Organ. pag. 325.

(f) Harv. de generat. animal. pag. 369.

(g) Ibid 370.

(h) Ibid. 366.

(i) Ibid. pag. 368.

mater pristinam valetudinem recuperavit. Quis mortalium credet, tantum obstaculum robustissimi etiam foetus viribus superari posse? An non potius summis miserae hujus puerperae nixibus debetur? Hinc discimus, quantum in candidissimis, ingeniosissimis, & ad observandum quasi natis, viris possit praeconcepta opinio.

Patet ex his, debilitatem virium merito inter causas difficilis partus recenseretur; unde optimo consilio, uti alia occasione ad §. 1291. dictum fuit, Spartanae virgines validis exercitiis firmabant corpus, ut, *strenue partus excipientes, bene, & facile adversus puerperii certarent labores.*

Sed & Spartana mater difficilem, imo quandoque omnino impossibilem experiretur partum, si partes ipsae naturales male se haberent, nec transitum nascituro homini permetterent, nisi difficillime.

§. 1312. **S**I vires deficiunt, hae excitandae sunt ope Uterinorum, Cardiacorum, Sternutatoriorum.

Summa hic opus habet prudentia Medicus, ne noceat imprudenti cardiacorum exhibitione. Rarius enim, quam creditur, puerperae debilitas partum reddit difficilem. Vidi toties, dum adstantes crederent, insignem adesse virium defectum, omnes miratos fuisse ingens robur, dum ultimis nixibus prodiret infans. Ipsa puerpera, & omnes adstantes in votis habent, partum accelerare. Verum antea monui in primiparis, quae omnium impatientissimae esse solent, celerem partum non esse tutissimum; praestare potius lentiores, ut sensim cedant partes, non autem simul, & semel violente distendantur. Semper debemus memores esse prudentis Galeni moniti (vide §. 6.); *Sive purgans dederis, sive vomitorium &c., prima exhibitio in tua potestate est, reliqua sibi fortuna vindicat.* Si enim tempore parturitionis cardiaca calida frequentius, aut majori copia dederis, ad vires nempe instaurandas, vel partum accelerandum, haec pergent agere, postquam peperit mulier. Sed omnes Medici agnoscunt, nihil magis prodesse post partum, quam quietem mentis, ac corporis, & pacatissimum humorum motum; qui accelerabitur post partum, dum pergent agere stimuli cardiacorum, quae parturitionis tempore exhibita fuerunt largiori copia. Quam prudenter Celeberrimus Boerhaave (k) hoc monuit, dum nobiles olei Cinnamomi vires enumerat: *At oleo Cinnamomi suppar videre nondum contigit, quotiescumque collapsae gravidarum, parturientium puerperarum, vires, absque inflammatione, absque ruptis, haecenusque hiulcis vasis.* Sed certe post partum, dum separatur placenta ab utero, hiulca sunt vasa, & copiosum sanguinem effundunt. Dum genuini partus dolores breviori se invicem intervallo sequuntur, pulsus fit plenior, celerior, facies tensa rubet, calor in toto augetur corpore. Judicet nunc Medicus, an in tali conditione corporis cardiaca calida stimulantia utilitatem habere possint? Quamvis enim in parturitionis initio talis status nondum adsit, tamen aderit brevi, etiam in puerperio quam maxime legitimo,

(k) Chemiae Tom. 2. pag. 129.

timo, & naturali. Solent in quibusdam locis circumferre obstetrices cistulas, spirituosos remediis plenas, quae parturientibus aliquando largiori dosi exhibent, & quidem tanto audacius, quo sunt minus peritae: unde saepe magna contigerunt infortunia. Si enim non a languore, sed a perverso situ foetus in utero, vel & uteri ipsius obliqua positura, difficilis partus fiat, tanto plus nocet obstetrix, quanto plus dolores urgeat, antequam mutato situ foetus, vel uteri leventur haec obstacula. Hinc, nisi certus sit Medicus de languore parturientis, nunquam exhibere debet cardiaca calida, & tunc adhuc tantum refracta dosi, repetitisque vicibus.

Urgent tamen haec obstetrices, parturientes, adstantes, & si neget, clam, inscio Medico, vel etiam invito, offeruntur talia. Saepius fui in tali casu, & malui semper praescribere illa, quae noveram innoxia fore, quam morose negare omne cardiacum remedium. Aquae stillatitiae ex floribus sambuci, tiliae, rosarum, ex cerasis nigris cum nucleis contusis, ex melissa, corticibus citri, arantiorum, & his similibus, grata fragrantia reficiunt, nec tamen calorem, & motum augent.

Nullibi magis dominantur mulierculae, quam puerperii tempore: insultant Medicis, tanquam rerum muliebrium ignaris: quaevis adstantium matronarum peculiare quoddam habet remedium, quod in principibus familiis per saecula jam usu probatum dicitur. Ratione agere cum his si quis vellet, oleum, & operam perderet, ac cum ratione insaniret. Magis profeci, dum facilem me monstrabam in adhibendis inanibus, imo saepe ridiculis, modo omni periculo, & superstitione carerent. Nunquam me opposui, si lapidem *Lyncis*, *Aquilae*, & alia similis farinae de collo parturientis suspendere, vel femori alligare vellent; imo, modo in reliquiis obtemperare vellent, vel ipsum *Helmontii* (l) remedium concederem, quod ex felle, & hepate anguillae siccatis, ac in pulverem tritis conficitur; si non ex vino, sed ex aqua, vel vino multa aqua diluto, sumeretur. *Pharmaco nimirum adhuc in stomacho existente, apertum fit os pubis, & valvae ossis sacri in lumbis, foetusque statim propulsus. Notavi scilicet, stomachum claves uteri gerere.* Nugatur deinde, dum vult, ideo anguillae hepar, serpentis nempe aquatici, maledicti, rigorem minuere, quia propter serpentis invidiam mulier in dolore parere debuit. Maluit certe prudentior in his *Mauriceau* (m) blando alloquio animum erigere parturientis, & jusculo, vel paucio vino cum pane tosto vires languentes erigere.

Praeterea notandum est, languere quandoque puerperas vel ob diuturnitatem parturitionis, vel etiam, quod frequentius longe contingit, ob metum doloris, & ancipitis eventus; unde quandoque, in tenerioribus imprimis, hysterica anxietas sequitur; ideo uterina, sive antihysterica remedia commendantur. Sufficiet in tali languore aliquot guttulas tincturae succini, vel caforei in aquis stillatis modo laudatis diluere, & cochleatim dare, donec levetur hoc malum.

Si

(l) In Capit. *Jus Duumviratus* pag. 247. N. 46.

(m) *Traité des malad. des Femm.* liv. 2. cap. 10. pag. 263.

Si autem magna, & subita debilitas oriatur, praecipue, si simul dolores cessent, magnum imminet periculum. *Viribus de repente deficientibus, lethalis extravasatio est metuenda* (n); dum sanguis vel undatim ex vulva profluit, vel in abdomen diffunditur, rupto utero; de qua re postea dicetur. Sponte autem patet, in tristissimo tali casu mortem accelerari per cardiaca calida, cum haemorrhagiam augeant.

Illud, quod sponte naturae contingit in morbis, si juvet, solet ars imitari: unde doctrina illa de nocentibus, & juvantibus magni momenti est in arte Medica: de qua re videantur illa, quae §. 602. septimo numero habentur.

Dixerat *Hippocrates* (o); *Mulier, uteri strangulatione vexatae, aut partus difficultate laboranti, sternutatio superveniens, bonum.* Notum est, inter sternutandum concuti totum corpus, omnes fere musculos subito, & convulsivo quasi motu agitari, conquassari omnia viscera: unde spes nascitur, dolores parturientis sic augeri posse, ut partus acceleretur.

Felix sternutationis in partu difficili effectus apud *Harvaeum* (p) legitur. Juvenula ob summum pariendi laborem in animi deliquium incidit, statimque adeo stupida, & comatosa facta est, ut nullis potuerit excitari remediis, licet varia tentata fuerint: cum autem nil deglutire posset, pennam, sternutatorio fortiori illitam, indidit naribus: licet autem adeo stupore obruta fuerit, ut neque inde sternutaret, nec excitaretur, tamen totius corporis convulsione quadam tentari coepit, quae, ab humeris incipiens, paulatim per totum corpus ad inferiora pertingebat. Quotiescumque autem adhibebatur ille stimulus, promovebatur partus; tandemque, inscia matre, & comatosa adhuc manente, natus est infans sanus, ac vegetus. Non notat tamen, an haec puerpera ad se redierit postea, & evaserit, an non.

Patet inde, irritatis per acre sternutatorium nervis, etiam non sequente sternutatione, auctos fuisse pariendi conatus, cum felici successu. Si autem facies vultuosa, rubra, oculi turgentes, calor magnus capitis adessent simul in tali parturiente, facile intelligitur, largam venae sectionem praemittendam esse, antequam validi illi sternutationis concussus tuto tentari possent. Secus enim vasorum in capite ruptura, & lethalis apoplexia metuenda foret. Unde etiam *Mauriceau* (q), dum laudat in convulsis parturientibus sternutatoria, venae sectionem suadet prius, nisi convulsio post profusam Haemorrhagiam secuta fuerit. Certe singultus, quem pro convulsione specie *Hippocrates* habuisse videtur, cum aeque a repletionem, ac inanitionem fiat, ut convulsio, solvitur sternutatione (r). Cui sententiae etiam accedit *Galenus* (s), dicens: *Signum itaque bonum est, quia indicat, naturam prius torpentem nunc exsuscitari, ac recreari, & propriarum motionum reminisci.*

(n) Manningham art. obstetric. compend. pag. 15.

(o) Sect. V. Aphor. 35. Charter. Tom. IX. pag. 215.

(p) De generat. animal. pag. 366.

(q) Livr. 2. chap. 28. pag. 335.

(r) Sect. VI. Aphor. 13. Charter. Tom. IX. pag. 255.

(s) In comment. ad Aphor. 35. Sect. V. Ibid. pag. 215.

§. 1313. **S**I uteri collum internum nimis angustum, durumve, limentis succurrendum quantum possibile, ut lubricum emollescat, vel foru.

Consideranda jam sunt impedimenta, quae in partibus naturalibus male se habentibus observata fuerunt, quibus partus difficilis merito tribui potest.

Foetus haeret in uteri cavo, ex quo per cervicem uteri, ejusque orificium exire debet, ut partus fiat. Cervix autem illa uteri solet & collum internum vocari, ut distinguatur a vagina, quae a quibusdam collum uteri dicitur, sed externum; forte minus proprie. Notum est pyriformem figuram utero plerumque tribui, cujus superior, & latior pars fundus, inferior autem, & angustior cervix dici solet. *Eustachius* (t) uteri integri, & dissecti figuras dedit; sed in non gravidis mulieribus talis est: apparet autem uteri cavum, triangulare quasi, superiori parte latius, convergere, & angustari, ubi incipit cervix, sive collum internum, quod descendendo iterum dilatatur ad os uteri usque. In utero autem gravido fundus sensim magis magisque distenditur, & assurgit; sed & postea uteri cervix incipit dilatari, ita quidem, ut circa tertium graviditatis mensem quarta pars supremae cervicis aequae distenta jam sit, ac uteri fundus. Quinto mense auctus magnitudine fundus occupat medium spatium, quod inter summitatem ossium pubis, & umbilicum interjacet; sed hoc tempore dimidia cervicis longitudo extensa est. Septimo mense fundus umbilicum tangit; octavo mense fundus mediam distantiam inter umbilicum, & scrobiculum cordis occupat; nono mense scrobiculum cordis attingit fere; & tunc tota cervix uteri distenta est (u); tunc autem cervix uteri disparet quasi, unum cavum faciens cum fundo, quod adultum jam foetum continet. Si consideretur exactissima figura uteri foeminae, in quintum mensem gravidae (v), patet, jam maximam partem cervicis, sive colli uterini interni deletam quasi esse distensione: notandum tamen est, illud, quod superest de cervice, brevius apparere, quam revera est, quia orificium uteri antrorsum incurvatum est, ut ejus interior superficies melius oculis pateret (x). Saltem inde patet, ultimo graviditatis tempore, instante jam partu, de cervice uteri vix quid superesse, cum tota jam dilatata, una cum fundo, magnum cavum faciat. Hinc tunc in summitate vaginae nil de cervice tangi potest explorantis digito; sed solum os uteri occurrit, miro pariter modo jam mutatum. In initio graviditatis enim illud tangitur exacte clausum, oblongum, prominens, fere instar rostri canis recens nati; sensim postea crassescit, & emollitur, ad sextum circiter mensem; post quem incipit minui in omni sua dimensione, in eadem proportionem, qua uterus magis distenditur, ita ut, partu appropinquante, totum complanetur, quasi confusum cum uteri tumentis globo: superest.

(t) Tabul. 13. & 14. (u) Brudenell Exton sect. 3. pag. 117. 118.

(v) Noortvvyk de utero gravido pag. 205. (x) Ibid. pag. 206.

pereſt tunc tantum parva circularis eminentia: in quibusdam tamen foeminis ultimis graviditatis menſibus uteri orificium craſſius eſt, mucoſis madefcens humoribus; ſed tunc laxum, & molle tangitur, non vero compactum, & firmum, uti in primis graviditatis menſibus fieri ſolet (y).

Cedere ergo poſſe debet non tantum uterus, ſed & ejus cervix, graviditatis tempore, ut crescenti foetui commodum praebeatur ſpatium; quod niſi fiat, abortus metuendus eſt, uti praecedenti Capitulo de gravidarum morbis dictum fuit.

Verum & uteri orificium pariter cedere debet, ac facile dilatari partus tempore; & licet in graviditatis initio clauſum inveniatur, videtur tamen poſtea demum aperiri. In utero mulieris, quinque menſes gravidae, orificium manifeſte hiabat, auctum valde, in ambitu rugoſum, glutine quodam tenaci, coloris ex rubro profunde fuſci, tanquam thrombo, infarctum: quod, utero dein per annum in convenienti ſpiritu ſervato, totum diſſolutum aperturam reliquit tranſverſo pollice longam, & profundam, latitudinis ubique fere aequalis, cui facile quovis loco calamus ſcriptorium immitteres (z).

Aderant autem in margine externo dicti orificii pori, admodum conſpici, ſimili glutine pleni, & globuli pellucidi, ad aliquam profunditatem cervicis ſubſtantiae immerſi, ſimili materia turgidi.

Adeſt ergo in his locis ſecretionis apparatus, ut & uteri hians orificium obturetur, & partes molles, ac lubricae ſerventur, ut facile dilatari, & cedere poſſint. Verum iidem illi folliculi, morboſi ſi fuerint, partum impedire poterunt. In muliere enim primipara, quae inter partus dolores, non excluſo foetu, exſpiraverat (vide §. 486.), inventum fuit matricis collum obturatum ſubſtantia glanduloſa, quae utero cohaerebat, & *parvis hinc inde foraminulis perforata erat*. Quandoque & obſervatum fuit, in mulieribus admodum foecundis has lacunas mucoſas abolitas fuiſſe tandem; unde ultimi partus fuerunt magis laborioſi.

Obſervatur autem, uti ante dictum fuit, aliquot diebus ante partum de vagina prodire humorem mucoſum, & genitalia perpetuo madefcere, ſicque omnia lubricari, ut facilior naſciture foetui praeparetur tranſitus. Hippocrates (a), ubi recenset commoda, & incommoda illorum, qui civitates ſeptentrioni expoſitas incolunt, dicit, neceſſe eſſe, ut robuſti, & ſicci ſint, capita habeant ſana, & dura, morbis acutis inflammatoriis obnoxii vivant, & tamen reliquis hominibus magis longaevi. Mulieribus autem praedixit, quod *multae ſteriles ſiant propter aquas, quae ſunt durae, crudae, & frigidae; purgationes enim menſtruae non contingunt idoneae, ſed paucae, & pravae. Deinde difficile pariunt, neque valde abortiunt &c.* Tabes etiam frequenter a partu contingunt, prae violentia enim ruptiones, & vulſuras habent. Durities autem, & ſiccitas partium facili partui obſiſtunt.

Con-

(y) Mauriceau traité des malad. &c. Tom. I. Liv. I. chap. VII. pag. 97.

(z) Noortvyk de Utero gravido pag. 7.

(a) De Aëre, locis, & aquis. Charter. Tom. VI. pag. 191.

Contra hoc vitium *Hippocrates* alio in loco (b) laudat sequentia: Si quae in partu est, sicca fuerit, ac aegre humectetur, oleum bibat, & locos oleo calido, & malvae aqua perfundat, & cerato liquido illinat, adipe etiam anserino cum oleo infuso. Similia adhibita fuerunt semper, ubi metus erat partus difficilis ob siccitatem, & minorem partium naturalium flexibilitatem. Merito suadet *Mauriceau* (c), haec emollientia non tantum adhibenda esse partus tempore, sed diu ante, ut debita mollities, & lubricitas possit obtineri. Imo etiam in partu legitimo, ac naturali monet obstetrices, ut inungant genitalia oleo emolliente, axungia, vel butyro recenti, si observaverint, illa difficilius dilatari (d). Hanc tamen cautelam addidit (e), ne partus tempore hae inunctiones nimis frequenter fiant, sicque abstergantur humores mucosi, qui tunc humectant, & lubricant has partes: optime enim notat, hos longe utiliores esse, quam alia quaevis linimenta. Dum in annosa muliere primipara partum difficilem metuerem, bis de die partes genitales balneo vaporis exponi curavi, & dein inungi recenti amygdalarum oleo, cum decocto radicum althaeae diu conquassato; sic enim emollientissimum, & lubricans linimentum obtinui, secutus nempe *Hippocratis* consilium. Duabus autem septimanis ante partum hanc methodum adhibui, & felici cum successu.

Haec sunt illa, quae tuto adhiberi possunt; vim enim inferre, ut dilatentur partes nimis angustae, & renitentes, periculosum est, & plerumque lethalis harum partium inflammatio cum acutissima febre sequi solet.

Accedit, quod quandoque praeter spem subito dilatentur partes, quae antea nimis angustae fuerant. Vidi saepe, obstetrices tangendo invenisse os uteri durum, clausum, licet aliqui partus dolores jam adessent; hinc abivisse ad alias, quas prompto auxilio credebant indigere. Vix horae spatium elapsum erat, quin orificium uteri, molle, apertum, facile cederet, sequente subito partu felici, antequam vocata denuo obstetrix adesse potuerit, ut opem ferret. Mirabatur *La Motte* (*), se non posse per pedes educere foetum sex mensium, dum nullo modo cederet durum uteri orificium: oleis, & aliis pinguibus usus fuerat frustra: abiit, ut pararet balneum vaporis ex herbis emollientibus, dum redit, invenit uteri os molle, & adeo facile cedens, ut foetum commodissime educere potuerit, tam felici successu, ut post sex dies per plateas incederet sana, & dissimulans illa, quae contigerant. Candide autem fatetur, quod oris uteri relaxationem balneo vaporis adscripisset, si post usum ejus secuta fuisset. Erat tamen solius naturae opus. Mirus legitur casus gravidæ (f), cujus vagina adeo erat arcta, ut vix calamus scriptorium admitteret: tamen, dum partus dolores ingruiebant, trihorii spatio adeo dilatata fuit vagina, ut robustum, & validum infantem pepererit. Unde merito concluditur, non facile desperandum esse, etiam in casibus diffi-

(b) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 33. Charter. Tom. VII. pag. 749.

(c) Traité des malad. des femm. gross. Liv. 2. chap. 10. pag. 262., liv. 1. chap. 27. pag. 198. (d) Ibid. chap. 4. pag. 239. (e) Ibid. chap. 7. pag. 245.

(*) Traité des Accouch. liv. 3. chap. 7. pag. 291.

(f) Académ. des scienc. in 4. l'an 1748. Hist. pag. 58.

difficillimis. Prudentius tamen actum fuisset, si graviditatis tempore de dilatatione vaginae cogitatum fuisset; de qua re ad §. 1315. adhuc dicendum erit. Natura enim saepe sibi soli sufficit, sed non semper, & tunc Arte opus est.

§. 1314. **S**I Tumor hic (1313.), vel in vagina enatus, expulsio-
nem impedit, is discutiendus, suppurandus, vel exi-
mendus ope Chirurgica.

Cum partus naturalis non nisi valido puerperae nixu fiat, etiam dum omnes viae, per quas nascens infans transire debet, liberae sunt, sponte patet, quemcumque tumorem, circa os uteri vel in vagina natum, foetus exclusionem impedire; adeoque cura in ablatione talis tumoris consistit. Varia autem obstacula haec inventa fuerunt, de quibus nunc agendum.

Uterus, uti notum est, inter vesicam, & intestinum rectum ponitur, adeoque quidquid tumere facit has partes, una cum utero in pelvi locatas, impedit facilem foetus exclusionem. Ad §. 1301., ubi ab incremento foetus nata incommoda recensentur, dictum fuit, difficultatem urinae, & alvi in gravidis saepius observari. Unde inter partus impedimenta recensentur faeces accumulatae in crassis intestinis, & imprimis in recto, uti & vesica distenta per urinam (g). Ideo circa finem graviditatis alvus, si moretur, molli clysmate ducenda est. Optime etiam, dum primi partus dolores incipiunt, clyisma applicatur, ut intestinum rectum penitus evacuetur: si enim tardius hoc tentetur, dum infantis caput magis jam descendit, tunc sic comprimitur intestinum rectum, ut nec clyisma facile admitti, nec faeces exire possint. Simul clysmata hunc usum habent, quod per nixum alvi evacuandae promoveantur dolores (h). Ob eandem rationem monentur parturientes, ut urinam excernere tentent: plerumque etiam, dum clyisma alvum ducit, urina simul exire solet. Quomodo autem succurri possit gravidae, dum urina cum difficultate excernitur, vel integre supprimitur, pariter ad §. 1301. dictum fuit; uti etiam de haemorrhoidibus, quae quandoque parturientibus multum molestiae faciunt, dum dolent turgidae, sicque ultimos pariendi nixus reddunt dolentissimos, imo quandoque impediunt, quominus parturientes totis viribus foetus exclusionem molliri possint ob doloris acerbiteriam.

Praecipue autem cavendum est, ne urina distendatur vesica: metus enim est, ne postea paralytica maneat vesica, & sequatur molesta incontinentia urinae: imo observatum fuit, plenissimam urinam vesicam validis parturientis nixibus ruptam fuisse; unde tristia, & vix medicabilia sequebantur mala. Post difficilem admodum partum mulieri effluebat urina, cum erecto corpore incederet, praeter voluntatem, non sine dolore acerrimo, ardore, & foetore. Instituto diligentissimo examine, patuit, vesicae partem inferiorem versus la-
tus

(g) Mauriceau Traité des malad. &c. liv. 2. chap. 10. pag. 260.

(h) Ibid. chap. 4. pag. 238.

rus ruptam, & rupturae labia callo quodam jam obducta esse. Cum autem portio urinae inter vesicam, & vaginam in tunica cellulosa colligeretur, mora acrior reddita erofit vicina; unde exulceratio sequebatur, & urina assidue purulenta excernebatur (i). Imo, si non rumpatur vesica, poterit, si inter partus nixus admodum plena fuerit, sic elongari in loco, ubi vicina minus resistunt, ut hernia vesicae sequatur; molestum satis malum, quod in gravidis aliquoties observatum fuit, dum ultimis graviditatis mensibus caput infantis fundum vesicae premit, quae tunc in utroque latere distenditur quasi in cornua, quae per annulos abdominales exeunt; quandoque & inter vaginam, ac intestinum rectum extensa vesica descendit, & in perinaeo tumorem herniosum facit, qui compressus, evacuata urina, evanescit, retenta urina, redit: plures tales casus leguntur (k). Facile patet, si hernia vesicae inter vaginam, & intestinum rectum protendatur, talem tumorem, vaginam comprimendo, angustare posse ejus cavum, quod & observatum fuit.

Vidit *Ruyfchius* (l) in parturiente muliere a conatibus vehementioribus natum tumorem durum, minoris pugni magnitudine, in latere dextro vulvae. Fatetur, quod fere deceptus fuisset, credens prima fronte, esse placentae uterinae portionem, quae quandoque exitum ante foetum quaerit. *Re autem penitus investigata, veram uteri lateralem portionem esse deprehendit: quod even- tus quoque edocuit. Foetu enim in lucem edito, statim ad naturalem rediit locum, patiensque convaleuit sine ulla ulteriori fomentatione, qua usi sumus in partu, ne pars uteri prolapsa gangraenam conciperet.* Facile autem concipitur, si orificium uteri non respondeat directe vaginae cavo (de qua re postea dicetur) tunc inferiorem, & lateralem uteri partem in talem tumorem extendi posse.

Huc etiam referri potest, tanquam partus impedimentum, vaginae prolapsus, qui simili fere modo fit, uti prolapsus intestini recti. Interior enim ejus tunica, laxior reddita, sensim quasi supra se ipsam invertitur, & extra vulvam prominet, sub forma quasi annuli turgidi, inaequaliter plicati, in cujus medio apertura est, qui facile digitum admittit (m); quo plerumque uteri orificium tangi potest, cum & illud tunc soleat profundius descendere.

Talis apparet vaginae prolapsus, si recens fuerit; multum mutatur, si diu duraverit malum, infarctis jam vasis, & miro quandoque modo degenerantibus. Unde aliquando a minus peritis, vel non satis attentis pro uteri prolapsu habitum fuit hoc malum. Si initio tractetur rite prolapsus vaginae, satis facile reducitur, & quiete in lecto, ac fomentis adstringentibus curatur (n). Si inveteraverit, saepe omnem omnino medelam respuit. Si ante partum vaginae prolapsus adsit, statim cura adhiberi debet, ne in partu, descendente foetus capite, magis magisque protrudatur interior vaginae tunica. Monet *van Deventer* (o), ut, si tale malum in parturiente jam adsit, ob-

(i) Stalp. van der vviel observat. 3^{re}. Cent. I. observ. 32. pag. 351.

(k) Académ. des scienc. l'an 1717. hist. pag. 19. Académ. de Chirurg. Tom. 2. p. 22. & seq.

(l) Observat. Anat. chir. observ. XLIV. pag. 23.

(m) Académ. de Chirurg. Tom. 3. pag. 390.

(n) La Motte Traité des accouch. liv. 5. chap. 21. pag. 657.

(o) Nov. Lum. obstetric. Cap. 30. pag. 134. 135.

obstetrix protinus omni studio prolapsam vaginam loco suo restituat, deinde maximopere curam gerat, ne os uteri nimis permittat delabi, sed illud supra in vagina retineat, & quoad fieri potest, manibus sustentatum servet, usque dum parturiens tam foetum, quam secundinam enixa fuerit. Deinde vaginam prolapsam restituere jubet, & idoneam adhibere medelam, ut curetur.

Interim cautela adhibenda est, ne alii tumores genitalium habeantur pro vaginae prolapsu (p). Post partus enim frequentes, aut laboriosos sic distrahitur vagina, ut postea, amisso robore, minus resistat tumentis a faecibus collectis intestino recto, vel vesicae urina plenae; & tunc saepe tumor in vagina apparet, qui extra vulvae labia prominet. Sic vidi mulierem, cui post duodecim felices partus, dum alvum deponere vellet, faeces delabebantur antrosum, distendentes laxam nimis vaginam, nec poterant ano exprimi: unde, simul ac duriores faeces excludendae erant, digito in vulvam immisso illas retrorsum pellere debebat, & retinere, donec anus aperiretur.

Patet hinc, quanta peritia, & prudentia opus sit, quam exacta cognitione partium indigeat, qui parturientibus foeminis utiliter opem feret.

Tandem & tumentia vulvae labia possunt partum magis laboriosum reddere, licet tales tumores non adeo periculosi habeantur a peritis, si frigidi, & leucophlegmatici fuerint; de qua re videantur illa, quae ad §. 1301. habentur.

Haecenus dictum fuit de partibus vicinis tumentibus, quae exitum foetus maturi possunt remorari. Verum & in uteri orificio, vel circa illud, uti etiam in vagina, possunt nasci omnis generis tumores, qui in reliquis corporis partibus observantur. Sponte patet, omnia haec obstacula tolli debere, si ullo modo fieri possit, antequam partus instet. Imo contingere potest, ipso parturitionis tempore diu pressas a foetu partes tumere, & ad inflammationem disponi; tuncque cura antiphlogistica opus est, & imprimis sanguinis missione, ut fiat vasorum depletio. Sic Hippocrates (q) suavit: quod si praegnans diuturno tempore immoretur, & parere nequeat, sed pluribus diebus partus doloribus discrucietur, sit autem juvenis, & aetate florens, multoque sanguine redundet, venas in malleolis secare oportet, & virium habito ratione sanguinem detrabere. Si vero alia quacumque de causa graviditatis tempore tumor inflammatorius has partes occupet, omni artis molimine tentanda est discussio; & si haec obtineri nequeat, promovenda est suppuratio, ut ante partum viae reddantur omnino liberae.

Observati fuerunt, & quidem satis frequenter, tumores in his partibus fulliculosi, vel & polyposi, similes satis narium polypis, & aliquando tam magnae molis, ut partum redderent impossibilem, nisi Chirurghi manu eximerentur.

Per multos annos in vagina gesserat tumorem puella, qui a quibusdam obstetricibus habebatur pro uteri prolapsu, & post longum tempus multum incre-

(p) Acad. de chirurg. Tom. 3. pag. 392. 393.

(q) De Mulier Morb. Lib. I. Cap. 77. Charter. Tom. VII. pag. 776.

increverat: contigit quadam die, dum domum rediret, quod sentiret, cum dolore, & impetu magno, prolabi ex pudendis tumorem, quem credens uterum esse, perterrita vocavit celeberrimum Chirurgiae Professore *Benevoli* (r), qui invenit pendentem extra pudenda tumorem, decem digitos transversos longum, cujus circumferentia eandem fere mensuram aequabat. Facile peritissimus ille vir videbat, non esse uteri prolapsum; aniceps tamen haerebat, quomodo tentaret curationem tanti mali: reducere conabatur in vaginam tumorem, nec poterat; unde conclusit, solam superesse exstirpationem, quam aegra magno animo petiit, ut tantis molestiis liberaretur. Collum, quo adhaerebat tumor vaginae, duos circiter pollices aequabat crassitie. Advocato in auxilium altero Chirurgo peritissimo, ligavit collum tumoris chorda forti, & crassiori, ut comprimere posset valide, absque scissurae periculo; simul ac vero chorda stringebatur, vidit membranas a chorda scindi; unde cessavit, attentus, an sequeretur haemorrhagia; quod cum non fieret, perrexit animose constringere, & totus tumor separabatur a cohaesione cum vagina, nec sequebatur valida haemorrhagia: postquam sufficiens quantitas sanguinis effluxerat, stuppis lineis implevit cavum, a quo separatus fuerat tumor, & solito apparatu firmavit. Tumor pendebat uncias viginti duas, mucosa constans substantia, quam tegebat tenuis membrana, sed satis fortis. Paucorum dierum spatio integre curata erat haec puella, applicato decocto hordei cum melle rosato, & in fine vino myrrhato. Monet autem, ejusmodi tumores decipere potuisse illos, qui statuunt, quibusdam mulieribus exstirpatum fuisse uterum, & tamen postea peperisse.

Similem tumorem minoris molis, in vaginae initio haerentem, ligatura collo tumoris circumducta, abstulit *Denys* (s), sed jam ulcerosum, in virgine viginti & duorum annorum: quarto autem post ligaturam die tumorem resecauit, cum putrescens jam pessimum spargeret foetorem. Perfecta pariter sanatio secuta fuit. Pari successu ligando abstulit tumorem durum, crassum, nullibi adhaerentem vaginae, sed a sinistra parte oris uteri pendulum.

At non tantum in vagina, sed & in utero ipso, constat, tales tumores nasci, qui prolongati per uteri orificium transeunt, & in vagina pendent. Saepe tales tumores pertinacis haemorrhagiae causae sunt, quae post ligaturam horum tumorum cessat. Aliquando per uteri orificium egressi, ab illo strangulantur, & cadunt. De his meretur legi Egregius *Leuret* (t), qui hanc rem perfecit, & artificiosa valde instrumenta excogitavit, ut collum talis tumoris stringi posset, dum altiori in loco haeret. Quam maxime merentur & legi illa, quae idem ille auctor alio in loco (u) de polypis uteri, & vaginae habet. Cum autem instrumenta, quae descripserat, ad ligandum polypum, operosa forent, & non nisi magna dexteritate poterant adhiberi,

(r) Dissertazioni &c. osserv. VI. pag. 101. & seq.

(s) Over het Ampt der Vroedmeesters &c. pag. 10. II.

(t) Observat. sur les polyp. pag. 99. & seq. & per totum.

(u) Mém. de l'Académ. de Chirurg. Tom. 3. pag. 518. & seq.

beri, simplicius descripsit aliud (v), quo, mediante filo argenteo, collum tumoris polyposi pro lubitu constringi poterit. Similem utcumque machinulam adhibuit *Denys* (x), ut pendulum ab orificio uteri tumorem ligaret; verum filo cerato usus fuit, loco fili argentei, quod tamen longe commodius est. Cum autem aegra post ligaturam applicatam discederet ex urbe, ipsi commisit, ut magis magisque torquendo ligaturam stringeret, donec caderet tumor; quod feliciter cessit.

Forte credi posset, tumores tales, precipue si in ipso utero radicati fuerint, conceptionem impedire. Verum satis numerosa exempla contrarium docuerunt: plures tales casus, & satis mirabiles quidem enumerantur (y), quibus evincitur, ne quidem debitum foetus incrementum semper per tales tumores impediri, multo minus conceptionem.

Videtur autem vestigium similium tumorum, qui ex pedunculo penduli in his partibus reperiuntur, apud *Hippocratem* (z) legi. Sic enim habet: *Si in pudendis gravis odor sit, & columella innascatur, dolorque detineat, dolorem quidem sedabit apii semen ex vino jejuna datum, gravem autem odorem anisum eodem modo exhibitum. At columellam praecidere oportet.* Major adhuc verisimilitudo accedit ex variante lectione, quae in *Manuscripto Vaticano* habetur (a); ibi enim loco *κίον*, *Columella*, legitur *κίσσος κισσίου*. Certe Castoreum officinarum & graveolentia sua, & figura similibus tumoribus non adeo inepte comparari potest.

§. 1315. **S**I excoriata harum partium labia coaluerint, cito, & ante partum, si fieri possit, dissecanda, & cicatrice obducenda sunt.

Ut partus succedat, debet foetus transire per os uteri, per totam vaginae longitudinem, per vaginae orificium externum, adeoque in tribus illis locis impedimentum haerere poterit.

Certum est, excoriata, & cruda harum partium latera, a quacumque demum causa hoc factum fuerit, concreescere inter se posse; nec impossibile est, ut idem in uteri orificio contingat. Clausa vagina, conceptum factum fuisse, fidei observationibus constitit; an autem concipere potuerit mulier, uteri ipsius orificio penitus concreto, & obturato, non constat. Verum quidem est, quod post impraegnationem factam concreescere possit os uteri; quod suspicari posset Medicus, si ulcera venerea, vel ab alia causa nata, has partes eroderent; at tactu ante partum hoc distinguere, non adeo facile videtur.

Ve-

(v) Mém. de l'Académ. de Chirurg. Tom. 3. pag. 578.

(x) Over het Ampt der Vroedmeesters &c. pag. 11.

(y) Académ. de Chirurg. Tom. 3. pag. 543. & seq.

(z) De Natura Muliebri Cap. 66, Charter. Tom. VII. pag. 715.

(a) Ibid. pag. 900, N. 197.

Verum quidem est, in gravidis naturaliter os uteri, quod prius acuminatum, crassum, & solidum fuerat, post bimestre, vel trimestre spatium sensim complanari, attenuari, & mollescere, ita ut duobus, tribusve ante partum mensibus os uteri jam dehiscat (b). Verum prudenter monet idem auctor sequenti pagina, *quod haec omnia sensu moderato sint intelligenda, utpote exceptionem facile admittentia*. In primiparis enim, robustis, & aetate proVectis os uteri quandoque ad extremum usque occlusum manet, nec aperitur, nisi propellentibus doloribus. Idem & contingere observavit in pravo situ infantis.

Praeterea observatur (c), gravidas quandoque spurios, obstetricibus dictos, pati dolores, qui per abdomen vagantur, non autem, ut veri, ex lumbis orti per latera abdominis tendunt versus os pubis: dum spurii dolores adsunt, os uteri contrahitur, adeoque imprudens quis credere posset, adesse orificii concretionem; praecipue, cum spurii illi dolores antecedant saepius genuinos, una & quandoque illos comitentur. Videtur & Moschion (d) probe hos dolores a veris distinxisse; nam, postquam partus instantis signa optime descripserat, dicit; *& quod fervoris dolor cum clausura, & siccitate in orificio invenitur*. Cum e contra per veros dolores orificium uteri dilatetur, & madescat magis.

Ex quibus patet, magna peritia, & prudentia opus esse, ut quis determinet, an revera os uteri concretum fuerit, cum hoc raro contingat, & forte tantum post impraegnationem. Inflammatio, suppuratio, mala venerea inter causas talis mali possent numerari. Sed & Hippocrates (e) notavit, fervida ulcuscula (aphthas) obsidere quandoque mulierum pudenda; de quibus videantur illa, quae ad §. 978. dicta fuerunt.

Alia occasione ad §. 486. mentionem feci casus, ubi orificium uteri concretum erat, in muliere nempe quadragenaria, primipara, cui, ob parvam nimis distantiam inter os sacrum, & ossa pubis, post quatuor dierum labores infans mortuus magna cum difficultate eductus fuerat: convaluit quidem ex molestissimo hoc puerperio, ac post tres menses denuo gravida, debito termino parturire incepit, & licet per biduum saevos dolores passa fuisset, non cedebat ullo modo orificium uteri. Dum tangebatur ab obstetricante Chirurgo, invenit, concrevisse os uteri absque ullo aperturae vestigio. In primo partu adeo difficili magna vis orificio uteri illata fuit, & suppuratio secuta satis larga, & diuturna, quam tamen ab exterioribus partibus, utcumque laceratis, deducebant adstantes. Admodum verosimile videtur, & interiora suppurasse, & post suppurationem concrevisse uteri orificium, sic, ut impraegnationi quidem via superesset, non vero excludendo foetui. Dilatata per extemporanea instrumenta vagina, cum aptiora deessent, cicatrix concreti oris uteri apparuit, & opus fuit scalpellum adigere ad medii pollicis profunditatem, ut concretum os uteri dividi posset: immisso digito tan-

(b) Deventer nov. lum. obstetric. Cap. 16. pag. 55. (c) Ibid. Cap. 17. pag. 60.

(d) Spach. gynaecc. pag. 4. N. 45. (e) De Natur. Mulieb. Cap. LXI. Charter. Tom. VII. pag. 714.

tangebatur caput foetus, sed omnis ambitus cartilagineam duritiem habebat, nec cedebat ullis miserae parturientis nixibus: unde omnis ille ambitus variis incisionibus divisus fuit, & sic incepit parum dilatari, nec satis tamen: tunc necesse fuit obstetricantis manu foetum educere, uti in primo puerperio factum.

Dum tot incisuris dividebatur cartilagineum uteri orificium, ne minimum quidem sanguinis exhibat; nec dolorem percepit aegra, querens solum de molesta vaginae dilatatione.

Simul ac, absoluto partu, in lectum deposita fuit, corripiebatur dolore pleuritico, valida admodum febre, & difficili respiratione; quibus ferendis, post tot calamitates toleratas, impar, post viginti quatuor horas periit (f).

Mirus ille casus docet, post inflammationem, & suppurationem concrevisse os uteri dura cartilaginea cicatrice; sed tamen hoc vitium tantum apparuisse manifeste partus tempore. Si autem justa foret talis mali suspicio, an non metuendus foret tunc abortus, & periculosa uteri Haemorrhagia, dum vagina vi dilatari debet, concretum os uteri sectione aperiri, & impediri deinceps, ne scalpello divisae partes inter se denuo concrecant? Antea ad §. 1306. dictum fuit, a levioribus etiam causis abortum metuendum esse.

Videri possunt & illa, quae de oris uteri obturatione per membranam, aliasque causas dicta ad §. 1290. fuerunt, ubi menstruorum fluxum impediebant; verum ibi simul notabatur, quod steriles fuerint tales.

Facilius cognoscitur, & curatur concretio vaginae, & orificii pudendorum; de qua re pariter ad 1290. actum fuit; ubi simul habetur mirus ille casus foeminae, quae, decimo sexto aetatis anno nupta, vaginam adeo arctam habebat, ut vix calami admitteret: haec tamen post undecim matrimonii annos gravida facta fuit, & quinto graviditatis mense incepit dilatari sponte sic vagina, ut feliciter pepererit. Dictum etiam tunc fuit de variis modis, quibus hoc vitium tolli possit. Si membrana claudens vaginam discindi debeat, vel partes concreatae separari, sponte patet, hoc debere tentari ante partum, ita ut sanatio jam perfecta fuerit, antequam parturire incipiat mulier. Si enim serius hoc fiat, non caret molestiis, uti docet sequens observatio.

Dum primipara parturire inciperet, obstetrix explorando invenit vaginam in media sua longitudine valide adstrictam, & angustatam: vocatus Chirurgus invenit, obstetricem vera dixisse, sed apice digiti tetigit parvulum foramen; quod postea advocatus etiam in molesto hoc casu *Benevolus* (g) digito dilatavit; unde commode introduci potuit speculum matricis, ut major fieret dilatatio. Potuit tunc caput foetus tangi; sed aderat adhuc tenuis membrana, cui uncum infixit, sicque a capite infantis removit, trahendo, dum alter illam forcice rescinderet: cum autem nondum videretur sufficiens esse apertura, quae caput foetus transmittere posset, manu immissa dila-

(f) Medic. Essays and observat. Tom. III. N. XIX. pag. 315. & seq.

(g) Dissertaz. &c. observ. V. pag. 96.

dilatavit, & laceravit hanc membranam ita, ut caput foetus omnino detectum foret: post trihorium peperit vivam puellam. Bene se habuit puerpera usque ad quintum a partu diem; tunc, cum magno rigore, febris secuta fuit, abdomen intumuit, cum vomitu, sudore copioso, & acerbissimo vaginae dolore, cum eruptione copiosa materiae purulentae, mucosae, & sanguine tinctae; omnibus artis auxiliis post plures septimanas obtinebatur mali imminutio; sex tamen mensium spatium opus fuit, ut ulcerosa vagina cicatrice obduceretur. Felix nihilominus, & absoluta curatio fuit, cum postea aliquoties feliciter pepererit. Cum autem postea peteretur a matre puerperae, an unquam tumore, vel alio quodam circa partes genitales morbo laborasset, constanter negavit: tandem recordata fuit, filiam in prima juventute, dum una cum coetaneis equitaret in arundine longa, cecidisse, & pudenda nodo baculi, cui inequitabat, fortiter imegisse, ita ut Chirurgus ultra mensem illius curam gerere debuerit. Unde probabile satis videtur, ab hac causa originem mali deducendam esse. Certe, si id fuisset cognitum, ante partum hoc obstaculum tutius removeri potuisset: partus enim proxime sequens laceram vaginam sic offendit, ut postea inflammatio, & sequens suppuratio, non potuerint evitari.

Post partum, laboriosum valde, vagina saepius inflammatur, & suppuratur, imo aliquando gangraenescit: si sanatio succedat, nisi cautela adhibeatur, vaginae latera concreescere possunt, vel & a duris, ac contractis cicatricibus sic angustari, ut difficillime dilatari possit in sequenti partu. Plures tales casus in Historia Medica habentur (b).

§. 1316. **S**I ossium compages arctior iter impediverit, linimentis emollientibus (1313.), fomentis similibus lenienda sunt, tum manu lege artis succurrendum parturienti est.

Ab hac causa omnium difficillimi partus contingunt, & cum vix emendabilis sit, merito a nulla re plus metuunt obstetricantes, quam a mala conformatione ossium, quae cavum pelvis constituunt.

Ossa pelvis, licet in recens natis ex quindecim ossibus distinctis componantur, postea adultiori aetate inter se sic uniuntur, ut in nubili virgine pelvis tantum constet quatuor ossibus, nempe osse sacro, osse coccygis, & binis ossibus innominatis: ultima haec ab Anatomicis solent singula in tres partes distingui, quae diversis insigniuntur nominibus. Anterior enim pars ossis innominati vocatur os pubis, superior, & simul posterior pars os ilium dicitur, inferior, & simul lateralis pars os ischion nominatur.

Haec ossa simul unita pelvis cavum constituunt, & ab illa parte, quae cavum pelvis spectat, laevia sunt. Pelvis cavum posterius os sacrum constituit, quod superius latius, sensim fit angustius, & infimae ejus, ac angustissimae parti nequitur os coccygis: ossa ilii superiorem, & lateralem, ossa ischii lateralem

(b) *Peu pratique des Accouch.* pag. 245. & seq.

lem, & inferiorem, ossa pubis anteriorem pelvis partem faciunt. Ergo sub pelvis nomine intelligitur illud spatium, quod ab his quatuor ossibus, inter se unitis, circumscribitur.

Simul etiam solet considerari introitus in cavum pelvis, & egressus ex cavo pelvis. Introitum formant posterius ultimae lumborum vertebrae antrorsum hic protuberantes, una cum suprema parte ossis sacri; a latere utrimque formatur a medio margine utriusque ossis ilii; anterieus a suprema parte ossium pubis. Exitus autem pelvis posterius formatur osse coccygis, a latere margine inferiori utriusque ossis ischii, anterieus curvatura inferiori ossium pubis.

A perfecta structura pelvis partus felicitas ut plurimum dependet: si enim nimis angusta via sit, sponte patet, foetus non nisi difficillime transprimi posse; imo quandoque hoc omnino impossibile esse. Verum, quod prima fronte mirum videbitur, & nimia latitudo pelvis nocere poterit, nisi sedulam curam obstetricans adhibuerit. Ut enim felix partus fiat, debet per uteri orificium, sensim dilatatum, foetus nixibus maternis exprimi, & uterus tamen sic sustineri, ut non simul prolabi possit. Si enim ingressus pelvis nimis amplius fuerit, uterus una cum foetu descendet, uteri orificio vix adhuc aperto, cum non urgeatur a partus doloribus satis, nisi uterus ob debitam angustiam pelvis sustineatur. Multiplici experientia edoctus *Deventer* (i), talia contingere, monet obstetrices; ut ad parturientes vocatae inquirant pelvis amplitudinem, nec confidant, licet *omnia plenissimis quasi velis ferantur*: metuendus enim est uteri prolapsus. Cavetur hoc malum, si uterum una cum foetu descendantem manu retineat, ne ex pudendis promineat. Sic prudenti arte utero praebet sustentaculum, quod nimia pelvis amplitudo negabat. Vidit similes casus *Ruychius* (k), & notat sequentia: *Mirum dictum, quanta monstrositate sese offerat eo tempore dictum uteri os, & quanta circumspeditione opus sit in tali partu, norunt ii, qui hisce nobiscum adfuerant casibus. In hoc statu foetus adhuc viventis exitum naturae committendum existimo, & os uteri utraque manu retinendum.* Neque hoc tantum, sed & uteri inversionem inde metuebat.

Notavit autem *Leuret* (l), dum introitus pelvis amplior est, plerumque ejus exitum esse angustiores; & contra, si introitus pelvis sit angustior, exitum esse latiore. In priori casu, in partus initio omnia cito procedunt, sed circa finem retardatur partus; tunc autem minor metus est, ne uterus prolabatur, & parturienti auxilium praestare potest obstetrix, blande reprimendo os coccygis, quod, antrorsum incurvatum, sustinet caput infantis, ac antrorsum versus inferiorem curvaturam, sive emarginationem ossium pubis dirigit, ubi majus pro exitu foetus spatium reperitur. Notum autem est, os coccygis cedere posse, ubi naturaliter se habet, uti monet *Leuret* (m), ubi alia pulcherrima de pelvis ossi structura habentur. Si vero introitus pelvis angustior fuerit, plerumque exitus latior est, & tunc initium partus len-

(i) Nov. Tum. obstetric. Cap. 27. pag. 114.

(k) Observat. Anatom. Chirurg. pag. 254.

(l) L'art des Accouchem. pag. 7.

(m) Ibid. pag. 6.

lentissime procedit; verum ubi has angustias superavit foetus, praeceps saepe egreditur, ob patulum magis exitum. Contingit etiam, ut pelvis non tantum in introitu, & exitu, verum etiam in toto suo tractu, nimis ampla sit; & tunc totus uterus, una cum contento foetu maturo, delabi extra pudenda posset, nisi perita manu caveretur (n).

Apparet ergo, quod nimia pelvis amplitudo culpari quidem possit merito, sed tamen praesto est in arte obstetricia auxilium. Verum longe major difficultas est, si pelvis nimis angusta fuerit; unde quandoque absoluta partus impossibilitas sequitur. Verum quidem est, nimiam foetus molem posse partum reddere difficilem, imo & impossibilem; sed hoc loco agitur de partu difficili ob vitium matris.

Signum autem pelvis adeo angustae, ut per ejus cavum foetus maturus nullo modo transire possit, ponitur (o), si non admittere possit manum obstetricantis Chirurghi, qualiscunque demum illa fuerit. Notum est, magnam satis diversitatem inveniri in diversis hominibus quoad manuum molem, & torositatem: omnium aptissimi ad artem obstetriciam laudantur illi, qui, una cum valido musculorum robore, manus angustas, & digitos longos habent: si ergo talis Chirurghi manum admittere nequeat pelvis, partus foetus maturi impossibilis habetur; & sola Sectio Caesarea superest; de qua postea dicetur.

Ossa pelvis omnes morbos pati possunt, quibus reliqua corporis ossa obnoxia sunt; adeoque & exostoses hic natae pelvis cavum angustare poterunt (p). Imo observatum fuit, femoris caput, ex acetabulo suo in foramen ovale motum, parum ante reductionem reddidisse impossibilem. Constat, ultimas lumborum vertebrae, nimis introrsum prominentes, licet ipsa pelvis bene conformata fuerit, partum omnino impedivisse.

Cum autem *Rachitis* plurima corporis ossa adeo mutet, & deformat, hinc omnes, qui de arte obstetricia scripserunt, metuendum esse difficilem partum testantur in illis, quae hunc morbum in prima aetate passae fuerint. Toties enim inde gibbositas, spinae distortio, claudicatio &c. per reliquam vitam manent. Optime haec mala descripsit Egregius autor (q), & notavit, non semper pelvim male conformatam esse, licet spina dorsi distorta inveniat. Si enim, non a rachitide in prima aetate, sed serius, duodecimo, vel decimo quarto anno, spinae distortio ab alia quacunque causa contigerit, tunc pelvis jam formata est, & potest debitam obtinuisse formam, licet reliquum corpus ob spinae distortionem deforme fuerit. Hi forte sunt illi casus, ubi mirantur obstetricantes, deformes foeminas non parere difficilius aliis, quibus optima corporis structura contigit. Notandum tamen est, licet bona fuerit pelvis, si spinae distortio pectoris cavum angustaverit, gibbosas foeminas difficilius parere, quia ob difficiliorem respirationem non possunt adeo validos exercere inter parturiendum nixus.

Cum

(n) L'art des accouch. pag. 7. 8.

(o) Ibid. pag. 9.

(p) Crantz de utero rupto

pag. 28.

(q) Brudenell, Exon. of midwifery sect. IV. pag. 82.

Tom. IV. Pars II.

Cum autem in Rachiticis infantibus ossa sint mollia, & flexibilia, neque incedere possint, ut sani infantes solent, sedili perpetuo affixi manent, vel nutricis gremio insident: unde coccyx antrorsum versus cavum pelvis premitur, extremitas inferior ossis sacri extrorsum vergit, suprema ejusdem ossis pars, una cum ultima lumborum vertebra, antrorsum prominet, & ad summitatem ossis pubis accedit, ita, ut quandoque in mulieribus inventa fuerit distantia inter os sacrum, & supremum marginem ossium pubis non superare trium pollicum mensuram, in aliis duorum, in quibusdam, sed raro, unius cum dimidio pollicis.

In aliis ob eundem morbum ultima lumborum vertebra, una cum ossis sacri suprema parte, introrsum vergit, sed ad latus; ossa pubis, quae exterius convexam, interius cavam superficiem habere debent, complanantur, imo quandoque & interiora versus convexa sunt: sed & pars inferior utriusque ossis ischii versus pelvis cavum vergit, & distantia inter horum ossium extrema, quae tres pollices cum quarta parte aequare solet, minuitur. Omnium tamen frequentissimum vitium ab hac causa natum est protuberantia ultimae lumborum vertebrae, & summitatis ossis sacri, quae facit, ut in deformi pelvi caput foetus toties haereat immobile in pelvis ingressu. Metum autem difficilis partus in illis, quae olim rachitide laboraverunt, auget, quia, licet sanatae venustam, & proceram corporis staturam acquirant, tamen fere semper circa pelvim aliqua deformitas manet. Inde patet ratio, quare in tali casu versati in arte obstetricia semper metuant difficilem partum.

Si ergo ossium compages arctior foetus exitum impediat, merito quaeritur, quidnam auxilii in arte superfit. Mollissima quaevis commendantur linimenta, fomenta, vapores &c. profunt haec quidem, praecipue si molles partes simul siccae, & nimis rigidae fuerint, uti ad §. 1313. dictum fuit; sed non multum spei est, ut brevi molliri possint hac methodo ossa, faciliusque cedant: interim tuto haec tentari poterunt.

Cum autem ossa, quae pelvis cavum constituunt, olim per interpositas cartilagineas cohaeserint inter se, quae incipiunt ossescere circa pubertatis tempus, hinc disputaverunt artis obstetriciae periti, an partus tempore haec ossa a se mutuo secedere possint, ut cavum pelvis augeatur. Satis crassam synchondrosin, quae ossa pubis necit, notavit *Eustachius* (r). Eadem haec commissura ossium pubis tegitur exterius magna copia fibrarum ligamentosarum, & aponeuroticarum, quae validae sunt: pariter & nexus ossis sacri cum ossibus illi ubique diversis planis fibrarum aponeuroticarum tegunt, quae & densae admodum sunt, & valde elasticae (s). Hinc videtur talis hic adesse apparatus, qui cedere utcunque possit, sed & vi elastica se statim restituere, simul ac vis distrahens cessat.

Os coccygis cedere posse, omnes concedunt, & nisi retrorsum vergere possit, dum caput infantis in exitu pelvis haeret, partum difficiliorem fore, constat. Verum ossa pubis disjungi posse, negat *Mauriceau* (t); quia in ma-

(r) Tabul. XXXIII.

(s) Levret l'art des accouch. pag. 3.

(t) Livr. 2. chap. I. pag. 210.

magno Nosocomio Parisino (*l'hôtel Dieu*) statim post partum pedibus incedere viderat mulieres ad lectum suum saepe satis dissitum; quod fieri non posset, si ossa pubis a se mutuo, vel ossa ilii a sacro disjuncta fuissent. Addit etiam, quod in pluribus puerperarum cadaveribus dissectis nunquam talem ossium separationem viderit. Verosimile videtur, quod in partu naturali, nec adeo difficili, licet utcumque cedere possit nexus ossium pelvis, tamen non fiat absoluta horum ossium separatio. Non videtur autem ullo modo negari posse, in difficili partu ossium pelvis a se mutuo sejunctionem contigisse. Testati fuerunt hoc celebres in arte obstetricia magistri; invenerunt nempe haec ligamenta, de quibus dictum fuit, mollia, & dilatata, ipsa ossa separata. Trecentis auditoribus in cadavere mulieris, quarto a partu die suspendio strangulatae, hoc demonstravit *Riolanus*. In sequenti post partum die ad minimi digiti distantiam separata ossa pubis invenit *Diemerbroeckius*. Similia vidit *Paraeus*, *Baubinus*, *Harvaeus*, *Spigelius*. Omnia haec testimonia collecta habentur (u). Ipse vidi in illustri puerpera, undecima a partu difficillimo septimana mortua, ossa pubis adhuc separata, ita ut cum crepitu supra se mutuo moveri possent. Hinc non miror, magni nominis in arte obstetricia virum (v), ex propriis observationibus, & cadaverum numerosa sectione edoctum, statuisse, quod saepius, quam creditur, contingat in difficili partu, ut ossa pubis a se invicem diducantur. Pubis ossa ad digiti distantiam a se invicem separata, & cartilaginem, qua haec ossa juguntur, emollitam, invenit *Cornelius a Solingen* (x): ubi etiam plures observationes leguntur, ex optimis auctoribus collectae, quae docent, in partu difficili ossa pubis, & alia, quae pelvim constituunt, ossa a se mutuo sejungi, emollitis, & magis tumidis redditis integumentis, quod imprimis notandum videtur (*). Certe observatur, ante partum vaginae membranam internam tumidulam reddi, mollem, humidam, & vulvae labia molliter intumescere. Os uteri, quod antea tangebatur firmum, & solidum, molle redditur, & dilatatur, antequam partus dolores ingruant. An similis mollities humida in ligamentis, ossa pelvis inter se nectentibus, nascitur ante partum, ut cedere possint, ubi opus erit in partu difficili? postea ossa sejuncta, foetu expulso, elasticorum ligamentorum ope ad pristinam redeunt unionem? Videtur certe hoc satis probabile esse. Vidi saepius, post difficilem partum puerperas de molesto dolore circa commissuram ossium pubis conquestas fuisse, nec potuisse primis diebus puerperii ullo modo situm erectum in lecto tolerare. Sensim tamen minuebantur hae molestiae, & convalescebant, libet tardius.

Verum si tanta vi opus est in angusta nimis pelvi ad exprimendum foetum, ut ipsa ossa disjungantur, patet satis, quantam vim pati debeat foetus caput, dum per arctas adeo vias transprimitur. Hinc toties mortui infantes pro-

(u) Bonet. Sepulc. Anatom. Tom. 3. pag. 117-119.

(v) Levret l'art des accou-

chem. pag. 3. (x) Stalp. van der Vliet observat. LXVI. pag. 284. & seq.

(*) Confer & Peu Pratiq. des accouchem. liv. I. chap. 12. §. 12. pag. 185. Denys verhandeligen &c. pag. 114. 115.

prodeunt in partu difficili; si autem vivi adhuc prodeant, elongatum caput habent, a solita figura multum recedens; quod peritae obstetrices molli, & aequabili manuum pressione ad debitam figuram reducere conantur. Notum enim est; calvariam recens nati infantis non esse penitus osseam, sed partim adhuc membranaceam; unde ossa possunt ad se mutuo accedere, sicque sphaeroidea capitis figura in oblongam mutari, ut facilius per angustam nimis pelvim exire possit.

Nec minor vis inferitur utero, dum foetum per angustam pelvim exprimere nititur. Uterum enim sua propria contractione agere ad partum promovendum, extra dubium est. *Hemsterbuys* (y) circa medium praecedentis saeculi vidit, quod gravidae canis uterus, abdomine aperto, suo nixu solo diaphragmate, & musculis abdominis non adjuvantibus, foetum exclusit. Recentiora experimenta idem confirmaverunt. In cane praegnante, partui jam propinqua, vidit celebris Medicus Bononiensis *Caldani* (z), uterum moveri satis fortiter. Credebat prima fronte, fieri hunc motum a foetibus in utero contentis. Discidit uterum, eduxit tres foetus vivos, & binos mortuos, fere totos putridos: uterus sic evacuatus jam propria vi sic contrahebatur, ut cavum ejus redderetur nullum. Perrexit uterus ille se movere per horam, & amplius; tuncque motus incepit languescere; leni stimulo poterat augeri, ita ut candela propius admota, contraheretur adeo valide, ut tota ejus cavitas deleretur. Eadem tentamina postea facta sunt in uteris binarum vaccarum non gravidarum, & dum adhuc haerent in corpore, & dum jam essent exempti.

Sed eandem vim utero humano inesse suadent multa. Dum dolores partus urgent, perita obstetrix orificium uteri tangens sentit dolorem instare, licet puerpera non sentiat; imo, uti praecedenti Capitulo dictum fuit, prudenti irritatione oris uteri incitatur uterus, ut contenta suo cavo expellat. Propria sua vi uterus, matre jam mortua, foetum expressit; in vivente, placentam relictam toties solvit, solutamque expellit, grumos sanguinis cavum replentes exprimit, & ex magna distensione in gravidis redit in pristinam magnitudinem. Toties senserunt obstetricantes Chirurghi, manum utero immissam valide constringi. Muscularem in uteri fabrica substantiam detexit *Ruyfchius*; confirmaverunt alii; de qua re videri possunt illa, quae apud Uteri Gravidæ descriptorem habentur (a). Omnia ergo haec concurrunt ad demonstrandam validam uteri in partu contractionem.

De valida uteri contractione *Ruyfchius* (diu antequam musculares illas fibras detexerat) adeo videtur fuisse certus, ut crediderit, uteri orificio pertinaciter clauso, vel capite foetus illud obturante, contentos in utero humores posse per tubas Fallopianas exprimi in cavitatem abdominis, & pelvim (b).
Imo

(y) *Messis aurea exhibens Anatomica* pag. 333. (z) Lettera scritta al chiarissimo

&c. Haller pag. 330.

(a) *Noortvyk de utero gravido* pag. 106. & seq.

(b) *Observ. Anatom. Chirurg. N. LXXXIV. & LXXXV. pag. 79. 80.*

Imo, quod magis mirum, videtur uterus in difficillimo partu ex propria sua substantia expressisse quasi transsudando sanguinem in cavum abdominis, qui post mortem concretus repertus fuit. Moritur ob difficilem partum mulier, non excluso foetu: in cadavere reperitur tota anterior uteri superficies tecta sanguine concreto, qui nullo negotio inde separari poterat, & supra mentem expansus placentam coagulati sanguinis exhibebat, quindecim pollices longam, pedem latam, & tres lineas crassam. Accurato examine nullum vas ruptum inveniebatur, nec gutta sanguinis in reliquo cavo abdominis apparebat (c). Unde probabile videtur, quod sanguis ille ex ipsa uteri substantia transsudando expressus fuerit per validissimos miserae puerperae nixus. Nec improbable videtur, in difficili valde partu hoc saepius contigisse; unde pessima sequi potuerunt mala post puerperium a corrupto hoc sanguine extravasato, in liquamen soluto, & viscera abdominalia alluente. Vix enim credibile videtur, tantam copiam grumosi concreti sanguinis, in cavo abdominis collectam, resorberi potuisse.

Dum ergo tanta vi uterus constringitur, & in difficili partu validissimis parturientis nixibus urgetur contra foetum, ejus cavo contentum, merito metuitur uteri ipsius ruptura, per quam foetus vel pro parte, vel & totus in abdomen matris delabatur, lethali plerumque cum eventu. Celebris olim Parisiis obstetriciae artis magister, *Gregoire* testatur, se triginta annorum spatio decies sexies observasse uteri rupturam: inter haec semel vidit, rupto utero ad placentae latus, foetum pedibus suis tetigisse matris diaphragma: in alio casu notat, caput infantis, totumque dextrum latus extra uterum reliquis partibus adhuc in uteri cavo haerentibus, ita ut foetus divaricatis cruribus inequitaret quasi utero (d). Plura certe inveniuntur rupti uteri exempla apud *La Motte* (e), & alios: notabilis imprimis ille casus, ubi foetus placentam, ac uterum pedibus suis perforaverat, & tamen *La Motte* per pedes illum eduxit: placenta postquam separata fuerat, manum denuo immisit utero, penetravit per uteri rupturam in abdomen, & intestina manifeste tangere potuit. Supervixit tamen misera per triduum. In alio simili casu supervixit puerpera per quatuor dies; & in cadavere vestigium tantum rupturae uteri inveniebatur, quod minimi digiti apicem caperet, contracto nempe jam utero. Mirabilis casus rupti uteri habetur (f), ubi totus foetus in cavo abdominis haerebat, excepto unius pedis extremo, & fune umbilicali: tamen feliciter pedibus eductus fuit; & post separationem placentae, dein manu immissa, sanguinem grumosum eduxit ex abdominis cavo. Supervixit & haec per octiduum. In cadavere mulieris, quae partus dolores per triduum toleraverat, & absque foetus exclusione perierat, invenit Celeberrimus *Alexander Monro* fissuram uteri, per quam foetus maturus una cum placenta delapsus fue-

(c) Medic. Essais and observat. Tom. IV. pag. 447.

(d) Acad. des scienc. l'an 1724. histoire pag. 52. Heisters vvaarnemingen 944.

(e) Traité des Acouchemens liv. IV. chap. V. pag. 463.

(f) Pea pratiq. des Acouchem. liv. I. chap. VIII. pag. 79. & seq.

fuerat in abdominis cavum ; quod etiam magnam sanguinis quantitatem continebat (g).

Sed non uterum tantum fissum , at ipsum quoque abdomen crepuisse in difficili partu cum magno fragore, legitur (h), & per hanc aperturam exivisse foetum, eductam fuisse placentam, contentaque abdominis viscera ab adstantibus visa. Integre tamen curata fuit puerpera sola applicatione butyri cum saccharo albo misti: cicatrix sanati vulneris simile vestigium reliquit, ac si crassiori acicula cutis rafa fuisset. Vix fidem mereri videretur mirus ille casus, nisi jurati autoptae testes coram magistratu veritatem confirmassent, ac in testium numero forent obstetrix, & alia mulier, quae placentam eduxerat. Testimonia autem haec, publica fide munita, a Secretariis *Societatis Edinburgensis* servantur.

Certum ergo est, in difficili partu uterum rumpi quandoque. Considerationem autem meretur, an cognosci possint signa, ex quibus praesagiri possit, uteri rupturam metuendam esse; & an dentur indicia, quae docent, uterum jam ruptum esse. Denique videndum est, an in tanta calamitate aliquid auxilii ab arte sperari possit.

Omne, quod obicem ponit foetui egressuro, inter causas rupturae uteri numerari potest; sed tamen non in omni partu, etiam admodum difficili, uterus rumpitur: imo rarius hoc contingere, notum est (i). Cum autem non omnia cadavera parturientium, pleno utero mortuarum, aperiantur, videtur iusta suspicio esse, quod uteri ruptura adfuerit, saltem in quibusdam illarum, licet plena certitudo non habeatur: imprimis, si validos, irritos quamvis, habuerint pariendi conatus.

Immediatam autem causam rupti uteri, praeter vim externam illatam, frequentissime saltem ponit *Levret* (k) calcitrationem foetus, dum capite in angusta nimis pelvi inclavato (ut vocant) haeret. Praecipue autem, cum infans convellitur; quod saepe contingit, dum jam morti proximus est: si simul tunc uterus propria vi, & nixibus maternis urgeatur, tanto magis ruptura metuenda est. Accedit, quod per motus convulsivos vis musculorum augeatur immaniter, uti in *Epilepsiae* historia dictum fuit.

Demonstratur fidelibus gravissimorum auctorum observatis, in omni sua parte uterum ruptum fuisse, quas collectas videre licet apud *Celeberrimum Crantz* (l), qui pulcherrimum de *rupto utero* tractatum scripsit. Signa autem, quae rupturam uteri praecedunt, haec sunt (m): Foetus, postquam aliquo temporis spatio immobilis mansit, subitis agitatur motibus, qui acutum matri dolorem excitant, in illo loco matricis, ubi rupturae periculum est: anxietas autem praecipue sedem figit versus medium regionis epigastricae. Illi succussus per vices redeunt, non limitato temporis intervallo: tandem ultimus, sed violentissimus subsultus succedit, qui mortem foetus denunciat; post-

(g) *Essais and observat. Physic. and Literar.* vol. 2. Artic. XXIV. pag. 339.

(h) *Ibidem* pag. 338. (i) *Crantz de utero rupto* pag. 12.

(k) *L'an des acouch.* §. 595. pag. 97.

(l) In loco modo citato & seq.

(m) *Levret Ibid.* §. 597. 598. pag. 98.

postea silent illi motus. Plerumque enim foetus convulsus moritur. His signis Celeberrimus Crantz (n) addit sequentia: *Vastum, & distentum abdomen, retracta vagina, orificium altum, dolores quidem veri, sed violenti, sine magnis intervallis frequentes, sine partus progressu ingrati, statim ab initio, aut medio naturalis nixus tempore adsunt. Ruptis aquis, dolores vehementius instant, sine intermissione improbi, sine partus spe crudeles, ita mulierem discruciant, ut & ignarum vulgus his non enixam vehementer miretur &c: donec tandem violentissimo subsultu elatus foetus, contractum calcitratum uterum perfodiat, aut membro magis obtuso dilaceret.* Disputat deinde in notis (o), an uterus rumpatur, aquis adhuc integris, an vero, postquam, ruptis membranis, jam effluerunt: & omnibus rite ponderatis concludit; *Nihil certi in hanc rem statui posse; hucusque vero in bene descriptis observationibus uterus semper post effluxas aquas ruptus est.*

Si haec signa modo recensita adfuerint, futurae uteri rupturae justus metus est: si post haec succedant sequentia, uterum jam ruptum esse, designant (p). Si nempe animi deliquium, vel magna debilitas sequatur, mente tamen adhuc constante, facies palleat, pulsus debiliior fiat, abdomen tumescat tumore largo, & plano, cum sensu caloris insoliti, sed blandi; si extrema frigescent, guttae sudoris visceri frigidi in facie appareant; tunc brevi deficit, & plerumque parturiens moritur convulsa. Aliquando, dum uterus rumpitur, concussionis sonum audiunt adstantes, & post animi deliquium melius se habere videtur; foetus motus raro, vel nunquam sentitur amplius; partus dolores cessant; foetus membra, quae in ore uteri antea tangi poterant, jam non amplius percipiuntur; si nempe vel totus foetus, vel pro magna parte jam in cavo abdominis haereat; tunc autem tangendo abdomen partes foetus distinctius tactu percipi possunt, quam antea, dum adhuc in uteri cavo haerebant.

Optime autem notatur (q), hanc symptomatum seriem non semper perpetuam esse; quasdam etiam absque ullis rupti jam uteri signis deficere, & mori paucas post horas; dum aliae, uti ex antedictis observatis constat, per plures dies supervivunt; in quibus varia debuerunt, vel saltem potuerunt esse symptomata, prout foetus in abdomine haerens haec, vel illa viscera, premendo, vel irritando, affecerit. Nec tamen semper foetus, rupto utero, in abdomen exit; nam & partu naturali, ac quidem placido, absque obstetricis auxilio foetus prodiit, placenta statim subsequente. Matre eadem die mortua, aperitur cadaver, & invenitur uteri ruptura (r).

Foetum autem, rupto utero, in abdomine haerere, imprimis noscitur, si pars, quae antea in orificio uteri tangebatur, jam non amplius sentiatur; si per muliebria sincerus defluat sanguis, aut jam congelatus decidat cruor; si orificium uteri, uti post partum plerumque contingere solet, conniveat; &

fi

(n) De rupto utero pag. 15. 16. & seq.

(o) Ibid. pag. 17. 18.

(p) Ibid. pag. 19. & seq. Levret l'art des Accouch. §. 599. pag. 98.

(q) Crantz de utero rupto pag. 22.

(r) Ibid. in notis.

si uterus collapsus fuerit (s). Contraria autem his signa indicant, foetum integrum, vel pro parte, adhuc uteri cavo contineri.

Cum autem plurima symptomata uteri rupti pendeant a iactura sanguinis, qui in cavum abdominis effunditur, possent eadem sequi a quacumque alia haemorrhagia, licet sanguis non colligeretur in abdomine. Si per uteri orificium, & vaginam effluit sanguis, causa manifesta est: verum, si membranis adhuc integris, funiculus umbilicalis ruptus fuerit, vel iisdem jam ruptis, foetus capite obturante, & implente uteri orificium, idem contigerit, replebitur uteri cavum sanguine, foetus ex inanitione convulsus uterum percutiet, parturiens debilitabitur, pallebit, sicque multa concurrent symptomata, quae pro signis uteri rumpendi, & rupti habentur. Raro quidem observata fuit haec causa internae haemorrhagiae, ita ut *La Motte* testetur, se illam tantum semel observasse; uti ad §. 1304. dictum fuit; contigit tamen. Alter enim casus ex *Levreti* observationibus habetur apud *Crantz* (t), ubi chorda umbilicalis rupta fuerat inter partus dolores, pluribusque gyris collo circumvoluta suffocaverat foetum. Cum autem venter magis magisque tumeret, imprimis in regione epigastrica, sed & simul tactu durus perciperetur, internam haemorrhagiam suspicabatur *Levret*, potius quam uteri rupturam, cum post hanc abdomen quidem sanguine impleatur, sed tumor planus, & mollis appareat; quo signo uteri ruptura distinguitur ab haemorrhagia, interna uterum integrum replente. Hinc, licet in illo casu *verum*, & *certum fuerit in consilio dubii*, & *falsi*, tamen non difficile fuit consummato in arte viro *Levret* veram facere diagnosin. Cum enim caput foetus totam fere vaginam repleret, nec tamen promoveretur per validos, & frequentes dolores, quatuor horis a parturiente toleratos, iusta erat suspicio, chordam umbilicalem collo, vel aliis membris foetus circumvolutam, partum retardare; adeoque metum esse, ne placenta, cui chorda affigitur, separaretur ab utero, & haemorrhagia sequeretur, uti toties contingit. Nec ullam culpam habuit, quod rupturam chordae umbilicalis non praecognoverit, cum tam raro contingat, & nullo modo cognosci possit, quamdiu foetus capite suo implet uteri orificium. Haemorrhagiam internam uteri integri distinxit ab illa, quae rupto sequitur utero, ac in abdominis cavum sanguinem effundit; & ex hac cognitione determinavit, quomodo parturienti succurrere posset.

Sequitur jam, ut consideretur, quomodo succurri possit parturientibus, dum partus difficilis pendet a compage arctiori ossium pelvis, quae transitum foetus impedit.

Optimus *Deventer* (u) monet obstetrices, si tangendo invenerint, angustam pelvim esse, ne urgeant parturientes, ut validos conatus adhibeant dolorum tempore: nunquam enim hic festinandum: praecipua spes est, ut sensim leniori nixu oblongetur caput infantis, sicque aptum reddatur, ut per has angustias transeat. Unde nulla remedia, nullae artes adhibendae sunt, ut

(s) *Crantz* de utero rupto pag. 39.

(t) *Ibid.* pag. 25. 26. in notis.

(u) *Nov. Lum. obstetric. cap. 27. pag. 115.*

ut augeantur dolores, robore, aut frequentia, licet importune saepe haec desiderentur a parturientibus, & adstantibus. Antea monitum fuit, ossa pelvis ex diversis constare ossibus, quae a se mutuo videntur recedere posse, ut spatium transituro foetui augeatur: firmantur ad se mutuo cartilaginibus interpositis, & ligamentis: haec observata fuerunt tumescere, mollescere, flexilia fieri, dum partus instat, ut plus cedere possint: verum haec sensim fieri debent, & hinc lentior partus laudatur in primiparis. Commodo situ locandae sunt parturientes, sive in sella perforata, sive in lecto, ita ut os coccygis libere retrorsum cedere possit, neque a pondere corporis, vel a vestibus ullo modo prematur. Imo, ubi jam in exitu pelvis caput foetus haeret, suadet auctor, ut antrorsum incurvatum os coccygis, manus in vaginam immissae dorso, dum vola sursum spectat, retroprimant aequabiliter, sicque capiti foetus emerfuro viam faciant obstetrices (v).

Verum si caput infantis, haereat in pelvis cavo, nec tamen transprimi possit ob viae angustiam, licet os coccygis retropressum fuerit, vel illud os non cedat facile, tunc aliis opus est auxiliis, quae varia a variis laudata fuerunt; sed non omnia aequae tuta. Quamdiu caput nondum penitus fixum, & immobile in pelvis cavo haeret, suaserunt plures, ut, capite retropulso, prudenter per pedes, obstetricantis manu prehenso, educatur foetus. Verum, si caput jam fixum in pelvi haereat, nec exprimi possit (inclavatum dicunt), tunc situs infantis amplius mutari nequit, nec caput retroprimi. Difficilis certe casus, cujus tot tristia exempla occurrerunt: si in his angustis diu haereat infans, moritur, & ante mortem convulsus, valida calcitracione quandoque matris uterum rumpit; uti dictum modo fuit. Si moriatur infans, flaccescit caput quandoque sic post aliquod tempus, ut valido nixu exprimatur. Sed fero hoc plerumque fit, dum a continua illa valida compressione in mollibus partibus gangraena fit, plerumque matri lethalis; vel, si emerferit, molestissima curatione opus est, & pessima saepe relinquuntur mala, ob devastatas per gangraenam partes vicinas, vaginam, intestinum rectum, urethram; quarum calamitatum exempla passim leguntur.

Crudeles hinc tentatae fuerunt operationes, dum uncis infixis protrahere conabantur Chirurghi. Verum quidem est, foetui jam mortuo ut parcatur, nullam esse necessitatem: sed postea patebit, non semper adeo certo constare de morte foetus in utero materno. Horrenda fuerunt exempla, ubi semilaceri foetus, vi extracti, uncis confixi, misero ejulatu vitam testabantur. Quandoque unci, male defixi, vel laceratis inter trahendum foetus partibus dilapsi, miseram parturientem laceraverunt, imprimis, si foetu diu jam mortuo, & semiputrigo, haec tentarentur. Unde factum est, ut prudentiores ab his abstineant omnino, vel utantur quam rarissime. Legi meretur de hoc *Celeberrimi Crantz egregius tractatus de re instrumentaria in arte obstetricia*; ubi de omnibus hic accurate agitur, simulque horrendus casus legitur (x)

ob-

(v) Nov. Lum. Obstetric. Cap. 27. pag. 122. 123.

(*) §. XXXVIII. pag. 37.

obstetricantis Chirurghi, qui uncus foetus capiti infixit, cerebrum extraxit, infantemque adeo enormiter laesum post horae spatium protraxit, vivum adhuc, & valido ploratu crudelitatem exprobrantem. Nec contentus hoc facinore, pede collo infantis imposito, spiritum elisit. Carnificis manum merebatur horrenda talis carnificina.

Omnes autem operam adhibuerunt praeclari in arte obstetricia viri, ut in difficili hoc casu liberarent matrem, nec tamen laederent foetum, ita ut ille superstes esse posset. Manibus protrahi incuneatum in pelvi caput non poterat: hinc cogitaverunt *de parando apto instrumento, quod ferreis quasi manibus caput prehenderet, foetumque vivum, si possibile esset, secure extraheret* (y). Chronologico ordine ibidem recensentur auctores, qui talia instrumenta vel invenerunt, vel jam inventa correxerunt sic, ut facilius, & tutius adhiberi possent. Simul etiam notatur, Veterum quaedam instrumenta salubri huic scopo facili negotio adaptari potuisse. Forceps nempe adhibitus fuit, cujus labia latiora utrimque foetus caput prehendere possent: labia autem illa excavatam curvaturam habere debebant, ut rotundae capitis figurae melius adaptari possent, & latiore superficiem prehendere, sicque minus laedere, dum agunt.

Facile autem patet, tales forcipes non potuisse habere crura juncta, ut in vulgari forcipe obtinet: tunc enim utrumque labium simul immitti debuisset, & deinde in ipsa vagina a se mutuo disjungi, ut caput prehendi posset; quod absque violenta partium distractione fieri non potest: praeterea forcipis labia inter caput foetus, & os uteri locari debent, quod vix rite fieri potuisset, si crura invicem juncta fuissent. Verum, dum crura separata sunt, unum post alterum introducitur, & postea, si opus fuerit, extra vaginam crura forcipis axe, vel cochlea, per foramina crurum sibi invicem impositorum transeunte, firmari poterunt, sicque caput protrahi: patet hinc, crura debere esse longiora. Manebat tamen semper difficultas in forcipe recto, ut crura jungerentur; hinc curvo forcipe *Leuret* usus est, *cujus labia mediam capitis diametrum aptius prebendunt, cujus crura facilius junguntur, & clauduntur, & qui, quo caput propius adducit, eo a fraenulo vulvae magis distat* (z). Hujus autem forcipis constructio, *ad formam vaginae, pelvis, & capitis infantis, exacta, bicurvilinea, & cava, a prima inventione his incommodis vacavit* (a). Simul objectiones contra forcipum usum factas egregie solvit.

Saeculum, & ultra elapsum est, quod in partu difficili quidam artis obstetriciae magistri longe feliciores fuerint aliis, dum nempe caput, incuneatum quasi, in pelvi haereret. Feliciter saepe absolvebant tales partus, dum alii, licet in arte obstetricia versati satis, infecta re abire debebant: Arcanam methodum servabant caute, ut nemini innotesceret. Videtur probabile, inventorem fuisse Anglum, celebrem olim in arte obstetricia magistrum, *Chamberlens* (b), qui una cum tribus filiis artem magna laude exercuit. Per
fexa-

(y) Crantz de re instrum. in arte obstetric. §. IX. pag. 13.

(z) Ibid. §. XXXIV. XXXV. pag. 34. 35.

(a) Ibid. §. XLII. pag. 45.

(b) Het Roonhuyssaansch geheim ondeckt &c. pag. 19. & seq.

sexaginta, & ultra annos latuit hoc arcanum, & *Amstelaedami* inclaruit ejus usu *Rogier van Roonbuysen*; unde postea arcana haec methodus vel haereditate, vel pretio numerato, una cum promissa silentii fide, ad paucos pervenit, qui hac arte inclaruerunt. Summa ergo laude dignissimi sunt Poliatri egregii *Amstelaedamenses*, *Jacobus de Vischer*, & *Hugo van de Poll*, qui proprio aere redemptum hoc arcanum communicarunt, & publica fide munitis testimoniis probaverunt detecti arcani certitudinem contra lucripetas, & improbos quosdam obtrectatores, qui publicum decipere conabantur. Figuram instrumenti exactam dederunt ita, cum omnibus suis dimensionibus, ut ubique locorum artifices illud imitari possint quam facillime.

Instrumentum hoc simplicitate sua se commendat: est enim vectis simplex, cujus extremum leviter incurvatum inter ossa pubis, & caput infantis inclavatum prudenter immittitur, sensimque protruditur, donec ad occiput infantis pervenerit, & curvatura sua illius convexitatem undique tangat. Tunc elevatur sensim alterum extremum vectis, donec tangat commissuram ossium pubis, quae hypomochlion firmum vecti dat, & ulterius elevando hoc extremum, caput infantis deorsum parum, & antrorsum premitur, sicque ex his angustiis liberatur. Dum una manu vectem moderatur obstetricans, altera sustinet anum, ut lacerationem caveat, simulque caput foetus, jam liberum, versus anteriora dirigat, ubi majus spatium nascenti jam infanti datur. Caeterum omnia, quae in conficiendo hoc vecte, illumque tegendo, & dein applicando sunt observanda, adamussim in egregio hoc tractatu describuntur.

Quamvis autem egregii viri, qui varios forcipes invenerunt, aut perfecērunt, omnem laudem mereantur & ob industriam, & ob candorem, quo sua inventa publico communicaverunt, tamen videtur vectis ille *Roonbuisianus* reliquis esse praeferendus.

Simplicissimum enim est instrumentum, parvae molis, facile occultandum, ne parturiens, & adstantes instrumentorum apparatu terreantur. Unde, dum latebat hoc arcanum, plurimi crediderunt, *Roonbuisianos* obstetricantes nullo instrumento uti, sed peculiari, ipsis solis nota, encheiresi difficiles illos partus tam feliciter, & saepe paucorum minutorum spatio, absolvere. Mirabantur quam maxime, hujus arcani possessores, ad parturientes vocatos, non semper statim opus aggressos fuisse. Si enim nondum penitus immobile in pelvis angustiis haereret caput, sed vacillaret adhuc, expectabant, donec penitus incuneatum haereret. Ratio facile patet: vectis extremum occipiti applicatum vacillasset, nisi firmum haesisset foetus caput, nec dilabi ex suo potuisset loco. Magnam praeterea utilitatem habet, quod potentia vectis agat in os occipitis, quod firmissimum est inter ossa capitis foetus. Per forcipes autem prehensum caput comprimitur, & oblongius redditur; quod juvat quidem exitum, sed & simul semper metum relinquit, ne molle encephalon hac compressione laedatur.

Numerosi, & felicissimi successus probaverunt plus satis utilitatem hujus simplicis instrumenti. Nam *Joannes de Bruyn*, a cujus haerede filia unica
hoc

hoc arcanum redemptum fuit, quadraginta duorum annorum spatio octingentos infantes, capite in angusta pelvi incuneatos haerentes, eduxit vivos. Sic apparuit ex annotationibus viri illius, qui integerrimae fidei ab omnibus semper laudatus fuit. Cum autem humiliter de se ipso sentiret, & invidorum calumniis laceraretur, non habuit civium suorum talem fiduciam, qualem merebatur. Caeterum servatorum infantum arte sua major procul dubio fuisset numerus. Pauci enim illi, qui arcanum hoc noverant, frequentius ad difficulter parientes vocati, mirabantur, quod tot annorum spatio octingentos tantum servasset infantes, cum ipsi longe plures, breviori multum tempore, felices successus numerare possent (c).

Quantam ergo cladem intulerunt humano generi, qui arcanum hoc texerunt! utinam non inter illos numeraretur *Fredericus Ruyschius*, cui ars nostra tantum debet. Quanta non debetur laus illis, quos generoso incoctum pietas honesto impulit, ut revelarent! Talis facti, fecisse, merces est, & praemium dabit optabilis serenae mentis tranquillitas illo tempore.

— — — *Dum numina nobis*

Mors instans majora facit . . .

Obstetricantibus, simul, ac innotuit, statim commendavi vectem; quo plures se feliciter usos fuisse testantur.

Si autem per exostoses, vel pessimam conformationem ossium pelvis adeo angusta fuerit, ut nulla arte obtineri possit, nec sperari quidem foetus exitus, tunc nihil superest, nisi ut Sectio Caesarea instituat. Idem verum est, si caput foetus praeternaturaliter adeo crassum fuerit, ut cavo pelvis, etiam naturaliter constituto, excipi nequeat: praecipue, si solidum caput, & monstrosae magnitudinis fuerit. Si enim distendente lymphā aucta fuerit moles, cedit, patitur se elongari; & observationes docuerunt, vectis modo descripti ope difficilem talem partum fuisse expeditum. Quandoque etiam validis parturientis nixibus pressum caput rumpitur, & effusa lymphā collabatur; sed infans tunc plerumque mortuus prodit, vel paullo post nativitatem perit. De qua re videri possunt illa, quae ad §. 1217., & 1218. dicta fuerunt.

In mortuae matris cadavere Caesaream Sectionem institui posse, ut servetur infans, nemo dubitavit, imo in quibusdam locis lege statutum est, ut hoc fiat in tali casu semper; & merito quidem. Utriusque *Siciliae Rex Carolus* talem legem sancivit quadragesimo nono hujus saeculi anno, quae statuit; *Ut quaevis persona, cujus dolo, impedimento, vel negligentia Caesarei partus operatio cum damno foetus omittatur, aut saltem retardetur, isque insuper, cujus malitia violentus abortus, ut ante dictum fuit, evenerit, habeantur criminis homicidii patratores (d).* Deinde mandatur omnibus iudicibus, ut severiori,

qua

(c) Voorreden Ibid. pag. 29. & seq.
& seq.

(d) Cangia Mila Embryolog. Sacr. pag. 255.

qua possunt, methodo processum omnino construant, illosque carceribus tradant, & consuetam formam, juxta ritum, legesque regni, capitali judicio persequantur; quo deinde ab iis, ad quos pertinet, pro ratione, tum qualitatis, & circumstantiarum in crimine, tum doli, & gravitatis, negligentiae repertae, ad poenas damnari valeant, quibus homicidia coercentur.

Omnia, quae ad hanc rem spectant, ex Theologia, Jurisprudencia, & Medicina, in utilissimo hoc opere collecta habentur, ordine digesta, & contra objectas difficultates defensa (e).

Sponte patet, tam cito, quam fieri potest, post mortem matris foetum liberandum esse; cum matre mortua, in magno versetur periculo. Neque desperandum tamen est de foetus vita, licet post mortem matris notabile tempus effluerit, uti pluribus constat observatis, quae videri possunt (f). Inter quae mirabilis casus est gravidæ a marito pluribus vulneribus confossæ, ex cujus utero, quadraginta octo post mortem horis, sectione eductus fuit infans, in pede per uterum confossum vulneratus, qui adhuc per quadrantem horae supervixit.

Interim, ut sectione liceat educere foetum in hoc casu, certo constare debet de morte matris. Dissimulari non potest, *Vinslovium*, & alios, demonstrasse, mortis signa non semper adeo certa esse, ac vulgo creditur. Nimis notum est, ipsum *Vesalium*, Caesaris Archiatrum, & Anatomicorum sui sæculi principem erroris accusatum fuisse, quem peregrinatione in terram sanctam expiare debuit, in cujus itineris reditu mortuus est.

Adeoque patet, omni quidem hic circumspectione opus esse, imprimis si subita morte e vivis erepta credatur gravida: syncope enim fallere posset: unde excitantia, & nervos acriter stimulantia, remedia prius tentari debent: crudele enim foret, matris nondum mortuæ uterum incidere, ut foetus educatur, dum nulla spes est salvandæ simul matris per sectionem, uti mox dicetur; unde in Rituali Romano habetur (g): *Si mulier prægnans mortua fuerit, foetus quamprimum caute extrahatur*. Crudele erat illorum institutum, qui instante jam morte, nondum tamen mortua gravida, ventrem discindendum suadebant. Contra talium barbaram carnificinam merito insurgit Venerandus plurimum, & eruditissimus auctor (h).

Ubi post morbum Chronicum diu toleratum, vel & validum acutum morbum, in gravida appropinquantem mortem vidit peritus, & prudens Medicus, non fallitur facile, dum mortem adesse jam pronunciat: sed summa attentio requiritur, ut syncopen a vera morte distinguat. Imprimis summa prudentia opus est in talibus, quæ animi deliquiis, morbisque hystericis, obnoxiae vixerint, & graviditatis tempore in validam syncopen lapsæ fuerint. In tali enim syncope pallescunt, facies collabitur, cadaverosa fit, extrema frigent, rigescunt, pulsus, & respiratio silent omnino. Probe memini, me subito vocatum fuisse ad gravidam mulierem, quarto circiter mense, valida cholera, & subitis, ac copiosissimis evacuationibus quinque horarum spatio adeo exhau-

(e) Pag. 53. & seq.

(f) Ibid. pag. 72. & seq.

(g) Ibid. pag. 59.

(h) Ibidem.

exhaustam, ut post convulsiones inciderit in veram syncopen, ita ut ab adstantibus pro mortua haberetur, dum accedebam. Frictionibus extremorum, lintheis calidis, stimulantibus remediis spirituosus ad nares, & prudenter linguae applicatis, per quadrantem horae nihil profeci: indignabantur fere amici, quod cadaver vexarem; perrexi tamen; & post aliquot minuta percepi aliquem in carotidibus motum; palpebras deduxit, ingemuit, & sensim ad se rediit, bonisque nutrimentis exhaustum corpus sensim repletum, gratisque cardiacis erectae vires fuerunt, ut integre restituta fuerit, & septimo mense vivum infantem pepererit, debilem tamen, & qui paucis diebus tantum supervixit.

Certissimum autem illud mortis absolutae criterium, putrefactio nempe cadaverosa, hic expectari nequit, cum certo periret prius foetus: quandoque enim per biduum, imo & diutius expectandum foret, antequam foetor cadaverosus perciperetur. Sectio autem Caesarea ad salvandum foetum in hoc casu instituitur tantum.

Ubi ergo sollicito examine, non perfunctorio tantum, nulla signa vitae apparent, nulla respiratio, nullus arteriarum, vel cordis motus percipitur, facies jam ante mortem cadaverosa fuit, oculorum acies fracta (ut vocant), & quasi lamella viscida obducta, rigida sunt membra, extrema frigida: si maxilla inferiore a superiore diducta, hiatus maneat, qui dein, elatere musculorum per frigus cadaveris aucto, sensim minuitur, sed non ad perfectam clausuram usque; si nulla subita, & copiosa evacuatio praecesserit, unde syncopes perfectae suspicio nasci posset, si nullis stimulis sopitus, & cessans jam motus humorum excitari potuerit (i); tunc, si non physica, moralis saltem, mortis perfectae certitudo haberi poterit; quae augetur, si ne quidem vivo igne corpori applicato ulla sensus, aut motus signa observentur.

Optime enim notat egregius ille auctor (k): *Aliud est dicere, Homines multoties errasse, illos reputando mortuos, qui vitam retinebant: aliud est, dicere, vivos a mortuis per signa internosci non posse: Sicuti etiam aliud est dicere, saepe adulterinam expendi pecuniam pro incorrupta; aliud tamen adstruere, non dari modum ad discernendum in pecuniis aurum probum a vitioso: primum enim verum, secundum omnino falsum existimatur.*

Ideo etiam in his locis, ubi lege cautum est, ne cadavera sepeliantur ante quadraginta octo horas elapsas post mortem, conceditur, ut citius inhumentur, si Medicus, qui aegro opem tulit in ultimo morbo, scripto testetur, & suo quidem periculo, se de morte vera, & absoluta certum esse. Absque hoc lex adaequate servatur, ne ruri imprimis, ubi horrendi erroris majus periculum est, nondum vere mortui sepeliantur. Sic etiam obex ponitur periculoso Judaeorum mori, qui in mortuum peccare se credunt, nisi statim post mortem calens quandoque adhuc cadaver humo tradant.

Celeberrimus Heisterus (l), cujus scientiam, candorem, & longaezum artis usum

(i) Ibid. pag. 60. & seq.

Sect. V. Cap. 113. pag. 758.

(k) Ibid. pag. 66.

(l) Instit. Chirurg. Tom. 2.

usum omnes venerantur, de hac re habet sequentia: *Quam rarissime enim, & vix ex centum millibus, qui a prudentibus, vel etiam a mediocri vulgo pro mortui habiti sunt, vel semel fefellit, ut non vere mortui fuerint, atque revixerint. Neque adhuc, quantum novi, ullum prostat exemplum, quod ejusmodi gravida, pro mortua habita, sub sectione revixerit. Imo si hoc aliquando etiam praeter spem, & expectationem contingat, Medicus inde nimium terreri non debet; quia scelus non commisit, & sectionem malo animo non instituit; sed ob fortum servandum eam pro cadavere incidit; ad quod faciendum partim ex religione, partim ex legibus, ut mox ostendemus, obligatur.* Omnis autem criminis suspicio deleri videtur, si in cadavere Sectio Caesarea instituatur eadem cum cautela, ac si in vivente muliere fieret: tunc enim vulnus inter laethalia numerari nequit; cum certo constet, sanatas fuisse illas, quae hanc operationem passae fuerant, uti mox patebit. Prudenter hoc observandum jussit *Senatus Venetus (m)*, ne sectio fieret decussata abdominis, ut in dissectionibus cadaverum fieri solet, sed talis, quae in viventibus fieri solet, dum Sectio Caesarea adhibetur. Praeterea jussit Senatus, ut Collegium Medicorum daret magistratui nomina illorum, qui ad hanc operationem perficiendam aptissimi judicabantur. Simul voluit, horum nominum catalogum in singulis pharmacopoliis omnium oculis exponi, ut cives certo scire possent, quorum auxilium implorare deberent in tristi hoc casu; sed & haec utilitas inde sequeretur, ut majori animo, & dexteritate Sectionem Caesaream facerent in vivis Chirurghi, dum eandem in cadaveribus tentassent saepius; illudque etiam fieret, quod artis obstetriciae optimi magistri toties optaverunt, ut nempe, aperto cadavere, paterent errores ab obstetricantibus commissi sive ignorantia, sive temerariis ausibus, & debita posset statui poena, si culpa detecta foret, quam caeteroquin terra tegit.

Dicendum nunc superest de Sectione Caesarea in vivente muliere instituenda, hac spe, ut & mater, & foetus servari possint. Quamvis autem numerosa satis observata doceant, felici cum successu hoc tentatum fuisse, nemo tamen peritus credet, Sectionem Caesaream esse omnis omnino periculi expertem. Debet abdomen largo vulnere, & ipse uterus gravidus, vasis dilatatis, copioso sanguine plenis, turgens, discindi. Minime videtur mirum, sectionem illam non tantum mulieribus illam subituris, sed & Medicis, & Chirurgis horrorem incussisse. Cumque non semper felix fuerit successus, hinc multi illam damnaverunt omnino, tanquam crudelem, & inutilem. Accedit, quod saepius nec parturiens, nec adstantes hanc operationem admittant, nisi dum jam vires fatiscunt omnino; tuncque mors, si sequatur, adscribitur operationi; cujus felix exitus sperari potuisset, modo citius fuisset adhibita. *Paraeus (n)* fatetur quidem, quod audiverit, Sectionem Caesaream cum successu institutam fuisse; sed tamen nunquam sibi persuadere potuit, illam, salva matre, factam fuisse: unde concludit; *id curationis genus, quod periculi, & desperationis plenum est, nunquam usurpandum esse.* Sic & *Mauriceau*

(m) Instit. Chirurg. Tom. 2. Sect. V. Cap. 113. pag. 758. in notis.

(n) Lib. de generat. Cap. 31. Spach. gynaecc. pag. 422.

Ruleau (o) acriter insurgit contra Sectionem Caesaream, quam nunquam in viva muliere tentandam esse declarat, tanquam certo lethalem, & a qua non nisi per miraculum evadere possit mulier, si unquam aliqua sanata fuerit. Tanquam turpes fraudes, & mendacia, damnat omnes historias, quae de Sectione Caesarea, superstitie matre facta, narrabantur, & imprimis in *Rousssetum* acerbissime invehitur. De eadem re legitur dissertatiuncula (p), ubi tandem concludit peritus ille in arte obstetricia vir, quod nunquam tentaverit in vivente, nec tentabit, nisi alterius vestigia legendo, cui feliciter Sectio Caesarea successerit.

Egregius Chirurgus de *La Motte* (q), de operatione Caesarea agens, fatetur, si ob malam conformationem ossium pelvis non relinquatur spatium sufficiens, ut foetus transire possit, tunc unicam relinqui optionem, inter certam mortem matris, ac foetus, & Sectionem Caesaream. Testatur, quod si talis casus ipsi contingeret post consilium in arte peritorum, absque haesitatione operationem susciperet, & omni cum cautela perficeret. Dicit, se credere, aequè possibilem esse hanc operationem, quam alias multas periculosas, atque ideo imprimis minus feliciter cedere, quia sero nimis, dum jam in extremis versatur puerpera, adhibetur. Damnatur tamen temeritatem illorum, qui in aliis casibus difficilis partus illam adhibent, cum firmiter sibi persuasum habeat, praeter malam conformationem pelvis osseae transitum foetui negantem, omnibus aliis causis partus difficilis per artem dextera manu succurri posse. Narrat deinde casum mulieris, quae jam per triduum parituriat, dum foetus mortui brachium extra orificium uteri pendebat. Ipsa mulier anxie desiderabat, ut inciso abdomine foetus extraheretur, & pertinacissime resistebat Obstetrici, ac Chirurgo, dum vel explorationis causa manum in vaginam immittere cupiebant. Nec ullum ratiocinium, nec horridus apparatus instrumentorum ad operationem requisitorum coram ipsa factus, a pertinaci proposito dimovere potuerunt hanc mulierem.

Sub specie Sectionis Caesareae instituendae, firmiter illam teneri jussit, & manu in uterum immissa, pedibus arreptum foetum integrum, quamvis omnino putridum, eduxit momenti quasi tempore, sicque invitam, & quantum poterat, reluctantem, liberavit.

Verum non satis mirari potui, eundem auctorem (r), in fine ejusdem capituli, ubi dixerat, se sine ulla haesitatione Sectionem Caesaream instituturum, si necessitas illam postularet, habere sequentia: *Metus, ne approbarem crudelē hanc operationem, & animos adderem aliis Chirurgis, ut illam tentarent ad exemplum Ruleau, facit, ut protestor, me, licet versarer in tali casu, ubi crederem illam absolute necessariam esse, simulque adesse optimam spem feliciis successus, tamen nunquam illam tentaturum.* Longe crudelior videtur illa operatio, ubi caput infantis, in pelvis angustia immobilis haerentis, quinto jam die, cultro discidit, cerebri partem eduxit, dein, manu in cavum cranii im-

(o) Liv. 2. chap. 32. pag. 352. & seq.

(p) *Peu pratique des Accouch.* liv. 2. chap. 2.

pag. 316. &c.

(q) Liv. IV, chap. XII. pag. 521. & seq.

(r) Ibid, pag. 526.

missa, digitis prehenso cranio, eduxit infantem, membra moventem adhuc.

Certum est hodie per numerosa satis observata, Sectionem Caesaream institutam fuisse, superstitie matre, & post integra sanitate fruente, ac foecunda. Alia occasione ad §. 170. 3., ubi de vulneribus lethalibus agebatur, bini casus memorati fuerunt Sectionis Caesareae feliciter tentatae, in quorum uno obstetrix dissecto utero foetum eduxit. Plura alia collecta habentur observata (s), quae docent, Sectionem Caesaream cum successu administratam fuisse; qualia hic recensere nimis longum foret.

Omnes tamen in eo conveniunt, periculosam esse hanc operationem, adeoque non adhibendam, si alia methodo liberari gravida posset. Considerando autem partuum Caesareorum historias, patere videtur, saltem in quibusdam institutam fuisse hanc operationem, dum adhuc alia in arte auxilia superebant, quibus cum fiducia quis uti potuisset. Sic legitur, ob concreta pudenda, abdomen dissectum fuisse gravidae, ut foetus educeretur: sed certe tutius scalpello haec concretio tolli potuisset; uti ex ante dictis constat. Eadem operatio instituta fuit, dum natibus prodiret infans duplicatus: notum autem est, talem situm infantis ab artis magistris nequidem inter laboriosos partus numerari, cum saepe facile sic prodeat infans. Plures leguntur casus mulierum, quae, Sectionem Caesaream passae, postea feliciter pepererunt, & saepius quidem: certe in his non potuit culpari mala pelvis conformatio, quae non emendatur hac operatione. De aliis legitur, quod saepius passae fuerint hanc operationem, dum absque hac parere non potuerint: in his procul dubio pelvis nimis angusta fuit, quam ut foetum adultum transmittere posset. Quamdiu in populosissima Amstelaedamensium urbe paucis tantum notus erat *Vetus Roonbuisianus*, illi soli feliciter caput incuncatum foetus liberabant ab his angustiis; quod aliis vel nunquam succedebat, vel rarissime, & non nisi foetu jam mortuo. Cum ergo egregiis inventis adeo aucta fuerit a *Roonbuisio*, *Levreto*, & aliis, ars obstetricis; sperandum est, rarius occurruram esse necessitatem Caesariae Sectionis; praecipue, si salutari lege caveatur, ne artis imperitae mulieres obstetricis munere fungantur, quae toties sua inciticia naturalem partum mutant in difficillimum.

Sectio ergo Caesarea locum habet, ubi de impossibilitate partus alio modo perficiendi constat: hanc autem *Levret* (t) in nimia pelvis angustia ponit, tali nempe, ut obstetricans manum in pelvis cavum deducere nequeat, vel saltem illam, postquam pedem infantis arripuit, retrahere non possit.

Praeterea, si utero rupto, uti ante dictum fuit, totus infans in cavo abdominis haereat, tunc partus impossibilis est, & sola superesset Sectio Caesarea: sed si considerentur symptomata pessima, quae uteri rupturam comitari solent; animi deliquium, pallor cadaverosus, frigus extremorum, pulsus deficiens, sudor frigidus; quem saepe brevi mors sequitur; quis audebit hanc ope-

(s) Académ. Royale de Chirurg. Tom. I. pag. 623. 650. Tom. 2. pag. 308. 450.
Cangia mila Embryol. sacr. Lib. 3. Cap. 1. pag. 113. & seq. (t) L'art.
des Accouch. §. 653. pag. 107.

operationem tentare in ancipiti adeo statu; quae tamen illico institui deberet, ut proderet. An unquam parturiens, parentes, adstantes admittent in arena captum consilium? An invenietur Chirurgus adeo obfirmati animi, ut illam perficiendam in se susciperet? summo jure has difficultates movet egregius *Levret* (v).

De conceptibus illis, qui extra uterum facti sunt, in ovario, tubis Fallopianis, &c., postea adhuc dicendum erit: facile autem patet, illos naturali via educi nunquam posse: unde & pro illo indicaretur Sectio Caesarea. Verum, uti optime monet *Levret* (v), ut gravis adeo operatio instituat, certo constare debet, foetum non in utero, sed extra uterum haerere. Signa autem Diagnostica, quae plenam hic dant certitudinem, haecenus deficiunt.

Licet autem, ut foetus in lucem edatur, requiratur proportionata pelvis amplitudo ad caput transmittendum, partus etiam difficillimus reddi potest, quamvis pelvis bene constituta fuerit, si caput foetus solito majorem magnitudinem habuerit; quae si talis foret, ut nullo modo transire posset, sola Sectio Caesarea opem ferre posset (x), praesertim, si a calcitracione foetus, in his angustiis haerentis, metus foret rupturae uteri. Verum, cum constet multis observatis, vasta etiam robustorum infantum capita sensim transpressa fuisse, vel forcipe, vel & *Veste Roombuyfiano* protracta cum non tantum ossa capitis foetus cedere, sed & supra se mutuo scandere, possint; cum praeterea constet ex ante dictis, in difficillimo partu ipsa pelvis ossa a nexu mutuo recedere, & viam ampliorem reddere, non videtur facile haberi posse omnimoda certitudo impossibilis transitus; quae tamen requiritur, ut periculosa adeo operatio, qualis est Sectio Caesarea, instituat. Hydrocephalo affectos infantes natos fuisse, constat, non tantum vivos, sed & per plures menses superstites (y): ipse aliquoties vidi tales, ut mirarer, quomodo per pelvis cavum transire potuerint. Verum tamen est, satis flexilia esse plerumque in hydrocephalo calvariae ossa, & totum caput facilius posse elongari, sicque melius ad transitum adaptari. Videri possunt & illa, quae ad §. 1217. de hac re habentur.

De Methodo autem Sectionem Caesaream perficiendi scripsit *Rouffetus* (z), cujus tractatus, gallica lingua scriptus, raro inveniri potest; sed hunc *Casparus Baubinus* Latinitate donavit, & invenitur in collectione *Gynaeciorum*. Optime & omnia, quae partum Caesareum spectant, collecta habentur apud *Celeb. Heisterum* (a). His addi merentur, quae *Levret* de operatione Caesarea habet (b).

(u) L' Art. des Accouch. §. 653. pag. 97.

(v) Ibid. pag. 108.

(x) Crantz

de utero rupto pag. 30. 32.

(y) Ibid. in notis.

(z) Isr. Spachii pag. 476.

(a) Institut. Chirurg. Part. 2. Sect. V. Cap. CXIII. Tom. 2. pag. 755. & seq.

(b) Suite des observations sur les accouch. labor. Artic. IX.

§. 1317. **I**nfantis vitio contingit, ubi ille immobilis, mortuus, vel ita situs, ut ipse sibi claudat portam.

Considerandae jam sunt illae causae partus difficilis, quae non a matre, sed ab ipso foetu pendent.

Antea patuit, praecipuam vim, per quam foetus excluditur, pendere a valida vi contractili uteri, & summis, imprimis circa finem, parturientis nixibus: foetus suis viribus non adeo multum contribuere videtur, nisi quod motu membrorum irritet uterum, ut validissime contrahatur. Quotidianis autem observatis constat, foetus etiam mortuos excludi absque adeo magnis molestiis.

Verum malus situs foetus in utero frequentior causa est difficilis partus: situs naturalis foetus, partus tempore, laudatur ille, ubi vertex capitis directe, una cum orificio uteri sensim magis magisque dilatando, vaginae imminet, ita ut facies os sacrum matris respiciat, occiput ossa pubis, brachia habeat lateribus applicata, pedes sursum elatos. Talem autem situm foetus non semper habuit, sed ultimis graviditatis mensibus in quibusdam citius, in aliis tardius acquirit. Antea enim caput non deorsum, sed sursum haeret (c). Quando autem caput deorsum labitur, tunc dicitur verti foetus; quod in multis circa octavum mensem contingit, in quibusdam, dum jam parturire incipiunt. Unde monuit Hippocrates (d): *Puer autem, ubi circumquaque membranae disruptae sunt, siquidem suo momento in caput inclinet, mulier facile parit.*

Quod si in latus (transversus), aut in pedes prodeat (id enim saepius contingit, si illuc momentum vergat vel propter uteri amplitudinem, vel si mulier in ipso partus dolore primum non quieverit); si sic, inquam, prodeat, difficulter pariet mulier. Jam vero ex his plurimae, vel ipsi foetus vel una etiam cum suis foetibus matres perierant. Alio in loco (e) pariter difficilem pronunciat partum, si foetus transversus in utero jacuerit, aut in pedes exeat: laudat vero, tanquam perutile, si capite prodeat: Ut enim, si quis in lecythum angusti oris olivae nucleum immittat, hunc transversarium educere non facile est; sic sane etiam mulieri gravis est affectio, ubi foetus transversarius fuerit; etenim ipsum exire per arduum: grave vero etiam est, si in pedes prodierit; & plerumque aut matres, aut puelli, aut ambo etiam pereunt. Est autem & haec magna causa, cur non facile exeat, si mortuus, aut sideratus, aut duplicatus fuerit.

Transversum quidem situm foetus in utero omnes adhuc hodie agnoscunt esse difficilem; verum, si per pedes prodeat, vix non pro partu naturali, ac facili habent obstetricantes, & difficiles partus plurimos feliciter absolunt, dum malum situm obtinet foetus, si pedes arripere, & sic extrahere ex ute-

(c) Noortvvyk de utero gravido pag. 208.

(d) De Natur. Puer. Cap. XI. Charter. Tom. V. pag. 324.

(e) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 31. Charter. Tom. VII. pag. 748.

utero possint foetum. Neque etiam pro difficili adeo partu habetur, si duplicatus infans natibus prodeat, modo non nimis torosus fuerit.

Foetus autem, in utero materno haerens, mobilis est, & quamdiu nondum capite, vel alia corporis parte, in ipso pelvis cavo figitur, potest nunc hanc, nunc illam, corporis partem offerre explorantis digitis. Notavit hoc *Deventer* (f), & monuit, mobiles tales foetus raro recte versos prodire, sed saepius in utero jacere transversos, & tunc, aquis jam formati, vel nihil omnino sentiri, vel & quandoque diversas foetus partes successive, manus, pedes, dorsum, &c. Vocabatur *La Motte* (g) ad parturientem, quae justum pariendi tempus adesse credebat: inveniebat os uteri dilatatum ad magnitudinem nummi Imperialis; dolores augebantur, aquae formabantur, & manifeste tangebatur caput infantis, unde brevi secuturum partum augurabatur: sed dolores cessabant, qui vesperi sequentis diei redibant frequentes, & validi; os uteri valde dilatatum, membranae aquas continentes jamjam rumpendae, videbantur. Cessaverunt denuo dolores, & per triginta quinque dies commode se habuit; tunc parturire incepit denuo: verum non amplius tactu percipiebatur caput foetus, nec ulla alia pars, & ruptis violentia dolorum aquis, absque difficultate *La Motte* introduxit totam manum ad carpum usque, tuncque invenit pedem, & manum foetus torosi admodum, ac fortis, quem pedibus arreptum non sine difficultate eduxit; ob magnam nempe corporis molem. Optime hinc concludit, non manere in eodem situ foetus, licet capite deorsum lapso pristinum mutaverint situm.

In Sacris Literis legitur (h) de *Thamar*, gemellis gravida, quod unus protulit manum, in qua obstetrix ligavit coccinum, dicens: ille egredietur prior. Illo vero retrahente manum, egressus est alter; dixitque mulier; Quare divisa est propter te maceria? & ob hanc causam vocavit nomen ejus *Phares*: postea egressus frater ejus, in cujus manu erat coccinum, quem appellavit *Zara*. Verum quidem est, quod gemelli soleant singuli in propria sua amnii membrana haerere, & communi chorio involvi; sed minime videtur impossibile, ut a motu gemellorum in utero rumpatur amnios, imprimis inter partus dolores, & tunc gemelli in eadem cava membrana haereant. Praeterea *Celeberrimus Mery* (i) exhibuit *Academiae Regiae scientiarum* binos gemellos, qui eodem involucro continebantur. Numerosae habentur in *Historia Medica* observationes foetuum inter se concretorum; qui debuerunt certo in eadem membrana cava habitasse: praeterea videmus, plures artis obstetriciae magistros enumerasse cautelas, ut in versione foetuum, dum per pedes educi debent, caveatur, ne singuli gemellorum pedes simul prehensi attrahantur, sicque partus ex difficili reddatur impossibilis. Unde confirmantur illa, quae in *Historia Sacra* leguntur.

Ubi vero foetus extra uterum haeret, tunc partus per solitas vias omnino im-

(f) Nov. lum. obstetric. Cap. 40. pag. 176.
observ. 374. pag. 570.
Mémoire. pag. 116.

(g) Traité des Accouchem. Liv. IV
(h) Genes. Cap. 38.

(i) Acad. de Scienc. 1693

impossibilis est. Antea dictum fuit, in difficili partu foetus quandoque, rupto utero, in matris abdomen delapsos fuisse. Sed & observationes docuerunt, foetus extra uterum conceptos fuisse in tubis Fallopiianis, & in ovaris, illisque locis excrevisse in solitam molem. Sexies feliciter pepererat mulier, & septima vice gravida per sex menses bene se habuit; verum ineunte mense septimo copiosam uteri haemorrhagiam passa fuit: non diu post fuscus foetidus ichor prodiit, & in vagina incepit molestam puncturam sentire: a Chirurgo extracta fuerunt quaedam foetus ossa, & postea adhuc plura: calvaria tamen adhuc integra tactu percipiebatur, nec spes videbatur, illam per aperturam, in laterali parte vaginae observatam, posse exire, nisi putredine ossium cohaesio soluta fuisset. Varia tentata fuerunt incassum, & vomitu, diarrhoea, aliisque malis confecta, ac emaciatissima periit. Prudenti cadaveris dissectione facta, apparuit, tubam Fallopiianam dextram, in saecum distentam, continere reliqua foetus ossa: uterus inveniebatur integer, & sanus (K). Nec adeo rarum esse, foetus extra uterum concipi, & crescere, monetur (l); ubi simul habetur rarus casus foetus inventi, non in cavo tubae Fallopiianae, sed in sacco a membrana exteriori tubae formato: circa umbilicum tumor nascebatur, transsudans serosam materiem; quo dissecto, extrahebatur foetus; sed jam semiputridus. Nulla autem arte servari potuit misera; sed undecima post dissectum tumorem die periit. Notatur autem, quod toto graviditatis tempore nunquam lac in mammis habuerit. Plura alia similia videri poterunt (m).

Sed legitur, & in ipso ovario conceptum factum fuisse, quod a crescente foetu ruptum, una cum copioso sanguine in abdomen effuso, inventum fuit, tubis Fallopiianis, & utero integris (n).

Sponte patet, sola operatione Caesarea tales foetus, extra uterum natos, educi posse. Verum videntur deficere signa, quae deberent certo docere, talem casum adesse: nemo enim prudens hanc operationem suadebit, vel instituet, nisi certus sit omnino, absolute illam requiri. Unde in cadavere mortuae matris hoc detegitur, vel abscessu in variis locis nato, dein aperto, foetus integer, vel putrefacti jam ossa soluta a se invicem, educuntur; quales plures casus in Historia medica habentur.

(K) Anton. Benevoli Dissertaz. &c. pag. 104. & seq. (l) Académ. des Sciences 1714. Hist. pag. 29. (m) Ibid. 1721. Hist. pag. 27. & 1748. in 4. Mémoir. pag. 108. & seq. (n) Philosoph. transact. abrid'gd Tom. 3. pag. 212. &c.

§. 1318. **M**ortuus cognoscitur, si immobilis; si arteriae umbilicales sentiuntur in funiculo umbilicali quiescere, maxime prope corpus infantis; si foetida exeunt; si pondus ingens; si laborat tenesmo; si syncope, horripilatione; halitu graveolente; colore livido; si diu elapsis aquis nondum peperit; si epidermis prompte a cute secedit; si cutis foetus flaccida, facile separanda; ossa mollia, & mobilia.

Agendum jam de signis, ex quibus concludi potest, foetum mortuum esse. Antequam enim hoc cognoscatur, in difficili partu cogitandum semper est de matre, & foetu servandis; ubi vero foetus mortuus est, rudius tractari poterit, & de sola matris salute agitur. Singula ergo expendenda sunt, & sedulo considerandum, qualem certitudinis gradum habeant.

Si immobilis. Quamvis foetum se movere in utero, certum sit, tamen ingens hic occurrit diversitas, non tantum in diversis mulieribus, sed in eadem: novi plures matronas, quae credebant, se foetum mortuum, vel saltem valde debilem parituras, cum vix ullum motum sentirent; attamen prodiit infans vegetus, & torosus. Omnium maxime solent angere gravidae, dum antea frequentes, & validos motus foetus senserunt, si inter pariendum sentiant fere nullos. Verum, si in difficiliore partu, ruptis jam aquis, uterus valide se contraxerit, & infantis corpus arctissime complectatur, motus vix ullus percipietur: poterit infans, in his angustiis haerens, hebetior fieri, animi deliquium levius pati, &c. Unde patet, hoc signum, si solum fuerit, satis incertum esse.

Si arteriae umbilicales &c. In partu naturali, dum caput orificium uteri, propulsis aquis, sensim dilatat, & ruptis aquis, os uteri replet, funis umbilicalis tangi nequit: hinc imprimis locum haberet hoc signum, dum una cum capite, vel alio foetus membro prodit chorda umbilicalis, vel & quandoque sola prolabitur; quod imprimis contingere solet, dum infans transversus in utero jacet. Tunc, si nullus in chorda pulsus arteriarum percipitur, concludi potest, infantem in summo versari periculo quidem, sed de certa morte neque ex hoc signo constat, cum languere possit foetus, & tamen postea reviviscere; uti satis frequentibus observatis constat, vitales prodiisse foetus, dum, versione facta, per pedes extrahebantur, licet in prolapsa chorda umbilicali nullus amplius arteriarum motus perciperetur.

Si foetida exeunt. Foetorem notare corruptionem jam inceptam, negari nequit, adeoque malum quidem signum est, sed non semper notat, foetum mortuum esse: potest enim ab alia causa fieri; unde merito monuit *Manningham* (o), quod *uteri excretiones foetidae non semper infantem mortuum indicant, quum a grumis sanguinis diutius retentis corruptis fieri possint.* Si enim vasis chorii, vel placentae solutis, sanguis exeat, nec libere tamen per os
ute.

(o) Art. obstetric. compend. pag. 23.

uteri elabatur, relictus grumescet, & aëris accessu putrescet satis cito: idem observatur post puerperium, dum grumi sanguinis in utero, quandoque & in vagina retenti, prodeunt admodum foetidi. Praeterea optime notat *Mauriceau* (p), contingere quandoque, ut ex gemellis unus mortuus jam computrescat, dum alter vivus, & sanus est: talem casum se vidisse affirmat in jurisconsulti uxore, quae motum foetus viventis se sentire dicebat, dum ipsi assidens obstetrix mortuum, & putridum testabatur. Ambo verum dixerant; primus enim, qui prodiit ex gemellis, mortuus erat, & corruptus; alter vivus, & vegetus. Sed & malus odor adest, si meconium foetus excreverit, dum adhuc in utero haeret; & acriter insurgit *Mauriceau* (q) contra illos, qui meconii excretionem pro certo, & indubitato signo mortis foetus ponunt; quod certo falsissimum est, cum soleat contingere, quando foetus natibus prodit, & frequenter etiam, dum ob malum situm verti debet infans in utero, ut pedibus arreptis educi possit.

Pondus ingens. Hoc signum imprimis locum habet, dum infans aliquo tempore ante partum mortuus fuerit: si enim per aliquot dies gravida nullum omnino motum infantis senserit, & dein percipiat, dum in hoc, illudve latus se convertit, ac si pondus iners huc, illucve dilabatur, tunc justa suspicio nascitur foetus mortui. Si autem foetus jam pelvis cavum ingressus fuerit, & ibi haerens moriatur, facile patet, hoc signum tunc non habere locum cum in tali casu non possit foetus situm mutare; praecipue, si, aquis elapsis, uterus se contraxerit. Optime *Hippocrates* (*) hoc notavit: *Quum mortuus foetus fuerit, tum aliis signis conjicere licet, tum etiam jubere oportet, ut modo quidem in dextrum latus jaceat, modo etiam in sinistrum convertatur. Dilabitur enim foetus in utero, quocumque se vertat mulier, velat saxum, aut aliud quidpiam, si mortuus fuerit, & pectinem frigidum mulier habet. Quod si vivat, pectinem calidus est, & totus quidem venter cum reliquo corpore decidit, nihilque in eo absque reliquo corpore delabitur.*

Si laboret tenesmo &c. Nititur sic viva mater, infamia saepe, nociturum cadaver expellere. Interim ille tenesmus non semper adest: animi deliquium horripilatio, saepius observantur; & si foetus mortuus jam in utero putrescere inceperit, tunc & halitus graveolens adest. Verum imprimis miramutatio in facie gravidæ observatur, dum mortuum foetum gerit: pallor sublivida, labia imprimis lividum colorem habent, oculi triste quid monstrant, nec solita vivacitate resplendent, licet ignorent gravidæ calamitatem suam. Quod imprimis vidi in nobili illa matrona, cujus ad §. 1306. mentionem feci, quæ bis pepererat infantem mortuum, chorda propria umbilicali in nodum constricta in utero: luctuosus apparebat vultus, licet hilarem se esse testaretur omnibus; post biduum mammae concidebant; postea languere incepit, & levi febricula corripitur; quæ mansit, donec mortuus foetus prodiret.

Sic

(p) *Traité des malad. des femm. gross. Tom. I. Livr. II. chap. XII. pag. 277.*(q) *Ibid. 278. 279.*(*) *De superfoetatione Cap. IV. Charter. Tom. VII. pag. 862. 863.*

Sic vicino funere palluit, uti scitissime *Vanierius* (r) de salicum stipitibus cecinit, quibus fulcire solent hortulani teneras arbusculas;

*Ut mors caeca rapit saepe optima quaeque, salignum,
Exstinctis tilia, atque ulmo, mirabere truncum
Fundere pallentes vicino funere ramos.*

Si diu elapsis aquis non peperit. Haeret enim tunc in magnis angustiis foetus, & ab utero contracto valide comprimitur, cum antea, in liquore amnii haerens, tutus erat ab omni pressione. In periculo mortis tunc versari foetum, agnoscunt omnes; sed nullo modo certum est hoc signum, cum passim observationes doceant, per plures dies in his angustiis haesisse foetus, & tamen prodiisse in lucem vivos.

Si Epidermis &c. Ubi de gangraena, & sphacelo §. 427. 429. antea agebatur, dictum fuit, dum pars corporis in mortem tendit, Epidermidem a cute separatam elevari in bullas ichore plenas: dum incepta putredo in cadavere est, periti Anatomici noverunt, facile separari Epidermidem a suppositis partibus; quo artificio solent uti, ut Epidermidis structuram indagent, & demonstrent. Unde patet, illud signum magni momenti esse, dum agitur de morte foetus.

Multo magis autem, si cutis foetus flaccida, facile separanda. Mollities enim, flacciditas, ad tactus vestigia non resurgens (§. 427. 4.), in parte corporis, numerabatur inter signa gangraenae jam praesentis; si autem his jungeretur cutis separabilis (§. 429. 4.), non tantum gangraenae, five mortis inceptae, sed sphaceli, mortis nempe absolutae, indicium habetur. Si capite praevio in uteri orificio haereat infans diutius in partu difficili, tunc pars capitis aperturae orificii uteri respondens incipit in tumorem elevari, si vivit: ubi autem talis tumor non adest, vel, si adfuerit, flaccescere incipiat denuo, tunc obstetricantes fere desperant de vita foetus. Si caput infantis in exitu haereat, cum non sit tumefactum, est, cur mortuum credas (s).

Offa mollia, & mobilia. Hoc de ossibus capitis foetus intelligendum: notum enim est, calvariam recens nati infantis pro magna parte adhuc membranaceam esse. Quamdiu illa pars membranacea a contento encephalo tenditur, tunc caput resistit: ubi autem post mortem omnia collabuntur, subsident membranae, partes osseae calvariae in foetu vacillant, & facile ad se mutuo accedunt; adeoque, & hoc merito pro malo signo habetur. Unde etiam fit, ut mortuo jam foetu, ossibus mobilibus, caput quidem facilius transeat: verumtamen inde non semper difficilis partus emendatur: nam *Infantis mortui caput, e corruptione emollitum, non aequae, ac vivi, exitum humeris in partu conciliat* (t). Tunc saepe accidit, ut dum capite arrepto infantem educere

ni-

(r) Praed. rustic.

(s) Manningham art. obstetr. compend. pag. 23.

(t) Ibidem.

nituntur obstetricantes, illud a trunco avellitur; qui, in utero manens, difficulter postea educi potest.

Cum autem ex modo dictis constet, omnia haec signa non dare singula plenam certitudinem mortis foetus, patet, magna cautela hic opus esse, ne instar mortui tractetur foetus, qui adhuc vivit. Apud *Hippocratem* legitur (u) de muliere, in quartum, vel quintum mensem gravida, quae, anasarca totius corporis tumens, simul asthmate laborabat adeo molesto, ut decumbere non posset; sed si qua somni incideret opinio, eum sedendo caperet. Fere sine febre erat, foetusque ex longo intervallo non movebatur, ac veluti ad corruptionem tendebat. Per bimestre spatium duravit illud asthma; postea, fabis melle conditis, mellis linctu, & cumino Aethiopico ex vino, usa, melius se habuit. Deinde multa matura, pituitosa, & alba, tussi rejecit, spirandi difficultas desit, & prolem edidit foemellam. Cum autem nulla fiat nec abortus, nec foetus mortui mentio, admodum vero simile videtur, quod vivam puellam pepererit, licet motus foetus in utero non perciperetur, & gravi adeo morbo mater laboraret. Minus prudentes Medici hydropis curam tentassent validis remediis, nullam curam habentes foetus: mitioribus usus *Hippocrates* morbum abstulit, prolem servavit.

Antea enumerati fuerunt aliquot casus foetuum vivorum, uncis crudeliter laceratorum, quia mortui credebantur: plures similes in Historia Medica habentur. Unicum exemplum adhuc adducam, quia ipse *Deventer* (v), adeo prudens in arte obstetricia, fatetur, sibi ipsi contigisse tale infortunium. Vocabatur ad vicinum pagum, ut succurreret mulieri, per plures dies jam parturienti, licet infans in situ naturali foret: intra bidui spatium nec obstetrix, nec mater ullum senserant infantis motum; hinc mortuum certo credebant; neque aliud se colligere potuisse, *Deventer* fatetur: unde matri servandae intentus rudius tractavit infantem, qui tandem in lucem prodiit vivus, & per paucos dies adhuc superstes fuit. Duo, vel tria in capite aderant tubera, ex nimia compressione nata, quod maxime dolebat. Subjungit autem sequentia: Fateor, hunc errorem totidem inde annis documento mihi & fuisse, & fore posthac, dum spiritus hos regit artus, ne unquam infantem, ut mortuum tractem, testimonio parturientis, aut obstetricis persuasus. Imo de proprio sensu diffidens, nihil ratum habens, praeter supremae capitis cuticulae dissolutionem, quae quidem ibidem haud facile dissolvitur, quia mediantibus capillis adhaeret; neque infantem ulterius sine maximo labore tangere licet. Monet autem, difficiles illos casus tunc imprimis contingere, quando nimis magnum caput, vel pelvis angustior est. Cum autem ars obstetricia novas suppetias acceperit per recentiorum inventa, multum sperare licet, etiam in difficillimis casibus, uti patet ex illis, quae ad §. 1316. dicta fuerunt. Monet, similem in partu difficultatem obtinere, si propter uterum obliquum infans in meatu, instar cubiti incurvato, haeret. Verum de hac re statim dicetur. Unde hoc tempore, dum ars obstetri-

(u) Epidemic. VII. aegrot. XI. Charter. Tom. IX. pag. 557.

(v) Novum lum. obstet. Cap. 32. pag. 140. & seq.

tricandi auctior adhuc, & emendatior est, firma manet conclusio, quam *Deventer* (x) habet: *Istiusmodi igitur infantes, de quibus hic sermo est, sive vivi, sive mortui, sola manu obstetricante, non autem instrumentis vulnificis traducendi sunt; quoniam aegre, uti dictum est, certo cognosci potest, vivine, an emortui sint.* Neminem poenitebit unquam, si mortuum foetum in difficili partu tractaverit, ac si vivus foret; sed quantae manent angustiae illos (*perpetuum quatiente animi tortore flagellum*), qui temerario ausu vivum infantem, uncis dilaniatum, protrahunt!

§. 1319. **S**imul ac foetus cognoscitur mortuus (1318.), metu gangraenae, syncopes, mortisque maternae eximendus est, vel per pedes maxime, si fieri queat.

Quamdiu adhuc in membranis clausis haeret foetus mortuus, non tam cito corrumpitur; verum ubi, ruptis membranis, aquae jam effluerunt, liber aëri datur aditus, & tunc in utero calido, ac humido cito putrescit. Sed dum uterus undique contiguus est putrido cadaveri, metus est, ne inde pessime afficiatur, & a resorpto putrido pessima mala sequantur. Dum submersi animalis abdomen rumperetur media aestate, tanta exivit mephitis, ut vix non in animi deliquium ceciderim, dum transirem, licet sanissimus, robustus, & in ipso aetatis vigore essem: non mirum ergo est, si syncope sequatur, dum putrescit in vivente matre cadaver. Imo a resorpto putrido febris mali moris oritur, quae post educatum foetum mortuum pergens matrem necat. Unde merito *Manningham* (y) monuit sequentia: *Mulieres, quae mortuum, & corruptum infantem edunt, febre interim continua laborantes, post partum, paucis interpositis diebus, fere moriuntur.* Unde omnes conveniunt in eo, foetum mortuum quantocyus educendum esse. Notat *Mauriceau* (z), foetum jam per aliquod tempus mortuo, cessare dolores, vel saltem adeo languidos fieri, ut non sufficiant foetui expellendo. Suadet tunc, ut excitentur nixus parturiendi acriori clysmate injecto; quod si non successerit, obstetricantis manu educendum est foetus cadaver potius, quam ut ecbolica dicta remedia exhibeantur, quae calida, acria solent esse, & magnopere nocere possent, vel omnino nugacia sunt, quibus confidere nemo prudens poterit.

Imprimis autem eligitur hodie, ut pedibus extrahatur foetus mortuus vertendo illum, si alio in situ haeserit; de qua versione sequenti numero dicetur. Ubi autem caput inclavatum haeserit, tunc illud retroprimi non potest: unde tunc uncis infixis caput protrahendum jussit *Mauriceau* (a). Hodie forcipe *Levretiano*, vel vecte *Roonhuysiano* feliciter hoc perficitur, & tutius, quam terrifico illo uncorum apparatu. Simul etiam consulitur famae obstetricantis, ne malevolae obstetrices, ut saepe solent, dicant, Chirurgum

oc-

(x) Novum lum. obstet. Cap. 32. pag. 142.

(y) Art. obstetric. compend. pag. 23.

(z) Traité des malad. des femm. gross. &c. Livr. II. chap. 30. Tom. I. pag. 342.

(a) Ibid. pag. 344.

occidisse foetum, quem mortuum uncis protraxit. Quantum autem profecerit in melius *Embryulcia*, manifeste patebit, si videatur methodus, quam commendavit *Hippocrates* (b) ad foetum mortuum educendum. Jussit enim, manus, & humeros abscindi, pectus ad jugulum usque dissecari, costas contundi, dum foetus in utero haeret. In alio loco (c) jubet, ut obstetricans in magno digito unguem habeat, quo humeros a cervice solvat, ventrem discindat; interanea dein eximere mandat, & molles costas contere; ut sic collabens foetus curpusculum facilius educi possit. Similia, imo adhuc crudeliora, alio in loco leguntur (d).

Dum per pedes arreptus foetus mortuus protrahitur, contingit aliquando, imprimis, si jam putrescere incepit, ut toto corporis trunco jam educto, colulum abrumpatur, & caput solum in utero maneat. Plerumque tunc os uteri se contrahit supra caput relictum, & cum illo reascendit, ac quidem tam alte, ut testetur *Celeberrimus Simson* (e), quod quandoque manum ad pedis distantiam, & ultra introducere debuerit, antequam caput tangere potuerit. In tanta capitis distantia a vulva periculosum foret unicos adhibere; & si capitis moles major fuerit pelvis cavo, tunc illud extrahendo, contunduntur partes molles, quae inter caput foetus, & pelvis ossa interjacent; unde multum mali metuendum est. Hinc credidit, utile futurum, si capitis moles minui posset, educto encephalo, & separatis, vel ad se mutuo compressis capitis ossibus. Ut hoc tuto perficere posset, excogitavit anulum (f), cui affixum est scalpellum: anulum hunc applicat secundae phalangi digiti indicis, ita ut scalpelli acies respiciat volam manus: flexo tunc digito ad juncturam mediam, acies scalpelli parallela est primae phalangi, & sic una cum manu introducitur; pollice, & reliquis digitis caput prehenditur, dein extenditur index, & scalpellum imprimitur capiti, sicque apertura fit, cui digiti immitti possunt, calvaria evacuari, & ossa educi: observavit autem, quandoque ossa non tam facile solvi a se mutuo, & separari; verum hoc succedere, si expectetur per aliquod tempus: evacuaverat hac arte calvariam, & solverat unum ex bregmatis ossibus, nec tamen caput educere poterat. Dum lassata esset misera parturiens, & *Celeberrimus Simson* pariter, per trihorium cessavit ab operatione, tuncque facile ossa a se invicem solvere potuit.

Haec sunt praecipua, quae in tristi tali casu tentari poterunt.

Si autem foetus mortuus educi nequeat, putrescet, vicina inficiet, putridum resorbebitur, corrumpet pessime matris humores; sicque post multas miseras toleratas citius, vel serius mors sequi solet. Hinc *Hippocrates* (g) dixit: *At vero, si cui puer immortalis fuerit in utero, neque exierit, humido existente utero, etiam nullum humorem continente, imo quum siccatus fuerit uterus, primum quidem puer intumescit, deinde colliquefcunt, & putrescunt carnes, ac foras effluunt, postremo vero ossa prodeunt, fluorque aliquando illam prehendit,*

nisi

(b) De mulier. morb. Lib. I. Cap. 69. Charter. Tom. VII. pag. 769. 770.

(c) De superfoetatione Cap. 3. Ibid. pag. 862.

(d) De foetus in utero

mortui exsectione Charter. Tom. XII. pag. 550.

(e) Medic. Essays and

observat. Tom. V. part. I. pag. 446.

(f) Ibid. Tab. IV. Fig. 1. pag. 468.

(g) De superfoetat. Cap. IV. Charter. Tom. VII. pag. 862.

nisi prius moriatur. Notum est, cadaver, dum putrescit, tumere, & imprimis circa abdomen; quod optime notavit *Hippocrates*. Si cito in saniem putridam solutae carnes effluant, & validis antisepticis datis cautum sit, ne matris humores corrumpantur, quandoque evaserunt tales, ossibus post soluta per putredinem ligamenta successive expulsis vel per vaginam, vel per anum; gangraena prius nata, & separata, quae partem vaginae, & intestini recti accumbentis consumserat; unde postea, foedo incommodo, faeces tota vita per vaginam exeunt. Talis casus legitur (h) de muliere, quae, quinto mense graviditatis lapsa, animi deliquio corripiebatur, quod sequebatur febris valida, & profusa uteri haemorrhagia, una cum nixibus parturiendi: convaleuit ita, ut posset solitos perficere labores; venter nec augebatur mole, nec subsidebat; subinde dolores sentiebat, quos semper comitabatur haemorrhagia. Octo mensibus elapsis, omnia haec mala augebantur, & finiebantur copioso alvi fluxu, cadaverosi odoris, cum tanta debilitate, in robusta caeteroquin muliere, ut de vita servanda nulla amplius spes haberetur. Post aliquot dies per anum inceperunt prodire foetus mortui membra, brachia primo, dein reliqua, ita ut intra octiduum omnes foetus partes per anum exiverint, excepta sola maxilla inferiori, quae serius prodiit. Perfecte tamen a tanto malo convaleuit.

Quandoque & foetus mortui frustillatim ex umbilici regione exiverunt. Testatur *Bartholinus* (i), se hoc vidisse in muliere, quae gemellos gestare credebatur. Instante partu, post duorum dierum labores, nihil comparuit; post sex hebdomadas credidit, se foetuum motum sentire denuo, qui quinque annorum spatio perduravit; ita tamen, ut sensim illos observaverit constringi, & imminui. Postea intumuit umbilicus, ac disruptus fuit, & primis diebus aqua limpida, mox sanguis, & pus effluxit, cum officulis nonnullis. Sic per umbilici foramen, septem, octove annis patulum, quam plura officula sensim prodierunt; successit dein aliud foramen infra umbilicum, ex quo alia officula infantis, magno cum dolore, quotidie exprimebantur a natura.

Testatur autem *Bartholinus*, quod plura ex his officulis in Musaeo servaverit. Similia & ab aliis observata fuerunt (K). Non sine ratione creditur, saepius foetus, vel integre exeuntes, vel frustillatim eductos, extra uteri cavum haesisse. Gravida, tempore solito gestationis praeterlapso, vehementissime parturit, nec tamen prolem enititur; febre, abdominis doloribus, ventris torminibus, apthis, aliisque diris symptomatibus, affligitur. Postea supra umbilicum apparent vesiculae, gangraenae instantis nunciae, quibus ruptis, ingens humorum prodiit copia, dein portio funiculi umbilicalis siderata, summo cum foetore. Post decem dies sinistra foetus manus ad cubiti flexum usque, per integumenta communia abdominis, jam gangraenosa, prominuit: post biduum, discisso prudenter abdomine, educebatur

foe-

(h) Acad. des scienc. in 4. l'an 1746. Hist. pag. 43. 44.

(i) Epistol. Medicin. Centur. IV. Tom. IV. pag. 99.

(K) Medic. Essays vol. V. part. I. pag. 442.

foetus, non mediocris magnitudinis, integer, foetidus: Difficilius educebatur placenta, quae neutiquam utero, sed finistrorsum tubae Fallopianae, ovariove, inhaerebat. Novem tamen septimanarum spatio integre convaleuit haec mulier a tanto malo, & Medicis atque Chirurgis, qui ejus curam gesserant, monstravit ventrem profunda cicatrice clausum, sed umbilico carentem (1). Hunc casum imprimis selegi, quia omnes, qui adfuerunt, Medicos, & Chirurgos probe novi; de quorum fide, & peritia nullum dubium esse potest.

Quanquam autem plerumque putrescat cadaver foetus in corpore materno relictum, & saepe frustillatim postea exiverit per varia loca, tamen & rari casus docuerunt, quandoque absque corruptione mansisse per plures annos, & sola mole, ac pondere molestum fuisse. Sic legitur (m) de Senonensi muliere, quae, sexagesimo octavo aetatis anno mortua, per viginti septem annos foetum mortuum gestaverat. Sterili in conjugio vixerat diu, & quadragesimo anno signa graviditatis animadvertit: cessabant enim menses, picalaborabat, motum infantis solito tempore percipiebat, mammis lacte turgentibus: absoluto gestationis curriculo, parturire incepit, cum suppressione urinae ad aliquot dies, quae postea ubertim profluxit. Credebatur & aquas ruptas fuisse, excreto simul sanguinis coacti thrombo. Postea conciderunt mammae; motus infantis percipiebatur exiguus, vel nullus; nec unquam partus secutus fuit: per totum triennium misera in lecto decumbere debuit; dein ad finem vitae usque semper languit, de tumore, duritie, gravi pondere, in abdomine pro vario corporis motu nunc in hanc, nunc in illam partem decumbente, conquesta: simul appetitus languebat, quem subinde acetariis, & absorpto omphacio, excitare tentabat. Tandem post tot calamitates, viginti septem annorum spatio toleratas, moritur. Periti Chirurghi, aperto cadavere, invenerunt uterum rugosum, & versicolore, sed simul tactu durum, ostracodermatis instar. Non sine difficultate durus adeo uterus dissecabatur; in cujus cavo inveniebatur foetus, transversim positus, & in orbem complicatus. Insolito spectaculo obstupfacti Chirurghi Medicos advocant, ut testes, & iudices forent; ut autem melius totum examinari posset, omnem illam molem manibus, & uncis extrahunt, domumque ferunt; quod non absque magna vi fieri poterat. Invenierunt in duro hoc utero foetum, ad coxam dextram, ad nates, & ad partem spinæ dorsi, omnino accretum uteri cavæ superficiei: ossa capitis tenuia quidem, sed firma, & instar cornu nitentia, cute capitis in multis locis pilosa: sinistra manus in pugnum adeo firmiter erat contracta, & summi digiti ita palmae haerebant, ut, licet apparerent seriatim inter se distincti, reipsa tamen in unum, idemque corpus vere lapideum concrevissent. Dextrum brachium ad umbilicum manum extendebat, quae ad carpum inadvertenter excisa fuit, & in alvo matris relictæ. In genere, *facto ex oculis, & tactu fudicio,*

(1) Cornel. Trioen observat. Medic. Chirurg. facic. pag. 64. & seq.

(m) Maur. Cordaei rhemi comment. VII. in Lib. I. Hippoc. de mulier. apud Spach. in Gynaec. pag. 740.

cio, totum istud opus Phidiae alicujus esse dixeris, qui vel ex ebore, vel ex marmore maturae aetatis embryi absolutissimam imaginem expressisset, maxime cum in ea duritie corpusculi moles non concidisset, imo cum cute nitida integram suam συμμετρίαν, & πολυχρόνιον retinuisset. Partes autem internae, viscera nempe omnia, cor, & cerebrum habebant naturaliter, eo dempto, quod ultra modum induruerant (minus tamen quam externae); ita ut hodie exertum illud corpusculum neque putredinem minetur, neque teredinem. Cum autem milleni testes hunc foetum viderint, & manibus tractaverint, de facti veritate nullum superesse potest dubium. Caeterum Lithopaedion illud Senonense figura adumbratum habetur (n), & satis rudi.

Sed & alia historia legitur (o) de foetu, qui per quadraginta sex annos latuit in alvo materna. Foemina nempe, quadragesimo octavo aetatis anno, omnia signa graviditatis sensit, tandemque partus dolores per septem septimanas toleravit, qui balneis adhibitis cessarunt quidem, sed abdomen tumidum remansit, absque dolore, solo pondere molestum. Postea adhuc duos infantes peperit sanos. Post mariti obitum quadraginta adhuc annis vixit; cumque semper se adhuc gravidam crederet, voluit, ut post mortem secaretur tumidum abdomen.

Rudi satis manu cadaver secuit Chirurgus, & ex abdomine magnum satis globum eduxit; quem, cum durus admodum esset, securis ictu aperuit. Cum in thesauro serenissimi Ducis VVirtembergensis servari deberet, relictus fuit in eodem statu ille globus. Per fissuram autem securi factam distinguere potuit Celeberrimus Camerer, in Tubingensi Academia Medicinae Professor, foetum, in hoc globo contentum, cujus caput difforme erat, pectus admodum complanatum; & quamvis foetus ille adhuc satis flexilis esset, tamen non foetebat. Involucrum autem, foetum continens, durum valde, cartilagineum, imo osseum, apparebat in omni ambitu, excepta illa parte, per quam adhaeserat cuidam abdominis loco; ibi enim major erat mollities, & adhaeserat carni crassae, ac rubicundae. Celeberrimus Camerer merito credidit, foetum illum in tubarum alterutra conceptum increvisse, cum mater postea binos adhuc infantes pepererit.

Foetum autem hunc, Lutetias delatum jussu serenissimi Ducis VVirtembergensis, vidit Celeberrimus Morand (p), qui simul recenset historiam foetus mortui, per triginta, & unum annos gestati. Plura Ibidem, lectu dignissima, de foetibus in matris corpore diu latentibus habentur.

§. 1320. **S**itus infantis redigendus est in eum, quo foetus possit educi vel per caput, vel per pedes imprimis.

Qualis sit situs infantis in partu naturali, ad §. 1317. dictum fuit; adeoque, si sic positus fuerit foetus, ut ipse sibi portam claudat, tunc situs ille mu-

(*) Maur. Cordaei rhemi comment. VII. in Lib. I. Hippoc. de mulier. apud Spach. in Gynaec. pag. 478. (o) Académ. des Scienc. l'an 1721. Hist. pag. 43. (p) Acad. des Scienc. l'an 1748. in 4. Mem. pag. 113.

mutandus erit, & reducendus ad naturalem. Imprimis hoc monendum est, ne dentur unquam stimulantia calida remedia in partu difficili, qui ab hac causa pendet. Urgent horum exhibitionem parturiens, adstantes, obstetrices, si minus peritae fuerint. Interim certum est, partus dolores eo plus nocere & matri, & foetui, quo validiores, ac frequentiores fuerint, si foetus sic situs sit, ut transire non possit. Leve refrigerans cardiacum, loco validi stimulantis remedii, prudens Medicus dabit, ut videatur aliquid agere, sicque querulae parturientis animum erigat, dum omnia disponuntur, ut perita manu situs perversus foetus mutetur. Magnae utilitatis autem est, si cito cognoscatur, foetum in malo situ haerere. Quando naturali in situ, praevio capite, foetus urget os uteri, illud sensim inter nixus parturientis dilatatur, & membranae, ante caput infantis positae, aquis collectis turgere incipiunt, formantque tumorem rotundum, tensum, dum dolor partus adest; flaccidiorem vero, ubi dolor remittit. Sic sensim, vi aequabili, magis magisque dilatatur os uteri, & ad felicem partum disponitur. Unde monent omnes periti artis obstetriciae, ne cito aquas, formari incipientes, rumpat obstetrix, nondum satis dilatato uteri orificio. Contingit enim aliquando, felici partu, foetum adhuc membranis suis inclusum prorumpere. Ubi autem aquae adeo distenderunt membranas, & os uteri jam adeo dilatatum fuerit, ut caput infantis, pone aquas haerens, in os uteri delabi possit, totamque ejus amplitudinem implere, tunc aquae rumpi poterunt; quod facile fit, si doloris tempore digito premat tumentes membranas obstetrix, vel easdem, digitis arreptas, leviter circumtorqueat. Si vero admodum tenaces fuerint hae membranae, scindi possunt, sed cum cautela, quia, erumpentibus aquis, caput foetus saepe proxime sequitur. Inter difficilis partus causas *Moschion* (q) ponit, si membranae nimis tenues rumpantur citius, sicque effundatur ille humor, qui ad lubricum lapsum (*δια το ὀλισθημα*) foetus praeparatus erat. Postea *Mauriceau*, & alii idem monuerunt.

Si autem uterus recte positus fuerit, id est, si orificium ejus directe respondeat vaginae, & aquae formentur acuminatae, oblongae, tunc signum est, infantem male situm esse, neque capite praevio prodire (r). Quandoque tamen caput non admodum remotum est ab uteri orificio; tunc autem jubet sequentia: *Si invenerit uterum recte positum, & humores in longitudinem expansos esse; si modo manum, modo pedem, aut etiam caput aliquatenus tangere potuerit, tunc opportunum tempus non negligat, judicans, satis protuberare aquas, & tactu caput aliquatenus sentiens, ocyus membranam unguibus confringat, & protinus digitis caput in ostium dirigat, obstaculis quibuscumque, manus scilicet, pedis, funiculi umbilicalis remotis; quod tum facile fieri poterit, quia satis spatii suppetit. Capite hoc pacto in ostium inducto, non est, quod obstetrix metuat, idem inde recessurum esse; humoribus enim effluxis, infanti in utero recto spatium*
non

{ q } Spach. Gynaec. pag. 19. 150.

{ r } Deventer. nov. lum. art. obstetric. Cap. 40. pag. 177.

non est, sese huc, illuc vertendi; quia uterus statim contractus infantem undique comprimit. Imo, quando aquae jam dudum effluxerunt, adeo arctatur uterus, ut difficulter verti, & in alium situm redigi possit; dum simul omnia sicca sunt: de hac difficultate conqueruntur omnes, qui de re obstetricia scripserunt, & hinc sedulo monent obstetrices, ut cito, si absolvendo partui se impares credant, peritum obstetricantem in auxilium vocent. Foetus enim in periculo versatur, parturiens debilitatur, si aquae jam dudum effluxerint, antequam tentetur foetus versio: & major vis ipsi utero applicari debet, dum in illo, jam contracto, & sicco, situs foetus mutari debet.

Veteres Medici putaverunt, foetum in utero satis mobilem esse; hinc tentaverunt, mutare situm perversum foetus, dum parturientem concutiebant subito, & satis valide. Sic Hippocrates (s), dum tentabat, vertere foetum, ut in caput prodiret secundum naturam, suadet sequentia: *Supinae reclinatae molle quidam coxis substernere oportet, atque etiam lecti pedibus aliquid supponere, quo altiores a pedibus decumbentes esse queant. Sed & coxae capite sint altiores, nullum vero capiti cervical subsit. Ad ea prospiciendum; quum vero retrusus fuerit foetus, & huc, & illuc circumagatur, sublatis lapidibus, pedibus lecti suppositis, & eo quod coxis subditum fuerat, & lectum, & coxas in pristinum statum restituito, capitique pulvinar supponito.* Patet satis, quod perversum foetus situm mutare in naturalem tentaverit hoc modo Hippocrates. An autem voluerit, situm infantis naturalem efficere, dum subducuntur fulcra lecti pedibus supposita, concussu quodam facto, an vero crediderit, illum jam adesse, dum removebantur haec, dubium videri potest. Cornarius enim haec verba, καὶ κατὰ φύσιν καδισαδαί, retulit ad praecedentia, quae de situ foetus agunt; Foësius vero, & Charterius, crediderunt, pertinere potius ad situm parturientis restitutum. Sed alia loca Hippocrates videntur docere, quod a concussione parturientis mutationem situs foetus expectaverit. Praecedenti enim capite (t), simili concussione, dum partus dolores urgebant, promoveri partum conabatur. Praeterea alibi (u), cum parturienti mulieri foetus transversus ceciderit, habet sequentia: *Concutere autem hoc modo oportet: Super tenui linteo substrato mulier reclinanda, alio superinjecto, quo ejus pudendum obveletur, & utrumque crus tenui linteo tegendum, & utraque manus. Duae autem mulieres utrumque crus apprehendant, & aliae duae utramque manum; deinde eam ipsam non minus quam decies valide concutiant. Postea vero mulier in lectum reclinetur, ita ut caput deorsum, crura autem sursum, habeat, & mulieres omnes, dimissis manibus, crura apprehendant, eamque crebro in lecto concutiant; facta in humeros rejectione, ut in ampliorem locum concussus foetus convertatur, & naturaliter prodire possit.*

Foetum, quamdiu aquae nondum effluxerunt, satis mobilem esse, & nunc hanc, nunc illam partem in uteri orificio tangi, antea dictum fuit. Deventer (v)

(s) De Mulier. morb. Lib. I. Cap. 68. Charter. Tom. VII. pag. 769.

(t) De foetus in utero mortui exsectione. Charter. Tom. XII. pag. 551.

(u) Ibid. pag. 768.

(vv) suo testimonio idem confirmat, simulque monet obstetrices, quod *Infantes isti mobiles raro recte versi prodeant*. Verum, aquis jam elapsis, contractus uterus foetum undique stringit, & nullo concussu situs ejus mutari facile poterit. Praeterea validis illis concussionibus metuenda foret solutio placentae ab utero, & inde periculosa haemorrhagia. Unde hodie Veterum haec methodus omnino exulat, & adhibetur perita obstetricantis manus ad mutandum situm infantis ita, ut exire possit, capite praevio, vel, si hoc fieri nequeat, pedibus educatur.

Dum enim perverso situ haeret in utero foetus, non semper potest in talem situm reponi, ut capite praevio prodeat: tantum obtineri poterit hoc, si caput non multum distet ab uteri orificio, ita ut obstetricantis digitis facile tangi, & ex situ moveri possit. *Mauriceau* (x) indignabatur Medicis, quod generale praeceptum dederint, situm perversum infantis mutandum esse ita, ut fiat naturalis omnino; cum hoc saepius impossibile sit, neque absque periculo infantis, & matris tentari possit. Unde ille pro generali regula in arte obstetricia posuit, in quovis situ perverso foetus pedibus educi debere: cui asserto optimi, & peritissimi obstetriciae artis magistri hodie adstipulantur.

Hoc tempore, si infantis pedes primo prodeant, non habetur pro partu praeternaturali, neque periti illum difficilem credunt, cum constet, illum satis cito absolvi posse, & absque periculo matris, vel infantis, si reliqua omnia se naturaliter habeant. Imo jam apud *Moschionem* (y) leguntur sequentia: Reliquis infantis positionibus praefertur quidem, *Quoties in caput feruntur, ita ut in orificium matricis directum caput ejus inveniatur, manibus scilicet, & lateribus, & femoribus junctis*. Proximum vero bono schemati est, *quoties & in pedibus descendit junctis, & orificio matricis oppositis, manibus scilicet per latera porrectis*.

Verum tamen est, ubi infans per pedes educitur, manus, & brachia vix unquam manere exporrecta secundum corporis latera, sed sursum elevari, dum truncus corporis transit per uteri orificium; unde postea brachia una cum capite transire debent, atque ita sua mole transitum capitis reddunt difficiliorem. Fatetur *Deventer* (z), omnes auctores postulasse, *ut brachia successive producta juxta corpus ponantur*; ego tamen contrarium sentio, & experitus sum in hac, aliisque rebus plurimis; quapropter brachia juxta caput relinquenda esse, confidenter suadeo, simul cum capite excludenda. Parturiens quidem, fateor, infantem omni nisu propellere tenetur, sed nubecula est cito transitura. &c. dein addit sequentia: *Mihi sane hoc modo res semper prospere successit; huic ergo praxi porro inhaerebo, quia periculum non est caput ab humeris avellendi, quod Paulo Portaali, aliisque (uti ultro ipsi fatentur) saepius contigit: neque mirum hoc est; brachiis enim juxta corpus detractis, os uteri instar laquei, vel tendicu-*

(vv) Nov. Lum. art. obstetric. Cap. 40. pag. 176.

femm. gross. liv. 2. chap. 21. pag. 314.

Cap. XI. Spach. Gynaec. pag. 10.

pag. 198.

Tom. IV. pars II.

(x) Traité des malad. des

(y) Harmon. Gynaec. pars prior

(z) Nov. Lum. art. obstetric. Cap. 40.

diculae contractum, & conclusum, non raro praefocat infantem, aut si jam defunctus sit, & tenellus, caput facile avellitur, quod in utero remanens uncis dein ferreis extrahendum est.

Si tamen caput infantis magnum fuerit, vel totus infans torosus, certum est, magnam satis vim adhibendam esse, ut caput cum brachiis simul transire possit; quod certe periculo carere non videtur. Ubi autem contrarium obtinet, tunc talis eductio tentari posset. Unde videmus, plures, qui post *Deventer* scripserunt, & quidem in arte peritissimos, consuluisse, ut brachia detrahantur, dum infans usque ad axillas protractus fuit; licet non semper, sed saepius hoc requiri, dixerint (a).

Caeterum observavit *Levret* (b), ex viginti infantibus, qui obliquo situ in utero locantur, vix unum reperiri, qui versus sinistrum uteri latus declinet. Causam autem hujus rei nondum detegere potuit.

§. 1321. **I**D efficitur 1. positu Matris debito. 2. mutatione situs infantis.

1. Duplici modo considerari potest situs puerperae, vel quatenus favet partui naturali, ut facilius prodire possit, vel etiam, dum per mutatum situm parturientis ars conatur emendare malam uteri posituram, aut majorem conciliare facilitatem, ut perversus infantis situs mutari possit. In partu naturali talis situs requiritur, ut obstetrix commode manus admovere possit, dum parturienti opem ferre debet, simulque nullum impedimentum sit, dum os coccygis in transitu capitis infantis retrocedere debet. Cum autem plures tales situs esse possint, satis magna diversitas in variis locis observatur, neque mulierculae facile a consueto more recedent. Optime monet *Levret* (c), in omni fere situ partum feliciter absolvi posse, si omnino naturalis fuerit; unde non oportet nimis morosum esse, si hunc, illumve situm parturiens praetulerit reliquis. *Latona*, ambabus ulnis palmam circumplexa, genua fixit in molli prato, sicque *Phoebum* in lucem effudit (d). Rusticas parturientes hunc situm praeferre, notat *Mauriceau* (e); sellam parturientium desiderant aliae, cujus figura habetur (f). In lecto ut pariant, laudat *Mauriceau* (g), & alii plures, ut partu absoluto statim quiescere possit puerpera, neque opus sit, illam ex sella parturientium in lectum deferre. Muniebatur autem linteis complicatis lectus, ut cruor, aliaeque sordes commode auferri possent. Apud ditiores solent binos lectulos, sibi mutuo contiguos, sternere, ut commode aliquot post partum horis in lectum purum, siccum, calidum puerperae reponi possint, nec cogantur diu in his sordibus decumbere. Praeter-

(a) *Levret art des accouchem.* pag. 116. *Cranz Emleitung in die hebammenkunst.* pag. 62. (b) *Ibid.* pag. 105. (c) *Art des Accouchem.* pag. 110.

(d) *Homer. Hymn. in Apoll. Spondan.* pag. 347. (e) *Traité des malad. des femm. gross. liv. 2. chapit. VII.* pag. 244.

(f) *Deventer. Nov. lum. art. obstetric. Chap. 26.* pag. 90.

(g) *Ibidem,*

terea ad partum absolvendum laudatur, si lectus durior sit, ne in molliori lecto fovea imprimatur, quae coccygis ossis retrocessionem, & obstetricis manipulationem impedire posset: unde *Mauriceau* (b) commendat, lectum sternere culcitris, quae pilis equinis fartae sunt, non vero plumis: eandem cautelam in difficili partu, qui obstetricantis manu absolvi debet, laudat *Levret* (i). Post partum autem conducit molle stratum. Pulcre hoc notavit *Moschion* (k), volens, ut bini sternantur lectuli; quorum unus durior utilis est, dum in lecto parturiunt; alter vero molliter stratus servit post toleratos partus labores.

Antea dictum fuit, uterum gravidum sensim magis magisque extendi, & simul adscendere ultra pelvis limites in cavum abdominis: hoc autem imprimis obtinet in uteri fundo, qui ejus pars superior est, & quandoque, uti dictum fuit, ad ventriculum usque adscendit. Facile intelligitur, uterum, adeo distentum, in abdomine declinare posse in alterutrum latus, vel & antrosum prolabi, si abdomen propendulum fuerit, dum pessimo more loricis stringunt abdomen gravidae, sicque liberum adscensum tumentis uteri impediunt. Optime autem notat *Levret* (l), fundum matricis non posse retrorsum labi; obstat enim columna vertebrarum, quae naturaliter introrsum hic prominet: tantum ergo locum habere potest, ubi mala spinae conformatio adest, quae extrorsum prominere fecit lumborum vertebrae. Patet simul, declinante sic fundo uteri, ejus orificium in oppositam partem vergere, neque directe respondere vaginae; unde partus difficilis sequi poterit.

Antea ad §. 1290. patuit, hanc uteri deviationem a Veteribus Medicis cognitam fuisse, illamque habuisse quandoque pro causa suppressionis menstruum; quando nempe os uteri non directe respondebat vaginae, sed oblique positum sic apprimebatur vicinis partibus, ut minueretur ejus apertura, vel & integre obturaretur. Dictum fuit tunc etiam de methodo, qua *Hippocrates* usus fuit, ut perversum uteri orificii situm mutaret in naturalem. Si autem floris menstrui excretio ab hac causa impediri potuit, sponte patet, difficilem partum ab eadem causa debere fieri. Colli, & orificii uteri declinationem variam descripsit & *Moschion* (m), monuitque, obstetricem digito hoc explorare posse, variaque recenset symptomata, prout os uteri has, illasve partes premit. Interim verum est, raro, vel nunquam, antequam *Deventer* scripserat, de perverso orificii uteri situ, tanquam partus difficilis causa, mentionem fecisse auctores, neque excussisse hanc rem pro dignitate, sed malum situm infantis in utero fere solum culpasse: ob hanc rationem librum suum *Lumen novum obstetricantibus* exhibere dixit, & queritur (n), plerosque, hanc sententiam non admodum fide dignam habituros esse; alios item nasutos, eandem ridentes, tanquam falsam, & novam rejecturos.

Postea optimi de arte obstetricandi auctores eandem sententiam confirmave-

(b) *Deventer Nov. Lum. obstetric. cap. 26. pag. 90.*

(i) *L'art des Accouchemens*

pag. 113.

(k) *Sphac. Gynaec. pag. 4. N. 48.*

(l) *L'art des accouch.*

pag. 37.

(m) *Spach. Gynaec. pag. 18. N. 141.*

(n) *Deventer Cap. XI.*

pag. 47.

verunt; & *Levret* (o) posuit, praecipuam causam obliquati uteri pendere a loco, cui placenta adhaeret. Quamvis enim illa ut plurimum fundo, aut posteriori parti uteri accrescat, tamen constitit observatis, placentam omni loco cavi uteri accrescere posse, ne quidem circumferentia orificii uteri excepta. Cum autem placenta septem, vel octo pollicum diametrum habeat, & pollicem crassa sit, patet sponte, uteri substantiam, cui placenta nectitur, augeri mole; unde fundus uteri, libere in abdomine haerens, declinabit versus illam partem, cui placenta nectitur, secundum gravitatis legem, simulque collum uteri, ejusque orificium tendet, ob eandem rationem, versus partem directe oppositam. Sic si placenta haereat laterali parti dextrae uteri, tunc ejus fundus declinabit versus regionem Iliacam dextram, collum vero haerebit in parte opposita. Hinc patet, tunc tantum imminere uterum directe pelvi, quando placenta ejus fundo, vel parti posteriori accrevit, si gravidæ corpus bene conformatum fuerit: idem fiet, si placenta accreverit orificio uteri, quod raro contingit; & fere semper tunc in fine graviditatis sequitur haemorrhagia uteri.

An tale quid indicavit *Hippocrates* (p), dum dixit: *Si cui secundae pueri in utero exeant, priusquam puer foras prodire incipiat, difficile parit, magisque periclitatur, nisi caput praecedat?* Si enim placenta, orificio uteri accreta, prius prodeat, profusa sequitur, & periculosa haemorrhagia: ubi autem caput infantis statim sequitur, & obturat orificium uteri, sanguini praeccluditur exitus. In textu quidem legitur *χαρίων*, quod pro extrema foetus membrana sumi saepe solet; sed monuit *Galenus* (q), hoc vocabulo etiam significari secundinas (*τὰ ὕστερα*); sub quo nomine etiam placenta continetur.

Saepe haec uteri declinatio visu, & tactu abdominis in muliere gravida detegi potest, dum in hoc, illove latere fundus uteri declinans ventrem attollit in majorem tumorem; imo ipsae gravidæ solent dicere, quod foetum in hoc, illove latere gerant, dum & majorem molestiam a compressione, vel distractione vicinarum partium sentiunt, & motum foetus magis percipiunt in illo latere, versus quod uteri fundus declinavit. Utile autem est haec novisse, ut postea, partus tempore, mutato parturientis situ, hoc emendari possit. Semper enim partus difficilis expectandus erit, si uteri orificium non respondeat directe vaginae; imo quandoque partus omnino impossibilis erit, quamdiu haec fundi uteri positura non mutetur. Si enim fundus uteri antrorsum delapsus fuerit collum, & orificium uteri angulum rectum cum vagina facient, collum vesicae comprimetur, ut nihil urinae exire possit. Quomodo autem, & qua encheiresi situs fundi uteri mutari possit, ut felix sequatur partus, apud *Deventer* (r) videri poterit, qui fuse satis de his egit; quibus & addi merentur illa, quae apud *Levret* (s) habentur.

2. Na-

(o) *Traité des Accouchem.* pag. 36. & seq.(p) *De superfoetati.* Chap. I. Char-

ter. Tom. VII. pag. 861.

(q) *Comment. in Aphor.* 49. Sect. V. Charter.

Tom. IX. pag. 224.

(r) *Cap. XLVI. & sequent.* pag. 201. &c.(s) *L'art des Accouch.* pag. 103. 110.

2. Naturalis situs infantis est, ut capite praevio, facie os sacrum matris spectante, prodeat: ubi autem a situ hoc naturali deviat infantis positura in utero, debet haec mutari, si fieri possit, uti dictum fuit; vel, si caput nimis distet ab uteri orificio, pedes quaerendi sunt, ut his arreptis perita manu protrahi possit infans. Hoc obstetricantes vocant *vertere infantem*. Quandoque contingit, ut pedibus primo prodeant; aliquando & aliae corporis partes in uteri orificio tactu percipiuntur.

Facile autem intelligitur, necessarium esse, ut distinguantur partes, quae se offerunt, ut obstetricans dirigat manum utero immissam, dum pedes quaerit. Qua autem encheiresi, & quibus cautelis opus sit, ut infantis versio tuto fiat, apud auctores artis obstetriciae, toties jam laudatos, legi poterit, imprimis apud *Leuret* (t), ubi omnia summa cum cura habentur descripta. Non enim videtur hujus loci esse, ut haec ad amissim describantur. Simul ac autem constat, infantem in utero male positum esse, & orificium uteri jam apertum est, praestat statim tentare versionem, quae longe difficilius perfici poterit, si aquae jamdudum effluxerint, sicque uterus contractus sit, & ficcus.

Postquam infans in lucem prodiit, nondum ab omnibus liberata est puerpera: membranae enim, in quibus infans haesit, chorda umbilicalis, & placenta, utero accreta, adhuc in cavo uteri haerent; quae omnia debent removeri, ut uterus se contrahere possit, & vasa sanguine distenta evacuari, sicque sensim ad pristinam magnitudinem redire. Omnia haec simul sumpta Graeci dixerunt *τα ὕστερα*; secundinas, quasi secundum partum, ut plurimum vocaverunt alii quoniam quandoque non leves molestias facit secundinarumeductio; unde & multa hic prudentia opus est. Cum autem omnia illa, quae sub secundinarum nomine continentur, foetu jam in lucem edito, nullum amplius usum habeant, hinc inutili hac sarcina statim uterum liberandum esse, voluerunt multi. Sic *Mauriceau* (u) quantocyus secundinas educendas jubet, etiam antequam ligetur, & abscindatur chorda umbilicalis, metuens, ne constringatur os uteri, si mora intercedat. *Deventer* (vv) quidem chordam umbilicalem abscindi prius jubet; sed, hoc facto, *sine mora secundis extrahendis omnis opera impendenda erit*. Imo, si apta ad hanc rem praesto sit alia foemina, suadet, ut illa liget, & abscindat funiculum umbilicalem, dum obstetrix, quae primum infantem sinu excepit bene valentem, vena umbilicali nondum constricta, vel abscissa, ocyus manum immittere potest extrahendae secundinae gratia. Hanc autem methodum praeferebat ideo, quia mox post partum, dehiscens adhuc uteri orificium, & ipse uterus nondum contractus, facile admittit obstetricantis manum, absque ulla vi adhibita, absque dolore puerperae: sic nullum periculum erat, ne, trahendo funem

(t) L'art des accouch. pag. 113-127. Crantz hebammenkunst. pag. 135.

(u) Traité des malad. des femm. gross. liv. 2. chapit. VIII. pag. 248.

(vv) Nov. lum. art. obstetric. pag. 125. Chap. XXVIII.

Tom. IV. pars II.

umbilicalem, fundus uteri inversus protraheretur; simul commode sic nexus placentae cum utero solvi potest, si nimis validus fuerit; & si mola, grumive sanguinis in utero haerent, aut partes lacerae membranarum, omnia haec simul, manum retrahendo, sensim educi poterunt, ne haec diutius relictæ putrescant. Praeterea credebat, se sic simul occasionem habere, ut uterum obliquatum in situm debitum restitueret; unde non protinus retrahebat manum; vel, si secundinam educendo hoc fecerat, denuo illam utero immittebat, & expectabat, donec uterus circa manum contraheretur. Testatur autem, hanc methodum sibi feliciter cessisse.

Alii, & magnae quidem auctoritatis in re obstetricia, viri suadent, non nimis festinandum esse; sed malunt, ut uterus, foetu jam excluso, parum contrahatur prius, antequam tentetur, placentae eductio. Ita consulit *Celeberrimus Monro* (x); & versatissimus in his *Levret* (y) monuit, non tentandam esse placentae educationem, nisi certus sit obstetricans, illam jam sic dispositam esse, ut facile sequatur.

Tunc autem sic se habere illam, creditur, si ante partum, in partu, vel immediate post egressum infantis ex utero copia sanguinis exeat. Signum enim hoc dat, placentam vel integre, vel saltem pro parte a nexu cum utero solutam esse. Quamvis enim tota chorii circumferentia utero gravido nectatur, & vasa quaedam manifeste ex utero in chorium tendentia observentur; unde ab his ruptis, dum protuberant aquae, & partus jam instat, aliqua sanguinis copia exit, sed parcior, uti antea dictum fuit; tamen maxima vasa sunt in illo loco, ubi placenta utero cohaeret. Si ergo copia sanguinis ante partum, in partu, vel immediate post partum prodeat, novimus, placentam saltem pro parte ab utero separatam esse, adeoque merito sperari posse integram separationem, si cum prudentia, & leniter trahatur funiculus umbilicalis. Verum, ubi notabilis copia sanguinis non prodiit, tunc novimus, placentam adhuc tota sua superficie haerere utero, tuncque cautela opus est: rudiori enim tractione inverti posset fundus uteri non tantum, sed etiam, si placenta feliciter sequeretur, subita, & profusa fieret haemorrhagia, ac valde periculosa, nisi uterus, statim se contrahendo, vasorum amplitudinem minueret.

Haec est ratio prudentis moniti, quod *Celeberrimus Levret* (z) dedit, non tentandam tunc esse statim placentae educationem, antequam uterus signa suae contractionis det. Quandoque enim uterus, foetu distendente quamvis liber, flaccidus, & iners collabitur; praecipue post laboriosum partum toleratum, & tunc totum abdomen planum, molle, ac flaccidum tangitur: ubi vero uterus contrahitur, & cavum suum minuit post partum, tactu percipitur in puerperae abdomine tumor pyriformis, satis durus, & circumscriptus. Tunc novimus, uterum valide contrahi; adeoque, educta placenta, non metuitur nimia haemorrhagia.

Un-

(x) Medical Essays and observat. vol. 2. N. XI. pag. 241.
couch. pag. 127. 128.

(z) Ibidem.

(y) L'art. des acc-

Unde statim educendam placentam voluit, si haemorrhagia monstraverit, illam ad exitum paratam esse, ut integre evacuatus uterus se melius contrahere possit, & sic haemorrhagiam minuere: mora enim grumescit sanguis, & magnos thrombos format, qui novo labore indigent, ut exprimantur. Imo, si thrombus talis obturet uteri orificium, & flaccidus uterus se non contrahat, pergit tecta haemorrhagia, & totum uteri cavum sanguine repletur, ita ut puerpera in validam incidat syncopen. Signum periculosi illius status est, si, tangendo abdomen puerperae, uterus apparet amplius, & mollis: solum tunc remedium est, ut manu statim in cavum uteri immissa, educantur grumi, sicque uterus, hoc facto, se contrahere possit, & vasa patula claudere.

Videtur & ipsa contractio uteri conducere ad separationem placentae. Cum enim placentae lobuli ingrediantur sinus uterinae substantiae, contracto utero, illi exprimuntur quasi, & hinc minus haerent. Uteri fabricam indagans *Ruyfchius* (a) dixit, aequae ac vesicam, habere *substantiam fibrosam, crassam, motricem*; sed observavit, *etiam peculiaribus gaudere fibris motricibus, in orbem positis, & quidem eo loco, ubi placenta in statu naturali sese utero applicat, nempe in uteri fundo*. Icone adumbravit has fibras (b): cum tamen postea hanc iconem praeter votum minus accurate delineatam inveniret, sub finem vitae aliam dedit (c). Credebat autem, has fibras servire imprimis separationi, & expulsioni placentae. Cum autem fibras illas tantum inveniret circa fundum uteri, & probe novisset, placentam non semper eidem loco adherere, conclusit, placentam difficilius separari, si extra sphaeram activitatis hujus musculi sita foret.

Hinc videtur concludi posse, educendam esse statim placentam, dum copiosus exit post partum sanguis: tunc enim facile sequi solet, cum saltem pro parte a cohaesione cum utero soluta sit: ubi contrarium obtinet, & uterus nondum dederit signum contractionis suae, tunc potius expectandum esse. Nunquam autem vis adhiberi debet: doluit *Ruyfchius* (d), quod, quinquaginta annorum spatio dum obstetricandi artem exercuisset, plures vidisset post partum felicem sanas, & hilares periisse, quod placenta rudius extraheretur. *Hippocrates* (e) diserte monuit, si secundae non facile excidant, *id sensim non vi, faciendum, ne praeter naturam divulsam quid inflammationem excitet*. Suadebat autem, ut pondere infantis solo tentaretur placentae educio, & quidem tali modo, ut quam lenissime hoc fieret: *Supponendae itaque foetui lanae, quam maxime sublatae, recens carptae, quo paulatim cedant; aut utriculi duo copulati, aqua pleni, supra quos lanae imponendae, & supra lanas foetus collocandus; deinde uterque utriculus stilo pungendus, quo sensim aqua defluat; effluente vero aqua, utres demittantur, ac confidant; his autem demissis, foetus umbilicum attrahit, umbilicus vero secundas extrahit &c.* Ad eundem quo-

(a) *Advers. Anatom. Dec. 3. N. X. in fine pag. 35.*(b) *Tab. 3. Fig. II.*(c) *Tractat. Anatom. pag. 9.*(d) *Ibid. pag. 11.*(e) *De superfœtatione**Cap. 3. Charter Tom. VII. pag. 862.*

quoque modum, abruptio, aut ante tempus abscisso umbilico, convenientibus appensis ponderibus, secundarum educio molienda. Haec enim istorum optima est curatio, & minime laedit.

Quamvis autem hodie haec methodus educendi placentam non adhibeatur, cum prudenti manu leniter trahendo umbilicalem chordam idem obtineatur effectus, patet tamen inde, Hippocratem damnaſſe omnem vim adhibitam.

Illa autem, quae apud Moschionem (f) leguntur, pulcherrima sunt; praecipue, si simul addantur, quae latina interpretatio habet addita ex libro matricis dicto (g), quid nempe agendum sit, si secundinae remanserint. Operae pretium credo totum textum hic addere, quod nostris temporibus vix posset consuli quid melius.

Cum infans in manus obstetricis ceciderit, si ad umbilicum adhuc cohaeret, obstetrix debet etiam attentare leviter, hac, & illac adducens, an per ipsum umbilicum infantis possit foras adduci, adjuvante conatibus suis & ipsa parturiente; idque fiat, quando fundo non adhaerent, & orificium patet. Neque vero in directum conetur, ut ne matrix simul adducatur. Si vero tarditas ipsa moram habuerit, praeciso umbilico, separandus est infans, cumque alia mulier accipiat, & reliquum ipsa teneat, & cum se matrix aperiat, ducendum, cum autem recludit, non conandum. Sed si ruptum, vel praecisum statim intus se absconderit, orificio matricis patente, perunctam manum statim obstetrix immittere debet, & si jam ad fundum matricis recesserunt, & si obvolutae sunt, & natant, quacumque parte apprehensis tollere debet. Si vero adhuc ad fundum matricis tenentur, resolutis ibi digitis, & apprehensis, secundinis, tentare hac, & illac, & adducens persuadeat auferre. Illae vero, quae imperitia in directum conantur, frequenter & ipsam matricem adducunt. Sed si ne sic subsequutae sunt, aut orificium matricis statim se clausit, ut neque manus immitti, neque ipsae exire possint, & fervor fuerit subsequutus, ibi, eisdem dimissis, omnibus succis, & encathismate, & cataplasmatibus, & vaporantibus, quibus ad fervorem uti solemus, utendum est. Hac enim diligentia, omni strictura laxata, frequentius, quidquid ibi remanserit, & alienum est, foras emittitur, & sua sponte cadit. Per fervorem autem (ζέω) inflammationem intelligi, patet. Ideo autem alias methodos, ad secundinarum expulsionem laudatas, damnat (h). Sternutamenta, & a scala suspensiones, & potiones dabant, quae eas ejicere possent, & fumos suffiebant, & pessos sanguinem educentes subiciebant. Quin etiam pondera ad ipsum folliculum ligabant. Quae omnia nos reprobamus; siquidem fervorem partibus ipsis facere possunt, & praesentem sine dilatione sanguinis fluxum.

Quamvis autem Mauriceau (i) voluerit, placentam omnino educendam esse, & quidem quantocyus fieri poterit, cum ab illa relicta mortem puerperae metueret, tamen sollicitè monet, leniter tentandam esse hanc educationem, nec majorem vim adhibendam esse dilatando os uteri; & melius esse, si quid de
pla-

(f) Spach. Gynaec. pag. 4. N. 53. & 54.

(g) Harmon. Gynaec. part. prior. Cap.

XIV. N. 7. pag. 13.

(h) Ibid. N. 9. pag. 13. 14.

(i) Traité des ma-

lad. des femm. gross. liv. 2. chapit. IX. pag. 252. & seq.

placenta residuum manet, illud relinquere, quam laedere uteri substantiam. Imo, totum opus naturae relinquendum esse, jubet, si violentia opus foret, ad placentam educendam; & tunc emollientissimorum decoctorum injectionem in uterum laudavit, ut & orificium uteri emolliatur, & suppuratione nata separaretur placenta a cohaesione cum utero. His factis, suadet clyfma, utcumque acrius, applicari, ut una cum alvi deponendae conatibus placenta prodeat, quod saepius successit; imo quibusdam, insciis fere, sponte exivit.

Inculcat obstetricibus hinc merito optimus *Rayschius* (k), ut nullam vim adhibeant, si placenta nimis haereat, nec uteri orificium vi dilatent, sed puerperam placidae tradant quieti. Sponte enim sua os uteri laxabitur, & post aliquot horarum spatium placenta prodire solet: nec metuebat putredinem a relicta diutius placenta, cum illam nunquam observasset. Testatur enim, *Nulam puerperam, ex adstricta, & remansa, secundinarum mole, tempore plusquam quinquaginta annorum, quo ipsi Professoris in arte obstetricia sparta, ante nemini oblata, humanissime demandata fuit, obiisse, nisi placentam uterinam nimis atrocis nisu per frustra eradicare voluerint. Familiare ipsi etiam fuit, eandem per dies, septimanas, quid quod? menses in utero retentam, & feliciter expulsam fuisse.*

Neque etiam ruricolae, & veterinarii a retentis secundinis vitulinis mortem vaccae augurantur (l). E contra constans apud illos observatio est, secundinas, nisi simul cum vitulo prodeant, relinquendas esse; quae tunc post novem dies solent sponte prodire. Si vero statim post partum evellerentur, saepe uteri suppuratio sequeretur (m).

Peritissimus in arte obstetricia *Brudenell Exton* (n) notat, plerumque decem, quindecim, viginti minutis post partum sequi secundinas, & non adeo frequenter opus esse, ut, immissa in uteri cavum manu, separaretur secundina, cum plerumque, leviter trahendo funem umbilicalem, sequi soleat: agnoscit praeterea, uteri orificium aequae facile dilatari posse aliquot horis post partum, quam antea: fatetur, si aliquid de secundinis in utero relinquatur (modo non sequatur magna haemorrhagia), illud post unum, alterumve diem sponte prodire; & quidem *absque ullo puerperae damno*. Ut consulat tamen famae obstetricantis, suadet, ut integre educantur secundinae, antequam obstetricans a puerpera recedat; rationem enim hanc addit: *in order to avoid reflections.*

Ob eandem rationem suadet, ut non nimis diu relinquatur placenta, quoniam caeteroquin posset per aliquot dies retineri. Non, quod inde tantum mali metueret; addit enim sequentia: *Si uterus a quodam accidente inflammaretur, & puerpera periret, obstetricanti imputaretur, quia secundinas reliquit.*

Ex dictis patet, mala, quae sequuntur secundinarum retentionem, saepe pendere tantum a rudiori obstetricum tentamine, dum famae suae consulere nituntur: turpe enim putant, si re infecta discedere debeant; hinc quaevis

ten.

(k) Tract. Anatom. pag. 13.

(l) Ibid. pag. 16.
de ziekte en sterfte van het Rundvee pag. 62.
& seq.

(m) Verhandeling van
(n) Sect. VII. pag. 238.

tentare audent. *Hippocrates* (o) dixit: *Ad secundarum elapsam, sternutario admoto, nares, & os comprimere oportet.* Sed sic magnus concussus fit totius corporis, & imprimis abdominis. An autem tutum est, uterum, partus tempore jam multa passum, sternutatione, & quidem compressa, tam valide agitare? An non majus inde malum metuendum est, quam a secundinarum diuturniori retentione? Non mirum erit, si post haec tentata, licet incassum, dolores in abdomine, rigores, febres oriantur. Sic enim alibi legitur (p): *Quum secundae statim a partu non secesserint, imi ventris dolores in laterum inanitate suboriuntur, ac febres; quod si secundae secesserint, mulier etiam sanescit. Plerumque vero putrescunt; sexto tamen, aut septimo die, aut etiam posterius secedunt.* Quod autem putredo illa secundinarum, de qua dicit, non adeo metuenda sit, patet ex alio loco (q); *Si mulieri secundae relictae fuerint, nisi uteri amplo ore fuerint, parcius, quam conveniat, purgatio prodit, venter durus, & magnus evadit, frigus detinet, & febris acuta, & dolor totum corpus, praecipue vero ventris partem umbilico inferiorem, pondusque in utero, ac termina, ac si foetus existat, sentiuntur.* Et curata secundas brevi putrefactas ejicit, & sana evadit. Mirum non est, secundis relictis, purgationem parciorem esse, cum placenta majoribus vasis sanguineis utero nectatur, quorum solutione copiosus sanguis prodit.

Ab uteri autem solius robore secundarum retentorum expulsionem expectasse *Hippocratem*, ex alio loco (r) patet, ubi sic habet: *Quum vero in utero gerens foetum menstruum, aut bimestrem, corruperit, & secundae exire nequeant, ipsa autem tenuis sit, hujus corpus tunc purgare, & opimum reddere oportet.* Non enim prius putrefacti foetus exeunt, nisi uteri robusti, & bene compacti fuerint. Notum autem est, secundinas difficilius educi in abortu, praecipue, si paucorum tantum mensium fuerint; hinc saepius relinqui in utero, quam in partu tempestivo, & naturali.

Ex omnibus hactenus dictis patet, ad plenariam liberationem puerperae requiri, ut secundinae educantur: statim quidem, si valida adfuerit haemorrhagia, cum tunc periculum in mora sit; sed & tunc facilius placenta sequi solet, cum jam pro parte soluta sit ab utero, sin minus, expectandum esse, donec uterus signa dederit contractionis suae; quod attracto abdomine cognosci potest, uti antea dictum fuit. Caeterum nullam vim adhibendam esse, si vel orificium uteri valide constrictum fuerit, vel placenta nimis fortiter haereat; cum multa majora mala metuenda sint a vi utero illata, quam a placenta relictâ, quae postea sponte, citius, vel serius, prodire solet. Monuit *Aegineta* (s), postquam illa recensuit, quae ad educendam placentam requiruntur: *Si ne sic quidem exemptae fuerint, non convenit turbare: post paucos enim dies putrefactae, & in saniem resolutae, excidunt.* At dum haec fiunt, a gravi odore me-

(o) Aphor. 49. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 224., & Epid. Lib. 2. in fine, Ibid. pag. 288.

(p) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. LI. Charter. Tom. VII. pag. 757.

(q) Ibid. Cap. LIII. pag. 758.

(r) Ibid. Cap. LII. pag. 757.

(s) Lib. VI. Cap. 75. pag. 93. versa.

metuebat, qui & caput oppleret, & stomachum subverteret; quod incommodum suffumigiis emendandum jubet. Non semper tamen in tantam putredinem transit placenta retenta: post tridui moram exeuntem vidi integram, dum urinam excernebat puerpera, nec putrefactam inveni; & feliciter evasit, licet tota nobilis familia aegerrime tulisset, quod impedivissem obstetricem, ne, vi adhibita, placentam educeret.

Cum autem sollicitae matronae eductas secundinas accurate lustrare soleant, & pessima quaevis metuant, si vel levissima suspicio fuerit, aliquid de membranis, vel de placenta adhuc relictum fuisse in utero, quantum potui, hunc scrupulum illis eximere conatus fui, & si quid tale credidissem factum, sollicitè texi, ne turbaretur malo tali nuncio puerpera, neque de fama periclitaretur obstetrix. Quidquid enim molesti, vel sinistri postea in puerperio contigerit, attribui solet huic negligentiae. Unde metuendum est, ne imposterum obstetrices, nimis uterum mundando, ut dicunt, illum laedant. Notavit sollicitè *Celeberrimus* in arte obstetricia *Levrez* (r), uteri superficiem illo in loco, cui placenta adhaesit, elevari in cristas, notabilis quandoque molis, quae obstetricem fallere possent, tanquam placentae reliquiae, quas avelendo, ipsam uteri substantiam laceraret. Certus sum, quod tales reliquiae sponte postea una cum lochiis prodibunt, nec nocent puerperae; sed obstetricis famae sunt satis insidiosae, quam probus Medicus in tali casu tueri semper debet. Nec periculum est a putredine relictorum, cum & haec prudenti elotione uteri facile caveri, aut emendari possit, uti sequenti *Capitulo* dicetur.

Legi merentur quam maxime illa, quae eodem in loco (u) de educatione placentae habentur: omnia enim ad hanc rem requisita ibi describuntur.

Quamvis plerumque placenta adhaereat fundo uteri, tamen constat, illam & aliis locis affigi: tuncque uterus quandoque inaequaliter se contrahit, & placentam retinet, quasi in cavo peculiari uterinae substantiae (v), & difficulter educitur. Observavit hoc etiam *Pen* (x), & consideravit talem cellulam, tanquam secundum uterum, quo sola placenta continetur; & cujus orificium non absimile est orificio ipsius uteri, habens margines crassos, du-ros, angustos, sed laeves simul: fere semper invenit talem cellulam, si aderat, in latere dextro uteri, raro in sinistro. Inaequalem talem contractionem uteri, qua placenta retinebatur, graphice descripsit celebris in arte obstetricia *Denys* (y). Vocabatur ad primiparam, quae ante quadrihorium infantem pepererat; sed funis umbilicalis ruptus fuerat, nec poterat obstetrix ullo modo placentam educere. Crediderat, se tangere placentam, sed accurato examine invenit, esse os uteri, quod admodum molle, crassum, & latum, tactu percipiebatur: manu in uteri cavum immissa, nullum placentae vestigium inveniebat; unde *Denys* vocabatur in auxilium, qui, manu in vaginam im-

(r) Mém. de l'Académ. de Chirurg. Tom. 3. pag. 229.

(u) Pag. 216 - 233.

(vv) Ibid. pag. 222. & l'art. des accouch. pag. 131. & 132.

(x) Pratique

des accouchem. liv. I. chap. IV. pag. 35.

(y) Verhand. over het Ampt der

Wroed-Meesters &c, Cap. 3. pag. 31.

immissa, credebatur pariter, se placentam ex uteri orificio prominentem tangere: orificium autem uteri pugni magnitudinem aequabat, quatuor digitos latum, & pollicem crassum: facile manum introducere potuit; sed cavum uteri digitis undique pertentando, placentam invenire non potuit, quod quam maxime mirabatur. Tandem, manu de novo in uterum immissa, invenit foramen, quod minimi digiti apicem vix admittebat; hinc credebatur, uterum perforatum esse: indice digito prudenter dilatabat hoc foramen; sed mox sanguis prorumpebat, & digito molle quid tangens, credebatur intestina esse: secundum dein digitum una cum indice induxit, & percepit, in hoc loco placentam latere; hoc facto, introduxit & pollicem; sicque sensim, non tamen sine molestia, separavit placentam ab utero, & separatam eduxit.

Foemina haec postea nihil insoliti passa fuit, & perfecte convaluit.

Patet satis, difficilem talem casum esse, & requirere periti obstetricantis exercitatum manum. An non spes est, talem particularem uteri constrictionem, per quam placenta particulari quasi cavo includitur, cessaturam? Notavit *Crantz* (2), si in tali casu, dum manus obstetricantis in uteri cavo est, novos dolores acquirit puerpera, tunc aperitur, & penitus quasi disparet ille saccus, in quo placenta haerebat, quae tunc facile sequitur.

Omnibus sic eductis, linteum quadruplicatum, molle vulvae applicatur, ut frigus aëris arceatur, quod pessime noceret.

(2) *Hebammentkunst* capit. 9. pag. 150.



MORBI PUERPERII.

§. 1322. **P**uerpera corripitur lipothymia, syncope, convulsionibus statim a partu: quia sanguis arteriosus a cerebro, & cerebello, aversus agitur in laxa abdominis vasa; dein dolore post partum, a labore tolerato, partibus contusis, a sanguine, foetu alio, secundinisve resistentibus.

Agendum jam est de morbis, qui post partum sequuntur, & qui ab ipso partu, ut causa, pendent: huc etiam spectant illa, quae a tolleratis inter partum doloribus ortum ducere potuerunt. Puerpera enim potest tempore puerperii aliis morbis corripitur, Epidemicis v. g., aliisque, de quibus hic non agitur, licet, si occurrant tales puerperii tempore, semper in illorum curatione Medicus rationem habere debeat illarum conditionum, quae in omni puerperio adsunt.

Ut haec omnia ordine tractentur, considerata sunt illa, quae, excusso foetu, & educta placenta, sequi debent necessario.

Ante partum uterus distensus intestina ex situ removet, omnia vicina pressit vasa, venosa imprimis angustavit, diaphragmatis liberam actionem impedit, abdominis musculos, & integumenta extendit. Evacuato utero, omnia haec cessant: pendula abdominis viscera in pristinum locum relabuntur, vicina vasa venosa, toties in gravidis varicosa, retentum sanguinem subito ad cor remittunt, cor dextrum quandoque fere obruunt; arteriosa vasa, a pressione jam libera, facilius admittunt pulsum ex corde sanguinem, quem venis jam pariter liberis tradunt. Musculi abdominales diuturna distensione robur amiserunt, pendula, & flaccida integumenta non resistunt (vide §. 25. N. 3.); post placentae separationem ab utero magna, patula vasa uteri sanguinis copiam undatim emittunt. Omnia haec concurrunt ad producendam lipothymiam, & syncopen statim a partu. Omnis enim fere sanguis versus inferiora vasa corporis, jam laxa, & patula, vergit; parca copia ad cerebrum, & cerebellum venit. Hinc merito illud tempus puerperii, quod immediate partum sequitur, pro maxime periculoso habetur, & nisi uterus subita constrictione vasa propria angustaret, adhuc majus illud discrimen foret. Ob hanc rationem periti in arte obstetricia, uti dictum fuit, monent, placentam ab utero non esse solvendam, antequam constet, utrum jam se contrahere: unde & adeo metuunt, si uterus, integre jam vacuus, flaccidus in abdomine fluctuet, nec in globum contractus tangatur. Diffluunt enim tunc sanguine,

& ob inanitionem subitam vasorum convulsae pereunt; simili fere modo, ac robustissima animalia, dissectis a lanione arteriis, sanguine fere omni exhausta validissime convelluntur, antequam moriantur. Ob eandem rationem suspectus habetur nimis facilis partus, dum, una cum aquis ruptis, uno quasi impetu, prodit foetus, vel & quando, membranis adhuc integris inclusus, una cum placenta prodit. Nullum tunc tempus relictum fuit, ut uterus se contrahere potuisset. Ubi vero post ruptas aquas aliquo intervallo foetus sequitur, tunc se jam contraxit, & undique se corpori foetus applicuit. Novērunt hoc obstetricantes, dum infantem ob malum ejus situm, manu in uterum immissa, vertere debent, ut pedibus extrahi possit. Imprimis tale infortunium metuendum est illis mulieribus, quae flaccidae temperiei laute, & in otio vixerunt, atque largam menstruorum copiam pati solent. Plures tales funesti casus apud auctores habentur, quos hic recensere supervacuum puto. Videtur & hoc indicasse *Hippocrates* (a), dum dicit: *Cum torpore exsolutiones, difficiles quidem ex partibus contingunt, & mentem amoventes, non tamen perniciosae. Sed & mensium copiam praesignificant.* Videtur autem tantum leviolem talis mali gradum indicasse, cerebri nempe actiones turbatas quidem, sed leviter. Nam vocabulum, παρακρουσικαί, leviolem tantum mentis emotionem designat: neque etiam mentionem fecit lipothymiae, syncopes, & convulsionum. Sed notat, copiosa menstrua habuisse tales mulieres; γυναικεία enim & menstruum fluorem, & purgamenta post partum significant apud *Hippocratem*; & utrumque verum est; nam flaccidae tales mulieres & menstruis, & lochiis in puerperio diffuere solent.

Dein dolore post partum a labore tolerato. Quantam vim adhibeat parturiens mulier, imprimis ultimis nixibus, nemo facile credet, qui nunquam vidit. Manibus fulcra, vel adstantes tenent quam firmissime, pedes apprimunt scabellis suppositis, lassant sic saepe robustissimas mulieres, quae opem ferunt. Secedunt aliquando ossa pelvis a se mutuo, uti praecedenti *Capitulo* dictum fuit, in difficiliore partu. Sed quanta vis requiritur tunc, ut hoc fiat! Hinc licet, foetu in lucem edito, incredibile levamen percipiant, nihilque mali se sentire, liberatas ab hac sarcina, laetae testentur, tamen sequenti die omnes artus quasi conquassatos dolere, sentiunt, & de magna totius corporis lassitudine conqueruntur.

Partibus contusis. Totum pelvis osseae cavum mollibus partibus tegitur, quae, dum validis nixibus transprimitur foetus, ad dura ossa premuntur, & contunduntur. Vagina observatur circa finem graviditatis quandoque intumescere, sed tumore molli; turgent aliquando labia pudendorum: contingit aliquoties, ut caput infantis, si mole majus fuerit, vel subito impetu prodeat, dilaceret peritonaeum ad anum usque. Sed a valida contusione inflammatio, omnesque ejus effectus sequi poterunt. Si caput foetus diu immobile in exitu haereat, a diuturna illa compressione sequitur gangraena partium

(a) Coacar. Praenot. N. 456. Charter. Tom. VIII. pag. 884.

tium mollium (b), & postea, si evaserint tales puerperae, escharae gangraenosae secedunt per suppurationem in ambitu factam: quandoque ipsum intestinum rectum, & vesica a diuturna, & continua pressione gangraenesunt; unde tristissima mala, quandoque vix medicabilia, supersunt. Tristes tales casus aliquoties vidi. Sed facile patet, molestos dolores tunc sequi debere.

An post partum, distento abdomine jam evacuato, spasmi musculorum abdominis secuti dolorem faciunt? Quandoque, sed rarius, puerperas de illo querentes audiui. In illustri matrona, quae sedecim infantes pepererat, caeterum sana, saepius tales crampi abdominis reliquo vitae tempore observabantur. Longaeva arte, muneribus gestis, & scriptis celebris, *Johannes Storck* (c), dum proprii morbi, quo tandem periit, historiam graphice describit, notat, evacuato abdomine per incisionem tumentis umbilici, se sensisse in musculis abdominalibus molestum utcumque, licet non dolentem, crampum, five spasmus, quem comparat molestiae, quam recens enixae puerperae percipiunt ab eadem causa.

A foetu alio. Qui tunc novos labores requirit, & partes jam dolentes irritare potest; licet tamen plerumque satis cito sequi soleat, cum viae jam patulae sint.

A sanguine, secundinisve restantibus. Post partum tota superficies uteri sanguine madet, & imprimis ille locus, cui adhaesit placenta: uteri orificium interim arctatur, & quandoque integre clauditur, quamvis plerumque per plures horas satis facile a digitis obstetricantis dilatari possit; uti praecedenti paragrapho dictum fuit. Post placentae separationem undatim profluit sanguis, sed brevi minuitur, & copia pariori depluit ex toto cavo uteri, moram ibi trahit, & grumescit dumque tales grumi, contracto utero, per ejus orificium transeunt, novi dolores, & nixus excludendi, oriuntur quos, cum post foetum jam exclusum sequantur, posteros dolores (*nachvvehen*) vocare solent; qui saepe satis molesti sunt, & puerperae animum dejiciunt, dum se omni molestia jam defunctam credit. Antea dictum fuit, partus dolores ab uteri orificio quasi incipere, ita ut perita obstetrix, contractionem quandam in uteri orificio cum tremulo quodam motu advertens, moneat parturientem, ut mox secuturum pariendi nixum strenue promoveat; si nempe omnia ad partum naturalem rite fuerint disposita. Post partum autem illa irritabilitas orificii uterini adhuc manet; unde, dum grumus concreti sanguinis impingitur orificio uteri, illudque sic irritat, totus uterus valide contrahitur, sicque grumum transprimit.

In pluribus vidi, ipsum sanguinem, nondum concretum, dum per os uteri transit, dolores illos, & nixus excitasse. Antea ad §. 1308. dictum fuit, dum periculosa uteri haemorrhagia educationem foetus requirit, leni & prudenti dilatatione oris uteri excitari partus dolores, si non adsint, augeri vero

(b) *Levret l'art. des accouchem. pag. 169. pag. 46.*

(c) *Histor. hydrop. universal. &c.*

vero, si jam praesto sint. Unde patet ratio dolorum, qui, ob retentum in utero sanguinem, post partum sequuntur.

Nec leves saepe sunt illi nixus: *Ruyfchius* (d) monet sequentia: Certo certius autumo, uterum sese summopere movere in partu, omnesque partus conatus naturales ab utero fere pendere. Qui conatus post partum non raro adeo vehementer perseverant, ut uterus semetipsum inveriens e corpore procidat. In aliis puerperis, paucis horis a partu, expertus sum, uteri motum fuisse adeo evidentem, ut obstetrices, imo & puerperae, saepius mihi dixerint, alium foetum adhuc in utero restare. Fatetur, se, manu abdomini puerperae admota, illum motum adeo manifeste percepisse, ut non valde exercitatus facile falli potuisset.

Quandoque illa uteri contractio tam valida est, ut ex grumo sanguinis omne fluidius exprimat, & illum condenset in massam quasi carneam, satis firmam, quae saepe cavi interni uteri exprimit figuram, posteaque citius, vel ferius expellitur, ac saepe pro *mola* sic dicta habetur: tali massa expulsa, de novo sanguis de utero exit, novus grumus nascitur, qui similiter densatur: aliquando in puerpera tres successive grumos redditos vidi; sed primo secundus minor erat mole, tertius secundo, & omnes uteri cavum figura sua exprimebant, tanto minores nempe, quanto uterus contractior cavitatem suam minuerat. Figuras talium concretionum dedit *Ruyfchius* (e), & notat, quandoque aliquid membranarum analogum illis appensum inveniri. Notum autem est, ex sanguine tales membranas concreescere posse, & similes, post venae sectionem in pede institutam, aquae innatare.

Similes dolores a secundinis restantibus fieri posse, sponte patet; de qua re praecedenti paragrapho dictum fuit.

§. 1323. **F**ascia lata laxum abdomen fulciens tollit priora mala (1322). Foetus alius, secundinae partes, grumi sanguinis, manu educenda.

Antea ad §. 1240., ubi de paracentesi abdominis agebatur, notatum fuit, olim non simul, & semel, sed partitis vicibus aquas hydropicorum eductas fuisse; quia observatum fuerat, animi deliquia, & syncopen, imo mortem, sequi, si integre evacueretur abdomen lymphæ collecta turgidum. Ratio tunc data fuit, quod nempe in laxa illa, & omni pressione libera abdominis viscera, ac vasa sanguis irrueret, sicque a cerebro, & cerebello averteretur: simul etiam periculum erat, ne vasa, & viscera, diu in aquosa hac coluvie macerata, a subito irruente sanguine rumperentur. Postquam autem idonea ligatura stringebatur abdomen sensim magis magisque, pro ratione effluentis aquae, numerosis experimentis evictum fuit, tuto omnes hydropicorum aquas simul, & semel educi posse, neque tunc sequi animi deliquium, aut syncopen.

Ve-

(d) Observat. Anatom. Chirurg. N. 93: pag. 86. 87. pag. 25. & seq.

(e) Ibid. observat. 28. 29.

Verum idem obtinet post puerperium, adeoque & eadem cautela indicatur: haberi tamen ratio debet, post validos adeo nixus, imprimis in difficili parti, abdomen, quasi contusum foret, obtuse dolere, utrumque ipsum similiter affectum esse. Unde valida constrictio abdominis hic nocere posset, uti optime monet *Mauriceau* (f); hinc suadet, tali modo applicetur ligatura, ut firmet, & fulciat quidem laxum abdomen, non vero valide premat. Magnum, quadratum splenium applicari jussit toti abdomini, & dein moderata ligatura firmari. Legi meretur tractatulus, quem *Celeberrimus de Gorter* (g) de fulciendo abdomine post puerperium scripsit lingua vernacula, ut eradicaret pessimam methodum, qua uti solebant mulierculae, puerperarum custodes, dum stringebant cingulo, vel angusta fascia circa medium corporis puerperas, & valide quidem (nullibi enim pejus, & pertinacius insaniunt stolidae anus, quam apud puerperas). Pulcherrimos autem effectus vidit semper, dum post partum statim abdomen molliter fulciretur lata fascia, mantili, vel mappa; quae si post aliquot horas, detumescente magis abdomine, laxius haerere incipiat, denuo moderate adduci potest, cavendo tamen semper validam compressionem. Observavit, hac methodo minores dolores post partum sequi, minus grumosi sanguinis in utero colligi. Praeterea vidit, alvum facilius sequi in puerperio, dum aliter durae faeces in colo intestino, facile distendendo, colliguntur in majorem molem, quae postea summas molestias parere potest, dum per anum debet exprimi. Pulcrum & effectum observavit in haemorrhagiis uteri chronicis, etiam in senili aetate, dum sacculum, roborantibus remediis plenum, applicabat abdomini, & simili fascia firmabat (h).

Foetum alium educendum esse, sponte patet, & cautelae, in tali casu observandae, passim apud obstetriciae artis auctores, antea saepius laudatos, habentur.

Secundinae partes, grumi sanguinis, manu educenda. De hac re ad §. 1321. dictum fuit: manu autem haec educenda esse, ideo monetur, quia quibusdam Medicis in more fuit, dare Emmenagoga, & Ecbolica dicta, remedia valida, si vel minima suspicio foret, aliquid adhuc latere in cavo uteri; quae methodus certe periculosa est, cum omnia talia remedia stimulantia, & calida sint, quae recens enixis puerperis minime conducunt. Illa ergo potius manu educenda sunt, si uteri orificium adhuc patulum sit, vel absque vi adhibita dilatari commode possit: ut facile exeat, si quid grumosi in utero collectum fuerit denuo, jussit *Moschion* (i), ut puerpera decumbat modice patentibus (diductis) pedibus, ut quidquid ex ea exire ceperit, non impediatur. Ne nempe, femoribus adductis, grumis impleatur vagina, sicque liber exitus lochiorum ex utero impediatur.

Si

(f) Malad. des femm. accouch. Tom. I. Liv. 3. Chap. 2. pag. 376. 377.

(g) Van de Sluitband &c.

(h) Ibid. pag. 36. & seq.

(i) Spach. Gynaec. pag. 5. N. 55. Harm. Gynaec. part. prior. Cap. XVII. pag. 14. Tom. IV. Pars II.

Si autem commode haec educi nequeant, merus est, ne aëris accessu putrescant, sicque utero noceant, vel &, resorpto putrido, febris mali moris accendatur, antequam haec in utero relictæ sponte prodeant. Dignum Academiae Chirurgicae membrum, *Recolin* (k) tentavit in tali casu per siphonem aquam calidam injicere in uteri cavum; quod cum absque ulla violentia fieri possit, utile, & tutum videtur. Nec successu caruit, uti in casibus ibi enumeratis patuit. Verum quidem est, quod haec injectio aquae calidae in uterum facta fuerit in foeminis, abortum passis; in quo casu placentae saepissime retinentur, & adeo tenerae sunt, ut pars prominens ex orificio uteri statim abrumpatur, si tentetur protractio. Sed nulla videtur esse ratio, quare idem non tentaretur, si post partum maturi foetus placentae pars, vel grumi sanguinis in utero retenta fuerint. Aqua calida emollit, ac solvit, & merito sperari poterit, unda aquae elabentis haec elui posse: quod si statim non sequantur, saltem hoc commodi inde habetur, quod putredo sic eluatur, adeoque diuturnior horum in utero mora minus periculosa sit: tuto autem repeti poterit haec injectio, & praeferenda semper videtur violentae orificii uteri dilatationi.

Videtur autem *Hippocrates* (l) injectione simili usus fuisse, dum uterus purulentus erat, & inde sterilitas sequebatur. Nam *pus genituram enecat, & corrumpit. Ac proinde pus ex uteris expurgare oportet, & uteri tuberculum tollere.* Postea addit: *Et uteri hoc modo colluendi; lac equinum coctum per sacculum tenuissimum, & purissimum transmissum infundito, idoneo clystere facto.* Hoc modo tenuissima serosa lactis equini pars, per sacculum transiens, depurando utero adhibebatur. Quod autem non in vaginam, sed in uterum ipsum injici curaverit *Hippocrates* illud serum, vel inde patet, quod in utero esset tuberculum purulentum, cujus deterfionem, & medelam moliebatur. Praeterea hoc confirmatur, quia peculiarem siphonem describit, qui huic injectioni serviret; & quem sic describit: *Clysteris quidem summa pars laevis esto, qualis specilli, argentea, supra quam, interjecto parvo spatio, foramen perforetur. Sint autem & alia foramina, hinc, & inde singula, aequaliter inter se distantia, ex obliqua (laterali) parte aequalia, non magna, sed angusta. Clysteris quidem apex solidus esto, ac reliquum totum cavum sit, quasi fistula, cui suis foeminae vesica, aqua calida probe emollita, & madefacta, alliganda est. Ubi eam alligaris, infuso in vesicam lacte, in foramina tenue linteum immitto, ne lac effluat. Postquam occluseris vesicam, alligatam mulieri ipsi, quam clystere lavaturus es, dato. Illa vero, detracto obturamento, in uterum indat. Noscet autem ipsa, ubi indere oporteat. Deinde vesicam manu comprimito, quoad totum pus foras effluerit. Id autem manifestum erit, ubi pus non amplius cum lacte exierit; patet enim, cum nullum amplius inest, tunc desistere oportere.* Cum autem *Hippocratis* scopus esset, cavum uteri a pure liberare, abluendo, hinc lateralem tubi partem perforari jussit plurimis foraminulis. Cum autem *Recolin*, per injectionem aquae calidae in uteri cavum, tentaret sanguinis grumos

(k) Acad. de Chirurg. Tom. III. pag. 202. & seq.

(l) De infocundis Cap. X. Charter. Tom. VII. pag. 850.

mos solvere, ac dividere, & placentam, si forte in quadam parte adhuc utero haereret, impetu, & copia injectae aquae separare, hinc merito curavit, ut siphon unicum tantum, & majus foramen haberet in apice, in laterali autem ejus parte nullum.

Alia adhuc apud *Hippocratem* loca occurrunt, quae docere videntur, quod injectionibus uterinis usus fuerit; sed cum non adeo evidenter sint, sufficiet textus modo citatus.

§. 1324. **D**olor a labore tollitur opiato, antacido, cardiaco, diluente, fotu anodyno externo.

Dolores post partum quandoque satis molesti sunt, nati a causis §. 1322. recensitis. Papaveris succus inspissatus, qui sub nomine *opii* in officinis prostat, vel & varia ejus praeparata, aut medicamenta composita, solent a plurimis laudari ad hos sedandos. Non tamen omnibus horum usus placet. Quidam, & peritissimi etiam in arte obstetricia, viri (m) damnaverunt opium, & omnia ejus praeparata.

Si tamen attento animo, & ab omni praejudicio libero perpendantur illa, quae immediate post partum observantur, videtur horum usus non esse repudiandus. In ultimis praecipue partus nixibus ingens agitatio totius corporis adfuit, metus de propria, & prolis salute, tristitia quandoque non levis, dum mortem instare credebant, saepe nimis pusillanimes. Verum est, haec, partu absoluto, minui quidem; sed non semper cito cessant. Uterus, qui validissimo nixu egit, ut foetum expelleret, non quiescit statim post partum, sed pergit quandoque validissime moveri, uti ad §. 1322. ex observationibus *Ruysschii* dictum fuit. Summa illa molimina parturientis, dum obstetrix, dum adstantes exclamant, nunc urgendum esse, nunc omnem vim adhibendam esse, si una cum prole salva esse velit, diutius haerent, quam creditur. Vidi hominem, jamjam submergendum, baculum porrectum validissime manu strinxisse; ex aquis eductus, in calidum lectum depositus, tamen non potuit manum diducere: &, dum adstantes hoc tentarent, potius digitos fregissent; post integram horam spasmus ille solutus fuit tandem. Observatur saepius, in puerperis satis valide constringi orificium uteri, ita ut non nisi vi diduci possit, ut grumi, vel secundinarum reliquiae eximantur. Prudentiores in tali casu expectare malunt, donec spasmodica illa contractio multum minuatur, vel cesset.

Vidi tunc toties, opio prudenter dato, omnes illos dolores fluuisse, & post pacatum somnum grumos concreti sanguinis sponte exivisse absque omni molestia. Candide fateor, me semper adhibuisse opiata post partum, nec poenituit unquam, cum sancte testari possim, quod nunquam inde ullam noxam viderim.

Verum opio, depurato simpliciter, usus fui; & dedi parca dosi, sed repetitis vicibus, donec optata quies sequeretur; a qua miro modo reficiebantur.

(m) Levret l'art des accouchem. pag. 138.

bantur. Haec autem cautela requiritur, cum Medici observent, variam copiam opii in diversis requiri, ut sequatur effectus: a medio autem grano in adulta nunquam aliquid metuendum est, & talis dosi pro re nata repeti poterit. Hinc aliquot grana opii in mixtura, sive potione diluuntur, quae cochleatim exhibetur; vel & haec cum pulvisculis absorbentibus teruntur, & divisim dosibus dantur. In *Materia Medica* ad hunc numerum tales formulae habentur; ad quarum normam plures similes componi poterunt.

A compositis autem medicamentis opiatis semper abstinui; qualia sunt, *Theriaca Andromachi*, *Mithridatium Damocratis*, *Philonium Mesues*, & his similia: partim quia unica dosi assumi solent; partim quia calidis aromatis simul constant, & periculo quandoque non vacat horum exhibitio, cum diversam adeo quantitatem opii in se contineant, licet promiscue laudari soleant. *Theriaca* enim triplo plus opii habet, quam *Mithridatium*; *Philonium* longe magis soporiferum est, quam ipsa *Theriaca*, & praeterea piperis, calidissimi aromatis, notabilem copiam habet. Cum autem succi papaveris efficacia sola hic opus sit, purum exhibere praestat, quam aliis inutilibus, quandoque & noxiis, mistum.

Cum autem quandoque partus doloribus exhaustae puerperae langueant, grata aromatica simul exhibentur, sed leniora tantum, vel saltem adeo refracta dosi, ut amabili fragrantia languentes reficere possint quidem, nec tamen valido nimis stimulo nocere valeant. Unde vel fragrantis aquae stillatitiae exhibentur; vel molle avenae, & hordei decoctum, addita quarta parte fragrantis vini Rhenani, superbibitur (qualis formula in *Materia Medica* pariter habetur); vel & una, alterave guttula olei stillatitii Cinnamomi cum saccharo diu triti in mortario vitreo pulvisculis additur, qui divisim dosibus sumuntur.

Adduntur autem his acidum absorbentia; quia saepius gravidae laborant soda acida dicta, & post partum exhibentur quandoque acida, quale est decoctum modo laudatum, vel saltem acescentia, ut puliculae hordeaceae, avenaceae, panatellae, emulsa, ac similia; unde etiam haec postea ad §. 1331. laudabuntur.

In omnibus tamen his consideranda est puerperae temperies; quae si calida sanguinea fuerit, mitiora tantum locum habere poterunt, sub titulo cardiacorum; e contra mucosae frigidae temperiei parum magis actiuosa concedi poterunt. Cavendum tamen semper, ne calida admodum stimulantia dentur: pessimus in quibusdam locis mos obtinet, imprimis ruri, ut recens enixis vinum calidum, larga copia macis, & cinnamomi addita, dilutis simul aliquot ovorum vitellis in hoc vino aromatico, propinent, & quidem adeo largiter, ut non semel paucis post partum horis puerperas temulentas viderim. Sponte patet, nihil damnosius fieri posse. Prudentiores carnis juscula, repetitis vicibus, & parca copia simul, exhibent, pulcro cum effectum; & subinde unum, alterumve cochlear recentis olei amygdalarum, vel solum, vel cum jusculo propinant; quod optime prodest demulcendo, si ventriculus ferat; quaedam enim nauseant inde, & tunc melius est oleo abstinere, ac blanda emulsa ex feminibus oleosis substituere; quae diluendo prosunt, dum olei copiam
fi.

simul habent, & a ventriculo facile tolerantur, blandumque nutrimentum suppeditant.

Cum autem blanda quies adeo profit recens enixis, facile patet, quid sentiendum sit de illa consuetudine, quae in multis locis invaluit, ut nempe puerperae, tribus primis post partum horis, ab omni somno arceantur. Hinc garrulae mulierculae, quandoque plus potae, circumstrepunt, alta voce in-
clamant, si vel palpebras nictitare videant, imo & instrumentis musicis vicini laetitiam testantur, ut simul vigilem servant puerperam. Videtur origo hujus consuetudinis haec esse. Antea monitum fuit, post partum quandoque, utero flaccido manente, nec se contrahente, immani haemorrhagia subito periisse puerperas; quas, dum dormientes credebant, inveniebant praeter spem mortuas. Verum, si lata fascia abdomen fulciatur, & uterus signa contractionis suae dederit, ille metus abest. Praeterea, si Medicus, vel perita obstetrix lecto puerperae affideat primis illis horis, facile apparebit, si quid sinistri metuendum hic sit, & prompta poterit adhiberi medela, uti antea dictum fuit. Prudentia jubet, ut primis illis horis non deferatur puerpera; sed nullo modo requiritur, ut perpetuo strepitu vigilare cogatur. Vivida lux puerperis nocet; haec ergo sic moderanda est, ne oculos nimis feriat; sic tamen, ut assidens lecto distinguere possit, an facies subito pallescat, aut collabatur; an anxia fieri incipiat; pulsus autem, & respiratio facile docebunt peritum, an vires vitales collabi incipiant. Leni cardiaco, sed grato, adductione fasciae latae, qua abdomen fulcitur, instans animi deliquium tolli poterit, uti saepius expertus fui.

Cum autem pudendorum labia in partu multum passa fuerint, praecipue in primiparis, & si caput infantis fuerit majoris molis, aut diutius in exitu vulvae haeserit, fotu anodyno blando illa fovere convenit. Ex oleo amygdalarum, vitellis, & albumine ovorum, simul mistis, supra cineres calidos, mollius cataplasma parabat *Mauriceau* (n), quod linteo illitum applicabat vulvae, & renovabat post tres, vel quatuor horas, si opus foret: dein fovebat primis quinque, vel sex a partu diebus, bis, vel ter de die decocto ex hordeo, seminibus lini, emollientibusve aliis herbis parato; simulque a grumoso sanguine, & aliis sordibus depurabat: alii tepido lacte foveant: apud quosdam cerevisia calida, admisto butyro, in usu est. Si labia vulvae tumuerint hydropicae, uti quandoque contingit, discutientia remedia his addi poterunt, uti *flores sambuci, chamaemeli, salvia* &c.

§. 1325. **N**imio lochiorum fluxu vexatur, a nimia fluiditate, agitatione sanguinis, vel ut plurimum a retentis (1322) in utero, ejus contractionem impredientibus.

Nimia dicuntur lochia, quando quantitatem solitam excedunt; hinc, ut quid certi de hac re statui posset, deberet cognosci illa copia, quae naturaliter

(n) Malad. des femm. accouch. Tom. I. Liv. 3. Chap. 2. pag. 374.
Tom. IV. pars II.

raliter exire solet quod non adeo facile est; cum linteis excipi lochia, vel lectum his conspurcari, novit tantum Medicus, & hinc quantitatem conjectura tantum assequi possit. Unde etiam de lochiorum quantitate debita apud omnes fere auctores, qui de arte obstetricia scripserunt, silentium invenitur; sed tantum de nimis, vel de suppressis lochiis dicunt. *Hippocrates* (o) quidem (uti alia occasione ad §. 1284. memini, ubi de quantitate floris menstrui agebatur) dixit: *Prodeunt autem lochia sanae mulieri satis abunde, primum Atticae heminae, & dimidia mensura, aut paullo copiosiora, deinde ad ejus rationem pauciora, quoad desinant*: similia his alio in loco habentur (p); ubi eadem mensura describitur; sed additur, quod quandoque paullo plus, quandoque paullo minus prodeat. Videtur autem Hemina Attica cum dimidia assignari tantum illi sanguinis copiae, quae primo impetu, postquam soluta fuit placenta, exit, & quaquaversum dispergitur, non secus, ac aqua in mensam effusa (q): sanguis enim, qui postea exit, difficilius quoad quantitatem determinari poterit, cum fomenta, cataplasmata &c., quae solent vulvae applicari post partum, hoc conspurcentur.

Praeterea observatur ingens diversitas in variis puerperis non tantum, sed etiam in eadem foemina in diversis puerperiis. Antea monitum fuit, validas, & quotidiano labore duratas mulieres parcum habere fluorem menstruum, & lochia pariter minori in his copia prodire: contrarium obtinet in illis, quae, opipare viventes, inertis languent otio. Cum autem uterus, dum distenditur in graviditate, sensim magis dilatata vasa acquirat, uti antea dictum fuit, eo largiora lochia expectanda erunt, quo magis distentus fuit uterus; & haec est ratio, quare in eadem muliere, diversis puerperiis, lochiorum quantitas varia esse possit. Notavit in *Aphorismis*, quos tanquam corollaria ex propriis scriptis collegit *Mauriceau* (r), puerperas, quae magnos infantes pepererunt, statim post partum validam plerumque haemorrhagiam pati, quia communiter in tali casu major esse solet placenta, & ampliora habere vasa, quibus uteri vasa, similiter aucta, respondent.

Credidit *Galenus* (s), foetum in se meliorem, qua nutriatur, sanguinis portionem trahere, deteriore relinqueret; quae causa est praegnantibus *cacochymiae*, quam natura post partum evacuat. Et paullo post subjungit, quod ideo *Lochia*, seu puerperii purgationem Medici nominaverint, non simpliciter evacuationem. Quamvis autem per illa, quae successive postea de utero fluunt, depuretur uterus, uti postea dicetur; tamen ille sanguis, qui statim post separatam placentam copiosus effluit, purus est, non vero sanguinis purgamentum relictum, postquam melior pars in nutrimentum foetus absumpta fuit. Optime hoc notavit *Hippocrates* (t), ubi de lochiis agit: *Prodeunt autem, velut sanguis e victima, si sana sit mulier (ut diximus), & sana futura sit, citoque*

(o) De Mulier. Morbis Lib. I. Cap. 71. Charter. Tom. VII. pag. 771.

(p) De Natur. Puer. Cap. V. Charter. Tom. V. pag. 314. 315.

(q) Ibidem.

(r) Aphor. 58. Tom. I. pag. 536.

(s) Commentar. in text. XX. Hippoc. Epidem. Lib. 2. Charter. Tom. IX. pag. 141.

(t) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 71. Charter. Tom. VII. pag. 771.

citoque concreſcunt, & expurgantur. Eadem habet alio in loco (u); dein addit ſequentia: *Si vero ſana non ſit mulier, neque ſana futura, purgatio tum parior, tum ſpecie deterior prodit, neque cito concreſcit.* Cacochymiae hoc eſt indicium; effluit enim talis ſanguis omni dote, qualis antea per vaſa gravidæ fluxit; adeoque ſanus erit, ſi ſana fuerit. Hoc autem quam maxime notandum eſt, ut rite intelligatur, quid lochia ſint ſtatim poſt puerperium, & quomodo poſtea mutantur, licet idem nomen maneat.

Nimia lochiorum quantitas imprimis conſideratur illo tempore, quod proxime partum ſequitur: tunc enim maximum inde metuitur periculum: naturaliter enim paucis poſt partum horis lochia jam minus rubent, & illa rubedo ſenſim magis magisque minuitur, ita ut color ruber tertio, quarto, quintove die penitus abſit (v). Uterus enim, ſenſim magis magisque contractus, vaſorum ſuorum capacitatem minuit. Unde lochiorum nimius fluxus cognoscitur imprimis inde, ſi nimio cum impetu ſanguis erumpat ſtatim poſt partum, ita ut palleat ſubito facies, obſcurentur oculi, tinniant aures, animo linqui incipiat: deinde, ſi moderatori quidem copia effluat ſanguis in initio, ſed diutius ſolito pergat exire, neque poſt aliquot horas color minui incipiat.

Nimia agitatio ſanguinis per labores toleratos, metum, alioſve animi affectus in cauſa eſſe poteſt; unde utilitas opiatorum patet, per quae talis agitatio feliciter ſedatur. Huc etiam refertur nimia fluiditas ſanguinis, per quam fit, ut etiam, contractis jam utcumque vaſis, ſanguis exire pergat. Sed notum eſt, ſanis, ac robuſtis hominibus ſanguinem denſum, & ſolidum eſſe, citoque concreſcere, dum vaſis exit.

Verum talis ſanguinis conditio ſupponit vaſa firma, & robuſta; cum e contra tenuis, & fluidior ſanguis adſit, quando vaſa debilia minus agunt in ſanguinem contentum. Unde & praſentis ſanitatis, & futurae in puerpera ſignum dedit, ſi poſt partum effuſus ſanguis cito concreſcat.

In flaccidis autem illis, & mollibus corporibus uterus jam vacuus debilius, & lentius ſe contrahit; unde nimius lochiorum fluxus ſequitur. Hoc videtur indicaffe Hippocrates (x), dum dixit: *Quod ſi mulier a partu paullo amplius, quam par ſit, purgata fuerit (id enim etiam contingit, ſi uteri lato ore fuerint, ut ex venis ad uterum tendentibus quaedam ex violento foetus egreſſa perruptae fuerint) &c.* Sed latum orificium uteri ſi maneat, designat, uterum ſe non ſatis contrahere, adeoque vaſa diutius patula manere. Vaſa autem uteri laedi quandoque ex violento, & ſubito foetus exitu, facile patet; uti etiam ex violenta placentae educatione, vel quando fortiter haerens utero rudi manu ſeparatur, ſicque ipſa ſubſtantia uteri laceratur, uti antea dictum fuit. Omnium autem frequentiffime nimius lochiorum fluxus fit a retentis in utero: tunc enim uteri contractio impeditur, & ſimul perpetua irritatio in contractionem adeſt; praecipue, ſi retenta haec pro parte in
ori-

(u) De Natur. Puer. Cap. V. Charter. Tom. V. pag. 315.

(v) Levret l'art des accouchem. pag. 134. Brudenell Exton pag. 409.

(x) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 43. Charter. Tom. VII. pag. 754.

orificium uteri protrudantur, neque tamen per illud transprimantur. Quandoque observatur, post primam sanguinis effusionem a partu os uteri constringi, sanguinemque in utero effluentem in grumum concreescere, qui brevi totum uteri cavum implet, & tunc parum, vel nihil fere, sanguinis effluit. Postquam autem grumus talis exprimitur, copia denuo sanguinis exit; quia nondum satis contracta fuerunt vasa. Hoc aliquando repetitis vicibus fit; sed, utero se magis contrahente, grumi mole minores exeunt, & tandem lochia moderata tantum copia fluunt.

Multa autem mala sequi solent magnam talem sanguinis jacturam; praecipue, si debiles, & tenerae ex sua natura fuerint puerperae. Cachexiam, Cacochymiam, Leucophlegmatiam, Hydropem ex largis haemorrhagiis sequi, antea demonstratum fuit. Similia notavit Hippocrates (y) de lochiis nimis: *Eam levis febris, & rigor prehendit, calorque toto corpore; nonnunquam etiam horror, & cibi fastidium, & omnino execrabitur, & tenuis erit, & debilis, & pallida, & tumida; & cibos aversatur; si quid vero edat, aut bibat, non coquitur.* Antea jam saepius dictum fuit, requiri copiam boni sanguinis, ut ex crudis ingestis fiant humores humani, ex quibus perdita restitui possint: unde patet, omnia degenerare in corpore post profusam, & subitam boni sanguinis jacturam.

Cum autem primo puerperii tempore tantum saepe periculum a copioso sanguinis effluxu metuendum sit, & tot mala quandoque sequantur, forte crederetur, idem timendum esse a diuturniore lochiorum fluxu, licet parviori copia. Verum considerandum est, anceps illud periculum adesse, quia subito sanguinis fluxu simul, ac semel vasa collabuntur, & vix ullus sanguis arteriosus ad cerebrum, aut cerebellum venit, nec datur tempus, ut vasa se contrahant, & minuta licet humorum copia, tamen plena maneant, sicque circuitus sanguinis perstet non turbatus. Robustus etiam homo, binis sanguinis libris per venae sectionem simul, & semel emissis, in animi deliquium cadet; quod nullo modo fiet, si quotidie tres unciae sanguinis detrahantur per octiduum. Praeterea longiori tali mora datur medelae locus, cum ex profusa haemorrhagia post partum subita quandoque mors sequatur.

Quanto autem tempore lochiorum fluxus persistere debeat, non adeo conveniunt auctores. Pro vario sexu infantis geniti lochiorum fluxus durationem determinavit Hippocrates (z) sic; *nam & purgatio a partu fit mulieribus, ut plurimum, in puella quidem concepta, duobus, & quadraginta diebus, eaque, ut maxime diuturna, ita perfecta est. Extra tamen periculum fuerit, si etiam quinque, & viginti diebus purgetur. In masculo vero purgatio diebus triginta contingit, sicque haec longissima, & perfecta est; extra tamen periculum fuerit, si diebus viginti purgetur. Postremo vero tempore quam paucissima purgatio procedit.* Si autem legantur reliqua, quae in eodem loco habentur, manifeste patet, Hippocratem non ex observatis determinasse lochiorum terminum, sed ex illa hypothese, quod tot dies deberent tribui lochiis, quot numerantur

(y) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 43. Charter. Tom. VII. pag. 754.

(z) De Natur. Puer. Cap. 5. Charter. Tom. V. pag. 314.

tur a primo conceptu ad perfectam embryonis conformationem usque, dum nempe membrorum distinctio appareret. Placuit autem *Hippocrati*, quadraginta duos dies determinare pro foemineo, triginta pro masculino sexu, ut haec conformatio absolvatur. Quenam tamen fuerit ratio, non liquet. *Du-retus* (a) credidit, tot dies debere impendi lochiis, quot per novem mensium spatium impensi fuissent menstruis, si gravida non fuisset mulier. Nam quae sunt biduo menstruales, ut sunt viragines, dies octodecim exigunt in puerperiis; quae tribus, viginti septem; quae quatrinduo, triginta sex; at menstruales quinque dierum, fere sunt puerperiales ad quadagesimum quintum diem a partu. Erat autem in illa opinione, lochiorum purgamenta esse reliquias emortuas menstruorum, in venis majoribus, & circa uteros stabulantium, quas per graviditatem incorruptas servavit amplificatio caloris nativi a foetu concepto; adeoque expurgandas esse.

Ast facile patet, haec omnia ex praeconcepta opinione, non ex fidelibus observatis deducta esse. Uterus graviditatis tempore extenditur, ejusque vasa dilatantur: post partum omnia ad pristinam molem, & amplitudinem debent redire, adeoque & vasa contrahi, ut minus sanguinis admittant, & emittant. Huic autem scopo fluxus lochiorum servit, ut nempe vasa uteri sic depleta contrahi possint. Quo ergo robustiora vasa erunt, quo minori impetu vasa uterina urgebuntur, eo brevior erit lochiorum fluxus. Unde puerperis, quae proli suae ubera praebent, lochiorum copia, & diuturnitas minuuntur: ob eandem causam in robustis, & valido labore duratis mulieribus lochia parce fluunt; & contra in laxis, & debilibus copiose, ac diu. Unde *Mauriceau* (b) statuit, nullam hic certam regulam obtinere, nullam diversitatem inveniri pro vario sexu infantis, sed plerumque quindecim, vel viginti dierum spatio lochia finiri. Idem suis observatis confirmat *Levret* (c), & optime monet, post febrim lacteam, antequam solitus menstruorum fluxus redeat, frequenter contingere, ut sanguis denuo prodeat subinde, sed absque ulla noxa. Credidit autem, hoc plerumque fieri in illis mulieribus, quae malae temperiei sunt, vel si fluor menstruus irregulari periodo illis redire soleat. Tamen idem observavi in sanissimis puerperis, & quae semper regulariter menstruatae fuerant. Nec mirum hoc videbitur, si consideremus, vasa uteri, circa graviditatis tempus ultimum, valde distenta fuisse, & licet postea contracta fuerint, tamen non statim pristinam firmitatem penitus recuperare, sed per aliquod tempus adhuc facile cedere humoribus impulsis; hinc a leviori etiam causa extrema vasorum uterinorum dilatata sanguinem emittunt. Unde, quando puerpera prolem non lactat, detumescentibus mammis, sanguineus lochiorum fluxus redit per aliquot saepe dies. Ob eandem rationem menstruus fluor, post puerperium absolutum sequens, solet esse copiosior.

(a) In Coac. Hippoc. tractat. 3. N. 4. pag. 444. 445.

(b) Traité des malad. des Femm. gross. Liv. 3. chap. 9. pag. 414.

(c) L'art des accouchem. pag. 135.

§. 1326. **S**I a retentis, haec educenda (1323.)

De hac re jam antea dictum fuit, quatenus nempe a sanguine grumoso, foetu alio, secundinis restantibus, lochiorum fluxus immoderatus sequitur.

Non incongruum videtur hic quaedam dicere de *Mola*, quatenus & haec inter illa numerari solet, quae retenta in utero noxam inferre possunt. Notum est, miras de *Mola* fabulas narrari a mulierculis; quod nempe *Molae* tales variorum animalium figuras habuerint non tantum, sed etiam animalem motum monstraverint, volando, currendo, latebras quaerendo &c.; quod *Molae* tales conatae fuerint celeriter redire in uterum, unde expulsae mox fuerant; quod nisi impediretur, ab hoc monstro immineret miserae puerperae certa perniciēs: imo vidi, dum de *Mola* quid mullaret garrula, & imperita obstetrix, mulieres, quae opem laturae parturienti aderant, au fugisse omnes, dum singulae metuebant, ne monstrum illud apud illas latebras quaereret. Numerosae tales historiologiae habentur, quas recensere pudeat.

Si uterus intumesceret, ut in gravidis fieri solet, neque tamen foetus humanus in utero contineretur, tunc *falsum conceptum*, vel & graviditatem spuriam vocabant auctores, qui de arte obstetricia scripserunt. Unde hydrops uteri, & tympanites, dum aëre elastico concluso distenditur hoc viscus, inter falsos conceptus numerantur (d): sed imprimis hoc nomen dabatur massis solidioribus, carneis quasi, quae post graviditatis signa prodibant de utero, & plerumque irregularis formae esse solent: hae proprie vocabantur *Molae*.

Satis communis opinio fuit, a gravissimis auctoribus probata, ex congressu utriusque sexus, loco foetus humani, produci quandoque deformem talem massam, quae omnino a naturali conceptu degenerat. Hippocrates (e) sic descripsit: *At molae conceptus haec causa est. Quum copiosi menses extiterint, & paucum, ac morbosum semen conceperint, tum minime genuinus conceptus gignitur; tum venter, tanquam utero gerentis, impletur, nihil autem in ventre movetur, neque in mammis lac generatur; pectus vero turgescit. Haec igitur biennium, saepe etiam triennium sic affecta est. Et siquidem una caro nascatur, mulier perit (neque enim superesse potest); sin vero multae, copiosus ei sanguis, & carnosus per pudendum erumpit. Quod si id moderate fiat, servatur; alioqui profluvio correpta perit. Atque ea quidem est hujus morbi conditio. Discernere autem oportet plenitudine, quodque in ventre non moveatur. Eadem habet alio in loco (f), nisi quod ibi legatur; neque lac in mammis generatur; ipsi tamen mammae turgent; dum in priori textu pectus turgere dixit. Haec ergo signa molae erant Hippocrati, si abdomen intumesceret, nec tamen suo tempore perciperetur motus foetus, & simul mammae turgent, nec lac tamen generaretur in illis. Futurum enim recens nato homini alimentum provida natura jam parat graviditatis tempore: ubi mola vero*

(d) Levret l'art des accouchem. pag. 184.

(e) De Mulier. morb. Lib. I. Cap. 70. Charter. Tom. VII. pag. 770.

(f) De Infocundis Cap. XVI. Ibid. pag. 855.

vero geritur, illud inutile foret, cum in utero informis massa haereat, non foetus humanus.

Sed etiam apparet, quod varii tumores, in ipsa uteri substantia enati, vocatae fuerint molae. Aëtius (g) enim sic descripsit: *Quae mola vocatur, affectus quidam uteri est, ad scirrhum tendens, interdum post inflammationem praecedentem eveniens, interdum post locale ulcus, cui caro superexcrevit; a motus autem gravitate, & difficultate molae nomen assumpsit. Affectum tumor immitis consequitur, cum hypocondriorum retractione, gracilitate, decoloratione, appetendique dejectione: ac primo conceptionis opinio suboritur &c. ubi manifesto vitia in uteri substantia nata molas vocat. Paulo post tamen addit sequentia: Tradunt nonnulli, in quibusdam mulieribus carunculas ad juglandis magnitudinem per pudendum excerni solitas, interdum singulis mensibus, interdum bimestres, & trimestres. Hanc aegritudinem alii tanquam insanabilem penitus reliquerunt, alii incobantem tantum curari posse, confidunt. Satis verosimile videtur, abortum hic notari: postquam autem varia descripsit fomenta, balnea, pessaria &c., partim emollientia, partim stimulantia, dicit: Quibus peractis, frequentissime plurima atri, & grumescens sanguinis copia exit, & morbus dissolvitur. Philosophus vero, detentis, inquit, uxoris amici menstruis, primo eam concepisse arbitrabar, postea, exaudito magis tumore, hydropem suspicari coepi, quum totum corpus tumescere cernerem: at tandem, ubi id esse morbi genus deprehendi, quod alii plinibum, alii molam appellant, rutam, & anethum in vino antiquo odorato decoxi, atque inde herbis abjectis vinum calidum propinavi, prope aquae loco hujusmodi offerens; statimque mulier, excreta cruoris copia, salutem adeptam est. Certe nec scirrhus uteri, nec ulcus profusa haemorrhagia curantur, quae potius mali ominis est; cum designet, ab acri ichore jam erodi vasa, adeoque omnia mala metui potius, quam salutem sperari posse.*

Multa observata evincunt, abortus saepius pro molis habitos fuisse. Ipse Mauriceau (h), licet semini corrupto utriusque sexus molarum originem adscribat, illasque a falso conceptu distinguat, fatetur tamen, quod multiplici experimento invenerit, falsos illos sic dictos conceptus fuisse veros conceptus primis ab impraegnatione diebus; adeoque tantum esse parvas placentulas, quarum membranae sanguine coagulato infarctae sint; quae, aquis contentis jam vacuae, ab uteri contractione pressae, acquirunt figuram cavi ipsius uteri. Foetus autem non invenitur, quia vita orbis ob nimiam teneritudinem diffluit, vel aquis ruptis informis muci specie elapsus fuit. Notum enim est, minimos Embryones, nisi in liquido suspensi haereant, collabi, & omnem formam amittere.

Ex his ergo patet, molas non esse natas ex corrupto femine, cum fateatur (i), molas, & falsos conceptus longiori tantum in utero mora a se invicem differre. Si enim relictæ illae placentulae secundo, vel tertio mense prodeant, tunc vocat falsos conceptus; si vero diutius in utero manserint,

&c.

(g) Lib. XVI. Cap. 82. pag. 161.

(h) Traité des Malad. des femm. gross. Liv. I. chapit. X. pag. 109. & seq.

(i) Ibidem pag. 111.

& augeantur, tunc vult, *molae* esse appellandas. Accuratus (k) dicitur, abortum duplici modo ejici: ovi, vel *molae*, specie: Aliquando *membranaeam vesicam* refert, majorem, minoremve, prout longius, breviusque fuit post *impraegnationem intervallum*, & ovo subventaneo non dissimilem, nisi quod extrinsecus obfessa sit rudimento *placentulae*. Hoc rudimentum leviter sanguine suffusum apparet, qui facile inde abluatur, dummodo in aqua frigida molliter concutiatur, & si aliquando frustulum coagulati cruoris alicubi tenacius haeserit, id nullo negotio ope *tenaculi* plerumque amoveri se patitur. Est perfecte illud, quod *Mauriceau* vocavit falsum conceptum.

Ubi autem abortus forma *Molae* prodit, (l), tunc *massam* repraesentat sanguinis rubri, valde compactam, quae nullo artificio, mihi hactenus cognito, solvi potest. Constat autem haec massa ex segmentis irregularibus, arcte ad se invicem appressis: trunculos *placentulae* ovi intra suam substantiam adeo tenet, ut hinc inde unicus extricari possit, sed semper plus, minusve dilaceratus; tota vero *placentula* nunquam expediri potest. Talis mola ergo est conceptus naturalis; sed ab effuso, & coagulato sanguine ovum humanum ita cingitur, & contractione uteri ita comprimitur, ut radices *placentulae* intricantur penitus, & facile rumpi possint *membranae*, aquae una cum minuto *embryone* effundi, vel relictus si fuerit, sic comprimi, ut non amplius distingui possit. Non enim *massae* ambientis ovum ubique eadem crassities, sed versus *placentulae* limbum multo tenuior; unde in illa parte, minus nempe resistente, *membranae* facile rumpi poterunt. Ubi autem talis mola prudenter diffecatur dextera manu, in amnio multum intropresso foetus invenitur. Habeo talem *molam*, in qua primo adspectu *embryonem* invenire non poteram, tandem obvium; exiguus scilicet, grano hordei vix major, abscondebatur inter inaequalitates amnii irregulariter intropressi: sed & alterum habeo, qui ovo suo, licet *molae*, satis proportionatus, priorem pollicis articulum longitudine aequet torosus (m).

Aliquando contingit, ut cruor coagulatus, ovo cohaerens, non ambiat totam ejus superficiem; unde in quodam loco talis *molae* *membrana* tenuis fere pellucida apparet, per quam contentus *Embryo*, liquori amnii innatans, manifeste conspicitur. Talis mola describitur apud *Denys* (n): continebat autem haec *membranula* duo circiter cochlearia liquidi, quod comparat liquori pericardii: *Embryo* albicans binos digitos aequabat longitudine. Multos vidi *Embryones*, in propriis *membranis* contentos, quosdam servavi, & manifeste observavi, si parvi admodum fuerint, quod tunc tota externa ovi superficies hirta appareat, fibrillis ramosis emissis: in majoribus jam aliqua pars *membranae* ambientis caret his fibrillis, & pellucida est. Cum jam *Embryo* ille duos *digiti* articulos aequaret, aliqua pars ovi his fibrillis carebat; cui ergo concretus sanguis minus haerere debebat; & in reliqua

ovi

(k) Noortvvyk de utero gravido pag. 119.

(l) Ibid. pag. 120.

(m) Ibid. pag. 121.

(n) Over het ampt, der Vroedmeesters en Vroedvrouwen. 2. hoofdstuck. pag. 170. 171.

ovi parte fibrillis intricatus haesit pertinaciter. Hinc licet tota illa mola referret carneam solidam massam, in parte inferiori apparebat pellucida membrana, dimidium solidum fere aequans magnitudine. Videtur autem haec pars membranacea fuisse pars inferior ovi, uteri orificio proxima, uti ex descriptione patet.

Validam admodum haemorrhagiam passa fuit haec mulier, & acres simul partus dolores; unde mirum non est, cruorem intricatum fibrillis, membranam ovi externam cingentibus, contractione valida uteri inter partus dolores, mutatam fuisse in massam talem, quasi carneam, densam, in superiori parte crassiorem, & latiore, in parte inferiori tenuiorem, & angustiore; ita ut cor humanum fere referret figura, cujus apex tenuis, membranaceus, & pellucidus foret.

Credebat autem *Denys* (o), a priori partu placentae partem mansisse utero affixam, quae in molem excreverat, cui postea, impraegnata muliere, ovum cum embryo contento adcreverat. Sed ex modo dictis facile apparet, quomodo talis mola produci potuerit, absque eo, quod placentae pars a priori partu residua supponatur.

Simul etiam intelligitur, quare saepius in talibus molis nullus Embryo reperiatur. Pars enim illa tenuis membranacea, vel nullo, vel paucio saltem tecta cruore, contracto dolorum tempore utero, facile rumpitur, elabitur tener embryo, una cum sanguine copioso, vel si manserit per chordam umbilicalem affixus ovo, aquis, quibus defendebatur a pressione, elapsis, comprimitur a contracto utero sic, ut quasi dispareat; imprimis, si vacuum jam aquis ovum ingrediatur sanguis: notum enim est, haemorrhagiam uterinam comitari molae exclusionem. Nemo, nisi hoc tentaverit, novit, quam difficile sit extricare parvulum embryonem ex tali massa densati cruoris: simul toties contingit, ut frustra quaeratur, cum ruptis membranis jam elapsus fuerit. His diebus trihorii spatio mihi opus fuit, ut detegerem embryonem in tali mola, octava post conceptum septimana expulsa. Obstetricibus deficit dexteritas; Medicis in numerosa praxi versantibus tempus, & quandoque patientia haec investigandi. Unde mirum non est, molam habitam fuisse pro massa informi, & pro falso conceptu, dum nihil organici deprehendebatur. Verum ex dictis patet, fuisse veros, & naturales conceptus, sed a sanguine circumambiente, ac uteri contractione miris modis mutatos, & abortiendo expulsos.

Hinc apparet, quid censendum sit de signis molae, sive falsi conceptus, quibus a vero distingui possit. Recensuerunt haec auctores plures, qui de re obstetricia scripserunt; uti & *Lamzverde* (p), qui ex instituto de molis scripsit. Omnes fere fatentur, *molae signa diagnostica cum signis verae impraegnationis fere coincidere*; reliqua vero, quae enarrantur, indicia sunt talia, *ut ad minimum aequivoca sint* (q). Pulcre autem explicat idem egregius auctor,

(o) Over het ampt. der Vroedmeesters en Vroedvrouwen. 8. hoofdstuck pag. 171.

(p) Histor. natur. Molar. uteri Cap. XVI. pag. 148.

(q) Levret l'art des accouchem. pag. 180.

etor, quomodo abortus, vel ejus reliquiae in molam mutantur, & hinc non adeo prudenter concludunt quidam, falsum fuisse conceptum, non autem veram impraegnationem (r).

Certe *Ruyfchius* (s), adeo oculatus in his, dum ex mandato Magistratus omnes populosissima in urbe Amstelaedamensi degentes obstetrices examinabat, ut illarum ignorantiam emendaret, sollicitè in molarum historiam inquisivit, plures ipsi allatas examinavit accurate, tandemque conclusit; *Verosimile admodum esse, Molas ita decantatas nil aliud esse, quam ejusmodi carnosas uteri excrescentias, aut placentulas retentas, & ab utero, uti supra innui, compressas; neutiquam vero ex mala conceptione ortas.* Excrescentiae tales carnosae, ex ipsa uteri substantia enatae, vera sarcomata, toties pro molis habita fuerunt. *Sarcomata, inquam, quia praeter carnem in illis nihil deprehendi: ejusmodi excrescentias uterinas, per pedunculum utero adhaerentes, observavi in ipso utero, dum mulieres in partus doloribus essent, & excretarum Iconem exhibeo.* Illud vero neutiquam mirandum, quandoquidem in ipso etiam stomacho, & vesica urinaria ejusmodi corpuscula excrescere, observari. Si jam conferantur illa, quae Celeberrimus *Levret* (t) de his scripsit, ubi simul indicat pulcrum methodum haec mala curandi per ligaturam uti & illa, quae ab eodem auctore conscripta alibi (u) habentur; patebit, sarcomata illa uterina frequentius occurrere, quam olim credebatur, simulque saepius pro molis descripta fuisse, etiam a peritis viris. Licet autem perita manu plerumque indigeant tales tumores, ut tollantur, tamen contingit, ut aliquando sponte separentur, & excidant; cujus rei plures observationes ibi habentur. Admodum verosimile videtur, illam molam, quae describitur, & delineatur (v) in *Actis Parisinis*, fuisse de genere sarcomatum, sive polyporum uterinorum. Historia hujus molae ab Academia Montepessulana missa fuit. In figuris hujus molae manifeste apparet pedunculus, a quo pendit tota tumoris massa; & si conferatur historia cum illis, quae in *Academia Regia Chirurgica* habentur (x), videtur vix ullum superesse dubium.

Praeterea notandum est, si duorum, triumve mensium embryo elapsus fuerit, ruptis membranis, & secundinae manserint, uti toties fit, cum quandoque adeo exigua uteri apertura sit, ut hae absque violenta dilatatione educi nequeant, tunc mira quandoque fit secundinarum degeneratio. Optime notavit *Celeberrimus de Gorter* (y), si parvulus embryo moriatur, non statim omnem vitalem influxum cessare in placenta, quae ab utero sanguinem recipit: adeoque si illa pergat crescere, dein post aliquod tempus ab utero separetur, & expellatur, prodire informem massam, quae mola vocatur. Cum autem in minoribus Embryonibus placentae moles major sit pro-

(r) *Levret l'art des accouchem.* pag. 62. 63.

(s) *Observat. Anatom. Chirurgic. observ.* 28. 29. pag. 25. & seq. & *observ.* 58. pag. 54.

(t) *Observat. sur la cure radic. de plusieurs Polypes de la matrice &c.*

(u) *Mémoir. de l'Académie de Chirurg.* Tom. III. pag. 518. & seq.

(v) *Académ. Royal des sciences l'an 1735. Mem.* 770-778.

(x) *Loco modo citato.* (y) *Van de Sluytband der kraemvrouwen* pag. 41.

proportionaliter, quam in foetu maturo, ideo illam comparavit foliis seminalibus plantarum, quae & mole majora sunt, & tamdiu parant nutrimentum tenerae plantulae, donec propria quadra vivere possit; tunc enim haec, jam inutilia, arefacta decidunt: uti autem haec folia feminalia sine plantulae nascentis ope subsistere possunt, ita & placentam, embryone jam destructo, vivere posse, autumat. Observata *Ruysschii* confirmant, placentam diu manere in utero posse, & in hydatides degenerare (z); praeterea notat, *placentulas duorum, trium, quatuorve mensium abortus ita indurari, talemque adipisci formam, ut pro molis habeantur ab imperitis, modo diutius, quam par sit, aut per dies aliquot in utero haereant.* Figuris tales sic dictas molas expressit; simulque notat, ab uteri compressione *carne musculoſa ſolidiores evadere.*

Sed & notat *Ruysschius* (a), sanguinem coagulatum in utero retentum, ab uteri compressione admodum durum reddi; cui *ſaeppiſſime membranis analogum quid appenſum invenitur, ſicut, poſt venae ſectionem in pede inſtitutam, aquae innatare videmus.* Figuris pariter coagulati cruoris degenerantis maſſas expreſſit. Saepe in puerperii primis diebus tales maſſas ejeſtas vidi, quae ſpiſſiorem, ſed a minimo motu tremulam adhuc gelatinam referunt; unde territae adſtantes mulierculae jurabant, vixiſſe molam, & ſe hujus rei eſſe oculatas teſtes. Si autem coagulatus cruor diutius manſerit in utero, denſatur magis, tenuiora exprimuntur, & loturae carniſum inſtar ex vagina prodiſt ichor; tenemus dein ſequitur, & exprimitur maſſa, cujus inferior pars in collo uteri haefit ſaepe per aliquot horas, & in apicem formatur, qui ibi minus preſſus fuit, hinc cruorem magis refert nigricantem, & adhuc tremulum, dum reliqua maſſae pars per uteri compressionem magis ſolidata eſt, & minus profunde rubri coloris. Dum talis maſſa exit, arduum eſt perſuadere adſtantibus, & puerperae, molam non eſſe, imo vivum animal. Confirmantur in illa opinione, quod puerpera inſigne levamen ſentiat, dum uterus liberatur a mole, qua gravabatur. Hinc facile patet, quid ſentendum ſit de omnibus illis hiftoriolis, quae circumferuntur, de puerperis, quae & foetum maturum pepererunt, & poſtea molam.

Cum ergo ex modo dictis conſtet, abortus, ſecundinarum degeneres reliquias, sanguinem coagulatum, ſarcomata uteri, toties pro molis habita fuiſſe, an operae pretium erit, fingere degener ex ſemine, & menſtruo corruptis monſtrum? Certe nullam molae hiftoriam novi (& legi plures,) quae non commode poterat explicari ex cauſis modo recensitis. An bona eſt diſtinctio, quam *Lamzveerde* (b) dedit; *Mola duplex eſt; una generationis, de qua hic agitur; altera nutritionis?* Fatetur, in utero virginum ex materia nutritionis tumores carneos naſci poſſe, & has *molae nutritionis* vocandas voluit; ſed de *molae generationis* ſequens conſcluſio apud illum legitur (c); *Molarum materia conceptionis, & formationis eſt genitura morboſa, ſive ſemen utriuſ-*

(z) Obſervat. Anatom. Chirurg. N. 28. pag. 26.

(a) Ibid. obſervat. 29. pag. 28.

(b) Hiftor. molar. uteri Cap. I. pag. 13.

(c) In fine capit. X. pag. 104.

utriusque sexus certis particulis destitutum, in uteri arcam effusum: materia nutritionis est sanguis menstruus affluens. Unde statuit, ad generationis molam coitum absolute requiri. In eadem sententia fuit & Fernelius (d); cujus haec est definitio: *Mola tumor est carnosus, non in substantia, sed in uteri capacitate genitus*: hinc excludit molas, quas nutritionis dixit Lamboveerde; sed pariter ad Molae generationem concubitum requiri statuit, dicens: *Molae causa est viri semen, idque aut corruptum, aut quovis modo invalidum, quod alimentum quidem trahere, nihil vero conformare potest* (e).

Certum est, omnes illas molas vocatas, quae embryonem humanum continent, & illas, quae relictæ placentulae degeneratione fiunt, absque concubitu nasci non posse. Sarcomata autem uteri, & ex concreto sanguine natas massas, absque ullo concubitu nasci posse, aequè certum est. Cum autem & haec sub generali molarum nomine comprehendi soleant, patet, magna cum prudentia molae nomen usurpandum esse, ne temere illibatae pudicitiae virginibus, & castis viduabus incontinentiae inuratur nota. Testatur Ruyschius (f), ejusmodi molas a virginibus (aut saltem de quibus nulla alia erat suspicio) fuisse exclusas. Figuram autem exhibet talis molae, quae collo angustiori refert sarcoma, sive polypum uterinum. Praeterea observavit, vetulas, viris non utentes, aliquando in lucem exposuisse tales molas. Circa illud tempus vitae, quo menstrua cessare incipiunt, in junioribus admodum raro, molas nasci, propriis ex observatis affirmat Levret (g). Idem & alii testantur (h).

Minus proprie vocaverunt *Molas*, dum uteri, aut vicinarum partium mira degeneratio tumores magnos produxerat. Sic Lamboveerde (i) in senioris virginis cadavere, quae per viginti, & plures annos tumidum gestavit abdomen, totum uterum invenit scirrhosum, cartilagineum, qui cultro vix cederet, octodecim libras pendentem: in puellae undecim annorum cadavere invenit tumorem quindecim librarum, qui ex parvo pedunculo pendebat affixus testiculo. Utrumque hunc tumorem ad molas retulit. Sic & Paracus uterum scirrhosum, durissimum, qui a cadavere exemptus ultra novem libras ponderabat, statuit, in initio molam fuisse, quae temporis successu in scirrhosum corpus, una cum uteri propria substantia, degenerasset (k). Imò jam apud Moschionem (l), dum de mola agit, leguntur sequentia: *Duritia matricis est, quae ex praecedente fervore fit, per quam venter totus extensus est ita, ut videatur gravida. Quandoque aliquid etiam in matrice generatur, copiosior caro augetur, & immisso digito, obstetrix in orificio, vel collo invenit illud ipsum. Quandoque tota matrix talem morbum patitur, ita ut totus venter lapidea duritie increseat, & reliquum corpus cum malo colore, & fastidio detineatur.*

EX

(d) Patholog. Lib. VI. Cap. XV. pag. 194.

(e) Ibid. pag. 195.

(f) Observat. Anatomic. Chirurg. N. 58. pag. 54.

(g) L'Art des Accouch. pag. 187.

(h) Brudenell Exton sect. VIII. pag. 127.

(i) Histor. natur. Molar. uteri Cap. 2. pag. 14. 15.

(k) Spach. Gynaec. pag. 424.

(l) Ibid. pag. 16. & Harmon. Gynaec. part. prior. Cap. VII. pag. 7.

Ex his patet, diversa corporis mala ab Auctoribus sub mola nomine describi. Simulque ex modo dictis apparet, quid de mola sentiendum sit.

§. 1327. **S**I ab affectu animi, sanguine nimis fluido, nimis agitato, concurrendum ad hordeata, gelatinas, emulsiones, opiata, adstringentia.

Si animi affectus validi nexum placentae cum utero solvere possint, & periculofam haemorrhagiam producere, quanto magis illud metuendum erit, dum post partum vasa adhuc hiant, vel tam parum contracta sunt, ut a leviori quavis causa denuo dilatari possint. Videantur illa, quae de hac re ad §. 1306. dicta fuerunt. Omnes ergo animi motus cavendi sedulo sunt, ab omni cura rei domesticae arcendae sunt puerperae, nec laetus, nec tristis adveniat nuncius, ne pacata ferenae mentis tranquillitas turbetur ullo modo. Prudenti lege *Harlemi* (quae Hollandiae urbs est,) cautum est, ne toto puerperii tempore quid fiat, quod necessariam puerperae quietem turbare possit. Signum affigitur januae domus, in qua decumbit puerpera, quo viso, non licet lictori, apparitori, vel alii cuicumque iustitiae ministro hanc domum ingredi. Tantam Respublica curam habendam voluit mulieris, quae patriae civem dedit. Optimi cives, a teneris jam assueti venerari foecundas matres, omnem strepitum a vicinia arcent solliciti. Pulcrum certe, & imitatione dignum exemplum.

A sanguine nimis fluido, nimis agitato, &c. Indicatio Medica facile patet: omnia, quae nimiam tenuitatem humorum emendare possunt, nimiumve motum compescere valent, tunc adhibenda. Verum imprimis hic attendendum ad illa, quae possunt efficere, ut uterus se contrahat, sicque hiantia vasa claudantur; & cum syncope, imo subita mors hic metuenda sit, cita medela requiritur. Antea dictum fuit, peritissimos in arte obstetricia magistros monuisse, ne placenta solvatur ab utero, antequam ille incipiat se contrahere, ut caveatur periculosa haemorrhagia. Tangendo abdomen puerperae, hoc distinguere norunt. Peritus obstetricans Chirurgus *Dusse* (*m*) indicavit methodum, per quam nimius lochiorum fluxus minui posset: applicabat utramque manum hypogastrio puerperae, & molliter premebat uterum, simul movendo manus per totum hypogastrium, nunc circuli in modum, nunc a dextris sinistrorsum, & contra, ab inferioribus sursum, & contra; sicque in omni directione leniter premere, & movere conabatur uterum flaccidum, ut se contraheret magis. Hoc modo solebant prodire sanguinis grumi; qui tamen, si majoris molis forent, & adeo replerent uterum, ut resisteret nimis molli illi pressioni, tunc manu prius educi debebant, de qua re ante dictum fuit. Scite addidit, pro more suo, orbis eruditi decus, *Fontanelle*, unicum posse culpam in hac methodo vitium, quod nempe admodum simplex cum esset, omni fere mysterio careret.

Observavit *Mauriceau* (n), quandoque nimium lochiorum fluxum produci a crassioribus faecibus, graviditatis tempore in crassis intestinis accumulatis. Vocatus fuerat ad puerperam, cui rudiori manu educta placenta fecerat validam haemorrhagiam, quae adhuc pergebat per quinque, vel sex dies. Quamvis autem aliquot clysmata emollientia applicata fuissent, nullae prodibant faeces; sed sola clysmata per anum exhibant: contra plurimum, qui aderant, opinionem acrius parum clyisma injici curavit, tali cum effectu, ut integram pelvim duris faecibus repleverit, statim detumuerit abdomen, antea inflatum, ac dolens, & haemorrhagia cessaverit. Testatur autem, quod eadem methodus ipsi postea feliciter cesserit ad minuendum nimium lochiorum fluxum; si nempe iusta suspicio foret, copiam faecum induratarum haerere in crassis intestinis.

Si autem post haec nullo modo cessaret nimius lochiorum fluxus, remotis culcitris, straminibus, simplici linteo tantum tectis, imponebat puerperam; lumbis applicabat oxycratum frigidum; in hyeme tamen parum tepescens; portulacae succum propinabat, lumbos cingebat recenti *Polygono*, quod & *Centumnodia* dicitur. Juscula meraca, & gelatinas parca copia dabat simul; sicque conservabat vitam minimam, ut daretur tempus vasorum contractioni. Pauculum vini rubri, aquae ferratae mistum, dabat pro potu.

Victum paullo incrassantem laudat *Sydenhamus* (o), & bis, vel ter de die uncias sex potus, qui parabatur ex vini rubri, & aquae plantaginis partibus aequalibus ad tertias coctis, & dein saccharo edulcoratis. Sic dissipabatur in auras multum de fragranti spirituosa vini parte, & manebat austerum adstringens, quod vino rubro inest. Bonum effectum satis vidi, si unciam mediam *tincturae cinnamomi* in unciis sex aquae stillatitiae *melissae*, vel similis diluerem, & cochlear talis mixturae omni bihorio exhiberem. Refocillat tale remedium, roborat, nec tamen motum sanguinis augendo nocet; aqua autem stillatitia *Cinnamomi*, ejusque oleum stimulum fragrantem aromaticum habent; sed roborans illud austerum una cum *Cinnamomi* fragrantia in tinctura adest; quae ideo magis convenire videtur.

Caeterum de efficacia opiatorum, & adstringentium, in nimio lochiorum fluxu, videantur illa, quae ad §. 1307. dicta fuerunt.

§. 1328. **Q**Uorum delectus docent signa morbi, temperiei, velocitatis.

Sic si a retentis grumis pergat nimius lochiorum fluxus, hi educendi sunt prudenter, uti dictum fuit; si a flaccida, & inertī temperie hoc fiat, roborantia cardiaca locum habent.

Verum si ab utero non contrahente se ingens haemorrhagia contigerit, ve-

(n) *Traité des malad. des femm. gross. liv. 3. chap. 5. pag. 386. &c.*

(o) *Dissertat. epistol. pag. 537.*

velox perniciēs metuenda est; adeoque efficacissima quaevis statim tentanda sunt; de quibus omnibus dictum fuit.

Sequitur jam, ut expendantur sollicitē illa mala, quae lochiorum retentionem sequi solent.

§. 1329. **D**Um fluit ab uteri vasis restrictis in mammas pabulum serosum lacteum, febricula exoritur, qua orta, saepe lochia omnino retinentur; unde infinita, & pessimae indolis symptomata; prout in hoc, illudve viscus rapiuntur; hinc phrenitides, pleuritides, peripneumoniae, anginae, paraphrenitides, mammarum inflammationes, peior hepatis, ventriculi, omenti, mesenterii, lienis, renum, intestinorum, tum Dysenteria, Colica, Iliaca, Apoplexia, Paralysis, & multiplex sane mali species.

Antea ad §. 1325., ubi de nimio lochiorum fluxu dictum fuit, constitit, quantitatem lochiorum multum variare, neque certam copiam determinari posse: idem & locum habet de tempore, quo durat lochiorum fluxus. Cum autem a lochiorum suppressione tot, & tanta mala metuenda sint, operae pretium est, considerare illa, quae naturali lege in puerperio contingere solent.

Simul ac placenta solvitur ab utero, puri sanguinis copia undatim effluit, & vasa, distendente sanguine libera, se contrahunt; unde brevi minuitur illa haemorrhagia, ita ut paucis post partum horis lochiorum rubedo jam incipiat minui, & color ruber tertio, quartove die, vel & quinto penitus absit (vide §. 1325.). Hoc autem imprimis notandum, quoniam vidi aliquando, Medicos pessima quaeque metuisse, dum hoc puerperii tempore lintea nulla rubedine tincta viderent; unde credebant, lochiorum suppressionem adesse, atque omnia artis molimina volebant adhibenda, ut lochia provocarentur denuo. Verum haec lochiorum imminutio naturalis est, magis magisque contractis vasis uterinis. Cum autem *Hippocrates* (vide §. 1325.) longum satis tempus lochiorum expurgationi statuerit, & alii crediderint *emortuas menstruorum reliquias*, toto graviditatis tempore collectas, sic effundi, inde tot natae fuerunt de lochiorum suppressione querelae. Solent autem postea sponte redire lochia sanguinea, uti pariter ad §. 1325. monitum fuit.

Adeoque non videtur periculum imminere, dummodo nulla alia mala symptomata adsint, de quibus postea, si lochia hoc tempore parciora fuerint, & non rubra. Verum omnino cessare, ita ut lintea, per aliquot horas vulvae applicata, sicca maneant, hoc certe peioris ominis est. Naturaliter enim tunc illud, quod ex utero depluit, boni puris similitudinem habet (p) tam colore, quam crassitie, & odorem fatuum, lymphaticum (q).

O 2

Si

(p) Levret l'art. des accouchem. pag. 135.

(q) Ibid. pag. 140.

Si omnia feliciter cedant, talia lochia pergunt, purulenta quasi, ad puerperii finem usque, ita tamen, ut quotidie copia minuantur.

Antea ad §. 1304., ubi dictum fuit de periculosa uteri haemorrhagia in gravidis, constitit, chorii superficiem ubique necti uteri cavo per cellulosa substantiam, per quam vasa ex utero ad chorion tendunt. *Cavum enim uteri universum vasa exhibebat plurima, impleta, ore aperto hiantia, cum reliquiis cellulosa illius substantiae, quae ovum ligaverat; haec potissimum cernebantur eo in loco, cui placenta adhaeserat; eratque locus ille tota fere posterior pars uteri, quae in situ dorsum spectat, amplius igitur, & vix minor, quam tertia pars circumferentiae uteri. Superficies uteri interna, qua placenta sustinuerat, inaequalissima apparebat, & leviter turgida adsurgebat, &c.* (r). Cum ergo uteri superficies, post partum etiam quam maxime naturalem, lacerae tunicae illius cellulosa reliquias habeat, & vasorum ex utero in chorion tendentium extrema rupta, praecipue in loco, cui placenta adhaesit, videtur tota cava superficies uteri ab his depurari debere, ut ad statum pristinum redeat. Cum autem & cellulosa haec substantia, & vasa, licet magna, tenerrima sint, lenis, & superficialia quasi suppuratio sufficit, ut lacera haec, & semimortua quasi a vivis, & sanis separentur, ac infarcta vasa in loco, cui placenta adhaesit, liberentur ab immeabili humore; sicque ex omnibus his solutis simul producat puriformis liquor, qui sub forma lochiorum utero exit; de quibus videantur illa, quae ad §. 387. dicta fuerunt.

Verum non potest separatio chorii, & placentae ab utero fieri, nisi plurima vasa rumpantur; unde fit *soluta cohaesio, recens, cruenta, partis mollis*; id est *Vulnus* (vide §. 145.). Verum quidem est, quod in vulneris definitione dicatur, illam cohaesionis solutionem fieri *a corpore duro, acuto, moto, pressio, vel resistente*, ut nempe a contusione imprimis distinguatur; sed facile patet, non mutari vulneris naturam, dum vasorum cohaesio tollitur avulsione chorii, vel separatione quantumvis leni, per quam tamen vasorum cohaesio solvitur.

Si jam phaenomena vulneris, §. 158. enumerata conferantur cum illis, quae puerperis contingunt, omnia ad amissum quadrant; quatenus nempe loci affecti conditio, & solutae cohaesionis causa permittunt, & sensibus detegi potest. Cruor enim primo cum impetu effluit, dein brevi sponte minuitur, & tandem sistitur; in vulnere externo sibi relicto crusta sanguinis innascitur, quae hic locum non habet, cum uteri superficies interna humida sit, & aëris liber accessus caveatur; contracto utero, & imprimis ejus orificio, simul linthea calida applicentur vulvae, ne aëris frigus noceat. Verum, paucis post partum horis, liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit. Uti in vulnere sensibus patente labia vulneris tument, calent, dolent &c. (vide §. 158. N. 5.), sic & simile quid videtur in utero fieri, at levius, quia superficialia tantum hic laesio obtinet, sed in lata superficie: oculis quidem haec distinguere non possumus; sed videtur inde deduci posse, quia

ut

ut in vulnere, ita & in puerperio, illo praecise tempore febricula adest, & pariter tertio, quartove die serius, vel ocyus adest purulenti quid, imo quandoque omni dote verum pus, quod muco, & humori transpiranti ex uteri, & vaginae superficie mistum, quandoque aliquam diversitatem habet a bono pure, licet a similibus cum pure causis factum. Ubi autem pus in vulnere apparet, tunc rubor, calor, dolor, tumor, febricula &c. cessant, vel minuuntur. Eadem mutatio in puerperis observatur. Pulcre illa lochiorum mutatio apud *Moschionem* (s) legitur. *Primo sanguis* (addendum voluit editor *purus, & multus*), *secundo faeculentus, & paucus, ultimo purulentus*.

Videtur hinc valde probabile esse, febriculam illam, quae in puerperis lactea solet dici, non tantum a lacte ad mammas delato nasci, sed etiam a depuratione uteri per blandam talem, & superficiariam suppurationem. Cum autem vel optimum etiam pus diutius retentum acre fiat, & putrescat (vide §. 406.) idem de lochiis purulentis verum erit, si retineantur. Simul apparet, non timendum esse purulentum talem lochiorum fluxum, cum naturalis sit, quod notari meretur, cum non tantum puerperas, & adstantes, verum etiam Medicos turbatos fuisse, noverim, dum periculosum uteri ulcus adesse credebant: augebatur metus, si simul subputridus odor nares feriret, vel ob lintea non satis frequenter mutata, vel dum aliquid grumosi sanguinis in uteri sinubus diutius retentum, in tabum subputridum deliquescens, simul prodiret. Quandoque in cavo uteri grumusus sanguis adest, saepe etiam in sinubus ipsius uteri substantiae insculptis, de quibus antea dictum fuit, aliquid de cruore remanet, quod postea malo odore lochia inficit. Saepius mihi videre contigit, quod optime monuit *Levret* (t), lochia nempe malum odorem habuisse, & tunc apparuisse maculas in linteis, quae limbo livido undique cingebantur, qui manebat, donec grumus cruoris exiret, vel minor si fuerit, in sinubus uteri deliquescens, una cum purulenta materia expellebatur; quo facto, omnis foetor aberat, & solitus odor subnauseosus nempe, in linteis percipiebatur. Unde intelligitur etiam, quare uno die foeteant, altero non: prout nempe lintea saepius, aut rarius permutantur, vel aliquid grumosi cruoris delitescit.

Si autem illud purulentum non exeat, sed resorptum misceatur humoribus, poterit mala metastasi ad viscera delatum, periculosos producere morbos. Indicavit *Hippocrates* (u) hoc discrimen. *Quibus ex partu prodeunt alba; his vero suppressis, cum febre surditas, & dolor acutus ad latus fit, mente moventur, & perniciose habent*. Eadem Prognosis alio loco habetur (v), & *Galenus* (x) in commentario ad hunc textum dicit: *Quum igitur hic sanguis vacuatus non fuerit a mulieris puerperio, aut uterum ipsum in phlegmonem attollit magnam, aut ad superiorem aliquam sedem vectus,*

Tom. IV. pars II.

o 3

parti

(s) Spach. gynaec. pag. 5. N. 56. & Harmon. gynaec. part. prior. Cap. XVII. pag. 14.

(t) L'art des accouchem. pag. 140.

(u) Coac. Praenot. N. 525. Charter. Tom. VIII. pag. 883.

(v) Hippoc. praedict. Lib. I. textu 82. pag. 751.

(x) Ibidem 752.

parti excipienti proprium affectum, periculumque adfert; ad quam autem pervenerit, mox apparentia symptomata indicabunt, quomodo & nunc tum thorax, tum caput vitiosum sanguinem ab utero sursum delatum, exceperint.

Apparet ergo, quod Hippocrates alba illa lochiorum purgamenta observaverit, & ab illorum retentione periculosam metastasin metuerit. Alius autem textus docet, quod pro purulentis habuerit, & ulceratum uterum crediderit. Sic enim habet (y): *Si ulcerati quidem uteri fuerint, neque puerperii purgamenta, ut decet, adfuerint, omnibus partibus dolebit, & nisi magna ulcera adfuerint, curata brevi, sanitatem recipit.* Agnovit ergo levem illam, ac superficiariam uteri suppurationem, & sanitatem brevi inde sequentem, utero sic depurato; distinxit illam a majori ulcere, quod post inflammationem validam uteri sequitur, & non in superficie cava, sed in ejus substantia haeret. Haec autem confirmantur illis, quae paullo post (z) sequuntur: *Quod si uteri inflammati non fuerint, sua sponte exit malum; graveolens, & lividum, aut nigrum, & grumosum existit, & mulier a lochiis purgatur.* Videntur haec pulcherrime convenire illis, quae modo dicta fuerunt.

Antea in morbis virginum, & gravidarum saepius dictum fuit, manifestum commercium inveniri inter uterum, & mammas; hincque statui solet, constrictis uteri vasis, in *mammas pabulum serosum lacteum fluere*. Creditur enim, tale serum lacteum ad uterum deferri, graviditatis tempore, pro nutrimento foetus. Dum chorion prudenter separabat ab utero Noortwyk (a), invenit, *uno in loco exiguum quid liquoris crassiusculi, albicantis supra chorion effusum, quod cremorem lactis non inepte referebat.* Quamvis autem alio in loco (b) moneat, se non legisse haec auctorem, qui tale quid in homine profluxisse, oculari testimonio adserat: minime tamen contemnendum censet. Accuratissimus Vvinslovv enim testatur, prope jam graviditate, ductus lacteos in utero adesse (c). Celeberrimus Astruc (d) idem confirmat, & tunc oculis se offerre dicit, si uterus foeminae, ultimo graviditatis mense, vel in ipso partu mortua, invertatur, totaque interna superficies, cui placenta non adhaeret, prius deterfa, leviter prematur: tunc numerosissimae guttulae liquoris lactei per poros minimos transsudant, qui pori sunt extrema vasorum, quae lacteum hunc succum a sanguine separant.

Si vero uterus talis in aceto maceretur aliquamdiu, & dein dextra manu tunica interna separetur, oculis apparent numerosissima vasa, exigua, vermicularia, alba, setam porcinam crassitie superantia, tres, quatuor, quinque lineas longa, liquore lacteo plena, qui ex vasis his laeis exit.

Ex quibus omnibus saltem hoc concludere licet, *Aliquid forte lacti simile secundum naturae leges intra ovum deduci, sed directum arteriarum uteri notabile cum ovi vasis commercium nequaquam probabilem reddere sententiam,*
quae

(y) De mulier. morb. lib. I. cap. XLII. Charter. Tom. VII pag. 753.

(z) Ibidem pag. 754.

(a) Uter. human. gravid. histor. pag. 10.

(b) Ibid. pag. 95.

(c) Exposit. anatom. traité du bas ventre N. 623. pag. 578.

(d) Traité des malad. des femm. Tom. I. pag. 12.

quae statueret, nil nisi lacteum humorem eo ingredi, cum per minora longe vasa sanguis liberrime fluat (e). Videri poterunt & illa, quae Robault (f) habet, ut evincat, non solum chylum, aut lac, sed & sanguinem ex matre ad foetum venire. Optime enim notat, solum succum lacteum secundum hanc opinionem effluere debere, dum placenta ab utero separatur; quod omnibus observationibus repugnat.

Primum hominis rudimentum, tenerrimum cum sit, tenuissimo indiget liquido, ut nutriatur, & crescat; at videtur crassioribus indigere, dum mole multum auctus est embryo. Circa ultimum graviditatis tempus jam crassiori assuescere debet pabulo, unde videtur tunc lac in quibusdam vasis uterinis adesse, & forte majori copia, dum pariendi tempus instat. Hippocrates (g) sequentia habet: *Pingui nempe incalescente, & candido effecto, quod uteri calore edulcatum est, in mammas expressum tendit, & in uteros quoque exigua portio per easdem venas defertur; ad mammas enim, & uteros ejusmodi venulae, & consimiles aliae feruntur. Quumque ad uteros pervenit, lactis formam habet, eoque exiguo puer fruitur. Deinde alibi (h), ubi in causas inquirat, quae faciunt, ut foetus exitum ex utero materno moliatur, dicit: Quod enim in sanguine dulcissimum est, ad sese attrahit, simulque aliquantula lactis portione fruitur. Quae quum ipsi pauciora sint, puerque jam plenior factus plus alimenti, quam adsit, requirat, ipse sese jactans, membranas disrumpens, initium partus matri inducit. Cum autem post nativitatem infanti natura destinaverit lac maternum pro nutrimento, probabile videtur, quod foetus in utero materno jam adultior, quandam lactis copiam recipiat, ut sic sensim assuescat huic alimento. Interim graviditatis tempore sic disponuntur mammae, ut lac jam incipiant a sanguine separare; unde in multis gravidis aliqua lactis copia ex papillis stillare solet: imprimis circa ultimos graviditatis menses; tunc enim, si partus succederet, vivere posset infans, non tantum septimestris, sed & minus maturus, uti antea dictum fuit. Unde lactis illud stillicidium de mammis indicat, jam obtinere facilem lactis a sanguine separationem; cujus aliqua parte videtur frui foetus in utero materno; quo si orbaretur omnino, imbecillior redderetur, utpote jam indigens robustiori alimento. Illud indicat Hippocrates (i) sequentibus: *Mulier utero gerenti si lac copiosum e mammis effluat, foetum imbecillum significat. Quod si solidae mammae fuerint, valentiorum foetum indicant. Dum autem infans in lucem editus, ab omni commercio cum utero matris separatur, simile ipsi in mammis praesto est alimentum, lac nempe, quod jam majori copia requiritur, quam dum in utero haerebat; quia hoc solo jam nutriri, & crescere debet, cum nihil amplius per umbilicalia vasa a matre recipiat. Unde tunc, constrictis uteri vasis post partum, illud pabulum serosum lacteum ad mammas fluit.**

O 4

Ute-

(e) Noortvvyck de utero gravido pag. 11.

(f) Acad. des scienc. l'an 1714. Mém. pag. 180. & seq.

(g) De natura pueri Cap. VII. Charter. Tom. V. pag. 318.

(h) Ibid. Cap. 10. pag. 322.

(i) Aphor. 52. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 225.

Uteri enim vasa minus urgentur, dum mammae turgent; & hinc, uti alia occasione, dum de menstribus agebatur, dictum fuit, *Hippocrates* (k) suavit: *Si mulieri menstrua velis sistere, cucurbitulam quam maximam mammis admove.* Et contra monuit alibi (l); *Si mulier, quae neque gravida est, neque peperit, lac habeat, huic menstrua defecerunt.* Nimis enim resistentibus uteri vasis, mammaria sic urgentur, & implentur, ut lactis separatio, & secretio sequatur.

Dum autem pabulum illud serosum lacteum per uteri vasa, jam constricta magis, exire non potens, ad mammas derivatur, oriuntur quaedam in toto corpore turbae, & nova occurrunt symptomata, quae considerari merentur. Levis febricula simul plerumque adesse solet, quam *lactariam* Medici vocare consueverunt.

Post partum una, alterave hora omnia pacatissima solent esse; pulsus, qui in ultimis partus nixibus elevatior, & celerior fuerat, brevi redit ad statum naturalem, & aliquot horis si dormiverit puerpera, alacrem se sentit, a tanto onere liberam, & vix de ulla re conqueritur, nisi quod artus ob nixus validos toleratos doleant; & quandoque vulva parum intumescat; quod malum emollientibus fomentis applicatis facile cedere solet. Verum secundo, saepius tertio, quandoque & quarto die somnus fit inquietior, cum insomniis turbulentis, quandoque & totam noctem ducunt vigilem; adest inquietudo, quandoque & capitis dolor, pulsus insurgit, ac celerior fit; horripilatio levis adest secundum totum decursum spinæ dorsi inter scapulas, & quandoque per totum corpus; sequitur major calor; mammae incipiunt dolere, tendi, tumescere; respiratio fit utcumque laboriosior; lochia minuuntur; simul ob tensionem vicinarum partium brachia difficiliter movere possunt. Si quiescant puerperae, potu copioso blando diluente utantur, & victu, tenui intra viginti quatuor horas omnes hae turbae sedantur per sudorem totius corporis aequabilem, satis copiosum, praecipue circa pectus; & mammae lacte turgent. In foeminis quibusdam optimae temperiei invenitur haec febris adeo levis, ut praeter noctem praegressam parum minus quietam, vix ullius momenti sit, praecipue, si infanti ubera dederint; quod & in propria uxore, & multis aliis puerperis vidi. Solebam enim, duodecim post partum horis, postquam bono somno resectae fuerant puerperae, admoveere recens natos infantes uberibus, cum crederem illud lac tenue, & serosum, quod primo ex mammis prodit, illis admodum salutare esse; de qua re postea in *sequenti Capitulo* dicetur. Ipsa suctio facit, ut lac facilius in mammas derivetur, & lactis eductio cavet, ne mammae ultra modum distendantur. Ubi autem subito tuebant mammae, nec a debiliore infante depleri poterant, nimis turgidae, suavit, ut ab alia muliere leni suctione evacuarentur pro parte, & dein infans uberibus admoveretur. Sponte patet, in illis, quae infantes suos lactare nolunt, caeteris paribus, majorem sequi difficultatem. Lac enim in mammis jam col-

(k) Ibid. aphor. 50. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 224.

(l) Ibid. aphor. 39. pag. 219.

collectum, redire denuo debet in sanguinem, & antequam hoc fiat, quandoque diutius moratur in tubulis lacteis mammarum, pluraque sequuntur mala, de quibus postea dicendum erit. Dum hoc factum fuit, mammae denuo detumescunt, & lochiorum exeuntium copia augetur, quae cum hoc tempore puerperii jam albescant, dicitur lac retropulsum per lochia evacuari; verum, uti dictum fuit, purulenta exeunt de utero, dum ejus cava superficies depuratur.

Per varias vias, lac in mammis collectum, retropulsum in sanguinem, exire dein notaverunt de corpore auctores: omnium naturalissima via credebatur, si per uteri vasa sub lochiorum forma prodiret: per urinam exivisse, observatum fuit saepius (*m*); per alvum pariter; aliquando & per sudores: sed dubito, an sudores vere lactei in puerperis fuerint observati. Fatetur tamen, quandoque lac disparere, absque ulla sensibili ejus evacuatione observata (*n*). Nec mirum hoc videbitur, si consideremus, lac humorem sanum esse, chylum nempe reliquis humoribus mistum, & una cum his per vasa, ac viscera circumductum, ut post aliquot horas acquirat indolem humorum nostrorum, illisque per repetitam vasorum, ac viscerum actionem penitus assimiletur. Proprio enim lacte vivimus omnes; ast non separatur a sanguine, & colligitur in mammis, semper sed & in gravidis, & puerperis tantum naturaliter hoc fit. Lac enim cum sanguine fuit aliquot post partum horis, & venae sectione instituta hoc tempore, lac toties invenitur fero sanguinis permistum. Sic minus miramur, intactas virgines, imo & viros, dum famelicis infantibus, & morosis ubera praeberunt, valida, & repetita suctione lac tandem prodiisse. In historia Medica plures tales casus recensentur. Si ergo lac non degeneraverit longiori mora in mammis, vel per febrim validiorem mutatum fuerit, non turbabit ulla functiones corporis, dum sanguini denuo admiscetur. Si autem lac jam utcumque degenerare inceperit ab humoribus sanis, facili negotio illud vitiosum per urinas, aliasve excretiones expelletur. Notavit *Leuret* (*o*), dum febris lactaria minuitur, plerumque sudorem sequi, qui molestum puncturae sensum in cute excitat, licet lochiorum copia plerumque augeatur eodem tempore. Sed & alvus, antea pigrior, jam libera redditur; vel saltem leni stimulo sollicitata evacuatur: si sudor cessare incipiat, urinae subtrubidae copiosius prodeunt; si vero pergant sudores, urinae magis coloratae sunt, & mediocri copia excernuntur, at semper tali, quae potulentis, a puerpera assumtis, respondeat.

Sed per alvum, urinam, & cutis superficiem, naturali lege, de corpore exeunt illa, quae sanitatem turbarent, si diutius manerent in corpore. Ex his omnibus patet facilis ratio, quare lac quandoque in sanguinem redeat absque ulla fere molestia.

Verum aliud quid obtinet in puerperis, quod sedulam considerationem meretur. Notum est, in quibusdam morbis lac facillime a sanguine secedere,

(*m*) *Peu pratique des Accouch.* pag. 214.

(*o*) *L'art des accouchem.* pag. 135.

(*n*) *Ibid.* pag. 215.

dere, & exire cum damno ingenti de corpore. Sic observatur in *Diabete* quandoque lactea urina, quae si copiosa fuerit, aut diu excernatur talis, corpus privat alimento suo, & ex marasmo vero talis aeger perit. Observata fuit & diarrhoea talis chylosa. Facilis ille secessus lactis a sanguine morbus est.

In puerperis autem videtur facilior secessus lactis a sanguine naturali lege obtinere, ut in alimentum recens nato infanti cedat. De causis, unde hoc fiat, hic non disputo: sufficit enim Medico novisse, quid fiat in corpore, licet rationem facti non semper liquido intelligat. Semper oportet nos memores esse salutaris moniti, quod *Celsus* (p) dedit: *Rationalem quidem puto Medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis, obscuris omnibus non a cogitatione artificis, sed ab arte ipsa rejectis.* Cum ergo certa observata doceant, faciliorem lactis a sanguine separationem in puerperis adesse, quae jam inceperat ultimo graviditatis tempore; & pariter constet, naturali lege, lac a sanguine separatum in mammis colligi, patet, si lactis derivatio in mammas impediatur, vel collectum jam ibi non educatur per papillas, mali quid metuendum esse vel in mammis ipsis, vel etiam in reliquo corpore, si ad aliena loca lac, a sanguine secretum, deponatur.

Merito funesta mala metuebat *Levret* (q), si, lochiis parce fluentibus, solito tempore non turgescerent mammae: praecipue, si instantis delirii vel levissima signa apparerent, aut balbutire inciperent. Quibusdam validus oritur capitis dolor, & quidem adeo subitus, ut ab externa causa caput percussum credant; sequitur aurium tinnitus, coma, stertor, risus Sardonicus, tendinum subsultus, convulsiones validae, mors subita. In cranio post mortem saepius inventa fuit lactea materia. Sed & acutos pectoris morbos in puerperis vidit (r), quos non sine ratione simili causae attribuebat; flaccidas enim viderat, his morbis ingruentibus mammas: ubi vero, bona fortuna, mammae denuo turgebant, cita sequebatur sanatio.

Sed & similis metastasis lactea quandoque in ipsa pelvi colligitur (s): raro autem hoc fit ante duodecimum, aut quintodecimum a partu diem, si febris lactea adfuerit, & mammae intumuerint. Ille autem facilis secessus lactis a sanguine diu manet in lactantibus foeminis. Talis enim metastasis ad pelvim contigit foeminae, integro post partum anno elapso; sed ante binas hebdomadas perdiderat infantem, cui haecenus ubera dederat. Observavit autem, plerumque talem metastasin fieri quindecim diebus, postquam flaccescere inceperunt mammae, etiam in illis, quae non lactaverunt, sed quibus lac per papillas tamen exstillaverat. Pluribus observatis hoc confirmatum fuit, neque multo citius contigit unquam talis metastasis, nisi in illis, quibus lac non derivatum fuerat ad mammas, sed statim potius ad alia loca tendebat. Solet tunc materia illa lactea colligi in tunica cellulosa, per quam peritoneum pelvi nequitur, vel inter musculum *Psoam*, & *Iliacum*, circa ligamenta lata, & quandoque in pluribus locis simul. Dum
hoc

(p) In fine Praefat. pag. 20.

(r) Ibid. pag. 149.

(q) L'art. des accouch. pag. 146. 147.

(s) Ibid. pag. 150. & seq.

hoc fit, obtusus dolor circa inguina, pondus in pelvi, & debilitas femorum percipiuntur. Si decumbat in dorso, femoribus extensis, plus molestiae habet, quam si eadem flexa fuerint. Rarius in utroque latere simul haec symptomata apparent; sed dum in uno latere tentatur dissipatio, in altero latere similia sequuntur symptomata. Postea ad femur lactea haec materia pergit, & tunicam cellulosa distendit; tandem eadem in crure, & pede observantur; sicque omnia tument oedemate, & minuuntur dolores, qui antea circa pelvim fuerant. Ubi dissipari incipit tale oedema, femora primo detumescunt, dein crura, & pedes, simili modo, uti antea in hydrope anasarca dictum fuit. Vidi aliquoties tales tumores puerperii tempore: dum digitis premuntur, non observantur foveae, ut in Anasarca; sed tumor magis resistit, & fomentis ex lacte, cum sapone veneto decocto, satis feliciter solent dissipari intra decem, vel duodecim dies; praecipue, si urinae crassae copiosae prodierint, primo turbidae, dein reliquis diebus multum sedimenti deponentes.

Sed talis depositio materiae lacteae quandoque in aliis corporis locis colligitur, non dissipanda amplius. Sic Egregius Medicus *Chomel* (1) observavit, in foemina primipara ita intumuisse ventrem, ut tribus a partu septimanis fere aequaeurgeret, ac ultimo graviditatis tempore. Rupto sponte umbilico, exivit ingens copia liquidi seroso-lactei, sed pessimi foetoris, & coloris subgrisei: bimestri spatio post ruptum umbilicum prudenti cura evasit, integre sanata. Credidit celebris ille Medicus, intra duplicaturam peritonaei illam Metastasin factam fuisse. Simul etiam notat, quod viderit in binis puerperis femora admodum intumuisse: tumores illos adscribit lochiorum suppressioni, & fatetur, quod non sine difficultate illos dissipare potuerit: videntur tamen tales tumores potius pendere a metastasi lactea. An simile quid in abdomine collectum invenit (u) *Ruyfchius*? Puerperam visitaverat acriter febricitantem, & de hypogastrii dolore immani, una cum tensione, & induratione, conquerentem. In cadaveris *abdomine invenit multum materiae foetidae, loturae carnis, aut lochiorum corruptorum ad exemplum; qualis etiam a me reperta est in uteri cavitate*. Credidit autem, illud liquidum, quod in pelvi fluctuabat, ex utero per tubas Fallopianas in abdomen venisse.

Observata practica peritissimorum Medicorum docent, lacteam illam metastasin varia occupare quandoque viscera (vv). Hyeme 1746. observabatur in puerperis morbus epidemicus. Aquae, dum parturiebant, effluebant, & postea uterus ficcus, durus, dolens tumebat, nec lochia solito fluebant modo. A ventris fluxu morbus incipiebat, dolor ventris sequebatur, imprimis circa locum, quem occupant ligamenta uteri lata, tensum erat abdomen, caput dolebat, & quandoque aderat tussis. Tertio, vel quarto post partum die mammae, quae tunc turgere solent, flaccescebant, & quinto, vel septimo

(1) Académ. des scienc. l'an 1728. Mém. pag. 581. & seq.
Chirurg. N. 84. pag. 79.

(u) Observat. Anatom.
(vv) Académ. des scienc. l'an 1746. in 4. Mém. pag. 160.

mo die puerperae moriebantur. Pauperes solas invadebat hic morbus; praecipue si in nosocomio peperissent. Februario mense adeo periculosus erat morbus, ut ex viginti vix una evaderet. In cadaveribus inveniebatur coagulum lactis externae intestinorum superficiei adhaerens, & serum lacteum in cavo abdominis effusum: simile serum in quibusdam reperiebatur in pectoris cavo, & dum pulmones secabantur, eructabant similem lympham lacteam, sed putridam. Ventriculus, intestina, uterus rite examinata, videbantur inflammationem passa fuisse, & grumi sanguinis ex dissectis canalibus uterinis exhibant: in multis etiam ovariorum suppuratio videbatur adfuisse.

An non ex haecenus dictis concludi potest, metastasin lacteam producere posse omnia illa mala, quae in textu enumerantur, & quae lochiis suppressis tribui solent? Prout nempe in has, illasve partes deponitur materia lactea, & quidem tanto majori cum periculo, quanto partes, in quas deponitur, ad vitam magis necessariae fuerint, uti etiam, si materia haec deponatur in loca, ex quibus difficulter eliminari poterit. Sic dum v. g. ad crura, & femora deponitur, magna spes est per fomenta, frictiones &c., sic disponi posse materiam hanc, ut denuo resorpta per varias vias de corpore expellatur per alvum, urinas, sudores imprimis. Ubi vero in cavum calvariae tendit, cita mors sequitur. Simul etiam patet, sollicite distinguendum esse illum tumorem femorum, & crurum, qui post partum sequitur, a simili, qui in gravidis ab utero tumente, & venas comprimente nascitur, qui post partum, dum uterus subsidet, sponte cedere solet. Prior enim a femoribus incipit, & dein ad inferiora descendit: tactui digitorum magis resistit, nec, cessante pressione, relinquuntur foveae: posterior ab inferioribus incipit, lente ascendit, mollior est, & prementibus digitis facilius cedit; est enim mera anasarca, a venarum compressione nata.

Simul etiam patet, puerperas lactantes minus periclitari ab hac causa, quam illas, quae natis ubera negant: Suctio ipsa lac in mammas evocat; retropulsio autem metastasis talis periculum facit.

Non tamen in illa opinione sum, ac si lochia retenta nullum facerent periculum; sed tantum hoc monendum esse credidi, etiam de depositione materiae lacteae ad varia loca corporis cogitandum esse. Lochia enim naturaliter minuuntur illo tempore, quo febris lactaria solet incipere, & vix sanguinea fluunt tunc, sed potius subpurulenta. Primis autem diebus puerperii majus videtur esse a lochiis retentis periculum; sequentibus diebus, post febrim lactariam minus; ita tamen, ut si retineretur illud purulentum, quod tunc exire solet, ab ejus resorptione in sanguinem multum mali metuendum foret. Accedit, quod, laeso in partu utero, ejus inflammatio saepe sequatur; unde lochia supprimuntur, de quibus nunc dicendum erit.

Dum, excluso foetu, placenta separatur, copia sanguinis exit, quae brevi postea minuitur; & tunc lochia minus rubro colore tincta fluunt. Aëris accessus liber tunc adfuit, neque ille postea omnino impediri poterit; hinc semper metuenda est cita putredo sanguinis, & aliorum humorum, qui in

cavo uteri, vel in sinubus, qui in ipsa substantia uteri adsunt, retinentur. Calor loci, humiditas, aëris accessus putredini extravasatorum, & stagnantium humorum omnino favent: idem metuendum est a placentae solutae reliquiis; quamdiu enim adhuc integra utero adhaeret, credibile est, humorum circumductionem adhuc pergere per placentam, adeoque illam non tam cito putrescere. Si autem extravasati humores libere exeant, a putredine nihil metuendum erit. A mora ergo in cavo, vel sinubus uteri imprimis metuendum est, ne putrescant extravasata, uterum ipsum male afficiant, & resorpta pessimas febres producant, vel ad alia corporis loca deposita & illa putredine inficiant. Si enim tot, & tanta mala fiant a blanda materia lactea, quid non metuendum erit ab ichore putrido? Hanc lochiorum retentorum corruptionem descripsit *Hippocrates* (x), monuitque, inde uterum exulcerari, & ab hoc putrido resorpto periculosam febrim accendi: unicam fere spem curae videtur habuisse, si putredo haec, antequam totum sanguinem corruperit, expellatur de corpore. *Quinto, aut septimo die quandoque venter turbatur, & nigra, & admodum graveolentia alias, atque alias secedunt, & urina quasi asinina. Quae si secesserint, melius illi esse videtur, & curata brevi convalescit; sin minus, periclitabitur vehementi alvi profluvio ipsi succedente.* Alvi perturbatio, per quam, nondum omnino fractis viribus, expellitur illud corruptum, salutaris est; verum ubi, diutius protracto morbo, omnes fere corporis humores in putrilaginem soluti sunt, tunc vehementi alvi profluvio perire solent. Unde simul patet, non omne alvi profluvium in puerperio semper timendum esse: haec tamen opinio multorum animis insedit, postquam viderant, a lochiis suppressis tandem colliquativo alvi fluxu perire puerperas. Probe memini, dum puerperae, gemellos enixae, curam gererem, me pessime exceptum fuisse ab adstantibus, dum nollem alvi fluxum compescere. Tertia die lochia omnino suppressa fuerant: venter durus, & dolens erat. Mollissimis fomentis adhibitis, lenissimis aperientibus decoctis copiose potatis, per alvum exiverunt viridia, foetidissima, & quidem cum insigni levamine, ac brevi convaluit.

Pessimas febres sequi ex lochiis suppressis, demonstravit *Hippocrates* (y), exemplo mulieris, quae ad frigidam aquam in Thaso decumbebat, quae filiam pepererat, nec esset purgata (a lochiis). Tertio enim a partu die correpta est febre acuta, horrida (*φρικώδης*); aderant deliria, alvus turbata, multis tenuibus, & aquosa bile mistis. Sitis aberat, & multa mala symptomata successive sequebantur: post multa molimina critica, sed imperfecta, post metastasin ad dextram coxendicem, sed absque fructu, post febris mutationes varias, tandem octogesimo die periit. Notavit *Hippocrates*, urinas fuisse perpetuo nigras, tenuisque, & aquosas.

Rarius autem est, tanto tempore protrahi funestum morbum, cum *Hippocrates* (z) alio in loco dixerit, de lochiis suppressis agens: *Moriuntur autem*

(x) De mulier. morb. lib. I. Cap. 37. 38. Charter. Tom. VII. pag. 751.

(y) Epidemic. Lib. 3. textu 62. Ægrot. 2. Charter. Tom. IX. pag. 294.

(z) De mulier. morb. Lib. I. Cap. 37. pag. 751.

tem aliae alio tempore, prout corpus, & affectio se habet: Verum unum, & vigesimum diem non excedunt. Frequentius ita accidit. In Epidemicis (a) describitur historia puerperae, quae laboriose peperit gemellas, nec omnino purgatae (a lochiis) prima die jam febris acuta accessit cum vigiliis, capitis, & cervicis doloribus, delirio, urinis tenuibus, aquosis, dein & nigris, aliisque malis symptomatibus; haec autem decimasexta die periit phrenitica. Confirmatur hoc Sydenhami (b) observatis: ille cautissime tractabat lochiorum suppressionem, & si minus succederet cura, conabatur trahere morbum: cum singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si aegra vicesimum diem superaverit, jam fere in vado est. Videtur autem haec Sydenhami methodus satis congruere cum textu Hippocratis (c); praecipue, si secundum raticanum exemplar (d), loco αὐτῶν τῶν Βλαδισσῶν, legatur μὴ βλαδισσῶν; tunc enim sic sonat; At si illi vel medicamentis, vel sponte purgatio eruperit; id etenim accidit, si uteri os suum relaxaverint, non coacti a sanguine derepente confertim delato; si, inquam, eruperit, graveolentia, & purulenta repurgantur, interdumque etiam nigra: tumque melius erit, & adbita cura convalescet. Perfecte haec conveniunt illis, quae paullo ante dicta fuerunt: purulenta enim exeunt, nauseosi odoris, & si grumofus sanguis, incepta jam putredine deliquescent, exeat simul, foetor adest, & maculae, in linteis repertae, cinguntur circulo livido, quandoque & nigro.

Lochiorum autem suppressio duplicem causam agnoscit; vel enim non depluunt in cavum uteri, vel in utero colliguntur, nec exire possunt, si in grumos majores concreverint, aut exitus per uteri orificium a quacumque causa impediatur. Quum mulieri a partu purgatio fluit, non copiose procedit, inflammatis nimirum uteris, eorumque osculo concluso. Uteri autem stomachus (collum) in se concidit undique (e): Notaverunt periti artis obstetriciae magistri, post partum, & placentae educationem collum matricis instar intestinuli pendulum in vaginae suprema parte reperiri, & quandoque ab imperitis obstetricibus haberi pro corpore peregrino, quod evellere conantur, pessimo certe, & periculoso errore. Cum autem vasa patula satis hient in uteri cavum, libera satis via est, per quam humores in uteri cavum venire possunt, nisi sequens brevi inflammatio tumere faciat uteri substantiam, & si haec vasa cito claudantur: unde uteri inflammatio merito pro frequenti causa suppressionis lochiorum habetur. De hac postea dicendum erit. Si a grumis obturetur os uteri, hi educendi sunt; de qua re videantur illa, quae ad §. 1322. & 1326. dicta fuerunt.

Sed & observavit Hippocrates, pudenda concreta fuisse tempore puerperii, unde liber lochiorum exitus impediabatur: interim tamen & suppressionis lochiorum effectus potuit esse talis concretio praeternaturalis. Sic autem habet: (f) Si puerperae aliqua pudendi pars obturata fuerit (jam vero & id vidi)

(a) Lib. 3. textu 39. Aegrot. 14. Charter. Tom. IX. pag. 308.

(b) Dissertat. Epistol.

pag. 535. (c) De mulier. morb. lib. I. Cap. 37. Charter. Tom. VII. pag. 751.

(d) Ibid. pag. 900. N. 207. (e) Ibidem pag. 751.

(f) De morb. mulier.

lib. I. Cap. 44. Charter. Tom. VII. pag. 754.

vidi), si os pudendi ulceratum fuerit, & ubi in partu, per vim egresso puero, ulceratum fuerit, contingitque quid apthae simile, valdeque inflammatur, & labra ex inflammatione, quum nimirum exulcerata fuerint, in sese concidunt, mutuoque cohaerent. Sed & frigus fit, & ambo labra occlusa sunt, quae purgationis reliquias constringunt. Quod, si purgatio prodiret, ulcera non itaque coalescerent. Quomodo autem tale malum tractari debeat, dictum fuit antea ad §. 1290., & §. 1315.

Antea ad §. 1290., ubi de causis retenti floris menstrui agebatur, dictum fuit, a perverso situ oris uteri posse impediri menstruum liberum effluxum. Ubi de partu difficili agebatur, pariter dictum fuit, obliquum uteri situm in causa esse saepius, ut mulier pariat difficilior. Sed & ab eadem causa lochiorum expurgationem impeditam deducit Hippocrates (g): Si ex partu uteri in dextram obversi fuerint, puerperii purgamenta non eunt, dolor imum ventrem, lumbos, & ilia detinet, crus dextrum gravatur, & torpor occupat &c. Si uteri in sinistram partem, aut coxam declinarint, dolor acutus, & vehemens lumbos, ac ilia, crusque detinet, & claudicat. In quocumque alio obverso situ uteri idem metuendum esse, facile patet. Nisi enim uteri orificium directe respondeat vaginae, difficilior fluent lochia; imo & integre possunt supprimi, si os uteri vicinis partibus appressum claudatur. Quomodo autem uteri obversioni succurrendum sit, antea ad §. 1321. dictum fuit.

Omniū tamen maxime metuenda est lochiorum suppressio, quae ab inflammatione uteri originem ducit. In difficili partu, uti antea dictum fuit, magna vis infertur utero, ita ut quandoque rumpatur: caput infantis, si mole majus fuerit, in transitu saepe contundit, imo lacerat os uteri; rudiori evulsione placentae ab imperita obstetrice toties laeditur uteri substantia: unde non mirum est, uterum inflammari post partum, & a tali tumore inflammatorio lochia supprimi. Tales autem uteri inflammationes vix resolvendo curari possunt; sed saepe in suppurationem abeunt, quandoque & in gangraenam subito lethalem. Hippocrates (h), de uteri ulcere agens, dicit: Morbus autem praecipue ex partu invadit, si quid in ipsis dilaniatum computruerit. Si ergo tales causae praecesserint, a quibus laesio uteri fieri potuit, tunc de inflammatione uteri secutura metus est.

Haec autem signa hujus mali recensuit Hippocrates (i); si inflammatus fuerit uterus, vellicatur; quod si quid corruptum fuerit, & recruderit, febris corripit acuta, & magna, horrorque durus partes circa pudenda; ferociter afficitur, mordetur, & concitatur. Ac si quis digito contigerit, rursus pejus habet, & pungitur, caput, & sinaput dolet, tum caligo, tum frontis sudor adest, extrema perfrigerantur, ac tremunt, interdum etiam sopor occupat, neque audire potest, neque aliquid uteris efficit; multum est cibi fastidium, neque stomachus, neque venter omnino cibum attrahit; vociferatur, prosilit, dolet, pubem, inguina, lumbos, & occultos pudendi locos; celeriterque intereunt. Similia

(g) De mulier. morb. Lib. 2. Cap. 28. pag. 816.

(h) Ibid. Lib. I. Cap. 63. pag. 765.

(i) De mulier. morb. Lib. 2. Cap. 50. Charter, Tom VII, pag. 827.

lia his alio in loco (*k*) habentur, ubi describit mala, quae contingunt, Si uteri ex partu inflammati fuerint; addit tamen & alia quaedam; Ex ventre vero incendium nunquam desinit, sitit, & coxendices dolent, imus venter vehementer intumescit, & alvus turbatur: dejectio mala est, graveolens.

Apud Aëtium (*l*) praeter generalia uteri inflammati signa, enumerantur illa, quae diversa loca uteri, quae a morbo occupantur, designant. Sic si uteri cavum aut fundus, fuerint inflammata, summum dolorem adesse, dicit; Ut saepe, nec exterius quidem, tangi patiatur. Si posteriorem uteri partem occupet inflammatio, Dolor lumbos magis vexabit, durique stercoris excrementa detinebuntur; quoniam intestinum rectum opprimitur. Si anterior, & inferior regio uteri inflammetur, urinae aderit difficultas, ob similem rationem. Si obliqua loca occupaverit, inguina extenduntur, & crura difficulter moventur.

A parco lochiorum fluxu Hippocrates (*m*) notavit, ventrem, ac vesicam constringi; & alibi (*n*), stranguriam succedere utero inflammato. Omnia signa haec inflammati uteri pulcre collecta habentur apud Moschionem (*o*); ubi etiam ex Cleopatrae observatione additur, utero inflammato, linguam asperam, ac nigram, quasi atramento tinctam, inveniri; & extremos digitos, ac ungues dolere (*p*). Omnia autem haec mala, quae inflammationem uteri comitari solent, etiam a recentioribus Medicis observata fuerunt.

Si considerentur illa, quae antea ad §. 1285., & 1293. dicta fuerunt de mirabili illo regiminis imperio, per quod uterus male affectus omnes corporis functiones turbare possit, minus mirum videbitur, tot symptomatum catervam comitari uteri inflammationem. Simul etiam notari meretur, uti optime monuit Celeberrimus Simson (*q*), uterum puerperii tempore magis irritabilem esse; hinc a leviori stimulo, & animi affectu stringi ita, ut lochia supprimantur illico, & caterva malorum sequatur. Hippocrates (*r*), postquam varia mala recensuit, quae sequuntur, si lochia non rite repurgentur, dat hanc rationem: Quippe cum in molli parte, & bene sensili existant, & in nervosa cavitate, multae autem cum ea partes communicent, sinciput, stomachus, mens percellitur, depravatur, nec facile intelligere solet.

Simul etiam hinc patet, quare periti in puerperis tractandis viri sinistri quid metuerint, si non sedaretur pulsus celeritas, inter parturiendum nata, prima post partum hora: solet enim tunc morbus acutus sequi, & merito metuitur uteri inflammatio, ac pessimae ejus sequelae (*s*). Videtur & huc spectare textus Hippocratis (*t*), ubi de febrium crisis, & diebus criticis agit. Postea enim subjungit: Ad eundem vero modum etiam mulieribus crises a partu contingunt. Illud autem videtur obtinere, si morbo acuto a partu

COR-

(*k*) Lib. I. de morb. mulier. cap. 54. pag. 758. & Cap. 55. 56. pag. 759.

(*l*) Lib. XVI. Cap. 85. pag. 162.

(*m*) De mulier. morb. Lib. I. cap. 36. Charter.

Tom VII. pag. 750.

(*n*) Aphorism. 58. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 230.

(*o*) Spach. Gynaec. pag. 12. 13. & Harmon. Gynaec. pag. 23.

(*p*) Harm. Gynaec.

pars poster. Cap. X. pag. 28.

(*q*) An Inquiry in fine Essays pag. 67.

(*r*) De mulier. morb. Lib. I. Cap. 42. Charter. Tom. VII. pag. 753.

(*s*) Levret

l'art. des accouchem. pag. 134.

(*t*) In Prognostic. Charter. Tom. VIII. pag. 668.

corripiantur; quod imprimis post difficilem partum contingere solet; laeso utero. Galenus (u) hoc suo Commentario confirmare videtur. Sic enim habet: *A quo die mulier pepererit, ab eo numerare incipias, non a quo cepit febricitare. Nam aliquae secundo, vel tertio die, postquam pepererint, in febrem incidunt, atque ab eo plerique futuram crisin enumerant. Verum res secus habet, quum oporteat a die, quo foetum edet, enumerationem exordiri.* Febris enim lactaria, quae secundo, vel tertio die incipit, plerumque brevi secedit, per blandum sudorem, sine ullis perturbationibus criticis. Sic, in textu Hippocratis paullo ante citato, mulier, quae gemellas pepererat, fed laboriose, prima die febre acuta fuit correpta, & postquam undecimo ac decimo quarto die mala symptomata adfuissent, phrenitica interiit decimo septimo die. Imo & illa mulier, quae in Thaso decumbebat, cujus pariter mentio facta fuit, tertio a partu die acuta febre correpta legitur quidem, sed tamen videtur Hippocrates a partus die numerasse morbi decursum. Notat enim, quod *multo tamen ante partum febriculosa decubuerat, cibumque fastidierat*: nec credibile est, illam febrem post partum siluisse, sed cum horrore in acutam degenerasse; quae tamen de lentae febris, quae ante partum afflixerat, indole participabat, cum octogesimo die mortua fuerit (x).

Unde patet, lochiorum suppressionem merito periculosam haberi: *Nisi enim a lochiis mulier repurgetur, magno morbo corripietur, vitaeque periculum incurret, nisi cito curetur, & aliquis convenientem ipsi purgationem promoveat.* Omnium maxime, si uteri inflammatio fuerit causa, vel sequela suppressionis lochiorum. *Nisi statim curentur, plurimae intereunt* (y). Quo & videtur spectare sequens Prognosis: *Uterinae in ventribus durities cum dolore, acute perniciosum* (z).

Haecenus praecipue dictum fuit de illis malis, quae ab utero male affecto, & lochiis retentis oriuntur, uti etiam de his, quae a metastasi materiae lacteae in puerperis metuenda sunt. Verum & ipsa lochia retenta, mora acriora reddita, resorpta vasis uterinis, & dein ad varia viscera deposita, producere posse periculosissimos morbos, facile intelligitur. Praeclarus Medicus Targioni Tozzetti (*), multis aliis scriptis in orbe literario notissimus, inseruit suis observationibus unam, alteramve, quae huc spectant, & quas desumpsit ex manuscripto Anatomico-Medico incerti auctoris, qui decimo sexto saeculo vixit, & videtur optima fide narrasse illa, quae viderat propriis oculis: simul figuras satis nitidas partium, de quibus agit, addidit. Secuit autem cadaver puerperae, quae postridie a partu gravissima corripiebatur Epilepsia, ita ut linguam sibi mordicus absciderit; dein Apoplectica interiit, cum per triduum totum mansisset aphona. Uterum invenit tumidum, plus, quam pollicem, in substantia crassum, durum, carnosum, vasa spermatica pollicem cras-

(u) In Prognostic. Charter. Tom. VIII. pag. 668.

Ægrot. 2. Charter. Tom. IX. pag. 204.

Cap. 54. Charter. Tom. VII. pag. 758.

Tom. VIII. pag. 883.

(x) Epidemic. Lib. 3. text. 62.

(y) Hippocr. de Morb. Mulier. Lib. I.

(z) Coac. Praenot. N. 528. Charter.

(*) Prima Raccolta di osservazioni Mediche pag. 92. &c.

crassa, tumida, subnigra, quasi essent sanguine grumoso plena, qui a partu debebat per uterum exonerari: testes, quos cornua uteri vocant plerique, invenit tumidos. In ipso uteri cavo invenit sanguinem crassum, atrum, haerentem arctissime cotyledonibus, ut vix avelleretur; qui putris videbatur. Cotyledones autem sunt venarum uteri oscula parva, ut puncta viderentur subnigra. Caro vero, seu substantia uteri carnosae, & alba erat, & dura, & per ipsam arteriae, & venae transibant, ut si quis acu istum librum perforaret; & cum per transversum secaretur caro, profuliebat sanguis, quasi si quis acu acutissima illam perforasset. Os uteri habebat duos veluti musculos parvos intro se, & tenues, sive membranae alicujus partes videantur, utrimque claudentes os ipsum, ut ne acus quidem immitti posset, gravida existente muliere. Sic mihi ostendit magister Gulielmus Barbitonsor &c. Collegit hinc, mulierem hanc periisse ob retenta lochia, quae prima tantum die fluxerant sat copiose, materia nempe in cerebrum translata: notat simul, ante annum aliquot convulsiones Epilepticas habuisse noctu. Conjecit quoque, maximum laborem fuisse illi in partus exitu ad os uteri; nam totum erat lividum, quasi ictum esset baculo, aut saxo. In capitis sectione, dum separaretur a cranio Pericranium, mirabatur, profuisse tantum sanguinis aquosi, ac tenuis, & serosi, ut cranium videretur simile esse cribro, & ab ipsomet osse emanabat, nec decipiebar, videbaturque illud cranium esse veluti perforatum, eratque colore subobscurum livente, & vidimus, venas durae matris fuisse in causa hujus floris & effusionis &c. Deinde addit: Notavi quoque, cum pericranium a cranio separaretur, quasi aliquod putre divelleretur ab osse, sic nullo momento, ac ut rem fracidam, illud ab osse separari. Videntur autem hic pericranium, calvaria, ac dura mater imprimis laesa fuisse; nam de reliquis in cavo calvariae contentis nihil refert. Sed mox subjungit sequentia: In Domicella de Mauvoyfin, quae obiit a partu epileptica una & apoplectica, secta observavi, totum ventriculatum sinistrum cerebri fuisse plenum aquoso sanguine, seroso, putri, ac pravi coloris, & venas plexus retiformis una cum arteriis fuisse tumidas, quasi insufflatas, subnigras, quae notae erant partis non naturaliter affectae. Hic manifeste ad capitis interiora delata fuerunt, lethali metastasi: nec invenit vasa rupta, sed tumida & infracta.

Facile autem intelligitur, lochia deposita ad varia viscera diversos efficere morbos pro diversitate functionum, quae ab his visceribus pendent. Horum malorum catervam descripsit Hippocrates (a); Si vero mulieri puerperii purgatio ad caput irruat (id enim contingit), plerumque statim moritur, si detineatur &c. Si vero per os non prodeat puerperii purgatio, sed cum impetu delata sursum vertatur, puerperia (lochia) delitescunt, neque pro ratione procedunt, tussis, & asthmata illam corripient, oppletoque a sanguine pulmone, latus & dorsum ipsi dolebunt valde. Quumque tussit, siccum per tussim rejicitur; alias vero spumosum expuitur. At progressu temporis sputum subnigrum, & turbidum apparet, pectora calor magis, quam reliquum corpus, detinet, nimirum sanguine ipsa calefaciente &c. Quod si purgatio impetu sursum delata per os non exeat, neque ad

pub-

(a) De Mulier. Morb. Lib. 1. Cap. 45. Charter. Tom. VII. pag. 755.

pulmones vertatur, ei ad faciem puerperia divertent, quae admodum rubicunda erit, & caput grave, neque id citra dolores movere poterit, oculi etiam valde rubicundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis effluet. Est, ubi etiam nonnullus sanguis per nares effluit, qui si effundatur, hoc modo morbus diuturnior evadit. In alio loco (b) monet, a lochiis minus, quam oportet, fluentibus, nonnullas corporis partes ad motum impotentes reddi, quandoque claudicationem sequi.

Omnia autem haec contingere possunt etiam in sanissimis mulieribus, quibus post partum purissimus sanguis exit, quasi de victima flueret: potest enim sola mora in cavo, vel sinibus uteri corrumpi, & putrida, inde nata, miasmata resorberi, quae dein pro diversa metastasi varios, & periculosissimos morbos producant. Majus certe discrimen metuendum erit, si humores ante partum jam multum degeneraverint a sanitatis conditionibus. Monuit Hippocrates (c) in illis locis, quorum incolae plaustris aquas potant, mulieres oedematofas fieri, & pituita alba laborare non tantum, sed vix in ventre concipere, neque purgationem post partum in his mulieribus commodam contingere. Alibi (d) dixit: In gestantibus uterum salsuginosa significant post partum molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurant; singulus in his, malum, & uterorum procidentia, quae & una interficit. Et paullo post (e): Uterum gerentibus salsuginosae juxta fauces fluxiones, malum. Antea enim dictum fuit, postquam sanguine distenta vasa uterina fuerint evacuata, tertio die lochia prodire, quae puris conditiones referunt, ficque uteri cavam superficiem repurgari. Verum ad §. 387. demonstratum fuit, requiri blandam humorum indolem, ut benigna fiat suppuratio. In tali autem puerpera aciores humores ad uterum derivantur; unde sensilis ejus superficies nimis irritabitur.

Sed & ob eandem rationem morbi praegressi puerperium considerandi sunt. Dixit Hippocrates (f): Quae ante partum in modum cholerae morbi doluerunt, facile quidem pariunt: verum si febricitent, maligne habent, tum alias, tum si circa fauces quid vexet, vel aliquod signum mali moris in febre appareat. De pituitosis, & lienosis mulieribus praedixit (g), & lochia non boni coloris proditura, & metum fore, ne supprimantur. Alibi (h) monuit: Si mulier uterum gerens morbo aliquo minime cognato laboreat, in puerperii purgatione perit. Recentiorum Medicorum observationes hoc confirmarunt. Sic Hoffmannus (i), quando gravidae, ultimis praesertim mensibus, cum aestu interno de virium debilitate valde queruntur, vidit saepe, & praedixit in puerperio prae-
vos eventus.

Dictum fuit, uterum a lochiorum retentione inflammari, & quandoque a

P 2

la-

(b) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 41. Charter. Tom. VII. pag. 753.

(c) De Aere, Locis, & Aquis Cap. 3. text. 7. Charter. Tom. VI. pag. 105.

(d) Coac. Praenot. N. 526. Charter. Tom. VIII. pag. 883.

(e) Coac. Praenot. N. 537. Ibid. pag. 884.

(f) Coac. Praenot. N. 535. Ibid. pag. 883.

(g) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 28. & 29. Charter. Tom. VII. pag. 746. 747.

(h) De Natur. Puer. Cap. V. Charter. Tom. V. pag. 315.

(i) Medic. ration. & syst. Tom. IV. part. 2. sect. I. Cap. I. pag. 25.

laborioso partu, vel & rudiori obstetricis manu inflammatum, suppressionem lochiorum producere. De signis uteri inflammati dictum fuit. Verum talis inflammatio vel curabitur blanda resolutione, vel reliquos inflammationis exitus subibit, nempe suppurationem, gangraenam, & sphacelum, scirrhumque, ex quo Cancer uteri sequi poterit. Uteri autem inflammatio gravior saepe omnes functiones encephali adeo turbat, & opprimit, ut mors sequatur, antequam varii inflammationis exitus locum habere possint. Antea ad §. 432. dictum fuit, gangraenam viscerum lethalem esse; genitalium vero curatu difficilem; simul aliquot casus sanatae gangraenae in genitalibus fuerunt recensiti; imprimis ex *Ruysschii* observatis. Dum nempe a difficili partu contusa vagina, & intestinum rectum gangraena contabuerant, & postea corrupta a sanis per suppurationem separata fuerant, superstite puerpera. Quando enim magnae molis caput diu in exitu pelvis haeret, sic comprimuntur omnes partes vicinae molles ad dura pelvis ossa, ut omnis humorum circuitus per partes pressas penitus impediatur; unde gangraena sequitur. Tales gangraenas curatas fuisse quandoque, certo constat. Verum, si gangraena validam inflammationem uteri praegressam pro causa habuerit, non novi, certa observatione constare, quod unquam haec curata fuerit; certe, si unquam, saltem rarissime, talem curam contingere, vix erit ullus, credo, qui dubitet. Cum autem nunquam gangraena sanari possit, nisi suppuratione facta, per quam omne corruptum, & mortuum separatur a partibus vivis, operae pretium erit, quaedam dicere de ulcere uteri. De Scirrho enim, & Cancro antea actum fuit, neque videtur hujus loci esse, ut de his inflammationis sequelis agatur. Non enim proprie ad puerperarum morbos pertinent, cum a puerperio jam resurgentibus molesta sint haec mala, & vix ante adverti possint.

Simul etiam facile patet, non intelligi hic superficiariam illam, & lenem suppurationem, per quam cava uteri superficies depuratur, uti ante dictum fuit: verum agitur hic de suppuratione in ipsa uteri substantia, post praegressam inflammationem producta. De his malis monuit *Hippocrates* (k): *At cura cito adhibenda est, si ulcera in utero fuerint. Nimirum enim tenero in loco sunt, seleriter increscunt, brevique putrescunt.*

Cognoscitur ex inflammatione praegressa, & signis suppurationis incipientis, de quibus & in *Capitulo de Abscessu*, & in morbis viscerum inflammatoriis saepius dictum fuit. Si ergo dolor circa uterum maneat pertinax, absque signis pessimis, suppuratio uteri expectanda est. *Dolor ventris post partum, in his purulenta purgant* (l). Solet & tunc febricula adesse, quae suppurationes aliqujus momenti, imprimis in visceribus, comitari solet. Unde *Celsus* monuit (m): *Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, ulcus in vulva est.* Si talis vomica in utero orta fuerit, optandum est, illam sic rumpi, ut pus per vulvam exire possit; tunc enim citius sanantur. Si autem per aliam viam pus exitum tenet, curatio protrahitur multum, & quandoque difficul-

ter

(k) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 66. Charter. Tom. VII. pag. 768. (l) Coac. Prae-not. N. 520. Charter. Tom. VIII. pag. 883. (m) Lib. II. Cap. 7. pag. 60.

ter admodum obtinebitur. Idem verum est, si pus, in uteri substantia collectum, per metastasin ad alia corporis loca deponatur.

Quandoque enim uteri vomica versus exteriora pus collectum derivat. Unde *Hippocrates* (n) monuit: *Si uterus, ischio incumbens, suppurat fuerit, necesse est, illum linteis carptis curari*. Tunc enim manibus accessus datur, dum uteri ulcus extrorsum aperitur; adeoque & linteis carptis, & turundis, & aliis pluribus opus erit; & ideo talia mala ἐμμεσι ab *Hippocrate* dicta fuisse, testatur *Galenus* (o); de qua re alia occasione dictum fuit. Aliquot tales casus ipse vidi, sed semper longa erat cura, & quandoque fistula manebat, licet sanitas in reliquis rediisset satis commoda.

Talis & casus apud *Celeberrimum Benevoli* (p) legitur de juniore puerpera, cui post partum difficilem quinto die supprimebantur lochia, cum febre valida, abdominis tensione & tumore, vomitu, urina parca, & reliquis uteri inflammati signis. Tentata fuerunt efficacissima remedia ad resolvendam hanc inflammationem: verum omnia symptomata perrexerunt usque ad vigesimum quintum diem; tunc febris cepit minui; cessabant graviora symptomata, manente tamen abdomine tenso, & tumido per sex menses, & ultra, imprimis circa dextrum llium, ubi percipiebatur durities circumscripta. Post alios sex menses tussi molesta corripiebatur; unde tumor ille durus, antea profundius latitans, incepit versus exteriora protuberare. Tribus adhuc mensibus elapsis, opem *Benevoli* imploravit, qui, omnibus rite examinatis, abscessum latere conclusit, fomenta applicuit, & sexdecim a partu mensibus locum aperuit; quo facto, exivit pus bonum, sed parca admodum copia, quanta nempe contineri posse videbatur sub integumentis, nec videbatur aliquid exire ab interioribus. Verum post octo, vel decem dies a tumoris apertura aegra corripiebatur frigore, cum febre, & sequenti mane, mutando apparatus, inveniebatur copia puris dissoluti & foetentis: perrexit autem similis materia sponte exire, nec augebatur copia, si manu premerentur vicina. Omni octava, vel decima die redibat febris, sequente copiosiori evacuatione puris per trimestre fere spatium. Nihil autem aliud toto hoc tempore factum fuit, nisi quod vulneris labia tenerentur a se mutuo remota, ut liber puri maneret exitus. Neque aliquid purulenti unquam de vagina prodiiit; & aegrae, licet diuturno morbo extenuatissimae, solito tempore prodibant menstrua. Vigesimo mense gangraena in vulnere aderat; qua separata, multum aucta fuit apertura, quae postea sensim imminuta fuit, manente parvo orificio, quod liberum exitum praebebat puri. Fistula mansit sic incurabilis, cum tuto incidi nullo modo posset, quoniam specillum immissum per sex digitos transversos adigi poterat, transversali, & satis profunda directione.

Mirabilis casus suppurationis post suppressa lochia legitur (q). Post laboriosum

((n)) Aphor. 47. Sect. V. Charter. Tom. IX. pag. 223. (o) Ibidem. (p) Dissertazione, ed osservazioni &c. N. 36. pag. 217. (q) La Motte Traité complet de Chirurgie Tom. I. pag. 268. Tom. IV. Pars II.

riofum gemellorum partum a valido terrore puerperae lochia supprimuntur omnino, cum tensione & dolore valido abdominis. Mollissimis fomentis applicatis, & similibus clysmatibus injectis, venae sectionibus in brachio repetitis, minuebatur utcumque vehementia dolorum, qui tamen manserunt perpetui per quadraginta dies, & ultra. Venter autem tumens superabat molem, quam ante partum habuerat. Subito augentur dolores, & quatuor digitorum distantia ab umbilico, tam a latere, quam versus inferiora, apertura sponte fit, per quam exeunt plures librae puris, replentes vas, quo aqua hauriri solet (*un sceau*); pergebat adhuc ex ingenti abscessu pus exire, donec penitus depletus foret. Simplicissimo apparatu Chirurgico applicato, brevi integre convaluit. *Hippocrates* (r), de cura hujus mali agens, suavitatis lactis usum; dein dixit: *Post lactis autem potum, cibis quam maxime in- crassandum, & ut utero gestet, procurandum; sana enim evadet. Plerumque autem ex hoc morbo evadunt, & steriles redduntur.* Haec tamen mulier post tam gravem morbum toleratum saepius peperit.

Contingit aliquando, ut pus collectum in uteri ulcere, resorptum, per alia loca exeat. Sic vidi in gravida, quae & hydropse anasarca laborabat, dolorem ortum in dextro ilio, satis intensum: post partum prodiit per vulvam pus olidissimum, quod copia minori sensim, & postea album, inodorum fluxit quotidie ad septimum a partu mensem usque: aderat simul cruris, & femoris dextri imbecillitas; dein ex mamma dextra pus exivit, & lente convaluit.

In alia puerpera vidi, post omnia signa abscessus in sinistro ilio collecti, alvi fluxum olidissimum secutum fuisse; simul & aliqua copia similis materiae de utero fluere cepit, cum levamine, & restituto appetitu, qui antea deficiebat. Post incepit sputa rejicere similia, & magna copia quidem: tarde pariter convaluit.

Uti jam in utero collectum pus per alia loca quandoque evacuatur, sic aliunde adveniens quandoque per uterum exit. Hanc distinctionem *Hippocrates* (s) fecit, & monuit, quibus signis hoc cognosci possit: *An vero ab ipsis sint uteris, hoc pacto dignoscet. Quae enim ab ipsis ulcerationes sunt, purulentam, & compactam purgationem exhibent; quae vero non ab ipsis, tenuem, & saniosam.* Omnia, quae de ulceribus internis curandis antea dicta fuerunt, hic quoque locum habent. *Ulcerata (uteri) vero curanda sunt, ut illa, quae in reliquo sunt corpore, studendo, ut inflammatio arceatur, repurgentur, impleantur, & ad cicatricem perducantur. Aqua autem potui danda est, vinum minime, cibique pauci, non multi (t).* Mollia satis remedia, & victum similem commendavit *Hippocrates* (u) in ulcere uteri, de quo hic agitur; nempe cujus materia non aliunde delata, sed in ipsa substantia uteri nata, & collecta fuit: *In quibus autem purulenta, & compacta defluunt, in his quidem universum corpus nullo modo movere oportet.*

(r) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 62. Charter. Tom. VII. pag. 764.

(s) Ibidem Cap. 65. pag. 766.

(t) Ibidem Cap. 66. pag. 768.

(u) Ibidem Cap. 65. pag. 767.

oportet, sed colluere, & ex his totam curationem moliri. Licet enim deterfio ulcerum, si sordida fuerint, quandoque acriora poscat remedia, tamen in parte adeo sensili, & tantum imperium habente in reliquum corpus, prudenti cautela opus est. Ulcus uteri curabat *Harvaeus* (v), quod satis antiquum jam erat: cum autem usitatis remediis parum proficeret, validiora tentare voluit, addens solitis injectionibus aliquantulum *Vitrioli Romani*; a cujus acrimonia percussus uterus subito se contraxit, induruitque adeo, ut ad tactum lapide rigidior sentiretur; simulque plurima symptomata hysterica oborta sunt, quae ab uteri strangulatu, tetrisque inde vaporibus sursum latis, Medici vulgo fieri existimant. Duravit aliquamdiu hoc malum, donec a mitioribus, & anodynis remediis placatus uterus orificium suum laxaret, liquoremque acrem (quem injeceram) una cum saniosa putrilagine expelleret. Utilis haec observatio docet, quanta mala sequi possint, si uterus irritetur, sive acri remedio, sive alio quocumque modo hoc fiat.

§. 1530. **C**uncta haec eradicantur sponte, radice mali excisa (1329.).

Cum omnia haec mala a lochiorum suppressione ortum duxerint, hinc, redeuntibus lochiis, omnia haec minui, vel & integre cessare solent. Praecedenti paragrapho patuit, retenta lochia diversissimos morbos producere, prout in hoc, illudve viscus rapiuntur; & *Hippocrates* (x) similia monuerat; Si ex partu minime purgata fuerit, venter, & crura tument, & vigor, & dolor in unum ventrem occupat, quandoque etiam ad viscera progreditur. Similia his alibi leguntur (y). Praeterea (z), loquens de puerpera, cui primis tribus, aut quatuor diebus puerperii purgatio prodierit, deinde ei derepente per datur, addit: Si vero curetur victus ratione mulier, supererit, si cito curetur.

Si enim viscerum fabrica a lochiis per metastasim depositis multum laesa fuerit, redeuntibus postea lochiis, non sequetur integra sanitas, sed quarundam actionum manebit vitium, & quandoque per omnem vitam. Unde alio in loco (a), ubi agit de lochiis ad caput, thoracem, aut pulmonem irruentibus, monet, puerperam plerumque statim mori; si autem superstes fuerit, pulmonem saepe purulentum evadere, tussim, & asthma sequi: Si autem ad caput vertantur lochia, mente alienabitur, & delirationes furiosae existent. Deinde addit: At curata convalescit; non autem multa spes est, illam superesse. Ac si forte supersit, surditas, aut in totum caecitas succedet. Suis observatis idem confirmavit *Sydenhamus* (b), ubi agit de malis, quae lochiorum suppressionem sequuntur: Nonnunquam enim Phrenesi laborant ex hac occasione, quae in dies efferatior reddita spasmos primum, dein mortem infert. Si vero mor-

P 4

tem

(v) Exercitat. de generat. animal. in Capit. de Partu pag. 379. (x) De Natur. muliebri Cap. 9. Charter. Tom. VII. pag. 685. (y) De Morb. Mulier. Lib. I. Cap. XL. Ibid. pag. 752. (z) Ibidem Cap. 39. (a) Ibidem Cap. 45. pag. 755. (b) Dissertat. Epistol. pag. 531. 532.

tem evadant, mitius aliquantum insaniunt quandoque ad ultimum vitae terminum. Tristes tales casus ipse aliquoties dolens vidi.

Inde patet, tunc tantum sequi integram sanitatem, redeuntibus lochiis prius suppressis, si nempe cito hoc fiat, & nullum viscus adhuc insigniter laesum fuerit per metastasin lochiorum.

§. 1331. **H**inc requiruntur Antacida lenia, ad labem acidam feri sopiendam; diluentia lenia ex hordeatis, avenatis, amygdalatis jusculis; aperientia specifica lenissima ex moderate cardiacis, & uterinis; aperientia localia, Clysmata, Fomenta, Cataplasmata, Emplastra, Linimenta, Cucurbitae, Pessaria, Suppositoria.

Agitur jam de methodo tractandi puerperas, ut lochiorum suppressio caveatur, & quaenam tuto tentari possint, ut lochia suppressa, vel parca nimis provocentur.

Imprimis hic attendendum est ad illa, quae ad §. 1329. dicta fuerunt; nempe lochia naturaliter multum minui, & circa tertium, quartumque diem vix sanguinolenta esse, sed tunc subpurulenta quaedam prodire, per quae uteri cava superficies depuratur; adeoque male consuleretur puerperis, si darentur talia tunc remedia, quae lochia pellerent. Dum autem mammae turgere incipiunt, tunc impetus, & copia humorum ab utero avertitur, & versus mammas tendit: unde lactantibus puerperis, caeteris paribus, minori copia fluunt lochia; illis vero, quibus lac ex mammis resorberi debet, fere semper lochia augentur, dum hoc fit.

Quies autem absoluta corporis, & mentis omnino requiruntur. Vix enim credi potest, quam mobiles sint puerperae in toto genere nervoso, praecipue si tenerae, molliter educatae, & hystericeis malis obnoxiae fuerint. Tristissimos irae, terrorisve effectus plurimis exemplis probavit *Peu* (c). Similes vidi aliquoties. Importunae visitationes amicarum, quae gratulaturae adveniunt, multum saepe nocent: praecipue pessimus ille mos apud nobiles invaluit, & vix potui obtinere, ut in aliud conclave, remotius a puerpera, convenirent illae, quae ex amicitia, vel more quotidie accurrebant, puerperam salutaturae. Si inter tot matronas sit vel unica, quae memores imo sub pectore reconditas iras, licet diu sopitae credantur, renovet, pessima certe metuenda sunt. Fragrantes odores, quibus multi adeo abuti solent, ut etiam, mutatis vestibus, tota cutis illis imbuta maneat, turbant saepe adeo puerperas, ut mox sequantur enormes capitis dolores, deliria, lochiorum suppressio (d). Plures tales casus vidi: hinc solent lectis puerperarum adnectere nodulos ex foetidis uterinis, *asa foetida*, *castoreo*, &c., compositos, qui quandoque & sua graveolentia molesti sunt. Omnia haec caveri poterunt, si puerperae in perfecta servantur quiete, ita ut vitentur omnia, quae mentem,

vel

(c) La Pratiq. des accouch. Liv. I. chapit. VIII. pag. 75. &c.

(d) Ibid. pag. 230.

vel corpus ullo modo turbare possunt. De hac cautela adeo necessaria jam dictum fuit ad §. 1329. Absolutam autem puerperarum quietem ad plures dies protractam voluit *Sydenhamus* (e). Credebat enim ex illis, quae in puerperio moriuntur, vix decimam quamque perire ob defectum virium, aut labores toleratos, sed tantum ideo, quod debito citius lecto surrexerint. *Quamobrem istis, quae me audiunt, ubique auctor sum, ut ad diem saltem decimum in lecto se contineant, si modo naturae paullo debilioris sint, praecipue si vaporibus, qui vulgo dicuntur, jam pridem fuerint tentatae.* In robustis enim, & laboriosis mulieribus observatur quotidie, quod non adeo longa in lecto mora indigeant. *Levret* (f) in illis, quae flaccidum corpus habent, & sedentariam vitam duxerunt, caveri jussit, ne ante duodecimum diem vel pedem lecto efferant ob metum prolapsus uteri.

Abdomen molliter fulciendum esse linteo lato, §. 1329. dictum fuit. Nihil autem magis noxium est, quam valide fasciis ventrem constringere. Mirabatur *Peu* (g), accedens secunda post partum die juvenem puerperam, quam feliciter liberaverat, anxiam jacere, oculis scintillantibus, ob immanem capitis dolorem, insomnem penitus: aderant nausea, tussis, animi leve deliquium, ructus foetidi, dolor lateris sinistri, lochiorum suppressio: subito binae venae sectiones in brachio, tertia in pede instituebantur, & tamen augebantur omnia symptomata: dum ulterius inquiritur in causam tot malorum, invenitur abdomen fascia valide adeo strictum ut mirum videretur, illam respirare potuisse. Solvitur fascia, mox redierunt lochia, & omnia illa mala symptomata evanuerunt. Plures ibi similes casus recenset.

Imprimis attendendum est, ne urina in recens enixis puerperis nimis diu retineatur. Dum enim vacuo jam utero flaccidum abdomen est, vesica distenditur facile absque ulla molestia, & saepe non sentiunt ullum nixum mingendi, antequam vesica ultra modum distenta fuerit, & vim se contrahendi amiserit; unde difficilis ischuria sequitur, quae cathetere in vesicam immisso levare debet. Ut hoc vitetur, sollicitè semper monui, ut puerperae, postquam per aliquot horas quieverint, tentent urinam excernere, quamvis nulum ad mingendum sentiant stimulum. Inter parturiendum enim quandoque sitiunt, & multum potant, post partum jascula dari solent; unde urinae copia in vesica colligitur.

Adeo religiose quietem in puerperio servandam voluerunt multi, ut piaculum crediderint, si lintea mutarentur citius, quam circa decimum a partu diem (h). Certum est, frigidum aërem, primis puerperii diebus imprudenter admissum, plurimum nocuisse, praecipue si inferiores corporis partes tangeret. Verum etiam considerandum est, lochiis conspurcata esse lintheamina, quae a calore corporis cito corrumpuntur, & pessime foetent. Memini, me aliquando visitasse tales puerperas, quae jam per aliquot dies in his sordibus

(e) Dissert. Epistol. pag. 532.

(f) L'art des accouch. pag. 139.

(g) La

Partiq. des Accouchem. liv. 2. chap. 16. pag. 526.

(h) Levret l'art. des accouch. pag. 139.

dibus morabantur. Dum manum de stragulis eductam mihi porrigebant, pulsus explorandi causa, tantus foetor nares feriit, ut vix non animo linquerer, quamvis non adeo delicatum me credam, ut a male olentibus afficiar facile. Sponte patet, pessima mala metuenda esse, si in putrida tali atmosphaera cogantur per plures dies decumbere puerperae. Observata fidelia confirmaverunt, putrida haec miasmata nocuisse puerperis, dum in nosocomiis decumbebant: magnus enim illarum numerus peribat; & suspicari ceperant Nosocomii Praefecti, ignorantiam, aut negligentiam obstetricantium in causa esse. Plura secabantur cadavera defunctorum, & corporis interiora abscessibus plena fuerunt inventa. Sapiens Medicus, omnia attente examinans, hanc causam invenit, quod sub conclavi puerperarum decumberent vulnerati. Confirmabatur ejus sententia inde imprimis, quod aucto vulneratorum decumbentium numero, cresceret puerperarum strages, minuto, pariter decresceret. Aër humidus, tam calidus, quam frigidus, nocebat; ficcus autem proderat: notum enim est, humidum aërem putredini favere, praecipue si simul calidus fuerit. Dum autem puerperae locabantur in conclavi inferiori, non observabatur amplius haec strages: aër enim, putridis exhalationibus imbutus, levior est, unde superiora petit (i).

Hinc videtur conducere, ut lintea citius mutantur, sed omni cum cautela, ne aër frigidior corpus allabatur, vel lintea humida, & frigidiuscula adhibeantur. Commode satis hoc fieri poterit, si breviori indusio utantur puerperae, quod tantum ad umbilicum pertingit: dum reliquum corpus tegitur linteo, quod procinctorii instar circumapplicatur, & cito, & facile absque mutatione corporis mutari potest. Omnia autem haec linteamina, siccissima, calida, vel & fumo *oliban*, *masliches*, &c, imbuta adhibentur. Ditioribus solent construi bini lectuli, sibi invicem exacte contigui, qui, si opus fuerit, levi negotio, & absque ullo strepitu possunt removeri, dum lectulorum pedes rotulis, in omnem directionem volubilibus, instructi sunt. Dum contigui sunt hi lectuli, facili negotio puerpera ex uno in alterum devolvitur; sicque omnia depurari poterunt. Vix credibile est, quantum levamen inde percipiant puerperae, si non cogantur diu immorari his fordibus.

Si tunc in perfecta quiete manserint, garrulae nimis arceantur custodes, ut muta sint ministeria, subobscuri in loco, dubia in luce decumbant, ut vitentur omnia, quae sensus valide afficere possint, puerperium feliciter absolvetur.

Victus debet esse mollis, liquidus, ex avena, hordeo, oryza, & similibus, jusculis carniū non nimis meracis, saepius de die, non nimia copia simul exhibitis. A carnibus abstineant, donec febris lactaria cesserit; deinde sensim carnes albae conceduntur, minori copia primo, dein prudenter aucta, prout fames, & digestio bona crescunt. Interim semper cogitandum est, puerperas esse nutriendas: seliguntur quidem cibi leves, & facilis digestionis; sed talis horum copia concedi debet, quae alendo corpori sufficit. Quandoque

(i) Peu la pratiq. des accouchem. liv. 2. chap. 1. §. 3. pag. 268.

que morosae puerperarum custodes, aliquando & Medici nimis severi, famem pati cogunt puerperas primis diebus, quod noxium est. De hac re videri possunt illa, quae antea ad §. 600. & 601. dicta fuerunt.

Potus pariter blandus, tenuis, copiosior laudatur; ut omnes humores diluti, & facile meabiles maneant. A vino primis diebus abstinetur, nisi languor aliquam ejus copiam poscat: assuetis aqua placet, & prodest, uti & blandae emulsiones, infusa ex emollientibus herbis parata. Cerevisiam recentem, bene defaecatam, mollem nunquam nocuisse vidi puerperis, quae hoc potu uti consueverant. Qualiscumque potus concedatur, semper dari debet subtepidus, frigidus nunquam: solent enim sequi tormina molesta, horrores, lochiorum supressio.

Cum autem, uti antea dictum fuit, serum lacteum ad uterum derivatur, & postea ad mammas, ac pleraque, quae pro potu, & cibo conceduntur puerperis, imprimis recens enixis, sponte acescant, hinc antacida lenia, absorbentia nempe, exhibentur, ex *lapidibus cancerorum*, *coralliis*, *cornu cerviusto*, &c. de quibus videantur illa, quae ad §. 66. dicta fuerunt, ubi de corrigenda acrimonia acida agebatur.

Antea dictum fuit, ultimo nimirum graviditatis tempore a tumente utero quandoque sic premi intestina crassa, ut colligantur in illorum cavo durae faeces, quarum saepe tanta moles est, ut post partum ad intestinum rectum delatae, difficillime excludi possint. Dum partus instat, prudentes obstetrices clyisma injicere solent, ne faeces in intestino recto haerentes obstaculum faciant. Multis mulieribus inter partus nixus alvus evacuatur. Si hoc factum fuerit, per biduum, vel triduum absque noxa expectari poterit. Si autem alvus stricta maneat, tuto ducetur, injecto clysmate, sed leni tantum. Jusculum, aut decoctum emolliens, cum uncia una, alterave *olei amygdalarum*, & eadem quantitate *syrupi althaeae* sufficiet ad hunc usum: scopus enim est tantum, vias lubricare, & faeces emollire, ut facilius exire possint; nec vidi unquam, hoc nocuisse. Sunt tamen quidam in hac opinione, alvum strictam conducere puerperis, & per octo, imo plures dies illam ducere non audent vel mollissimo clysmate, expectantes, donec sponte, non sine magnis saepe angustiis, & nixu validissimo, durae exprimantur faeces. Metuunt enim diarrhoeam, quam semper ominosam, & vix non certo lethalem puerperis credunt. Monuerat Hippocrates sequentia (k): *Si vero uteri ex partu laboraverint, febris levis detinet, interiore autem parte venter accensus est, interdumque ad coxam usque intumescit, dolor etiam inum ventrem, & laterum mollitudinem occupat, & dejectiones biliosae sunt, & graveolentes, ac nisi alvus sistatur, derepente perit.* Varia dein commendat ad alvum sistendam remedia. Verum antea ad §. 586. β., ubi de febrium causis agebatur, monitum fuit ex Hippocrate, febris, aut diarrhoeae periculum esse, si alvus nimis diu moretur. Et ad §. 772. in *Phrenitidis* historia pariter dictum fuit,

ex

(k) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 55. Charter. Tom. VII. pag. 759.

ex Hippocrate, & Galeno, alvum interceptam non quidem proprium esse affecti cerebri signum, sed capitis mala ab alvi interceptione semper augeri, & deteriora reddi. Notum autem est, in puerperio capitis dolores toties molestos esse, quandoque & succedere deliria: unde patet, diu strictam alvum puerperis non prodesse. Hippocrates (l) ipse in periculosa lochiorum suppressione iussit, *alvum emolli*: melius autem est *clysmata injicere*. Ita & Mauriceau (m) in periculosissimo puerperarum morbo, inflammatione uteri nempe, commendat alvum liberam esse servandam per clysmata mollia, quae nihil acris stimulantis habent. Unde patet, tutum, & utile esse, si puerperii tempore alvus eluatur clysmate.

Neque adeo metuendum semper est a laxiori etiam sponte alvo, vel & levi diarrhoea in puerperis, si nullis aliis gravioribus symptomatibus stipata fuerit. Celeberrimo de Haen (n) in Batavis puerperis observare aliquoties contigit diarrhoeam pro lochiis: perniciofa haec in genere credita, tamen plures in vita servat, si vires bene conserventur. Ego & in Batavis, & in Viennensibus puerperis aliquoties observavi, etiam quando lochia fluebant moderata copia. Antea notatum fuit, ab utero gravido tumente multa viscera comprimi, & sic impediri in suis functionibus posse; nec adeo infrequens est gravidis mulieribus icterus. Non mirum ergo est, si libera jam ab uteri pressione viscera expellant per alvum illud omne, quod graviditatis tempore retentum, & accumulatum fuerat. Hinc videntur celebres Practici, simul ac a partus laboribus nati tumultus compositi sunt, jam de liberandis visceribus abdominalibus cogitasse. Concinnabat Hoffmannus (o) ex amaris extractis, gummatibus resinosis, & aloë probe correctis pilulas, quarum grana quindecim dabat mane, & vespere, secundo jam post partum die; & pro re nata per plures dies pergebat in illarum usu. Nam roborando tam intestinorum, quam ipsius uteri, per extensionem nimiam robore exuti, tonum, blande simul stimulando, imum ventrem, ac intestina a sordibus, ipsum quoque uterum a stagnante corrupto sanguine repurgat. Ob similem rationem Levret (p) laudavit diuturnum usum *Arcani duplicati*; sed parca dosi adhibiti; tantum incepit illud dare post febrim lactariam jam finitam. Maluit enim, & prudenter quidem, statim, vel brevi post partum, nihil moliri, nisi magna posceret necessitas. Diluentibus mollibus solvetur sensim, si quid visceribus impactum haeserit, & vel sponte sua, vel leni stimulo postea, dum omnia jam in vado sunt, de corpore exhibunt.

Cum autem, suppressis lochiis, utero inflammato, omnibus in perniciem tendentibus, alvo exeunt tenuia, olida excrementa, cum virium insigni prostratione, mors prae foribus est; hinc ad minimum diarrhoeae initium adeo perturbantur puerperae, & adstantes, talemque alvi fluxum statim co-

hi.

(l) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 42. Charter. Tom. VII. pag. 754. (m) Traité des
malad. des femm. gross. Liv. 3. chap. 11. pag. 421. (n) De Haemorrhoid.
Theses Cap. V. pag. 76. (o) Medic. Ration. systemat. Tom. IV. sect. 2. Cap. X.
pag. 498. (p) L'art des Accouchem. pag. 138.

hibendum volunt, & nisi obtemperet Medicus, actum est de ejus fama, si puerpera moriatur. Generale axioma Practicum dedit *Hippocrates* (q), cujus ad §. 11. memini: *Si qualia purgari deceat, purgentur, tum confert, tum facile ferunt, si e contra, difficulter*. Nec fallit haec regula. Optimo jure hinc diarrhoeam puerperarum in criticam, & symptomaticam distinxit *Levret* (r). Critica solet post tertium vel quartum puerperii diem incipere; alvo excernuntur pultacea flava, vel alba, aut binis his coloribus variegata, cum levamine, & sine lochiorum, vel urinae suppressione, sed imminutione tantum: appetitus, & somnus manent, pulsus pacatus est, abdomen molle. In symptomatica Diarrhoea e contra observatur, quod citius incipiat, limosa, & nigricantia statim per alvum exeant, quae demum mutantur in grisea, & serosa, quandoque mucosa, & sanguinolenta; lochia supprimuntur, abdomen intumescit, vires minuuntur, appetitus deletur, somnus deficit; urina minuitur copia, & lateritium sedimentum deponit, sitis adest, sentit ardorem internum, dum externa corporis superficies friget.

Criticam talem diarrhoeam inhibere vetant artis regulae; symptomaticam coërcere parum videtur tutum, cum sic retinerentur in corpore putrida. Antisepticis efficacibus putredinem inceptam corrigere, & simul labentes vires firmare, indicatio Medica poscit. Si quid autem putridi mistum humoribus fluat per vasa, & debilitans alvi fluxus adsit, poterit illud tutius per urinam, & sudores exire de corpore. *Hippocrates* (s), postquam in suppressione lochiorum alvum emolliendam, praecipue per clysmata, suaserat, uti dictum fuit, addit: *Quod si facile vomuerit, etiam vomitus ciendus. Satius autem urinam ciere, & sudorem provocare*. Lenia diluentia, quae copiose dari solent puerperis, & urinae vehiculum, & sudoribus praebent: non autem laudantur sudores, qui cubiculi intenso calore, stragulorum pondere, vel calidis sudoriferis datis, exprimuntur; illi enim nocerent: tunc tantum profunt, quando blando lecti tepore, & dilutis humoribus promoventur. Sic enim totius corporis lassitudo, a partus laboribus toleratis, tollitur, & febris lactaria solvi simili modo solet. Videantur illa, quae §. 715. & sequentibus de *Sudore Febrili* dicta fuerunt.

Hinc patet ratio, quare praecipui auctores, qui de arte obstetricia, & morbis puerperii scripserunt, blandos illos in puerperio sudores adeo laudent; cum tantam ex his utilitatem observaverint, & e contra tot noxas, si imprudenter suppressi fuerint. Alvi fluxus enim cum saevis torminibus, dolores artus molestissimi, lochiorum suppressio, febres validae sequi solent; quae omnia mala feliciter superantur, si tepore lecti, jusculis diluentibus datis, redeant sudores (t). Imo *Sydenhamus* (u), qui, uti notum est, non adeo

(q) Aphor. 25. Sect. I.

(r) L' Art des Accouchem. pag. 162. & seq.

(s) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 42. Charter. Tom. VII. pag. 754.

(t) Levret l'art des Accouchem. pag. 137. La Motte traité des Accouchem. Liv. I. chapit. 37. pag. 144. 149. Brudenell Extent of Midwifery. sect. VI. 411. 421.

(u) Dissertat. Epistol. pag. 532.

adeo favebat calori lecti, & sudoribus, tamen solito suo candore, dum de puerperis loquitur, dicit: *Praeterquam enim, quod ista, qua in lecto fruuntur, quies a malis jam toties commemoratis eas immunes praestet, non interruptus lecti calor spiritus pariter reficit tum a pariendi doloribus, tum ab evacuationibus in hoc casu solennibus exhaustos fractosque: quinimo & Naturae suppetias fert, atque omnes, quas gestationis tempore mulier congefferat, cruditates digerit, & amolitur.*

Si ex signis, antea recensitis, constet, uterum inflammari, omnia illa, quae in historia inflammationis, & morborum inflammatoriorum, dicta fuerunt, locum habent. De venae sectione autem, in puerperis administranda, adhuc quaedam dicentur paragrapho sequenti.

Ut autem suppressa lochia denuo redeant, laudantur *Aperientia specifica lenissima, ex moderate cardiacis, & uterinis.* Illa, quae evacuationem lochiorum promovent, remedia, solent vocari *Aristolochica*, & horum enumeratio habetur (v). Distribuuntur autem in duas classes, nempe in derivantia, & aperientia sic dicta; de quibus ultimis nunc agendum, & quae interno pariter, ac externo usu adhiberi solent. Si percurratur horum remediorum Catalogus, omnia inveniuntur calida esse, & stimulantia, ita tamen, ut quaedam plus, alia minus actiuosa sint. Sic v. g. *Artemisia, Cardiacae, Chamaedrys* leniores sunt, quam *Sabina, Satureja, &c.* idem verum est de oleis stillatitiis: ita *oleum Cinnamomi, Caryophyllorum*, acerrima sunt; *oleum Macis, Melissae*, quamvis fragrantissima, tamen longe mitiora sunt. Conducunt haec cardiacae, si debilitas adsit, & languor. Idem & de uterinis dictis remediis verum est, quae aucto humorum motu vasa uteri urgent, & aperiunt occlusa: hinc eadem remedia & *Emmenagoga*, & *Aristolochica* dicuntur; de quibus videantur illa, quae ad §. 1291. dicta sunt.

Verum, cum in puerperis metuenda semper sit uteri inflammatio, si in tempestive suppressa lochia fuerint, prudentia suadet, ut lenissima tantum specifica, uterina & cardiacae, remedia adhibeantur: hoc autem fit, seligendo mitiora ex his; vel si validiora adhibeantur, parca copia horum aquae copiosae infusa detur, dum simul fomentis, vaporibus, &c., sic disponuntur vasa uteri, ut facilius cedant aucto parumper impetui humorum: omnium maxima cautela requiritur in illis, quae facile mobiles, & hysterice passionibus obnoxiae sunt. Prudentissime, ut solet, Medicos hinc monuit *Sydenhamus* (x), ut non pergant diu in usu remediorum, quae uterina dicuntur; *Sed, exhibitis aliquamdiu remediis, quae in hoc casu cum successu usurpari solent, si votis ea non respondeant, ab iis temperandum est; cum neque fortiora hic locum habeant, neque in mitiorum usu perseverare debeamus propter attritas & fere prostratas puerperarum vires.* Semel tantum, ut spirituum conturbationem compesceret, *Laudanum*, vel solum vel uterinis remediis mistum, propinabat: *Sedulo enim animadvertendum est, quod si, zelo hoc semel misso, scopum non*

(v) Institut. Boerhaav. §. 1226. pag. 537.

(x) In Dissertat. Epistolari pag. 533. & seq.

attingamus, nec sequantur lochia, opium nullo modo est repetendum, ut in aliis casibus fieri solet, & debet. Idem de Enematum usu pronunciavit, nec repeti haec voluit, si post unius injectionem lochia non sequerentur. Tunc autem rem omnem tempori, Medicorum facile Principi, ac Coryphaeo, commitendam censuit. Imprimis ideo, cum singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si aegra vigesimum diem superaverit, jam fere in vado sit. Constanter hanc methodum secutus fui, nec poenituit unquam. In puerpera, cui lochia parcissime fluxerant, manebat dolor molestus in hypogastrio, qui non cedebat lenioribus remediis ad provocanda lochia adhibitis. Fomenta mollissima applicui interdium, de nocte. Emplastra similia, cum jam surrexerat ex puerperio; post sextam a partu septimanam copia sanguinis de utero fluxit, cum levamine doloris, & postea sana, ac foecunda vixit.

Altera classis remediorum Aristolochicorum (y) continet illa, quae ad uterum determinant, hoc effectu, ut humores majori copia, & impetu versus inferiores aortae ramos deriventur. Hoc autem obtinetur vel minuendo resistantiam vasorum inferiorum per balnea, fomenta, cucurbitas, emplastra aromatica; vel augendo circulationem humorum in partibus inferioribus per frictiones; quo & spectat missio sanguinis ex venis pedum. Sed considerandum est, nisi uteri vasa constricta referari possint, hoc motu aucto, omnia mala augeri; unde iterum patet, & in horum usu prudentia opus esse. Videantur de his illa, quae in *Capitulo de obstructione* ad §. 134. 135. habetur.

Hinc videtur *Manningham* (z) monuisse; *Si suppressis lochiis inflammetur uterus, e brachio potius, quam e pede, mittatur sanguis*. Accelerato enim sanguinis motu per vasa inferiora, magis urgebitur uterus inflammatus. *Hoffmannus* (a) statuit quidem, si lochia subsistunt, praestare semper, ut in inferioribus sanguis post pediluvium detrahatur; fatetur tamen, sibi aliquot innotuisse exempla, ubi, lochiis subsistentibus, purpurata febris oborta fuerat cum gravissimis symptomatibus, profuisse insigniter sanguinis ex brachio educationem. Simul & casum recenset (b) puerperae, cui ob aërem frigidorem admissum, subitumque ab incendio terrorem, lochia suppressa fuerant. Mox secuta fuit pleuritis, & secta in talo vena, non redierunt lochia, uti neque post secundam sanguinis missionem in brachio institutam. Verum, sudore per universum corpus per viginti horas profuse manante, & alvo clystere molliente subducta, demum rursus prodierunt uteri purgamenta, & aegra ex ancipiti est levata. Simul hinc patet, venae sectionem repetitam quidem impedivisse, ne acuta pleuritide suffocaretur, sed per sudorem criticum superatum fuisse ancipitem morbum.

Quamvis autem per venae sectionem in pede institutam minuatur resistentia sanguini per inferiores arterias fluenti, adeoque in illis augeatur celeritas,

ta-

(y) Institut. Boerh. §. 1226. N. I. pag. 537.

(z) Art. obstetric. compend. pag. 87.

(a) Medicin. Systemat. ration. Tom. IV. sect. 2. Cap. X. pag. 517.

(b) Ibidem pag. 516.

tamen ob eandem rationem avertitur impetus, & copia ab ipso utero, saltem pro parte. Dum enim acceleratur motus per arteriam Iliacam externam, minuitur impetus per Iliacam internam ejusdem lateris, quae praecipuos utero ramos largitur. Praecipua autem curationis spes videtur pendere a laxatione vasorum uteri constrictorum. In casu enim modo recensito a frigore aëris, & terrore stricta erant vasa cutanea, atque uterina, & dum sudor profusus per laxata jam, ac aperta vasa cutanea fluebat, brevi post vasa quoque uterina reſerata debitum lochiorum fluxum reſtituerunt.

Unde patet, quare *Aperientia localia* commendentur, sed praecipue mollia quaevis, de quibus dictum fuit ad §. 1291. Ab irritantibus enim cavendum est. Ob hanc causam *Pessaria*, & *Suppositoria* vix unquam adhibentur: priora vaginae, posteriora ano immituntur. Cum autem suppositoria ideo ano indantur, ut mole, vel stimulo, vel utrisque simul, nixum depnendi alvum excitent, praeferuntur in puerperis clysmata mollia, quae alvum ducunt, simulque duras faeces emolliunt, intestina lubricant, simulque, dum intestino recto haerent, vicinum uterum fovent.

Quamvis autem *Pessaria*, & *Suppositoria*, diversis parari possint modis, communiter nihilominus solebant parari ex melle. Sic illa *Hippocrates* (c) describit. *Pessos autem subdititios, si valentes desideras, sic conficito. In mel semicoctum ex medicamentis apposititiis praescriptis immitte, quae educere possunt, & quum immiseris, balanos ad eorum instar, qui in sedem immittuntur, efformato, illosque longos, & tenues facito. Deinde mulieri supinae, in lectulum alius a pedibus instratum reclinatae, balanum apponito, & panniculo illigatum, aut alia re consimili, calefacito, dum colliquescat. Quod si debiliorem balanum supponere velis, in linteolum obligato.* Videtur Pessorum usus Veteribus Medicis satis frequens fuisse, cum in *Libro de Natura Muliebri*, & in *Libris de Mulierum Morbis* plures Pessorum species describantur, quorum quidam acris satis remedia continent. Morbis vaginae curandis a Chirurgis cum fructu adhibentur; sed admodum dubium videtur, an in lochiorum suppressione tuto adhiberi possent. Os enim uteri, & ipsa vagina partus tempore multum passa fuerunt; hinc facile irritari possunt, quod videtur omnino evitandum esse. Bona fide fateor, quod ad hunc scopum, lochia nempe provocandi, pessariis nunquam usus fuerim.

§. 1332. **V**Enae sectio haud facile, nec nisi urgente summa necessitate, adhiberi potest.

Quid lochia sint, cui usui serviant, quomodo mutantur colore, minuantur quantitate, in praecedentibus dictum fuit. Quae omnia si rite perpendantur, patebit, Venae sectionem raro requiri in puerperis, & debilitando nocere saepius; adeoque non adhibendam esse, nisi ubi necessitas postulat.

Multi videntur esse in illa opinione, sanguinem, qui post partum effunditur,

(c) Libr. de locis in homine, Cap. ultimo, Charter. Tom. VII. pag. 377.

tur, malae esse indolis, & fere gaudent, si debiles, pallidae, exhaustae, a puerperio surgant mulieres; unde si suspicentur, non fluxisse satis magnam copiam sanguinis. Venae sectione demunt, quod superfluum gravare corpus autumant. Patet ex ante dictis, lochiorum copiam variam admodum esse in diversis mulieribus, quae tamen feliciter puerperio defunguntur: notum est, puerperis, quae natis ubera praebent, lochia minori copia fluere, & citius desinere. Pariter constat, tertio, quartove puerperii die purulenti quid exire; nullo quandoque, vel paucio, sanguine tinctum, in sanissimis etiam puerperis; sequitur tunc febris lactaria, quae, lacte ad mammas delato, per blandum sudorem solvi solet. Hoc tempore lochia suppressa credunt, & toties Vena secatur, dum pro morbofo habent illud, quod secundum naturam est; uti antea fufius dictum fuit. Leves hoc tempore quandoque circa uterum dolores percipiuntur, mollibus fomentis satis cito curabiles, qui pro inflammatione uteri habentur, & sanguinis missionem citam, ac repetitam poscere creduntur. Quenam signa inflammationem uteri adesse demonstrent, ad §. 1329. dictum fuit; in quo casu venae sectionem conducere, nemo dubitat. Sic *Aëtius* (d) prudenter monet sequentia: *At ubi vehementior inflammatio infestaverit, si neque aetas, neque habitus, neque anni tempus, obstiterit neque inflammatio post abortum, aut immensam sanguinis vacuationem supervenerit, cubiti vena secanda est, ac sanguis pro virium ratione educendus, licebitque in secunda quidem venam incidere, in tertia vero sanguinis missionem repetere.*

Nonnisi cum cautela ergo *Aëtius* suavit venae sectionem, & tantum, dum uteri vehementior inflammatio aderat. Non convenit ergo ob leviores etiam puerperarum querelas sanguinem temere mittere; cavendum est, ne naturalis lochiorum imminutio pro morbosa suppressione habeatur.

Tristem imprudenter repetitae sanguinis missionis, in Illustri puerpera sana & vegeta, effectum memoriae reliquit *Celeberrimus Hofmannus* (e), testis oculatus. A rudiori obstetricis manu jam altero post partum die tumor dolens occupabat vaginam, & collum internum uteri: exacerbatis symptomatibus, lochiis non rite fluentibus, accessit febris; Archiater vocatus venam in brachio secavit, & intra septem dies sexies, modo in brachio, modo in pede sanguinis missionem repetiit. Sub ultima autem Venae sectione oculi ceperunt obfuscar, ita ut candelam peteret, quamvis dies esset quam lucidissima; & brevi post lethalis sequebatur lipothyma. Cadavere aperto, sequenti die, in toto vasorum systemate vix aliquot restabant sanguinis cochlearia. Unde concludit *Hofmannus*, *Medicos plures in eo delinquere, quod in inflammatoriis puerperarum affectibus sanguinis missionem repudient omnem: hic in excessu peccatum fuit graviter: sed medium tenere beati.*

Profusae adeo sanguinis jacturae mortem successisse, non adeo mirum videtur; sed vel unicam venae sectionem, in puerpera temere institutam, lethalem fuisse, *Sydenhamus* (f) testatur. Matrona honesta, ac proba statim a partu corri-

(d) Lib. XVI. Cap. 85. pag. 162.
Sect. 2. Cap. X. pag. 520.
Tom. IV. pars II.

(e) Medic. Ration. Systemat. Tom. IV.
(f) Dissertat. Epistol. pag. 535.

corripiebatur paroxysmis hystericeis, & lochia penitus deficiebant. Tentavit methodum suam; sed caruit successu: hinc totam rem tempori committere voluit; quotidie illam invisens, non vidit augeri mala. Ad decimum quartum diem usque sic exspectando traxit morbum. Persuaserunt tunc marito adstantes mulierculae, venam uxori in pede sine mora secandam esse; quo facto, *Paroxysmi hysterici adeo invalescebant, ut intra paucas horas spasmi accederent, & non ita diu postea, aerumnarum requies, Mors.* Plures puerperas periisse vidit *Leuret* (g), quibus multum sanguinis eductum fuerat, imo ne unicam quidem evasisse, dum hoc tentabatur ad avertendam, vel curandam uteri suppurationem, vel metastasim lacteam; de qua ad §. 1329. dictum fuit.

Patet ergo, non facile in puerperis venam secandam esse, nisi urgens necessitas indicet hanc evacuationem. In casu illo (h), cujus jam mentionem feci, ubi ob fortissimam abdominis constrictionem, suppressis lochiis, intolerabilis capitis dolor sequebatur, cum aliis malis symptomatibus, ter vena secta fuit absque ullo levamine: postquam autem fascia soluta fuit, mox redierunt lochia, & omnia mala symptomata evanuerunt.

Notandam est, hic tantum agi de morbis puerperii, qui a partu, & ejus sequelis, ut causa, pendent. Potest enim puerpera alio tentari morbo, dum in puerperio decumbit, qui propriam curam requirit. Notavit *Sydenhamus* (i), nonnunquam febrim, quae lochiorum suppressionem sequitur, transire in classem Epidemicarum, quae illo tempore grassantur; tuncque harum febrium curam requirere, habita tamen semper puerperii ratione. Antea ad §. 890. N. 1. notavi, quod in puerperis Pleuritide correptis, licet lochia fluerent, venae sectionem instituerim. Non enim lochia semper sistuntur, dum inflammatorius talis morbus puerperio supervenit. Sic vidit acutam pleuritidem, post partum valde laboriosum, in puerpera quarto post partum die, *La Motte* (K), profusis sudoribus minime levatam, ut sperabatur. Tamen vehemens talis morbus ne quidem imminuerat lochiorum fluxum, & serius cum vocatus fuisset, quater venam secare debuit, ut morbi impetum refraenaret; sequente tamen vomica purulenta, a qua evasit, tota exhausta, & macie confecta. Lactis usu sensim refecta fuit, & omnino convaluit. Dum octavo a partu die acerbissimus lateris dolor corripuisset puerperam. *Tulpius*, cum identidem novis insultibus urgeret dolor, ter pedis, & quinquies brachii, venas solvere debuit (l). Tantam sanguinis jacturam non solum toleravit, sed & ingens alvi profluvium sustinere debuit, antequam integre debellaretur morbus.

(g) L'art des accouchem. pag. 167.

(h) Peu la pratique des accouchem. pag. 526.

(i) Dissertat. Epistol. pag. 532.

(K) Traité complet de Chirurg. Tom. I. observat. 45. pag. 245.

(l) Observat. Medic. Lib. 2. Cap. 2. pag. 105.

§. 1333. **N**Eque curanda symptomata proinde, ac si essent morbi acuti sui generis (1329.).

Hoc satis inculcari nequit, cum tot errores in praxi hic contingere soleant. Antea jam saepius dictum fuit, uterum habere mirum imperium in reliquas corporis partes. Sic v. g. vehementes quandoque capitis dolores oriuntur, qui minus cautos fallunt, ac si inflammarentur meninges cerebri. In illo casu ante memorato, ubi, a nimis adstricto abdomine, dolor capitis immanis aderat, oculi scintillabant, &c., quis non cogitasset, ignorata causa, validam instare Phrenitidem. Vena saepius secatur sine fructu: dum fascia solvitur, omnia cessant mala. Imprimis autem de hac re cogitandum est in teneris, & hystericis malis obnoxiiis: vidi sic dolores abdominis satis molestos in tali puerpera, dum grumus sanguinis exiturus retinebatur in uteri orificio parumper. Paulo post, evanido ventris dolore, querebatur, se similes dolores, ac in abdomine perceperat, in capite sentire; post horae quadrantem urinam dimittebat tenuem aquosam, & mingendi hoc conatu expellebatur grumus: statim capitis dolores cessant, & pacatus somnus aliquot horarum sequitur; evigilans, se sanam jam esse sollicitae matri laeta nunciat. Numerosos similes casus vidi, qui me docuerunt, varia symptomata, quae puerperium comitantur, & saepe morbos acutos referunt, non indigere cura inflammationis.

§. 1334. **L**acte ad mammas delato, saepe fit ejus stagnatio, coagulatio, dolor inflammatorius, suppuratio, Schirrus, Cancer.

Lac, recens nati infantis pabulo dicatum, graviditatis tempore jam adesse solet in mammis saepius, & quandoque magna satis copia exstillat, uti antea dictum fuit. Sic apta redditur jam in gravidis lactis officina, ut post partum nutriri infans possit. Quamvis autem viderim, statim post partum ubera duxisse infantes, tamen plerumque mammae a partu flaccescere potius solent, neque tenduntur fere, nisi secundo, tertio, quatorve die, quandoque etiam serius. Sentiunt puerperae leves horripilationes, sub cute quasi repentes, inquietiores fiunt, somnus turbatur, febricitant plerumque, incalescunt. Deinde incipiunt mammae, turgent magis magisque, brachia cum quadam molestia moventur. Tunc dicitur, lac ad mammas deferri; quod si moderato cum impetu fiat, omnia illa incommoda cessant brevi, imprimis si infans matris ubera ducat, sicque nimia a collecto lacte mammarum distensio caveatur; lac illud primum, quod in mammis post partum colligitur, serosum tenue est, & recens natis utilissimum, dum tenue nutrimentum dat, ventriculum, & intestina a sordibus depurat, alvumque simul leniter solvit.

Quandoque subito lac in mammas rapitur, & intra paucas horas illas maxime distendit. Dictum fuit saepius de commercio, quod uterum inter, & mammas observatur: mammariam internam, & epigastricam inter se per ana-

stomofin communicare, scripserunt Anatomici, & in recenter enixae puerperae cadavere haec vasa calamus scriptorum aequare visum fuit (*m*). Quandoque humores subito sursum rapi, & non tantum mammas distendere, sed & vasa encephali, videtur *Hippocrates* indicare (*n*), dum scribit: *Quibus mulieribus sanguis in mammis colligitur, maniam significat.* Quibusdam mulieribus per ductuum lacteorum extrema lac ex papillis facile exit, & sponte quidem, ita ut viderim aliquoties lintea, quae mammis applicata fuerant, saepius mutari debuisse, cum tota madescerent a lacte seroso: in talibus raro stagnatio, & coagulatio obtinet. Plerumque autem suctione opus est, ut lac exeat; cum papillae, plicatilibus membranis constantes, his collapsis, complicant tubulos lacteos, & facilem lactis exitum impediunt (*o*). Unde per suctionem minuta atmosphaerae pressione, papillae simul elongatione in rectum dispositis tubulis lacteis, exit lac, mammarum distensio minuitur. Requirebatur autem, ut lac non semper deplueret, sed collectum in mammis manere posset, donec infans ubera posceret. Ductus igitur lactei, quorum congeries substantiam glandulosam mammae constituit, in initio suo angusti sunt, in medio decursu suo ampliores, dein iterum prope papillam angustantur, & circa basim ejus circularem quasi communicationis alveum constituunt, ex quo tubuli lactei emergunt, qui per papillam distribuuntur, & circa papillae orificium minutis osculis hiant (*p*). Unde manifeste apparet, totius hujus apparatus effectum esse, ut lac colligi, & moram trahere, possit in mammis. Toti huic substantiae glandulosae mammarum se interferit membrana adiposa, cujus cellulae numerosissima vasa sanguinea, & lymphatica sustinent, & ductus lacteos, glandularumque racemos. Totus ille apparatus continetur membrana, quae cellulosa continuatio videtur: ejus pars, quae fundum sive, basim mammae constituit, crassior est, & supposito musculo pectorali adhaeret; reliqua ejus pars tenuior est, & cuti firmiter accrescit (*q*).

Unde apparet, mammarum fabricam, & situm efficere, ut multum distendi possint, quod requirebatur ad lactis collectionem: sed simul ac distendens vis minuitur vel parum, propria elasticitate satis fortiter contrahuntur, & per patulos in papilla tubulos lac ad aliquot pedum distantiam ejiciunt. Hinc, dum plena ubera ducunt infantes, nutrices sentiunt motum quemdam in tota mamma, solentque dicere, quod *mammæ concidant*, tuncque magno cum impetu lac exsilit, & quidem tanta copia, ut infans deglutire non possit; unde papillam deserit; vel & providae nutrices, simul ac incipientem illum motum in mamma percipiunt, statim papillam ex ore infantis remonent, illamque reddunt, simul ac primus ille impetus exsipientis lactis cessaverit. Hoc fieri solet, dum firmæ, & solidæ mammae sunt, vix in pendulis, & flaccidis.

Lac autem, quamvis optimum, si stagnet, cremorem album, crassum, pinguem, ejicit sursum (*r*), infra manet lac; defloratum dictum, subcaerule-
lescens,

(*m*) Hemsterh. Messis aureae pag. 138.

(*n*) Aphor. 40. Sect. V. Charter.

Tom. IX. pag. 219.

(*o*) VVinslovv Exposit. Anatom. traité de la poi-

trine N. 19. pag. 586.

(*p*) Ibid. & N. 13. pag. 585.

(*q*) Ibid. N. 11. 12.

(*r*) Herm. Boerh. Chem. Tom. II. pag. 297.

lescens, pellucidius, & tenuius. Si lacti miscetur *coagulum lactis* dictum, quod paratur de succo ventriculi ruminantium, abit in aequabilem coagulata scissilem massam, quae brevi sponte secedit in serum, & in colostratum, five caseosum. Si acidum admiscetur lacti, statim grumescit, & coagula format, altera lactis parte remanente fluida (s). Verum lac purum, sibi relictum, acescit, imprimis in aëre calido, & tunc simili modo grumosum fit, ac dum acida affunduntur lacti. Sed & lac ab alcali fixo sale addito flavescit magis magisque, prout plus de alcalino sale admiscetur, & tandem flavus ille color in profundum fere rubrum mutatur: ac simul lac coagulatur, licet non tam valide, ac quidem ab acido admisto fit (t). Sed febri-
canti valide animali, lactanti prolem, lac corrumpitur in uberibus, fitque tunc ex candidissimo flavescent, ex dulci falsum, ex crassulo saniosum tenue, interim crassamento coagulato in mammis relicto, ex inodoro subfoetidulum, infanti horrendum, & fastiditum. In coagulatione ergo lactis, nna cum febre calida, & colore flavescente, non licet Medico cogitare de causa coagulante acida, sed de calore nimio, & forte alcalescente potius coagulatione. Quin forte centies Medici observant, lac coagulari sic a febre, ubi ne semel id vident factum ab acido.

Quacumque ergo de causa stagnet lac in mammis, metuenda est ejus degeneratio, & coagulatio: solet tunc tenue serum ex papillis fluere, manente mamma aequae tenfa, dolente, tumida, dum omne grumosum retinetur. Frequentior hujus mali causa observata fuit, si frigidus aër subito pertingat ad mammas (u); unde solent puerperarum custodes linteis calidis fovere mammas, ut aëris frigus caveatur.

An forte mala conformatio pectoris, & difficilior reditus sanguinis venosi a mammis huc quid contribuit? In illis foeminis, quae non lactant infantes, omne lac, quo mammae implentur, debet denuo in sanguinem redire per venas: si autem ille reditus difficilior sit, stagnabit lac in mammis, & metuentum est lactis coagulum. An tale quid Hippocrates (v) indicavit? Quibus virginibus orthopnoea contingit, illis uterum gerentibus mammae suppurantur.

Si ergo lac ad mammas delatum stagnaverit, fiet separatio partium, ex quibus lac constat. Cremor pinguis secedet, qui febrili calore rancescet; caseosa pars, licet primo acescat, in morbi progressu putrescere poterit; plus enim de animali natura jam habet. Nam si lactis coagulum intra densum linteum magna vi premitur, ut omne serum inde separetur, pinguis fit caseus, constans cremore lactis, & caseo proprie sic dicto: talis aetate acerrimus fit, non acidus, sed alcalino proprior. Si vero, cremore prius ablato, ex coagulato lacte caseus paratur, ille durefcit instar cornu, atque, igni admotus perfecte, ut cornu, lentescit, ustulatur, comburitur, foetet (x).

Unde patet, quare stagnante, coagulato, degenerante, in mammis lacte,
se-

(s) Ibid. pag. 301.

(t) Ibid. pag. 302.

(u) Levret l'art des Accouchem. pag. 155.

(v) Coacar. Praenot. N. 549. Charter. Tom. VIII. pag. 284.

(x) Herm. Roerhaave Chem. Tom. 2. pag. 301.

sequatur illarum inflammatio, & metuendae sint omaes ejus sequelae, si resolvi non possit.

§. 1335. **C**Ognoscitur horrore, frigore, & calore reciprocis, febricula, signisque incipientis inflammationis.

Solet saepe inflammatio mammarum comitari febrim lactariam, quae cum horrore, & frigore reciprocis incipit, uti dictum fuit. Quandoque & serius oritur, dum a quacumque causa lac stagnans degenerare incipit in mammis. Prior frequentius contingit illis puerperis, quibus lac in mammis collectum retropelli debet: posterior saepius contingit in lactantibus. Cum autem eo major resolutionis spes sit, quo citius medela idonea applicatur, hinc ad haec signa incipientis inflammationis attendendum est. Tumor, dolor, calor, rubedo, una cum febre, praecipua sunt; de quibus videantur illa, quae dicta fuerunt ad §. 382., ubi de signis inflammationis agebatur.

§. 1336. **C**uratur 1. antacidis lenibus. 2. diluentibus lenissimis. 3. discutientibus externis cito applicatis.

1. Cum lac sponte sua acescere soleat, & dum acescit, grumescere incipiat, hinc antacida hic commendantur, de quibus videri potest *Materia Medica* ad hunc numerum, & illa, quae ad §. 66. de corrigenda acida acrimonia dicta fuerunt. Seliguntur autem lenissima, & imprimis illa, quae acidum absorbentia vocantur, quae nullam acrimoniam habent. Piscium ossa exsiccata, ut *Mandibulae Lucii piscis*, a quibusdam maxime laudantur. Salia alcalina fixa, quamvis vim antacidam certam possideant, attenuentque illa, quae per acidum coiverunt (y), & ad coagulum lacteum resolvendum laudentur, tamen non nisi parca dosi, & aqua copiosa diluta, adhiberi solent; cum omnia blanda, & lenia puerperis conducant. Praeterea experimenta docuerunt (z), non esse verum, quod ubique asseritur, resolvi illud coactum rursus in antiquum liquidum, & resolvere alsalia, quae ab acidis erant densata. Patuit enim ex illis, quae ad §. 1334. dicta fuerunt, lac ab alcalino sale admisto grumescere, quamvis non adeo fortiter coaguletur, quam ab acidis affusis. Praeterea constitit, longe frequentius lac densari in mammis a febre, & calore, quam ab acido coagulante.

2. Haec enim omni scopo satisfaciunt; leniunt, emolliunt, concreta humectando disponunt ad resolutionem, & ad omnes inflammatorios morbos adhibentur. In *Materia Medica* plures tales formulae habentur. Huc etiam spectant victus humidus, & potus tenuis, aquosus, copiosus.

3. Cum manibus accessus detur facilis, hinc ab externa remediorum applicatione magnam utilitatem merito speraverunt omnes. Dum enim cito, incipiente inflammatione, sedulo haec applicantur, magna spes est benignae re-

(y) Herm. Boerhaave Chem. Tom. 2. pag. 58.

(z) Ibid. pag. 303.

resolutionis. Praestat autem semper mollissimis remediis uti, ut, si resolutio inflammationis non successerit, omnia ad blandam suppurationem disponantur. In ipso morbi initio *Poscam*, sive *Oxycratum* applicuit *Moschion* (a): credebatur enim, vim constringentem aceto inesse; hodie solventem aceti vim omnes agnoscunt. Applicabat autem spongas molles oxycrato, aceto nempe aqua diluto, madidas, vel panem eidem intinctum cum palmulis tritis. Haec adhibeat, *lacte irruente cum tensione, gravitate, dolore sed & cum fervore*. Verum, si fervor mammarum augeretur, illa voluit applicanda, quae laxare possunt; fomenta nempe ex oleo, & aqua calidis. *Celeberrimi Benevoci* observationes, confirmatae a *Nannoni* (b), docent egregium usum aceti aqua diluti, non tantum in incipiente mammarum inflammatione, sed etiam, dum jam provector morbus est. Aliquot casus ibi recententur, qui egregiam huius remediae vim ostendunt. Prout autem inflammatio vehementior erat, eo magis diluebatur acetum, ne irritando noceret. Si autem resolutionis signa non apparebant, sed calor, dolor, tumor in mamma augerentur, & pulsus fieret celerior, removebat poscam, & sola aqua calida fovebat, uti & unguentis, ac emplastris, ut promoveret suppurationem, abjecta omni spe resolutionis.

Plurimi mollissimis usi sunt remediis tantum. Sic *Mauriceau* (c) adhibebat cataplasma molle ex mica panis in lacte cocta, addito deinde oleo amygdalino, & aliquot ovorum vitellis. Huic cataplasmati imponebat splenia oxycrato madida. Multum boni exspectabat a *Brassica capitata rubra*, aqua cocta in pulvem, quae dein in mortario trita per cribrum transprimebatur, ut aequabilissima esset; & tunc addebatur aliquid mellis, oleique *chamaemelini*, per infusionem parati. *Leuret* (d) mollibus, anodynis, leniter solventibus, topicis, curam aggreditur; dein, ubi, tensa prius mamma laxari incipit, tunc solis solventibus utendum, jubet; cataplasmate ex pane, & vino simul coctis, aqua marina vino rubro animata, urina sana, sale alcalino, sed ammoniaco, in aqua solutis, usus fuit.

Sapone veneto in lacte, & aqua soluto curavi, ut foveretur mamma, tumens collecto lacte; bis, vel ter de die exposui vaporibus aquae tepidae; dein, si remitteret parum dolor, mollem cum his frictionem adhibui; & vix aliis opus habui, si adhuc resolutio sperari poterat.

In *Materia Medica* ad hunc numerum habetur Cataplasma, quod partim ex emollientibus, partim ex discutientibus aromaticis constat, addito pariter sapone veneto. Cum autem haec omnia in lacte coquantur, multum perit de aromatum stimulo volatili, & prodest imprimis, ubi infarctio mammarum a lacte adest, una cum inflammatione non adeo valida. Ubi autem magnus calor, rubor, dolor adest, tunc mollissima remedia praeferuntur reliquis.

§. 1337.

(a) Spach. gynaec. pag. 6. N. 58. & 60.
Mammelle pag. 26. & seq.
Liv. III. Chap. XVI. pag. 435.

(b) Trattato delle Malattie delle
(c) Traité des Malad. des femm. gross. &c.
(d) L'art des Accouchem. pag. 156.

§. 1337. **S**i jam in apostema tendit, quantocyus maturandum, aperiendum, depurandum, consolidandum; de quibus in Chirurgicis.

De signis, quae demonstrant, inflammationem non posse resolvi, sed in suppurationem tendere, dictum fuit antea ad §. 386. Ubi ergo hoc constat, mollissima sola conducunt, una cum subpinguibus. Solam farinam avenae, in lacte coctam, addito dein oleo lini, cataplasmatibus forma applicandam, consului pauperibus, ut sumtibus parcerem, & optimo quidem cum effectu. Quomodo autem abscessus, inflammationem non resolvendam sequens, curari debeat, dictum fuit ad §. 402. & sequentes. Hinc superest tantum, ut quaedam notentur, quae peculiariter observantur in mammis suppuratis.

Antea dictum fuit, mammarum substantiam consistere ex glandulosa, lobulosa, partim ex substantia glandulari; unde optime distinxit *Levret (e)*, quandoque infarciri posse tunicam cellulosa solam, quod raro fit; saepe idem malum obtinere in parte glandulari; omnium frequentissime tamen utramque hanc partem simul affici.

Si sola tunica cellulosa inflammata in abscessum tendat, mamma tumet multum, sed uniformi, & aequabili tumore; unde non mutatur convexa ejus figura, nisi forte duobus locis distinctis mammae distincti formentur abscessus. Plerumque tamen interstitia, inter tales abscessus posita, suppurationis tempore rumpuntur, & bini vel plures, abscessus sibi mutuo vicini in unam vomicam confluunt. Admodum dolere solent tales mammarum abscessus, antequam sponte, vel per artem puri collecto via paretur.

Contigit tamen mihi videre bis in puerperis totam mammam fuisse consumptam valida suppuratione, licet vix ullum dolorem percepissent, & cutis leviter tantum rubesceret. Finita suppuratione cutis, accrevit suppositis partibus omnino, & de tota mamma nil supererat, praeter flaccidam papillam.

Suppuratio, quae in tunica cellulosa fit, satis promte procedit: pus tamen, quod exit, varium est, & inaequale; vomica autem facile detergitur, praecipue si sponte fuerit ruptus abscessus.

Ubi vero sola pars glandularis affecta fuit, tubera tactu percipiuntur in mamma, quae sibi mutuo non adhaerent, imo quandoque satis distant; cutis mammae non est tensa, nec dolet in initio; fere tantum dolor sequitur, quando rupturae proximus est abscessus. Suppuratio admodum lente procedit, neque fit simul, & semel in omnibus tuberibus: solet enim, uno abscessu rupto, aliud tuber dolere, attolli, & suppurari. Hinc per menses quandoque talis mammae suppuratio protrahitur, & in adultioribus quandoque per integrum annum.

In lentis talibus mammarum suppurationibus conducunt remedia, quae parum plus moyent, quale est v. g. Cataplasma illud, quod in *Materia Medica* ad

(e) L' art des Accouchem. pag. 157.

ad praecedentem numerum proponitur. Embrochae, quas laudat *Leuret* (f), ex fale alcalino fixo copiosa aqua diluto, ex sapone, & fomenta ex his parata, tunc multum profunt. Omni enim modo curandum est, ut totum solvatur in pus, nihilque duri maneat in mamma, quod scirrhi, & canceri metum relinquere posset.

Mirum casum vidi bis in eadem muliere. Dum gravida esset, incepit dextra mamma tumere, absque dolore: tumor ille augebatur quotidie, ita ut octavo graviditatis mense mammae moles femur attingeret, & deberet suspensorio sustineri; aliter incedere non potuisset misera. In vasta hac mamma poteram distinctissime tangere sex tubera, non cohaerentia sibi invicem, pugnū mole aequantia, satis mobilia. Dum pessima quaeque metuebam, mirabar, post felicem partum totam hanc molem minui, tubera solvi, ita ut intra bimestre spatium mamma rediret fere ad solitam magnitudinem: namquam sinistra. Nullum autem remedium adhibuitur. Post biennium denuo gravidæ omnia eadem contigerunt, eodem pariter post partum eventu.

Omnia haec observatis practicis confirmavit *Nannoni* (g). Invenit enim, si inflammatio occuparet partem cellulosa[m] mammae solam, & suppuratio sequeretur, non inde minui lactis secretionem: contrarium obtinebat, si substantia glandulosa mammae similiter afficeretur; tunc enim minuebatur, vel & integre cessabat lactis secretio, prout major, minorve pars glandularis substantiae fuerat infarcta. Observavit pariter, suppurationem tardiorē in parte glandulari, quam in parte cellulosa, & majus periculum esse scirrhusae duritiei remanentis.

Si autem inflammatio, in suppurationem abitura, occupet & cellulosa[m], & glandularem substantiam mammae simul, tunc mamma tumet inaequaliter; in quibusdam locis durior est, quam in aliis (h), & suppuratio citius fit in parte cellulosa: unde saepe talis abscessus sponte rumpitur, & bonum pus fundit, dum adhuc dura tubera supersunt, quae postea sensim maturescunt.

Ob hanc causam emollientibus, simul additis dissolventibus, uti dictum fuit, promovere suppurationem conantur periti; imo suadent, ut tamdiu apostema clausum relinquatur, donec pus, sponte ruptis integumentis, viam sibi faciat; ita enim melius solvitur omne durum, & interstitia, inter vicinas sibi mammarum vomicas, solvuntur, ut pus in unum cavum confluat, sicque per unicam aperturam effluat (i). Observatum fuit, minus deformem cicatricem manere, si sponte rumpatur mammae abscessus, quam si ferro secetur (K).

Rupto sponte, vel secundum artem aperto, abscessu, simplicissima methodus optima est. Turundae semper nocent, cum inter respirandum moto pectore

(f) L'art des Accouchem. pag. 159.
melle pag. 48. 49. &c.

(g) Trattato delle Malattie delle Mam-

(h) Levret sur l'art des Accouchem. pag. 157.

(i) Ibid. 158.

(K) Ibid.

re moveantur & mammae. Ne quidem unguentis usus fuit *Nannoni* (1); sed, folis linteis carptis mollissimis adhibitis, mammam fovebat perpetuo aqua calida, de nocte molle Cataplasma ex mica panis, lacte, &c., paratum applicabat. *Leuret* (m) Emplastro, Nurimbergensi dicto, totam tegebat mammam, & fovebat aqua cum sale alcalino, uti dictum fuit. Simul optime monet, dum dolor rupto abscessu cessat, vel insigniter minutus est, ut cum prudentia brachium moveatur: agentibus enim musculis mammae suppositis, pus exprimitur, sicque impeditur, ne sinus, aut fistulae fiant. Hoc enim quandoque contingere, jam dudum scriptum est. Sic *Erotis* (n), postquam consultuerat, ubi ex lacte mamillae dolent, fovendas esse aqua calida, dein tegendas *Argilla in aceto distemperata*, addit; si Apostema fiat, *Quod si locus ille fuerit fistulatus, cum cura hac poterimus subvenire. R. radicem mundatam Hel-lebori nigri, & intinctam oleo, vel melli impone, & pulverem de Lappa combusta super insperge. Id enim curam*

Quandoque contingit, ut, licet omni cum cura tractatus fuerit mammae abscessus, consolidato jam ulcere, quid duri remaneat, quod si relinquere-tur, scirrhi metum faceret: hoc imprimis contingit, si in glandulari mam-mae parte natus fuerit abscessus. Vapor aquae tepidae, mollis frictio, fo-menta solventia ante laudata continuo applicanda sunt, donec totum resolvat-ur. Nec ulla interponi debet in horum usu mora; quo enim diutius illud durum relictum manserit, eo difficilius remediis cedit. Post suppuratam mammam relictæ durities, cum nec fomentis cederet, nec emplastris, *Nan-noni* (o) adhibuit unguentum mercuriale loco mammae indurato, & viginti trium dierum spatio totum fuit resolutum. Candide tamen fatetur, tentatam fuisse inunctionem mercurialem ad curandum talem durum tumorem, qui jam per biennium in mamma haeserat: quamvis enim magna copia Argenti vivi adhibita fuerit, ita ut salivatio sequeretur, non successit cura: mole quidem minutus erat tumor, sed durities residui aucta fecit, ut praeter extirpationem nulla spes curae maneret. *Cicutam* vidi externo simul, & interno usu felicissime dissolvisse duros tales tumores.

An pus, in mamma collectum, nec foras emissum, interiora thoracis gravare potest? Mirus legitur casus apud *Ballonium* (p): *Mulier dolor obortus est in mamma sinistra ab aliqua suppressione lactis, ut conjicere est. Tu-mor erat; disparuit. Saltem nil foris eminebat. Non desit dolere illa pars, quamvis nil foret conspicuum. Macrescebat in dies. Nil proficiebat. Langue-bat. Palpitatio cordis insignis: unde ea oriretur, dubitabant. Dum in va-rias opiniones circa latens hoc malum abirent Medici, Duretus accersitus omnia rimatur. Tandem collectum est, parte interiore abscessum latere, qui, nisi aperiretur, mortem repentinam esset accersiturus. Contra multorum opinionem ea par-*

(1) Delle Malattie delle Mammelle pag. 29. 36.

(m) In loco citato pag. 159.

(n) Spach. gynæc. Erot. de passion. Mulier. Cap. 20. pag. 51.

(o) Delle Malattie delle Mammelle pag. 61.
Lib. II. Tom I. pag. 151.

(p) Epidem. & Ephemer.

parte septicum admoveatur. Aëris aliqua ex parte cuniculis, pus manavit multum. Miraculo convaluit.

§. 1338. **L** Actantis papillae dolor, fissura, inflammatio tollitur balsamicis blandissimis, spirituosus cephalicis applicatis.

Papillae, ex media convexitate mammarum eminentes, multum variant crassitudine, & longitudine in diversis mulieribus. Saepius contingit, ut a loricis, quas pessimo more gestare coguntur puellae, sic deprimantur papillae, ut vix emineant; imo aliquoties vidi, subsedisse penitus, ita ut loco eminentis papillae appareret foveola in mamma, in qua delitesceret. Impossibilis tunc est lactatio, nisi educi possit papilla; quod saepe feliciter obtinetur, si graviditatis tempore saepius applicetur parva cucurbitula, ex qua antliae pneumaticae ope educitur aër; tunc enim depressa papilla exiurgit, & dum saepius hoc tentatur, incipit eminere magis magisque.

Papillae constant substantia spongiosa, & elastica (q), ex pluribus fasciculis ligamentosis composita, quorum extrema constituunt basin, & apicem papillarum. Hi fasciculi per totam longitudinem leves plicas habent, quae dum, protrahendo papillam, elongantur, evanescunt; redeunt statim, simul ac papillarum elongatio cessat. Inter hos fasciculos elasticos locantur septem, vel octo tubuli lactei, qui circa apicem papillae parvis osculis hiant; cumque illi tubuli arctissime haereant fasciculis illis ligamentosis, una cum illis plicantur, & elongantur. Tenuis productio cutis tegit papillas; cui dein superincumbit Epidermis.

Dum sugit infans, papillam inter labia, saepe & inter gingivas premit, & protrahendo elongat, sicque complicatos tubulos lacteos in rectum deducit, & facilem lacti ex mammis parat exitum.

Quandoque fit, ut morosi infantes, frequentius sugendo, valide premendo inter gingivas, irritent sic papillas, ut doleant, & inflammantur: huc etiam concurrat acrior infantis saliva, dum recens nati infantes aphthis laborant: circa dentitionis tempus, dum pruriunt gingivae, pessime saepe mulctant miseram matrem, premendo papillas; imo saepe lacerant integumenta; unde fissurae sanguinolentae, & dolentissimae, quae sine acerbo cruciatu incumbens indusii attactum ferre nequeunt.

Molestissima lactantibus haec mala sunt, & quae saepe lactationem reddunt omnino impossibilem, cum infantis damno, & periculo, ne lac in mammis retentum coaguletur, & omnia illa mala sequantur, de quibus statim dictum fuit.

Solet quidem laudari usus spirituosorum, ut v. g. Spiritus rorismarini, si linteam hoc madidum papillae applicetur (vide *Materiam Medicam* ad hunc numerum); verum facile patet, si fissa, excoriata, aut valde inflammata fue-

(q) VVinslovv. Exposit. Anatom. pag. 586. 587.

fuerit papilla, dolorem immaniter augendum esse. Unde haec tantum usum habent, dum papilla integra adhuc est, nec inflammata, ut nempe, spirituosus applicatis, firmior reddatur papilla, ejusque integumenta fiant magis callosa, ut suctionem, & pressionem facilius ferant. Verum cum jam fissa papilla est, & acriter dolet, mollissima quaevis conveniunt, qualia in *Materia Medica* ad hunc numerum recensentur.

Sequenti methodo usus fui ad haec mala curanda, & felici quidem cum successu: si papilla inflammata, vel & fissa doleret, linteis carptis, *succo sempervivi majoris* madidis, fovendam curavi, saepe eadem renovando, ne ficescant, & haereant; operculum ex plumbo, vel cera paravi, superius patulum, quod dolentem papillam recipere posset, & impedire, ne indusium, aut vestes ullo modo papillam premere possent. Fissuras papillarum inungi curavi oleo cerae, repetitis destillationibus limpido, & mollissimo reddito. *Nam remedium est incomparabile prorsus ad mala papillarum nervosarum, quae in cute extrema occurrunt. Nam in curandis fissuris labiorum hybernis, in fissuris papillarum in lactantibus, in digitorum, manuumque rhagadibus vix aliud habet simile, si subinde levi illitu applicetur (r).* Repetitis autem destillationibus oleum cerae, quod prima vice butyri instar crassum prodibat, & graveolens, tenue redditur & fragrans.

Dum haec fiunt, necesse est, ut ex altera mamma sola lac fugat infans: si prior mamma lacte turgeat nimis, prudenti suctione a muliere, ad hanc rem conducta, depleri poterit, quae loca dolentia vitabit facile, si labia applicet areolae papillae. Solet etiam, vitro imposito, quod longo rostro instructum est, per suctionem satis commode depleri turgens lacte mamma.

Hoc modo solent brevi fatis tempore curari haec mala. Consolidatis autem fissuris, & sedata penitus inflammatione, tunc spirituosus applicatis potest roborari papilla; a dilutis forte incipere proderit, ne nova irritatio fiat, & caveatur subita, ac nimia corrugatio tubulorum lacteorum, quorum extrema in summitate papillae aperiuntur. *Mastiche*, si digeratur in copia aequali aquae, & spiritus vini, tale remedium dat.

§. 1339. **L**ac abundans nimis, & tenue temperatur victu blando, siccoque, & motu: lac deficiens curatur victu humido, blando, nutriente; foru, frictioneque mammae; sublatione Causae indagatae.

Lac abundans &c. Omnes, uti notum est, proprio lacte nutrimur. In lactantibus ergo pars nutrimenti in mammas derivatur, ut nutriatur infans, & illud totum de nutricis nutrimento decedit. Unde nutrices, si sanae, & robustae fuerint, majorem ciborum, & potuum copiam assument semper, sicque sine detrimento sanitatis robusto infanti ubera praebere possunt, imo & pluribus, uti notum est.

Con-

(r) Her. Boerh. Chem. Tom. 2. pag. 157.

Contingit autem aliquando, ut tanta lactis copia derivetur in mammas, quod plerumque simul tunc tenuius esse solet, ut nutricis corpus defraudetur alimento, dum omnis recens chylus statim a sanguine separatur; unde omnes humores acriores redduntur, & subputridi; sitis oritur; febricula; & corpus vero marasmo contabesceret, nisi emendari posset nimia illa lactis secretio. Quandoque satis difficulter hoc obtineri potest. Victus siccior, sed blandus tamen, ex carne assa, pulticulis ex hordeo, avena, oryza, paratis, sed spissioribus, motus corporis, multum profunt. Potus debet esse parcior, & meracior. Cerevisia mollis, sed meraca, Cereris quasi extractum liquidum, insigniter prodest illis, quae huic potui assueverunt: continent tales cerevisiae magnam copiam materiae nutritivae, cumque spissiore consistentiam habeant, non fermentantur; hinc blanda, & molles manent, licet diu fermentur. Si his tentatis non minuatur nimia lactis secretio, ablactandus est infans; caeteroquin nutrix brevi deficeret. Vidi, per plures septimanas, licet ab uberibus jam remotus fuisset infans, perstitisse perpetuum, & molestum lactis de mammis stillicidium, aucta quotidie corporis macie. Cum varia incassum tentassem, tandem cessit malum, dato omni triherio infuso forti *salviae* ad unciam unam alteramve.

Lac deficiens &c. Ibi omnia adhibentur contraria, victus nempe humidus, quies, potus dilutus nutriens, ut hordei, vel avenae, decoctum cum tertia parte Lactis recentis admisti, juscula copiosa, ova recentia, & similia; ex quibus copia boni chyli facile conficitur actione viscerum chylopoieticorum. Per haec efficitur satis facile, si mulier caeteroquin sana sit, ut copia lactis cum sanguine fluat: tunc autem debet promoveri lactis secretio in mammis, quod obtinetur fotu, & leni frictione, praecipue frequentiori frictione, vel infantis, vel, si ille vacua nolit ducere ubera, alterius mulieris. Non enim facile desperandum in hoc casu, cum historia Medica doceat, non tantum virginibus, sed & viris, lac in mammas derivatum fuisse, dum moros infantes vana, ut putabant, lactationis specie placare conabantur. Si aliae evacuationes per alvum, sudores, &c., copiosae, in causa fuerint, hae sunt sistendae.

Possunt tamen esse tales causae defectus lactis, quae vel omnino non, vel difficulter admodum emendari poterunt. Notavit *Hippocrates* (s) sequentia: *Ut plurimum vero quae pauca menstrua demittant, eas sine lacte esse contingit. Sicciores enim sunt, & densiore corporis habitu.* Et alio in loco (t), de illis agens incommodis, quae obtinent in civitatibus septentrioni expositis, notat, multas mulieres steriles fieri propter aquas, quae sunt durae, crudeae, & frigidae; purgationes enim mensium non contingunt idoneae, sed paucae, & pravae. Deinde addit: *Quum vero pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac enim aquarum duritie, & cruditate extinguatur.*

Si

(s) De Natura Pueri Cap. X. Charter. Tom. V. pag. 323.
& aquis. Cap. II. Charter. Tom. VI. pag. 192.

(t) De Aëre, locis,

Si jam in mammarum fabrica vitium sit, si totum corpus densum, torosum fuerit (viragines solent vocari tales mulieres), saepe mammarum in talibus vestigium tantum apparet, & adeo contracta sunt omnia vasa, ut lacti appulso cedere nequeant; tunc certo lac deficiet. De similibus Hippocrates (u) dixit: *Sunt autem, quae natura lac non habent, & quibus lac ante tempus deficit. Eae vero natura solidae sunt, & densae carnis; ideoque, cum via densa sit, non a ventre ad mammas satis humoris defertur.* Vidi in aliis quandoque mammas maximae molis, sed mera pinguedine obrutas, ita ut omnes ductus lactei compressi ab adipe incumbente ne guttulam quidem lactis admittere potuerint.

Facile patet, has causas vix esse emendabiles ulla arte.

(u) De Mulier. Morb. Lib. I. Cap. 72. Charter. Tom. VII. pag. 71.





MORBI INFANTUM.

§. 1340. **I**nfanti recens nato oriuntur morbi proprii 1. a strigmentis glutinosis, caseosis, lentis, quibus os, oesophagus, stomachus, intestina, ei replentur.

Pertractatis illis, quae in virginibus, gravidis, partu, puerperio, observata fuerunt, superest, ut agatur de morbis, qui in recens nato infante observantur. Quamvis enim, simulac vivere incipit, plurimis obnoxius sit (variolas v. g. in utero materno foetum passum fuisse sequenti Capitulo patebit), tamen hic agendum erit de illis morbis, quorum causae adsunt, dum homo nascitur, & quae reliquo vitae tempore, vel omnino non, vel saltem minus frequenter, observantur.

Magna enim mutatio contingit in recens nato: paullo ante in utero materno clausus, humore ambiente a compressione defensus, ab omni aëris tactu liber, nec luminis, nec soni, actione afficitur. Dum nascitur, vi exprimitur, novas ab aëre insolito, ab tactu obstetricis, quandoque rudiori, molestias patitur. Sed quanta & internis partibus mutatio fit eodem tempore. Pulmo, qui ante parum tantum sanguinis recipiebat, jam omnem totius corporis sanguinem transmittit, & tradit cordi sinistro: viscus hoc, antea collapsum, expanditur aëre inspirato. Diaphragma, dum agit, pectoris cavum auget, hepar deprimit: in ipso hepate mutatur humorum motus. Non mirum ergo est, vagitum, & ploratum in ipso vitae principio adesse, licet sanissimus caeteroquin fuerit infans. Subita illa, & adeo insolita, mutatio fletui causam dat. Quod scite *Plinius* expressit (v): *Itaque feliciter natus jacet, manibus, pedibusque devinctus, flens animal, caeteris imperaturum, & a suppliciis vitam auspicatur, unam tantum ob culpam, quia natum est.*

Simulac infans in lucem prodierit, per chordam umbilicalem adhuc nectitur placentae; qui nexus solvi debet: haec enim vita communi cum matre usus fuit: postquam autem chorda umbilicalis secta fuerit, nil cum matre amplius commune habet, sed propriam vivit vitam. Unde prudenter monuit *Levret* (x), non esse ligandam, nec rescindendam chordam umbilicalem, nisi prius respiraverit infans: quandoque enim pallidi, debiles nascuntur, praecipue si diu in pelvis exitu haeserint, nec vagitum edunt: concutiendo leviter infantem, fricando, irritando fauces, nares, plumulae motu,

sa-

(v) Hist. Lib. VII. in Prooemio.

(x) L'art des accouch. pag. 210.

falem linguae imponendo, aliisque stimulis, excitant sopitum motum, & dum haec tentantur, liberum commercium foetus cum matre per chordam umbilicalem fervant.

Si vero recens natus infans faciem tumidam lividam habeat, nec respiret, vel parum tantum, chorda subito refecanda est, etiam absque ligatura, ut, effluente aliqua sanguinis copia, liberetur sanguine gravatus pulmo, nec adhuc dilatatus per liberam inspirationem. Suffocationis enim periculum imminet. Simul ac autem vagire inceperit infans, libere jam respirans (γ), chorda liganda est.

Chorda autem umbilicalis ligatur ad quatuor, quinque, vel sex, digitorum distantiam ab umbilico, ut nempe locus novae ligaturae superfit, si forte prior delaberetur, subsidente chorda umbilicali; vel, fortius adstricta, fecasset vasa umbilicalia; unde haemorrhagiae periculum nasceretur.

Haec ergo sola cautela requiritur, ne propinquo ad umbilicum loca chorda refecetur: Vidi, in quibusdam familiis moris fuisse, ut ad distantiam decem, vel duodecim digitorum chordam ligarent, nec refecarent illam chordae partem, quae ultra ligaturam erat, sed intra linteum convolutam applicarent corpori infantis, donec tota caderet. Mole majori hoc molestiam parit aliquam, caeterum nihil mali.

Separatio autem chordae umbilicalis, ad quamcumque ligetur distantiam, semper fit prope umbilicum. Cutis enim abdominis infantis ad aliquot linearum distantiam tegit chordam, & in illo loco, ubi cutis desinit, separatio fit, quod quarto, quinto, sextove die contingere plerumque solet.

Tota cutis infantis recens nati lubrico glutine tegitur, majori, minorive copia in variis; unde tepido in balneo mollihus spongiis abstergitur cutis, ut nitida fiat: tota cutis rubescit tunc, acsi leviter Erysipelatosa foret (z), & post aliquot dies solet Epidermis desquamari. Haec cutis rubedo aequae manifesta est in Aethiope, ac in Europaeo; & vulgo creditur, eo nitidior, ac pulcriorem cutim futuram postea, quo magis rubicunda fuerit in recens nato infante (a).

Cutis nitiditas merito commendatur, non tantum in recens natis, verum etiam postea: multis enim morbis cutaneis obnoxii sunt infantes, nisi cutis quotidie molliter detergeatur: *Galenus* (b) volebat, recens nati totum corpus modico sale aspergi debere, sic omne glutinosum abstergeretur adhuc efficacius: iussit autem hoc fieri illo scopo, ut cutis densior, & solidior redderetur: verum vix convenire videtur, ut cutis leviter quasi inflammata, & tota rubescens salis stimulo irritetur. Sufficiet mollis absterfio sordium aqua moderate calida, cui quidam modicam saponis miscent, quandoque & parcam vini quantitatem.

Dum infans in hoc balneo haeret, sollicitè lustrandum est, an quid vitii appareat. Solet saepe, imprimis post difficiliorem partum, tumor in hoc
vel

(γ) L'art des accouch. pag. 210.

pag. 61.

pag. 6.

(z) Brouset Educat. Med. Tom. I. cap. 3.

(a) Vander Monde Essai de perfect. l'espèce humaine Tom. 2.

(b) De Sanit. tuend. Lib. I. Cap. 7. Charter. Tom. VI. pag. 50.

vel illo capitis loco apparere, qui discutientibus, de quibus in cura contusionis dictum est, feliciter sanari solet. Observavit tamen *Levret* (c), raro diu supervivere infantes, si tales tumores in occipite sint, sed convulsos mori: in aliis capiti locis similes tumores illud periculum non habent. Idem metuendum est, si in recens natos futurae nimis a se mutuo distent: hoc enim solet fieri, vel quia ante terminum ex utero prodierunt, vel quia collecta praeternaturaliter in cavo calvariae lymphæ hydrocephalum producere incipit.

Contingit etiam in partu difficili, ut aliquod infantis membrum luxetur, vel frangatur. Ingenue fatetur *Pen* (d), talia sibi contigisse infortunia: reducendae statim sunt partes in situm naturalem, & cura solet feliciter succedere in tenellis his corporibus, absque ulla deformitate relicta: idem & *Levret* (e) testatur.

Simul in recens natis explorandum est, an alvi, & urinae viae liberae sint. Si urinam, & alvum deposuerit post nativitatem, omnis metus abest: sin minus, dum infans in balneo lavatur, lustrandae sunt partes hae.

Quandoque in recens natis anus inventus fuit bene conformatus, sed membrana praeternaturali omnino clausus: nullus ergo patebat exitus meconio, quod nisi expellatur de corpore, pessima mala sequentur, & tandem mors, uti ad §. 1345. patebit. Si circa ani principium talis haereat membrana, satis feliciter cura succedere solet, discindendo hoc obstaculum: hoc feliciter tentavit in binis infantibus *La Motte* (f). Postquam alvus bene evacuata fuerat, lavit anum spiritu vini, & texit linteis carptis ficcis; sicque paucorum dierum spatio curam absolvit. Nullis autem turundis usus fuit, quia illae mole sua, suppositoriorum instar, irritabant perpetuo ad alvi excretionem.

In hoc casu protuberans tumor plerumque apparet in ani loco, in cujus medio ater Meconii color translucet: si prematur ille locus, mollis pastae instar retrocedit; sed, remoto digito, mox iterum redit tumor (g); quem non tantum dissecandum vult *Levret*, sed in omni ambitu circulariter excindendum jubet. Interim *La Motte* simplici sectione curavit; & novi, aliis idem feliciter cessisse.

Difficilior longe casus est, si membrana talis claudens in altiori loco intestini recti haeserit. Talis casus legitur (h): Anus bene conformatus apparebat in infante; sed integro a nativitate biduo alvum nondum deposuerat; unde omnia mala, quae retentum meconium sequi solent, aderant. Clysmatum injectio tentata fuit incassum; non poterant penetrare in cavum intestini recti: examine instituto, inventa fuit membrana tenuis, claudens intestini cavum, & immisso in anum digito minimo, secundum ejus ductum introducebatur *Pharyngotomus* ad membranam cludentem usque;

Tom. IV. pars II.

r

quae

(c) L'art des Accouch. pag. 212.

(d) Pratique des Accouch. liv. 2. chap. I. pag. 314.

(e) L'art. des Accouch. pag. 214.

(f) Traité des Accouch. liv. 1. observat. 86. pag. 129.

(g) Levret l'art d'Accouch. pag. 216.

(h) Acad. de chirurg. Tom. I. pag. 385.

quae tunc , protrusa lanceola , quae in cavo phlebotomi occultatur , discindebatur tuto , & apertura facta digiti apice dilatabatur . Mox alvum deposuit infans , & postea anus solito fungebatur officio per binos menses , quibus supervixit ; dein aliam ob causam periit . Nulla saltem cum verisimilitudine poterat hujus infantis mors huic operationi tribui , cum tamdiu supervixerit .

Ubi vero nullum ani vestigium apparet omnino , parum spei superesse videtur . Certo moriendum est infanti , nisi meconium exeat ; hinc ex artis regulis certae perniciiei anceps etiam remedium praeferendum est , si parentes illud admittere velint . Unde celebres Chirurgi , scisso loco , ubi anus naturaliter inveniri solet , tentaverunt viam parare ad intestinum rectum , hac spe , ut viam faecibus retentis facerent , & deinde artificiosum anum pararent . *Petitus* (i) indicavit methodum , & cautelas , ut talis operatio ex arte institui posset . Reliquis instrumentis praetulit acum triquetram (*Trocart*) , sed crassiolem , & breviorlem , per cujus thecam , educta acu , lanceola , vel cultellus transmitti potest tuto ; verbo dicam , nihil neglexit , quod artis erat . Sed incerta sunt omnia ; nescimus , quale obstaculum lateat : Anatome autem evicit , inveniri talia , quae nulla arte emendari possunt . Celeberrimus *Littre* (k) invenit in infante , sexto a nativitate die mortuo , intestinum rectum in duas partes divisum , quae tenuibus aliquot filis , pollicem circiter longis , cohaerebant adhuc : utrumque extremum intestini sic separati clausum erat . Facile patet , tale malum cognosci non posse , nisi post mortem ; & licet cognitum foret , vix ullam emendationis spem superesse . Mentio quidem fit alicujus methodi : verum quis auderet , abdomen vivi infantis aperire , extrema intestini quaerere , inventa aperire , aperta sibi mutuo unire , vel saltem extremum superius intestini , apertum prius , vulneri abdominis unire sic , ut anus artificialis in loco vulneris per totam vitam maneret ? Quantum novi , talis curatio a nemine unquam tentata fuit .

Quandoque totum intestinum rectum deest . Dexterrimus Chirurgus (l) recens nato puello ne minimum quidem invenit ani vestigium ; profundam satis incisionem fecit ; immisso per vulnus digito , intestinum rectum non invenit . Acum triquetram adegit profundius per vulnus , ut viam meconio pararet ; sed praeter aliquot sanguinis guttas nihil prodiit . Post mortem invenit , integre deficere intestinum rectum , & colon meconio plenum , libere in abdomine fluctuans , desinere in extremum perfecte clausum .

Hinc videtur non sine ratione statuisse *Leuret* (m) , talia vitia curari non posse , nisi integer sit intestini recti tractus ad integumenta usque . Quandoque extremum intestini recti devium unitur vesicae in maribus ; tunc faeces alvinae delabuntur in vesicae cavum , & per urethram exire nequeunt , nisi liquidae sint ; unde patet , miseros tales infantes non diu superstites esse posse :

(i) Acad. de Chirurg. Tom. I. pag. 377.

(k) Academ. des scienc. 1710. hist. pag. 47.

(l) Medic. Essays and observ. Tom. IV. num. 32. pag. 442.

(m) L'art des Accouch, pag. 216.

posse (*): in sequiori sexu observatum fuit, in vulvam quandoque hiare intestini recti finem (n). Tales superesse possunt: & novi virginem, nubilem jam, caeterum fatis sanam, quae foedam hanc calamitatem patitur.

Novi quidem, exempla practica allegari, quae docerent, hanc operationem cum successu factam fuisse, dum nullum ani vestigium apparet; sed non videntur adeo certa esse. *Hildani* (o) casus adduci solet, ubi sic servasse creditur sex dierum infantem, qui nondum alvum deposuerat, & in praesenti mortis periculo versabatur. Feliciter curatus fuit; & postea *Hildanus* a Consule loci, quem inhabitavit curatus infans, accepit, illum sanum, & incolumem vixisse ad decimum octavum aetatis annum. Sed certe ipsa verba *Hildani* demonstrant, adfuisse ani vestigium. Sic enim habet: *Anus obductus erat membrana praedura, in qua nullum fere indicium, aut vestigium ani, praeterquam macula nonnihil livida* (a translucente nempe meconio). *Illic facta parva incisione (ne sphincter laederetur), novacula linteis juxta ariem involuta, deinde immisso speculo ani, & quod reliquum dilatato, statim ejecta est incrementorum colluvies.* Ex quibus manifeste patet, intestinum re-ctum integrum fuisse ad integumenta usque.

Alter casus legitur apud *Celebrem Chirurgum Saviard* (p) de infante, in quo nullum ani vestigium aderat: adegit lanceolam longiorem, qua majores abscessus aperire solebat, usque ad trium digitorum transversorum longitudinem; & tunc meconium exivit; aperturam factam dilatavit; vulnus solito modo deligavit. Hinc dubitari nequit, integerrimae fidei virum talem operationem tentasse. De successu autem altum tenet silentium. Neque casus illi, qui in *Academia chirurgica* habentur, felicem habuerunt eventum.

Similia impedimenta & in canali urethrae inventa fuerunt: quandoque enim orificium urethrae in glande non erat apertum; & tunc cura difficilis non erat: aliquando pars urethrae deficit omnino; & tunc radicaliter hoc malum curari non potest (q). Caeterum hoc vitium diutius toleratur ab infante, quam si in intestino recto foret. Urina enim sibi viam invenit, quandoque per umbilicum, aliquando, circa scrotum parvo abscessu facto, urina prorumpit; qualis casus legitur (r). Cum autem nulla adesset urinae incontinentia, nec ullum pateretur incommodum jam adultior infans, nihil tentare voluit prudens ille Chirurgus. Aliquos vidi, quibus urethrae orificium sub glande in penis parte inferiori hiabat.

Contingit quandoque, ut recens natus infans superflua quaedam membra habeat, quae nulli usui futura sunt, sed potius incommodum parient. Sic aliquoties vidi in manibus, & pedibus sex digitos: superflui tales digiti plerumque carnei tantum sunt, nullo osse fulti, vix mobiles, & manus deformes reddunt. *La Motte* (s) ligavit filo cerato in recens nato infante quatuor

r 2

tales

(*) *Academ. des scienc. in 4. 1755 hist. pag. 50.*

(n) *Ibidem.*

(o) *Oper. omn. Centur. 1. observat. 73. pag. 54.*

(p) *Observat. chirurg. num. 3. pag. 8.*

(q) *Levret l'art d'Accouch. pag. 218.*

(r) *La Motte Traité des Accouchem. liv. 1. observ. 85. pag. 129.*

(s) *Ibidem pag. 128.*

tales digitos, qui omnes intra tres, vel quatuor dies ceciderunt, & cicatrices, illis delapsis, sponte formabantur. Neque ullo signo apparuit, ligaturas has infanti ullam fecisse molestiam.

Quo autem tempore haec superfluum ablatio fieri debeat, non convenit inter omnes. Quidam post ablactationem, vel adhuc serius, hoc faciendum suadent; alii statim post nativitatem, quorum opinionem amplectitur *Levret* (t), modo infans sanus sit: testatur autem, quod nunquam poenituerit, hoc fecisse, & plures alios Chirurgos, ipso suadente idem tentasse cum felici successu.

Recens natus infans, uti dictum fuit, in tota corporis superficie, glutine mucoso, satis saepe spisso, madet. Gluten autem solet vocari corpus semifluidum, cujus una pars dum movetur, trahuntur & adhaerentes partes, dum tota glutinis moles locum non mutat. Sed & simile gluten in ore, stomacho, oesophago, intestinis reperitur, & recens natis infantibus non tantum ex naribus, verum etiam ex ore sponte exire solet, vel ab obstetrice, dum cutim depurat, educitur.

Foetus, quamdiu in utero materno haeret, liquore amnii undique alluitur, liquor hic, dum: ruptis partus tempore membranis, aquae effluunt, saepe satis viscosus apparet; tota cutis tali glutine tegitur; qui ergo videtur liquori amnii originem debere: cum autem multi in illa opinione sint, foetum non tantum per vasa umbilicalia a matre nutrimentum accipere, verum etiam per os nutriri, deglutito amnii humore, facile credebant, se intelligere, quare ab ore ad anum usque cava viscera simili glutine obducerentur, ac in cutis superficie invenitur.

Alii e contra crediderunt, liquorem amnii excrementitium esse potius, & ex ipso foetus corpore produci; foetum non deglutire in utero; os semper clausum habere; liquorem amnii non inveniri in ventriculo, & intestinis foetus. Addunt, foetus observatos esse, qui capite carebant, & tamen increverant. Plura alia argumenta pro, & contra hanc sententiam legi possunt (u). Nec videtur hic locus esse, ut omnia, & singula expendantur. Sufficit novisse, quod viscida talia in primae coctionis viis inveniantur, aequae ac in cutis externa superficie: simul notum est, tota vita fecerni lenta, mucosa in ore, oesophago, ventriculo, intestinis; adeoque & in foetu haec secreta, non excreta, accumulari posse. Forte statim post nativitatem major secretio fit, cum in foetu omnia organa secernentia turgida appareant: sic hepar invenitur magnum, & succi plenum; ita & totum turget glandulosum systema.

Verum in textu dicitur, non tantum viscida, sed & caseosa lenta in primis viis recens nati infantis reperiri. Praecedenti capitulo patuit, verum lac venire ad uterum, imprimis ultimo graviditatis tempore. *Hippocrates* (v) dixit: *At vero puer, compressis labris, ex matris utero fugit, ac tum alimentum, tum etiam spiritum &c.*: Quid si quis roget, quomodo hoc quis nescit, quod puer

(t) L'art d'Accouch. pag. 220.

(u) Medic. Essays and observat. Tom. I. pag. 171. & seq. Tom. II. pag. 121. & seq.

(v) De carnibus cap. 3. Charter. Tom. V. pag. 304.

puer in utero trahat, & sugat, hoc illi respondere licet. Pueri, quum nascuntur, stercus in intestinis habent, ac in lucem editi, tum homines, tum pecora, celerrime ventrem exonerant. Atqui stercus non haberent, nisi in utero sugerent, neque; ut primum puer natus foret, ubera sugere posset, nisi in utero suxisset.

Quidam voluerunt, cum in recens natis mammae in utroque sexu inveniantur saepe lacte turgidae, quod foetus in utero propria sugeret ubera, imprimis ultimo graviditatis tempore. Situs certe infantis, & facilis spinæ dorsī flexilitas non repugnant huic opinioni. Saepe vidi turgidas mammās in recens natis, imo & induratas, ita ut fomentis, ac emplastris opus fuerit ad resolvendum illud concretum. Quandoque & observatur, mammās attolli aliquot post nativitatem diebus. Quidam crediderunt, hoc contingere ob ligaturam Chordae umbilicalis: arteria umbilicali enim compressa, voluerunt sanguinem tunc retrogredi per epigastricas arterias, mammariis communicantes. Forte & hoc verum est. Mirabatur Medicus, infantem, biduo a nativitate, horrore, dein calore corripī, febricitare: simul dextra tumebat mamma, quam dum leviter premeret, exiverunt ex papilla aliquot lactis guttulae. Rem examinans Medicus invenit & infantem, & matrem circa idem fere tempus in febrem lactariam incidisse. Intellexit Medicus ex parentibus postea, quod, cum mamma dextra paullatim subdidisset penitus, similiter & sinistra intumuerit; ex qua pariter pauculae prodierunt lactis guttulae (x).

Caeterum illud argumentum *Hippocratis*, quod nempe recens natus infans sugere non posset, nisi in utero jam suctioni assuevisset, non adeo urgere videtur. Ipse enim, uti alia occasione ad §. 1. notavi, fatetur, quod *a nullo edocta natura, & citra disciplinam omnia, quae conveniunt, efficit.* Si vitulus inermi adhuc fronte ferit, hinnulus molli adhuc ungula calcitrāt, &c., non adeo mirum apparebit, recens natum infantem sugere posse, licet in utero nunquam suxisset.

§. 1341.

QUa sola de causa nauseae, vomitus, tormina, singultus, convulsiones saepe oriuntur; atque deinceps restant indigestiones assumtorum.

Dum iners tale gluten in ventriculo fluctuat, vel faucibus adhaeret, irritatione sola nauseam, & vomitum producit. In adultis toties ab hac causa molestissima nausea fit; imo sola agitatione plumulae in faucibus nausea, & vomitus producit, uti notum est. In teneris recens natis ergo facile eadem contingent, etiam a leviori causa, si circa oesophagi orificium similia strigmenta glutinosa haereant, sequetur singultus; in intestinis ab eadem causa producentur tormina; imprimis, si illud glutinosum, ob aëris liberum accessum corrumpi jam incipiens, acrius reddatur: saepius tamen a meconio, de quo postea dicetur, nimis diu retento, tormina fiunt.

Tom. IV. Pars II.

r 3

Unde

(x) Instit. Bonon. Tom. I. pag. 151. 152.

Unde patet ratio, quare *Hippocrates* (y) inter parvulorum, & recens natorum morbos vomitum recenseat. Cum autem §. 652. demonstratum fuerit, nauseam, & vomitum pro causa proxima habere convulsionem fibrarum muscularium faucium, oesophagi, stomachi, intestinorum, diaphragmatis, muscutorum abdominalium, facile patet, quare nausea, & vomitus, si validiora fuerint, vel diu durent, convulsionem excitent universales, cum totum genus nervosum adeo mobile sit in tenellis infantibus, & tot insolita recens natis contingant. Optime hoc monuit *Hippocrates*, (z), dum de recens natis agit; sic autem habet: *Quin & loco spirituum, & cognatorum humorum, cum quibus familiaritatem, & amicitiam in utero intercessisse necesse est, externis omnibus utitur, crudioribus, siccioribus, & minus in humanam naturam redactis* (ἡσων ἐξὸνδρωτισμείνοισιν). Notum enim est, ex ingestis per viscerum, & vasorum actionem, ac vires produci humores humanos. Quandiu enim in utero matris haeret foetus, nihil ad illum venit, nisi quod in materno corpore jam subactum fuit, & indolem humanorum humorum acquisivit, vel saltem, quam proxime tantum absit ab hac conditione. Simul ac natus est, abscissa chorda umbilicali, omne commercium cum maternis humoribus cessat, & per os recipere debet nutrimentum, propriisque subigere viribus. Unde mox subjungit *Hippocrates* (a); *Ex quibus multos suboriri dolores, multas etiam mortes. Quandoquidem & plerumque viris tum locorum, tum victuum mutationes morbos pariunt.*

Facile patet, absterisionem, & educationem hujus glutinosi requiri: si enim maneret, indigestiones assumptorum sequerentur necessario. Notum enim est ex Physiologicis, per totum tractum intestinorum, & ventriculi arterias eructare in omni puncto tenuem humorem, qui contenta in ventriculo, & intestinis humectat, solvit, apta reddit, ut in chylum mutantur, a vasis lacteis resorbendum. Si jam latera horum viscerum tenaci tali crusta glutinosa vernicis instar maneat obducta, nec exhalare poterunt arteriae, nec resorbere venae; adeoque ingestis, vix mutatis, & indolem suam frequentibus, replebitur cavum intestinorum, & abdomen tumebit brevi, dum reliquum corpus emaciabitur defectu nutrimenti.

Notum pariter est, succum pancreaticum, & utramque bilem in duodenum intestinum depluere: si illud emissarium, tenaci glutine obductum, transitum neget, vel difficulter admodum transmittat, turbabuntur horum viscerum actiones, & bilis in sanguinem retrogressa icterum faciet. Hepar enim in junioribus magnae molis est, & bilis magna copia in recens natis invenitur, secreta jam, & collecta ultimis mensibus, dum foetus in utero materno haeret, nec excreta tamen, cum diaphragma quiescens, antequam respiraverit infans, annexum hepar non moveat.

Hæc est ratio, quare toties in recens natis icterus observetur; sed fere semper cito curabilis: absteriso enim glutine, bilis emissarium impediante,
 mox

(y) Aphor. 24. Sect. 3. Charter. Tom. IX. pag. 119.

(z) De Octimestri Partu Cap. 2. Charter. Tom. V. pag. 352.

(a) Ibidem,

mox cedit morbus, & ipsa bilis, dum in intestina depluit, efficacissime solvit omne glutinosum, lenta attenuat, & naturali suo stimulo alvum movet. De qua re videantur illa, quae ad §. 75. habentur, ubi de curatione morborum ex glutinoso spontaneo oriundorum agebatur.

§. 1342. **C**uratur facile jejuno horarum x., vel xii.; assumptione pauci vini cum melle misti, iterata dosi hoc tempore abstinentiae dati; vel lenissimo quodam simul adjecto stimulo purgante.

Omnia tamen illa incommoda, quae glutinosis, accumulatis in primis viis, originem debent, non adeo difficulter superantur. Jejunium enim decem, vel duodecim horarum saepe solum sufficit. Respirationis motu omnia viscera abdominalia agitantur, concutiuntur. Bilis, quae satis copiosa adest in recens natis, in intestina depluens, nisi emissarium ejus obstructum fuerit, solvit illud gluten, & abstergit ventriculi, ac intestinorum cavum: motus peristalticus, per naturalem stimulum bilis auctus, fricando abstergit illud glutinosum, dum ipsa bilis admista tenacitatem minuit. Uti enim alia occasione jam aliquoties monitum fuit, in homine vivo intestina magnum cavum non habent, sed crassa satis latera opposita se mutuo tangunt; unde per ipsum motum peristalticum mucus, naturaliter cavam superficiem inungens, continuo secretus, abstergitur, ne accumulatus gravet. Hinc per solam abstinentiam aliquot horarum ventriculus, & intestina depurantur sic, ut apta sint excipiendis commode, retinendis, & digerendis alimentis, quae recens natis ingeruntur.

Haec autem glutinosis abstersio, & expulsio pulcre promoveretur, & tuto, si pauculum mellis in vino, vel hydromele diluti saepius detur, parca copia tamen, ad drachmam nempe unam, alteramve, abstinentiae hoc tempore: utiliter & lenis stimulus purgans his additur, qualem dat *syrupus cicchorei cum rheo*; cui etiam aliquid *saponis veneti* miscetur, qui potens, & blandum simul remedium dat ad glutinosa attenuanda: imprimis autem saponis usus laudatur, si color ictericus in cute appareat, vel urina tingat lintea colore flavo: tunc enim certi sumus, liberum bilis in duodenum exitum esse impeditum a glutine, quod ergo quantocyus abstergendum est: talium remediorum formulae in *Materia Medica* ad hunc numerum habentur.

Mel leviter coctum recens natis commendat *Moschion* (b), vel & mulsam tepidam ori instillari, jubet, ut *stomachus, & venter purgetur*: sic ad lac sumendum disponitur.

Quale autem nutrimentum, post abstersionem primarum viarum, conducat recens natis, non ita convenit inter Medicos. *Aëtius* (c) pariter mel despumatum laudat, & aquam mulsam tepide instillandam; deinde jubet, ut mater, emulcto prius, quod crassum est, e mamillis, & acubito ex calida aqua

(b) Spach. gynaec. pag. 7. N. 71. 72.

(c) Lib. IV. Cap. 3. pag. 67. versa.

fomento, lac praebeat infanti; sed mox addit; *praestat tamen usque ad quartam diem a matris lacte abstinere*. *Paraeus* (d) voluit, absolutam expectari debere lochiorum expurgationem, antequam mater ubera praebeat. Imo *Moschion* (e) omnino damnavit lac maternum, & alienum praetulit; quoniam credidit, ex laboribus in partu toleratis, & puerperii purgatione lac pravum esse, spissum, & difficilis coctionis.

Forte prima fronte speciosa videri possent haec ratiocinia; sed simul ac Medici Naturam ducem spernunt, errant fere semper.

Post aliquot horarum abstinentiam recens natus infans nutrimento indiget; hinc, si lac negetur, aliud alimenti genus subministrari debebit. Pulticulas ex lacte, vel jusculis paratas exhibent. Verum aliena haec sunt, omnino diversa ab alimento, quo infans usus fuit, dum in utero materno haerebat. Matris humoribus vixit ante paucas horas: praesto sunt in mammis similes in materno corpore parati in usum recens nati, qui hos desiderat, qui fugere novit, a nemine doctus.

Prudens Medicus post partum conciliat blandum somnum puerperae; quo ubi resecta fuerit, nil metuendum est a praegressis partus doloribus. Neque metuendum a lochiis, ac si maligni quid haberent; de qua re in praecedenti capitulo abunde dictum fuit. Primum illud lac non est spissum, sed dilutum, & tenue, diversumque ab illo, quod tempore febris lactariae in mammis colligetur. Purgat leniter, & abstergit primas vias primum illud lac. Hinc *Celeberrimus Monro* (f) mirabatur Creatoris sapientiam, qui recens natis concessit lac tenue, dilutum, leviter purgans, & deterfis bene primis viis post tres, quatuorve dies aliud dedit spissius, & magis nutriens.

Unde curavi semper, ut proprii infantes lac maternum sumerent, postquam illa blando somno resecta fuisset: idem aliis semper suasi, nec unquam poenituit consilii dati. In vaccis similem lactis diversitatem statim post partum observamus.

Unde simul patet, recens natos, quibus ubera matris negantur, magis adhuc indigere leni stimulo purgante, ut bene depurentur primae viae; nisi forte recens enixam puerperam pro nutrice obtinuerint; quod oppido raro contingit. Hinc, dum eligebam nutrices pro recens natis principibus, semper praetuli talem, quae lac tenue, & dilutum maxime habebat, licet vulgo damnari soleat tale lac: observavi simul, tale lac sensim postea majorem consistentiam acquisivisse. Nec aliquid damni metuo a tenuiori lacte: si tamen robustus infans postea crederetur spissiori lacte opus habere, alia nutrix substitui posset.

(d) Spach. gynaec. pag. 413.

(e) Ibid. pag. 7. num. 73.

(f) Medic. Essays and. observat. Tom. II. artic. XI. §. 13. pag. 242.

§. 1343. **Q**uin ad proluendam hanc pituitae mucosae saburram saepe profunt egregie Epithemata moderate aromatica, & spirituosa.

Solent quandoque abdomen tegere Epithematibus aromaticis, sed lenioribus, ne rubescens cutis, & leviter quasi Erysipelatosa irritetur nimis. Usus imprimis habent, si debiles sint recens natis & omnes motus appareant languidiores. Spes est, ut per hos stimulos excitentur vires ventriculi, & intestinorum, sicque facilius saburra illa glutinosa expellatur. Formulae talium Epithematum in *Materia Medica* ad hunc numerum habentur; ad quarum normam plures aliae similes componi facile poterunt. Quidam ad eundem scopum adhibent Emplastra leniter aromatica, *Ceratum v. g. stomachicum Galeni*, & huic similia. Major tamen efficacia ab his, quae praecedenti paragrapho laudata fuerunt, expectatur.

§. 1344. **M**ultum patiuntur vulgo a meconio non satis cito expulso, ob debilitatem foetus, duritiem materiae, copiam ejus nimiam, siccitatem viae.

Invenitur in foetu maturo, nativitati proximo, materia faeculenta, nigra, vel & ex nigro viridescens, tenax, viscosa, totum plerumque tractum crassorum intestinorum ad recti finem usque replens. Splendet haec faex, & cum colore, ac tenacitate papaveris succo inspissato (opium vocant officinae) similis sit, hinc a veteribus Medicis Graecis *Μηκόνιον* dictum fuit, papaverculum Latine reddi solet. Haec faex, accumulata in foetus intestinis, irritat fibras, molestiam, & tenesmum creat; unde partus tempore irrequietus infans matris dolores excitat, vel jam praesentes auget; simul ac respiraverit infans natus per aliquod tempus, nigra haec faex per anum exire solet, non quidem simul, & semel omnis, sed satis larga copia plerumque.

Cum enim foetus salivam propriam deglutiat, & in ore, oesophago, ventriculo secretum mucum in intestinis, similiter muco obductis, colligat, bilem, ac humores alios affluentes recipiat, omniaque haec aliquas semper faeces ponant, ab his collectis talis materia in intestinis crassis accumulatur. Si foetus simul liquorem amnio contentum ore hauriat, quod multis satis probabile videtur (g); tunc ex hoc faeculenta relictā meconii quantitatem augere poterunt. Copia meconii talis esse solet, ut crassa intestina sufficiant ad illud continendum: rarius enim meconium occurrit in tenuibus intestinis. Nigra illa faex, per plures menses accumulata, exire debet de corpore, ut recens natus infans sanus maneat, & saepe pars ejus exire solet per anum, simul ac natus est. Si autem debilis langueat infans, tunc tardius haec evacuatio contingit: si meconium durius fuerit, difficulter nixibus infantis exprimi pote-

(g) Vide Instit. Medic. Boerh. §. 682, 683.

poterit : hoc autem rarius contingit ; sed molesta potius glutinositate adhaeret intestinorum lateribus ; tantam enim habet tenacitatem , ut difficulter a naribus , & femoribus ablui possit , & lintea inficiat maculis , quae difficulter eluuntur .

Si magna copia meconii in intestinis haeserit , longius tempus requiritur ad evacuationem ; nam , uti dixi , non expellitur simul & semel omne meconium .

Notum est , intestinorum cavum naturaliter lubricum , & humidum esse , sed imprimis intestina crassa mucos copioso inungi , ut duras faeces facilius transmittere possint . Observatur autem , intestina eo plures glandulas , plusque muci habere , quo fini propiora sunt (*b*) . Hinc ano circumfusa haeret tanta pinguedinis copia , ut faecibus , intestinum rectum distendentibus , cedere possint vicina , & omnia lubricentur . Si mucus ille , vel pinguedo deficiant , alvus pertinaciter tarda est . Verum raro observatur haec siccitas in recens natis , quibus totum corpus molle , humidum , & succo plenum est .

§. 1345. **H**inc ab ejus mora , aere jam appulso , acrimonia , acor , putredo , in vapores resolutio , adeoque dolores torminosi ; convulsiones , nauseae , vomitus , singultus , tusses , sternutationes , clamores , fletus , pervigilia , terrores , febres , macies , mors .

Meconium , excrementitium cum sit , & corpori inutile , distendens & gravans intestina , quibus retinetur , de corpore eliminandum esse , nemo dubitat . Ipsa Natura sponte hanc evacuationem tentat statim post nativitatem , si nihil obstat .

Quandiu enim infans in utero materno haeret , nullus aer ventriculi , aut intestinorum cava ingredi potest . Saepius antea dictum fuit , extravasatos humores , in cavis corporis collectos , per menses haerere immutatos , & , postquameducti libero aëri expositi fuerint , subito putrescere , pessimamque mephitim quaquaversum dispergere . *In capitulo de Hydrope* plura talia habentur , quae hoc evidenter docent . Idem a meconio metuendum est , nisi cito de corpore exeat . Observavi , aliquoties meconium , quod statim post nativitatem exit , non habere malignum odorem , sed , si per aliquot horas in linteis relictum fuerit , tunc acidum spirasse , quandoque & putridum , prout nempe in hanc , illamve indolem magis inclinaverit . Omne enim foeculentum , quod a bile utraque , succo gastrico , pancreatico , &c. , in intestinis foetus colligitur , cum animale productum sit , potius in putredinem vergit . Antea dictum fuit , admodum probabile esse , ultimis graviditatis mensibus lactis aliquid venire ad foetum jam adultiorem . Lac autem acciscit sponte ; sed tamen pars , lac constituens , caseus nempe , rancescit , si pinguis sit ; sin minus , in naturam animaleam vergit , & lentescit , cornuum instar , si igni propius admoveatur ; & , si comburatur , similem foetorem spargit , ac cornua , & ungulae animalium , dum uruntur .

Antea

(*b*) Vide Instit. Medic. Boerh. §. 111. 112.

Antea in *Capite de Ructu, & Flatu* §. 646., & §. 647. patuit, humores putrescentes, & fermentantes dare ructibus, & flatibus materiem. Si aër extricatus ex his humoribus distendat ventriculum, ac intestina, & per illa libere oberret, vel sursum per ructus, vel deorsum per flatus, exploditur. Si vero acre irritans simul adsit, per quod fibrae convulsione constrictae liberum flatulentae materiae transitum impediunt, tunc membranae claudentes tenduntur, distrahuntur; unde dolores, & anxietates intolerabiles; qui emissis flatibus mox cessant, & denuo redeunt, nisi causa horum malorum ablata fuerit. Si autem inflammatio, & febris accesserint his malis, etiam in adultis, & robustis hominibus, intolerabiles dolores fiunt, & saepe cito mors.

Patet ergo ratio, quare a retento meconio *dolores torminosi* fiant, & anxietates; quae mala testantur miselli irrequieta, & perpetua jactatione corporis, & clamoribus, & fletu; quamvis ante elapsum primum aetatis mensem vix unquam lacrymas emittant; hinc potius clamant, quam flent, miselli.

Si autem, uti ad §. 1341. dictum fuit, a solo glutine, primas vias mole sua irritante, tot mala oriri possint, quanto magis haec metuenda sunt, dum meconium piceae tenacitatis, nimis diu retentum, a libero aëris accessu acrimoniam acquirit, & loca, quibus haeret, irritat.

Recens natis, si omnia recte cedant, somnus fere perpetuus est; verum, si doleant, pervigilia adsunt: ubi explosis flatibus dolor cessat, mox obdormiunt; redeunte dolore, quasi territi subsiliunt; validae, & universales convulsiones sequuntur, saepe cito lethales. Si his supervixerint, nisi meconium expulsum fuerit, cito emaciantur; ita ut intra triduum viderim obesos, dum nascebantur, penitus macilentos. Nec mirum hoc: perpetuo, nec interrupto fruebantur nutrimento, dum in utero materno erant; nunc nausea, & vomitus ingestionem alimenti impediunt; & si quid subinde ingestum fuerit, non digeritur, sed corrumpitur; unde vitiosa in visceribus saburra augetur. Somnus, adeo reficiens infantes, vel nullus est, vel continuo per dolores interrumpitur, cum fere perpetuus esse debebat: dolor ipse vires consumit, unde mors sequitur brevi. Quotidianae observationes docent, plures infantes ab hac sola causa perire in ipso vitae limine.

Inter recens natorum morbos *Hippocrates* (i) recensuit *vomitiones, tusses, vigilias, pavores*. Caeterum irritationem intestini crassi tussim excitare, docet observatio satis mira *Celeberrimi Albini* (k) de milite, cui intestinum colon, vulneratum, sic sanatum fuerat, ut cicatricem per ambitum orae duxerit unam ventris plaga, & intestini: unde interior intestini superficies oculis patebat non tantum, sed & universa quandoque foras protrudebatur. Si aër frigidiusculus ad intestini internam superficiem perveniret, statim superveniebat tussis, quae non cessabat, nisi intestinum denuo recaluisse.

(i) Aphor. 24. sect. 3. Charter. Tom. IX. pag. 119.

(k) Academ. Annotar. lib. 2. cap. 8. pag. 34.

§. 1346. **C**orrigitur vis expellens sopita stimulo leni purgante, leni supposito, cardiaco suavissimo, & leni.

Cognoscitur, vim expellentem sopitam esse, si nullos nixus ad deponendam alvum faciat infans; vel admodum debiles tantum. Facile patet, tunc opus esse leni stimulo purgante: *Rheum*, & omnia, quae inde praeparari solent in officinis, solum sufficit: acriores enim purgantium stimulos, absque convulsionum periculo, tenellum recens nati infantis corpusculum non fert. *Syrupus cichorii cum rheo*, *Syr. ros. solut. simplex*, *Manna*, *Cassiae fistulae* pulpa sunt praecipua, quibus Medici utuntur in hoc casu. In *Materia Medica* ad hunc numerum plures tales formulae habentur.

Suppositoria ad eundem scopum adhibentur, quae vel mole sola, vel leni stimulo addito, leviter irritant finem intestini recti; unde tenesmus alvum deponendi sequitur; sicque evacuatur Meconium retentum. *Sebum candellarum*, in globulum, vel parvum conum formatum, mole sola agit: globuli saccharati, qui solent ex *semine foeniculi* saccharo obducto parari, praeter molem, lenem sacchari sensim deliquescentis stimulum habent; qui paullo efficacior est in suppositoriis, quae ex melle cocto, vel sapone veneto formantur; de quibus vide *Materiam Medicam* ad hunc numerum.

Quaecumque ex *Materia suppositoria* haec fuerint parata, oleo inunguntur, ut lubrica, absque vi ulla, per anum immitti possint. Relinquuntur, donec una cum faecibus alvinis exeant; quod plerumque satis cito fieri solet. Si diutius maneant, sensim solvantur; & si quid stimulantis simul habeant, ab hoc nixus deponendi alvum excitatur, si a sola mole suppositorii hic effectus non fuerit secutus.

Commendantur & grata Cardiaca, si debilis infans fuerit; quae leni stimulo excitant torpentes ventriculi, & intestinorum actiones. Formulae horum in *Materia Medica* habentur.

Cognoscitur autem, omne Meconium exivisse, si faeces alvinae colorem mutaverint; qui tunc flavus, vel ex albo flavescens solet esse, & post aliquot horas, si in linteis relinquuntur, in viridescentem saepe mutatur. Quandoque etiam biliosa viridia per alvum prodeunt, postquam Meconium evacuatum fuit: optime enim notavit *Monro* (1), recens natorum vesicam felleam plerumque turgere bile viridi, & acriore; quia ob respirationis defectum, & gluten, obliniens intestinorum latera, non tam facile in intestina exire potuit. Haec est ratio, quare, evacuato meconio, tormina adhuc maneant, ob copiam bilis per intestina transeuntis; qua evacuata, melius se habent: hinc in similibus usu pergitur, donec faeces flavae, molles, absque signo doloris, per alvum prodeant. Laxior enim alvus junioribus magis prodest, quam si stricta fuerit. Quod & affirmat *Hippocrates* (m), dicens: *Quibus copiose profuit alvus, & belle concoquunt, illi meliore sanitate fruuntur.*

(1) Medic. Essays and observat. Tom. II. artic. XI. §. 13. pag. 243.

(m) De Dentitione num. 4. Charter. Tom. VII. pag. 871.

§. 1347. **D**urities materiae corrigitur haustu feri lactis recentis cum paucō melle diluto, clysmate ex sero lactis saponato, vel mellito.

Raro Meconium durum est; sed potius picea fere ejus tenacitas facit, ut difficilior per alvum exire possit: at si nimis diu haeserit, indurescere posset: tamen satis cito corrumpendum meconium, per moram nata acrimonia, plus nocebit, uti ad §. 1345. dictum fuit.

Primum illud lac maternum, cujus usus ante laudatus fuit, facile cavebit nimiam duritiem meconii, simulque vi diluente minuet tenacitatem. Si ubera materna non ducat infans, pauculum feri lactis, melle edulcorati, exhiberi solet (vide *Materiam Medicam* ad hunc numerum); quod facile assumunt recens nati infantes. Optime etiam profunt clysmata ex sero lactis, paucō melle, & pauculo saponē veneto; cum meconium praecipue in crassis intestinis collectum haereat, & sic facile elui possit. Sufficiet, si uncia, vel sesquiuncia talis feri lactis injiciatur, & leni vi quidem, ne tenera intestina inde moleste afficiantur. Tutius enim est, repetere tale clyσμα, si opus fuerit, quam simul, & semel majorem copiam adhibere.

§. 1348. **I**n testina lubricantur, assumpto oleo Lini, Olivarum, Amygdal. dulcium, &c., tum, injectis iisdem Clysmatis specie, & linimentis similibus.

Omnia olea pressa lubricant, ficcitatem intestinorum emendant, illorum latera obliniunt, omnemque acrimoniam obvolvendo enervant, quaecumque demum illa fuerit: hinc, uti notum est, ad venena acria ingesta adeo laudantur ab omnibus olea mollia recentia, tam ex vegetabilium, quam ex animalium classe desumpta. Ubi ergo meconium, acre jam redditum, intestina irritando, dolores torminosos producit (§. 1345.), usum habere haec poterunt. Cavendum tamen videtur, ne majori copia, vel diu haec adhibeantur. Solidarum enim partium robur minuunt (§. 35.), & si diu maneant in ventriculo, ac intestinis, rancescunt, pessimamque acrimoniam inducunt: in sanis etiam, & fortibus hominibus, si opima pinguis copiosa in prandio assumerint, observatur, quod vesperi eructent merum oleum; sed jam adeo acre, ut oesophagum, & fauces exurat, imo fere praefocet. Haec est ratio, quare in *Materia Medica* ad hunc numerum parca tantum quantitas oleorum mollium praescribatur, simulque admisceantur syrapi, ut sacchari saponacea virtute reddatur illud oleum miscibile humoribus aquosis, sicque caveatur, ne diutius cavae intestinorum superficiei haereat. Ob eandem rationem oleo lini additur ovi vitellus, & mel mercuriale, dum forma clysmatis recens natis injicitur: simulque monetur, tale clyσμα semel in die injiciendum esse, donec lubricitas redeat. Scopo enim hoc obtento, melius abstinetur.

Solent & commendari inunctiones abdominis mollibus unguentis; quae tamen non ita directe intestinorum lubricationi servire possunt.

Obfer-

Observavit *Tiffot* (n), olea pressa, recens natis infantibus data, sedasse tormina ventris quandoque satis cito; sed postea rediisse frequentius, si continuaretur oleorum usus. Curavit quosdam, absque ullo remedio dato, prohibendo olei usum.

§. 1349. **Q**ua Methodo, quibus Medicamentis felicissime superantur varia illa, & pessima symptomata ab hac una radice orta (§. 1345).

Primae viae strigmentis mucosis undique occupantur in recens natis; quod multis molestiis originem dat, uti dictum fuit: crassa intestina copiam tenacis meconii habent, quod gravat, distendit, & mora acrius redditum irritat. Si autem haec educantur de corpore, ventriculus, & intestina depurantur, aptaque evadunt, ut recipiant, retineant, mutant ingesta, quae requiruntur ad nutritionem, & incrementum recens nati infantis. Unde patet, hanc methodum, haec remedia sufficere, ut superentur mala recensita.

§. 1350. **S**i vero usquam, hic antacida usum habent, & inter illa absorbentia imprimis.

Cum recens nato infanti praebeantur ubera, vel pulticulae ex lacte, farinaceis, pane, atque omnia haec ex propria natura sua degenerent in acrimoniam acidam, patet, quare antacida hic locum habeant, & inter illa praeferantur absorbentia; quia acidum quidem domant efficaciter, sed simul nullam acrimoniam habent. Videantur illa, quae §. 66. dicta sunt, dum de morbis spontaneis ex acido humore agebatur.

§. 1351. **O**piata raro, neque sine magna circumspectione, adhibenda.

Pessimus ille mos apud plebem in multis locis nimis invaluit, ut opiata dentur, dum misero ejulatu infantes dolorem testantur: sic quidem doloris sensus obtunditur; sed causa doloris pergit agere, & potest tenellum recens nati corpusculum destruere. Si a meconio retento, & acri reddito, intestina vellicentur, ejus expulsio promoveri debet, uti dictum fuit: si ab acrimonia acida talia mala contigerint, illa corrigi tuto potest per absorbentia remedia. Cum autem laxior alvus profit primo hoc vitae stadio ad evacuandum meconium, expellendamque bilem copiosius collectam, & acriorem quandoque, opiata nocent, cum alvum strictam reddere soleant. Unde patet, talia remedia locum non habere; vel si perpetui ejulatus aliquod lenimen postulent, lenissima sola adhibenda esse. *Syr. st. rhoeados, syr. diacodii,*

codii, & his similes, qui in omnibus officinis habentur, aqua diluti, & parca dosi dati, repetitis vicibus, donec blanda quies sequatur, tolerari possent; validiora nocent semper. Nutrices mercenariae, & custodes infantum clam saepe solent haec dare infantibus, & cum brevi nullum amplius effectum praestent, nisi dosis augeatur, hinc quandoque audacter ad magnam quantitatem adscendunt; sicque assuescunt his miselli, ut diu postea his carere nequeant omnino: unde vidi stupidos, & hebetes vixisse ad tertium, quartumve annum usque. Sensim tamen in plerisque haec mala, procedente aetate, emendata fuerunt.

§. 1352. **Q**uin evitanda omnia nimis attenuantia, stimulantia, volatilia.

In utero materno foetus blandis sanae matris humoribus vixit, ac increvit, & uti antea dictum fuit, damnum accipit, si gravida acrioribus cibis, potibus, vel condimentis indulserit. Postquam natus est infans, molle lac maternum ipsius usibus destinatum est. Tenera recens natorum viscera nihil acris, nihil irritantis ferre possunt; hinc omnes prudentes Medici, dum tractant infantum morbos, ab illis cavent. Unde patet, quantum peccent mulierculae, dum calidis opiatas compositionibus somnum infantibus conciliare nituntur. *Iberiacam*, *Mithridatium*, & similia aromatica misellis ingerunt, quantumvis etiam reluctantis: multum usitata est in quibusdam locis compositio, quae *Electuarium*, seu *requies Nicolai*, & ab effectu *Requies puerorum* in officinis dicitur. Illud *Electuarium*, praeter largam satis opii copiam, continet *Nucem Moschatam*, *Cinnamomum*, *Zingiber*. Imo vidi, quod calidissimum *Electuarium*, in officinis *Philonium Romanum* dictum, exhibuerint; quod, praeter opii largam admodum copiam, continet *piper*, & igneam *pyrhetri* radiculam: haec compositio adeo calida est, ut fauces vix non inflamment, dum deglutitur.

Postquam *Sylvii* sal volatile oleosum incaluerat, fere pro Panacea habebatur, cum vix non omnes morborum causas ab acido solo derivaret. Praeterea, cum acida acrimonia in ventriculo, & intestinis infantum toties adsit, & plurima mala producat, hinc acre illud remedium, quod ex sale volatili alcalino, & oleis aromaticis calidissimis constat, infantibus adhibitum fuit. Verum, si halitus illius remedii nares feriat robusti, & sani hominis, fere convellitur totum corpus. Quantum ergo metui debet, dum similis halitus, calore corporis actuosior redditus, per ventriculum, & intestina tenelli infantis oberrat. Acidum quidem domat hoc remedium, & cum acido unitum mutatur in salem neutrum blandae indolis, sed nocet acri stimulo, antequam hoc fiat.

Haec est ratio, quare prudentes Medici maluerunt absorbentibus uti remediis ad domandum acidum in primis viis infantum haerens; imo illa praetulerint salibus fixis alcalinis; licet haec salibus volatilibus alcalinis minus stimulent. Omnia enim illa, si non occurrant acido, vel antequam illi uniantur, sua propria acrimonia nocere possunt. Absorbentia autem blanda sunt, & nullam acrimoniam habent.

§. 1353. **C**uique vero singulari malo (1345.) facile remedium invenitur, cognita historia causae, & curationis omnium morborum huc usque descriptorum.

Omnia illa mala, quae §. 1345. enumerantur, solent feliciter tolli, causa sublata; id est, dum meconium expellitur, & a glutinosis lentis ventriculus, ac intestina liberantur. Interim contingere potest, ut post diuturniorem moram meconii, jam acrioris redditu, male affecta fuerint intestina, & ideo post expulsionem etiam meconii aliqua ex his malis adhuc supersint: possunt enim v. g. intestina inflammari, ventriculus a diuturniori vomitu sic irritari, ut nausea, & vomitus maneant. Verum tunc medela requiritur talis singulorum malorum, qualis determinata fuit antea, dum de his morbis agebatur: habito tamen semper respectu ad tenellam aetatem, quae mollissima tantum fert remedia.

Hinc etiam patet ratio, quare sollicite cavendum sit ab omnibus, quae sensuum organa in recens natis subito, & valide afficere possint. Unde prudenter *Moschion* (o) monuit, ut recens nati decumbant *in loco mediocriter calido, non valde lucido, sic ut nullus ibi odor sit*. Sic imitatur providam naturam, quae in recens natis infantibus pupillam membranula occudente munivit (p), ne vivida nimis lux oculos perstringeret. Similis cautela & circa auditus organum habetur, partim per membranam obturantem, partim quia meatus auditorius brevissimus est; postea sensim elongandus. Unde male consulitur regum pueris, dum in luminosis conclavibus exponuntur, dum in vicinia exploduntur tormenta bellica, &c. Noxium hunc morem, si non abolere omnino potuerim, saltem sic emendare licuit, ut vix amplius nocere possit.

Molle recens nati corpusculum, & cereae flexilitatis fere ossa caute tractanda sunt, ne membrorum difformitas producat, postea difficulter emendanda. Tota tamen tantae rei cura committi solet mulierculis, quae fasciis stringunt, artus componunt pro lubitu suo; Medicorum, & Chirurgorum optima consilia spernunt petulanter; unde saepe magnae miseris infantibus molestiae oriuntur.

Caute praecepit *Moschion* (q), ut reponantur recens nati in strato, molli quidem, non admodum tamen, sed mediocriter tantum: metuebat enim, ne spina dorsi, vel cervix distorquerentur, si a pondere corporis stratum subsideret nimis.

In utero materno foetus, molli liquori amnii immersus, omnes artus libere movere poterat; postquam autem in lucem editus est, mox fasciis circumductis sic stringitur, ut immobilis haereat. Molli fascia, sed leniter stricta, obvolvere corpus, & artus non nocebit quidem, ut a nutrice, ac custodibus tra-

(o) Spach. gynaeceor. pag. 7. num. 69.

(p) Albin. Annotat. Academ. Lib. I. pag. 33.

(q) In loco modo citato.

tractari, de loco in locum deferri, & uberibus admoveri possit. De tempore, quo fasciis utendum est, dixit *Moschion* (r), quibusdam statutos esse dies quadraginta, aliis sexaginta; se autem in ea esse sententia, fascias conducere, donec firma fuerit corporis compages; quod in robustioribus citius, tardius in imbecillioribus contingit.

Praecipuus ergo, imo unicus, fasciarum usus est, ut a frigore aëris defendatur infans, & impediatur laesio a rudiori attactu, uti etiam a frictione partium ad se invicem. Unde artus circumducuntur molli linteo, ut attritus omnis vitetur. Pessimus autem ille mos nimis obtinuit, ut fasciarum adstrictione artus immobiles, & in rectum extensi retineantur, sicque miselli in tali situ cogantur decumbere, qui etiam sanis, & robustis hominibus intolerabilis foret. Antea, dum de decubitu in morbis agebatur, dictum fuit, illum laudari optimum, qui in sanis dormientibus constanter observatur; qui nunquam extensis in directum artibus dormiunt, sed semiflexis, dum, motu voluntario silente in somno, musculi flexores praevalent extensoribus, & articulos leviter flectunt. Stolidae infantum custodes omni molimine flexuram artuum impediunt, brachia, & cubitos in directum extendunt, extensa fascia firmant circumducta, lateribus corporis applicant, & retrorsum trahunt: simili modo & artus inferiores tractant, omnem genuum inflexionem impediendo; sic miserum infantem, mumiae instar fasciis involutum, ac immobilem, matri, & adstantibus monstrant, tanquam de re bene gesta gloriantes.

Ipsae mulieres mirantur, infantem, miserrime ejulantem, dum in fasciis haeret, quiescere statim, simul ac solutis his vinculis membra libere movere potest. Sed nec evidenti hoc experimento convincere potui obstinatissimas, ut maiorem libertatem infantum membris relinquerent. Augustis prolibus sex primis a nativitate septimanis semper adstiti bis de die, dum fasciae applicabantur, & nisi manifeste perciperem, omnes artus libere flecti posse, totum apparatus removendum jussi illico, quantumvis obmurmurarent mulierculae, non consilio, sed sola autoritate compescendae. Simul curavi, ut inculcaretur obstetricibus, quae pro more recens natis primas fascias applicare solent, ne arcta nimis deligatione uterentur. Sic sensim obtinui, ut plures resipiscerent.

Nunquam aliquid metuendum videtur a laxitate fasciarum: in utero materno libere fluctuat foetus, membra fortiter movet, calcitrat. Integrae nationes nullis unquam utuntur fasciis, sed molliter tectos ab injuriis aëris tantum defendunt. Europaei tamen mirantur robur, & agilitatem horum hominum (s), & raro in illis observatur corporis deformitas.

Imprimis cavendum est, ne caput valide prematur in recens natis; nihil enim periculosius est. Optimum monitum habetur (t); *Caput pannis, aut lanis*

(r) Spach. gynaec. pag. 10. n. 107. 108. & Harmon. gynaec. part. I. Cap. 21. pag. 17.

(s) Hist. natur. gener. & particul. avec la descript. du Cabinet du Roy tom. 2. pag. 457.

(t) Spach. Harmon. gynaec. part. I. cap. XXI. pag. 17.

lanis mundis contegatur. Dum in eodem capitulo de fasciis circumducendis reliquo corpori agitur, in capite tamen nulla fit ligaturae mentio; & merito quidem, cum ossa capitis mollia sint, membranis inter se unita tantum, ita, ut pressione externa adhibita, facile supra se mutuo scandere possint, sicque minuto calvariae cavo cerebrum comprimere. Mollis pileolus, laxae capiti applicatus, sufficit. In illis, qui a nativitate fatui vixerunt, plerumque calvariae forma depravata invenitur.

Praeterea & fasciarum nimia adstrictio nocet, quatenus liberum thoracis motum, ad respirationem requisitum, impedit, costasque ultimas spurias introrsum premit; unde plurima mala sequi possunt. Dum simul ab eadem causa abdominalia viscera comprimuntur, ventriculus nec debitam copiam lactis recipere, nec receptum retinere poterit; unde frequens lactis regurgitatio, & vomitus molestus sequi solent; uti *Mauriceus* (u) optime monuit.

Cum autem foetus, in utero materno a fune umbilicali pendulus, agitetur facile hinc inde, dum mater corpus movet, hinc non sine ratione creditum fuit, recens natos simili motu, oscillatorio quasi, delectari; unde cunis imposuerunt infantes, ut lenissimo hoc exercitationis genere frui possent, sicque magis magisque firmari. Quotidiana experientia docet, morosiores etiam infantes blando hoc motu demulceri, & in suavem somnum delabi. Verum requiritur, ut illa cunarum agitatio lenis sit, & aequabilis. Unde *Moschion* (vv) dixit: *Cunae vel pensiles sint, vel pedibus, spondisque suis infra, supraque ita fabricatis, ut facillime in utrumque latus moveantur.* Pensiles cunae omnium optimae sunt, cum parva vi moveri possint aequabilissime, & absque ullo strepitu. Simul motus, talibus cunis impressus, sensim sine sensu minuitur, tandemque absque ullo concussu definit.

§. 1. 54. 3. **M**ultum patiuntur ab ipso lacte, dum id nimis cito, fortiterque, in stomacho coagulatum, compingitur in unam massam gravem, acremque.

Postquam in lucem editus est infans, resecta chorda umbilicali, ablatum est omne commercium, quod hactenus cum matre habuit, sed post aliquot horarum jejunium, ut melius abstergerentur primae viae, uti dictum fuit, alimento opus est; quod ut praesto sit, tenue, serosum, detergens lac in mammis maternis provida natura paravit. Nihil ergo magis naturale, nihil magis utile infanti esse potest, quam ut propriae matris lacte nutriatur. In utero ab humoribus maternis nutrimentum habuit, & incrementum; imo admodum probabile videtur, uti antea monitum fuit, ultimis graviditatis mensibus lac ad uterum, & foetum ferri.

Si jam adultis, & sanis hominibus subita in victu mutatio non caret periculo, sponte patet, multum metuendum esse, ne recens natus infans ab alieno

nu-

(u) *Traité des malad. des femm. gross. Tom. I. liv. 3. chapit. 37 pag. 506.*

(vv) *Spach. Gynaec. pag. 9. n. 104.*

nutrimento male afficiatur, & langueat. Cum enim non tantum foeminis humanis, sed & quadrupedibus mammae datae fuerint, tanto plures numero, quanto numerosiores foetus parere soleant, ut singulis alimentum praesto foret, simul ac nati sunt, patet evidenter, naturale institutum esse, ut recens nati infantes alantur lacte materno tandiu, donec, incrementum corporis robore, & dentibus enatis, duriores cibos, qui majori digestionis molimine indigent, assumere, & in usus suos convertere possint. A naturali autem lege prudens Medicus nunquam recedet, nisi ob graves, & urgentes rationes.

Verum quidem est, lac sponte sua acescere, coagulari in ventriculo, mora acrius reddi, & multa inde fieri mala de quibus jam agendum erit: unde videntur quidam lac habuisse pro alimento minus congruo, & alium potius victum suasisse recens natis. Verum, si adeo languidae fuerint viscerum chylopoieticorum vires, ut lac, in materno corpore jam paratum, & subactum, digerere nequeant, an separari poterit, posse subigi alia ingesta, quae a sanorum humorum indole magis remota sunt, quam ipsum lac? Certe vix hoc verosimile videtur. Lac, antequam in mammis colligitur, omnium viscerum, & vasorum corporis humani actionem expertum fuit, cum omnibus humoribus totius corporis mistum per vasa fluxit, imo jam proximum est humoribus humanis. Nulla ars praeviam talem mutationem inducere poterit, ingerendis cibis, qualis in lacte jam adest. Hinc merito concluditur, lac esse aptissimam nutrimenti infantum materiam. Illa autem mala, quae a lacte non bene digesto contingere observantur, caveri poterunt; & si nata fuerint, non adeo difficile est, illa emendare, uti patebit in sequentibus.

Helmontius (*), licet lac damnaverit, & plurima mala inde metuenda recensuerit, dixit tamen: *Natura destinavit lac in uberibus pro cibo, & potu infantuli, quod ipsi alimentum commune cum brutis cessit.* Sed ideo lac minori in pretio videtur habuisse. *Natura regitur digito Dei.* Ita est. Lac ergo, ut alimentum ordinarium ad vivendum sufficienter praebuit; non autem, ut vitae longe inserviret. Non enim natura amplius de vita longa est meditata, postquam novit, auctorem suum vitam accurtasse, nec velle unumquemque longaevis. Lac autem unicuique in cibum dedit ex aequo; etenim morborum exercitum; ut mille mortis praecocitates ad vitae fundamenta vergerent in ruinam. Natura ergo per lac satisfacit finibus sui auctoris, deditque alimentum belluinum. Cum autem de vita longa, per arcana sua remedia producenda, somniaret, quotidie bis de die guttas quatuor de arbore vitae sumendas voluit: ob hanc causam etiam lac damnavit, quod medicamen ad vitam longam, ut a cunis quotidie guttatim porrigitur, ad vitam longam, & sanam non potest digeri, ut neque penetrare, si intra crassos lactis grumos sepeliatur. Utpote sic etiam venena in lacte propemodum innocua evadunt, & velut castrata sterilefcunt.

Sed quale alimentum lacti, quod damnat, substituit. Laudo pro pueri nostro alimenta, quae pane, tantisper in tenui cerevisia bullito, cum melle despumato, seu minus, cum saccharo, instituitur: donec simul in mucilaginis, aut collae specie-

ciem,

(*) In Capitulo: *Infantis nutritio ad vitam longam* pag. 622. & seq.

ciem, sive gelatinam, devenerint. Notum autem est, panem cum cerevisia coctum cito acescere, & valide quidem: nemo sane functionum corporis gnarus spissam talem pultem praeferet lacti, quod de uberibus ducitur.

Hinc non adeo multos sequi *Helmontii* paradoxam sententiam, observatur, qui omne omnino lac damnavit, humanum aequae, ac aliorum animalium. Ridentur pro merito a prudentibus vanae illae de vita prolonganda Chemicorum fabulae, nec a lactis usu arcebunt recens natos, ne scilicet molli lacte obtunderetur efficacia *Entis Cedrini, Arboris vitae &c.*

Alii, & egregii viri, quos veneror, mitius senserunt de lacte, illiusque utilitatem agnoverunt quidem, sed praetulerunt humano lac aliorum animalium, & speciosis argumentis suam opinionem stabilire nituntur.

Fatentur quidem, historiam sacram, & profanam testari, Reginas, & Principes foeminas ubera dedisse propriis infantibus (y). Imo piaculum fore testantur, si naturali huic legi non obedivissent. Verum prima haec saecula morum innocentia commendabat, & una cum lacte virtutum semina natis tradebant matres. Nostris temporibus vitia praedominantur, morborum semina, & criminum una cum lacte materno hauriunt infantes. Hinc in votis habetur (z), ut Principum auctoritate ab uberibus prohiberentur infantes. Medici nunquam desinere deberent monitis instare, dum patienter expectant talem temporum felicitatem.

Mitius, fateor, de saeculo nostro censendum crederem: si numerosa fuerint vitia, non desunt tamen virtutes. Parricidii crimen primam mundi infantiam jam maculavit: post quindecim a creato mundo elapsa saecula crimina adeo increverant, ut, tarda adeo ad vindictam, divina ira totum genus humanum diluvii aquis deleverit, servato solo Noë, viro justo, & perfecto, cum familia sua. Prima haec saecula procul dubio pejora fuerunt nostris. *Omnis quippe caro corruerat viam suam in universa terra (a).*

Nec facile induci possem, ut crederem, lac in mores imperium habere. Novi quidem, multa de hac re historias narrari. Quanta diversitas morum in Caïno, & Abele fratribus! Iisdem tamen parentibus nati, eadem ubera duxerant. Quis credet, Caïnum iram, invidiam, crudelitatem ferocem adeo una cum lacte ex uberibus matris viventium haussisse? Quotidiana observata docent, fratres, ex iisdem parentibus genitos, eodem lacte nutritos, moribus esse diversissimos. Si verum sit (de quo dubito tamen), in Moscovia, & Islandia (b) matres nunquam lactare prolem, an constat, ibi vitia minus dominari, quam alibi? Vitulus, in ferocem taurum crescens, idem cum matris indolis sororibus lac de uberibus hausit. Dum solliciti parentes nutricem, quamvis caeterum sanissimam, remove vellent ideo, quod stupidioris ingenii videretur, veteranus Medicus subridens dixit, nutricem procul dubio ingenio praevalere vaccae, cujus lacte nutrire volebant prolem. Quam parum autem lac in mores agat, proprio suo exemplo docet egregius auctor

(y) Vander Monde sur la maniere de perfectionner l'espèce humaine Tom. 2. chap. V.

(z) Brouzet sur l'éducat. Médic. des Enfants Tom. 1. chap. V. pag. 165.

(a) Genes. cap. VI.

(b) Brouzet sur l'éducation Méd. chap. V. pag. 160.

auctor (c). Fatetur enim, se per octodecim menses nutritum fuisse lacte nutricis ebriosae, absque ullo detrimento vel roboris, vel sanitatis. Nec tamen pulcher tractatus, quem de educatione Medica infantum scripsit, ullo modo hoc morum vitium sapit.

An non illi, qui lac humanum damnant, tanquam morborum mentis, & corporis causam, timere deberent stupidam asini hebetudinem, vel falacitatem, & irrequietam corporis agilitatem, dum lac asinum, vel caprillum nutrimento infantum adhibetur (d)?

Si lac animalium in morbis difficillimis curandis profuerit, lac humanum adhuc longe maiorem praestitit utilitatem. Videantur illa, quae ad §. 28. i. dicta fuerunt, uti & illa, quae de phthisi curanda ad §. 1211. habentur. Notatum tunc fuit, calidum ex uberibus emulctum lac, dum aëri exponitur, halitum emittere grati satis odoris, qui statim in auras dispergitur, & non sine ratione creditur esse subtilissimi, atque elaboratissimi fluidi, in corpore materno parati, progenies. Totum illud perit cito, dum lac aëri exponitur: unde provide natura fecit, ut lac ex uberibus transeat in ventriculum infantis immediate, absque ulla iactura subtilissimi illius halitus.

Alterum argumentum, quod opponitur lactationi, est, quod lactantes foeminae minus foecundae sint; & secundum hanc sententiam augeretur hominum numerus, si lactationis munus aboleretur omnino: voluit celebris auctor (e) ad minimum duas tertias partes temporis, quo mulieres foecundae esse solent, inutiliter perire, dum lactantur infantes. Videtur autem haec opinio repugnare certis, & quotidianis observatis. Numerosissimas vidi mulieres, quae singulis fere annis feliciter pariebant, licet ubera praebarent infantibus. Nobilem matronam novi, quae octodecim infantes peperit, lactavit omnes, & ab ultimo partu resurgens, nihil de venusta forma amiserat, ita ut filiarum soror potius, quam mater, videretur. Magnam in Austria observo mulierum foecunditatem, etiam in plebeis, quae nutricum sumtus ferre non possunt, & quae longe facilius putant, ubera praebere infantibus, quam in tempesta nocte alium cibum parare. Multas audiavi querulas, quod tantum sexies, vel octies peperissent, firmiter persuasae, quod singulis puerperiis noxii quid secederet de corpore; quod nisi fieret, morbosas brevi se futuras, metuebant. Patet ergo, foecunditatem non impediri lactatione, & video quotidie, lactantes infantes feliciter crescere.

Suasi semper, nec poenituit, puerperam totam integram esse matrem filii sui; quod est enim hoc contra naturam imperfectum, atque dimidiatum matris genus, peperisse, ac statim abjecisse abs sese? aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod non videret; non alere nunc suo lacte, quod videat, jam viventem, jam hominem, jam matris officia implorantem? an tu quoque, inquit, putas, naturam foeminis mammarum ubera quasi quosdam naevulos venustiores, non liberum alendorum,

(c) Brouzet sur l'éducation. Méd. pap. 175. in notis. fect. de l'espèce humaine chap. V. pag. 88.

(d) Vander Monde sur la perfection de l'espèce humaine. (e) Brouzet sur l'éducat. Médic.

Tom. I. chap. V. pag. 164.

Tom. IV. Pars II.

dorum, sed ornandi pectoris causa dedisse? Sic enim, quod a vobis scilicet abest, pleraeque illae prodigiosae mulieres fontem illum sanctissimum corporis, generis humani educatorem, arefacere, & extinguere, cum periculo quoque averſi, corruptique lactis, laborant, tanquam pulchritudinis sibi insignia devenuſſet &c. (f). Galliae Regina filio ubera praeſtuit, nec ceſſare voluit, licet aegrotaret. Dumque paroxyſmi febris intermittentis tempore alia matrona mammas porrexisset ſitienti, & ejulanti puello, aegre hoc adeo tulit, ut digito in os infantis immiſſo, vomitum excitaverit, nolens, ut, alia materno ſuo munere fungeretur (g).

Si autem mater ob morbum, debilitatem, aliamve cauſam infantem lactare non poſſit, vel nolit, tunc optimum eſt, ſi nutrix eligatur, quae praebeat ubera. Primum, quod requiritur in nutrice, eſt ſanitas illibata: hinc Medici omni cum cura inquirunt, an aliquid morboſi poſſit detegi. Si color cutis bonus fuerit, oculi vivaces, gingivae bene coloratae, & firmæ, dentes mitidi, & ſani, cutis ubique pura, nullus odor malus ex ore, naribus, vel cute ſpiret, functiones omnes corporis rite peragantur, tunc de integra ſanitate certi eſſe poſſumus. Simul examinatur infans, quem lactat, an ſanus ſit, an juſtum incrementum acquiſiverit: inde enim concluditur de lactis bono effectu. Prudens, & perita obſtetrux omnia ſollicite perlustrat, & ſi in quodam loco ſuſpecta cicatrix, puſtulae, fluor albus inveniantur, repudiatur merito nutrix.

Aetas optima laudari ſolet a vigesimo quinto ad trigefimum aetatis annum. Sed certe viginti annorum nutrices inveni robustas, & ſaniſſimas, quae feliciffime hoc munere functae fuerunt. Majorem prudentiam in adultioribus laudare ſolent; & hoc forte conſiderari meretur: verum nutrices Regiis pueris ubera praeſtunt tantum, reliquarum rerum cura relinquitur prudentibus, & probatae fidei mulieribus: apud privatos, ſi nutrix curam infantis ſimul gerere debeat, caeteris paribus, primiparis praeferuntur illae, quae plures infantes pepererunt, modo adhuc in flore aetatis ſint.

Mammarum forma laudatur illa, ut non ſint flaccidae, ſed tenſae, elaeſticae, & moderatae molis. Metuebat *Aërius* (h), ne in magnis mammis nimia copia lactis conficeretur, quod, ſtagnando corruptum, noceret infanti. Verum antea, ubi de puerperii morbis agebatur, notatum fuit, praeter apparatus ſecernendo, & colligendo lacti dicatum, in mammis adeſſe tunicam adipoſam, quae, ſi multo adipe diſtenta fuerit, mammarum molem auget quidem, ſed lactis ſecretionem non promovet, at impedit potius, dum glanduloſam mammae partem ſua mole comprimit. Saepius vidi, ingentes tales mammas parum lactis dediffe.

In papillis laudatur ruber color, firmitas, & ut ſatis ſuper mammae diſcum emineant, ut facile illas infans arripere poſſit. Moderatae etiam magnitudinis ut ſint, oportet; nimis magnae enim ſi fuerint, linguae motum, ad deglutitionem requiſitum, impediunt; ſi vero nimis tenues fuerint, difficilius in-

(f) Auli Gellii Noct. Attic. Lib. XII. cap. 1. pag. 281.
citato pag. 166.

(h) Lib. IV. cap. 4. pag. 67. verſa.

(g) Brouzet in loco modo

infans illas ore retinere poterit, & dum fugere tentat, facile elabuntur (i). Optimum simul est, si, leni compressione mammae facta, imprimis circa areolam papillae, lac facile, & ad magnam distantiam ex pluribus quasi siphunculis profiliat. Si vero latiores fuerint hi siphunculi, ut tanquam per fistulam confertum lac emittant, *Aëtius* (k) suffocationis periculum metuebat. Caeterum aetatem nutricis definit, ut nec viginti annis junior, neque quadraginta annis major sit.

Moris erat, nutricem non dare ubera, nisi quatuor, imo & sex septimanae a partu numerarentur; ut scilicet a lochiis pura, & a toleratis in partu laboribus omnino restituta foret. *Mauriceau* (l) fatetur, se propriae matris lac praeferre, ideoque se potius optare, ut duodecim, aut quindecim a partu diebus nutrix alere inciperet infantem. Sed facile patet, non semper talem haberi posse. Unde *Aegineta* (m) dixit, magnum infanti esse commodum, si nutrix non ita diu ante pepererit; & imprimis, si ejus infans masculus fuerit. De sexu infantis parum sollicitus fuit, modo in reliquis nutrix optime constituta foret. Fuerunt alii in hac opinione, pro masculo nutriendo eligendam esse nutricem, quae masculum peperit, & contra, si sequioris sexus infans foret.

Lactis bonitas cognoscitur, si odorem non ingratum spiret, album fuerit, dulcis, & saccharini quasi saporis; si aqua pura mistum aequabilissime diluatur. Consistentia laudatur talis, si guttula ungui imposita, inclinato parum digito, non illico defluat tota, sed aliqua pars in superficie unguis maneat: si vero nimis haereat ungui, crassum, & viscosum damnatur. Simul laudatur, si non omnino album, & opacum fuerit, sed aliquid subcaerulescentis habeat, semipellucidum quasi.

Caeterum prudenter monuerunt (n) auctores, ut eligatur nutrix, quae prudens sit, nec in iram prona, cui addidit *Aëtius*, non epileptica. Dictum fuit antea, ubi de Epilepsia agebatur, magna quandoque intervalla inter retri hujus morbi paroxysmos interponi, & intermedio hoc tempore nullum latentis morbi vestigium detegi posse: praeterea mulieres, quae in validos animi affectus pronae sunt, saepe hystericis malis vivunt obnoxiae. Facile patet, tales nutrices amovendas esse; certa enim observata docuerunt, infantes, qui ira furentium obstetricum ubera duxerant, subito convulsos fuisse. Nec mirum hoc videbitur, si considerentur illa, quae ad §. 104. & aliis in locis de mutationibus miris in corpore humano factis per validos, & subitos animi affectus dicta fuerunt.

Hinc optime in aulis plures nutrices eliguntur, quae eadem in domo sub tutela prudentis matronae vivunt, & omnes eodem victu utuntur, secum mutuo quotidie conversantes, simul proprias proles lactant, illarumque curam gerunt. Sic occasio datur, ut detegantur corporis, & animi vitia, quae nondum

(i) Lib. IV. cap. 4. pag. 67. versa. (k) Ibid. (l) Mauric. Traité des malad. des femm. gross. &c. tom. 1. liv. 3. chapit. 43. pag. 52. (m) Lib. I. cap. 2. pag. 2.
(n) Aëtius Lib. IV. cap. 4. pag. 67. versa. Moschion apud Spach. pag. 7. n. 76.

dum innotuerant. Unde *Aëtius* (o) dixit: *Divitibus vero praestat plures habere nutrices.*

Cum autem certis observatis constet, lac, in mammis secretum, & collectum, nondum omnino deposuisse ciborum, & potuum indolem, patet ratio, quare in victu delectus habendus sit. Unde prudenter monuit *Aëtius* (p), cibos congruo tempore exhibendos esse, boni succi, quantitate debita: jussit, abstinendum a porris, cepis, alliis, sale maceratis, ab omnibus virosi, & tetri odoris, a bellariorum copia, &c.

Nec tamen victus, quo ante uti solebat nutrix, simul & semel mutandus est, cum illo utens antea vixerit sana. Hinc prudenter de nutricum diaeta *Moschion* (q) dixit, illas nutriendas esse communiter, sicut omnes homines, ut sana esse possit. Contra hoc praeceptum toties peccant nimis sollicitae matres, dum nutricibus exhibent omni arte culinaria parata cibaria, dum urgent jam saturas, ut gustent saltem oblatas delicias, credentes, se prodesse proli, dum nutricis ventriculum gravant. Plenus victus prodest quidem nutricibus, modo appetitus respondeat, ut copia lactis semper praesto sit. Victus tamen simplex omnium optimus est, ex jusculis, carnibus juniorum animalium elixis, vel assatis: profunt & olera mollia, fructus horaei bene maturi, non acidi, ova recentia, lacticia: epima, pingua, acria, salsa, aromatica vitanda: sic enim ex his in sanae nutricis corpore copia boni, & blandi chyli parabitur; quae & nutrici, & infanti alendis abunde sufficiet. Simul & satis magna ciborum varietas ex his parari poterit, ne eadem fercula, quotidie repetita, fastidium pariant.

Dum recens natus infans ubera ducere incipit, commendari solet nutricibus, ut liquidiori victu utantur, aucta jusculorum copia, & minuta carnis quantitate; si acer nutricis appetitus validiorem cibum poseat, copia potus tenuis chylum dilutiorem reddere poterit.

Sensim autem, crescente infantis robore, & validiores cibi nutrici concedi poterunt (r).

Potus laudatur imprimis aqua pura, cum reliqui potus, arte parati, cerevisia, vinum v. g., & similia vel acida jam sint, vel sponte sua acescant, & in infantibus acida acrimonia metuenda sit. *Moschion* (s) primis diebus aquam solam concedit; postea, adultiori jam infante, vinum potui communi misceri, permittit. Aliquid tamen videtur concedendum regioni, & consuetudini: notum est, in quibusdam regionibus aquam vel nunquam, vel saltem rarissime potari. Si v. g. cerevisiae potui semper assueta fuerit nutrix, aquae potum vix feret, & languebit brevi. Cerevisiam nunquam vidi nocuisse assuetis, modo mollis, recens, & bene defaecata fuerit; praecipue meracior, quae non tam facile acescit, & satis multum nutrimenti in se habet. *Aëtius* (t), dum lac deficeret in nutrice, *Zythum* propinari jussit; dixit-

(o) *Aëtius* Lib. IV. cap. 5.

(p) *Ibid.* cap. VI.

(q) *Spach. gynae.* pag. 7.

n. 77.

(r) *Moschion* apud *Spach.* pag. 7. n. 77.

(s) *Ibidem.*

(t) *Lib. IV. cap. 6. pag. 67. vers.*

xitque: Eodem die ubera lacte replebuntur. Mulieri autem videbitur, ubi poculum acceperit, omnibus membris languescere, & exsolvi, donec lac in mammillis collectum fuerit. Debet autem talis cerevisia meracior nondum per fermentationem temulentam vim acquisivisse; tunc enim fortiter inebriat. In pluribus lactantibus egregium talis cerevisiae effectum vidi, & quidem in propria uxore, quae, dum infantibus suis daret ubera, lectum petens, hujus cerevisiae libram sumxit, hoc cum effectum, ut tota nocte ubera lacte plena haberet.

Cum autem pleniori victu utantur nutrices, si desidem vitam agentes inertit torpeant otio, sanitas brevi detrimentum patietur: hinc omnes Medici nutricibus suaserunt, ut salubri motu corpus exerceant. Laudaverunt imprimis exercitia, per quae corporis partes superiores maxime exercentur (u). Hinc farinam parare, lectos sternere, imo aquam portare, jusserunt. Deambulatio in aëre aperto, puro, sereno prodest quam maxime. Multum facit ad nutrices sanitatem conservandam, si pacatus animus, & hilaris sit.

Multum metui solet, si lactanti nutrici menstrua prodierint; imo apud quosdam in more est, ut statim alia substituatur. Multae enim noxae solebant imputari sanguini menstruo, uti in *Capitulo de Morbis Virginum* dictum fuit. Aëtius (vv) monuit, ne nutricibus detur bellariorum copia, & praesertim pinearum: hae enim, quod oleaginosae sint, bilem generant, & in stomacho fluitant, sed & venerem excitant, a qua omnino nutricem abstinere oportet: hora enim concubitus menses provocantur; unde & lac corrumpitur, & depravatum, paucissimumque generatur. Similia & apud Moschionem (x) habentur. Dum nutrices eliguntur, inquiri plerumque solet, an lactationis tempore menstrua habuerint olim: si fateantur, ereditur, tales nutrices minus conducere. Vidi, sexies mutatas fuisse nutrices anni spatio ob hanc solam causam. Soleo in tali casu sollicitè examinare nutricem, ejusque lac. Si nihil in sanitate mutatum invenio, si lactis copia, & qualitas omni dote bonae fuerint, meo consilio nunquam mutata fuit nutrix. Simul notandum est, quod miserae nutrices, dum menstruorum prima vestigia percipiunt, animo turbentur, metuentes, ne removeantur. Ubi vero blando alloquio erectae spem habent, non futurum, quod timent, mox omnes illae turbae silent, & pristina redit alacritas. Bona fide asseverare possum, me nunquam, sub datis conditionibus, aliquid damni observasse, si lactentes menstruantis nutricis ubera ducerent. Plus metuendum videtur a frequenti nutricum mutatione.

Moris quidem est in aulis, ut nutrices a consortio mariti separentur, & Aëtius (y) severe concubitus prohibet, & ob menstrua, a quibus metuebat, & quia quaedam ipsarum concipiant; quo nihil nutriendo infanti perniciosius. Quotidiana tamen observata docent, mulieres, quae proprios infantes lactant, maritorum consortio uti libere, & nihilominus feliciter prolem educare; multasque concipere lactationis tempore. An non potius metuendum est, dum mulier in flore aetatis commode, & laute vivit, ne furtiva venere utatur, vel,

(u) Aët. in loco modo citato. Moschion. pag. 7. n. 77. 79.
(x) In loco modo citato.

(vv) Ibidem.

vel, si severe custodiatur, languere incipiat. Aliquoties hoc contigisse, vidi. Haec est ratio, quare moderatus licitae veneris usus non credatur nocere nutrici, nec infanti (2). Verum quidem est, inveniri quandoque mulieres, non adeo in venerem pronas ex propria temperie, quae tunc plerumque iners, & frigida esse solet, sed pro nutricibus eligi solent sanissimae, & succi plenae, in quibus talis temperies non adest.

Nec videtur adeo metuendum esse, si lactationis tempore conceperint: solet illud satis frequenter contingere mulieribus, quae suis infantibus ubera praebent: cum enim saepius lactationis tempore non prodeant menstrua, contingit frequenter, tales gravidas esse, licet ignorent. Imo in pluribus laeque bonum, & copiosum manet primis graviditatis mensibus. Plerumque contingit, utero mole aucto, lactis copiam in mammis minui; imo sponte evanescere: verum infans, per aliquot saltem menses materni lactis beneficio usus, facilius ablactationem feret. Credi solet, recens concepto Embryoni nocere, si gravida mater infantem lactet: sed tantillae molis est, ut facile nutrimentum in utero inveniat, licet copia lactis quotidie ad mammas derivetur. Si binos, imo plures foetus in utero nutrire possit foemina, cur non posse nascentem foetum in utero, & natum jam infantem, alere eodem tempore?

Vidi mulierem, quae primos partus dolores percipiens, dabat ubera annuo infanti, illumque subridens monebat, ut valediceret mammis, quae mox nascituro dicatae jam erant. Dum mirabar, dixit, sex jam vicibus se idem fecisse. Post paucas horas enixa fuit infantem sanum, & robustum, quem feliciter educavit.

Non incongruum videtur, hoc loco agere de illis impedimentis, quae faciunt, ut infans vel omnino non, vel saltem difficulter ubera ducere possit; simulque considerare, qua methodo haec obstacula tolli, vel emendari possint.

Linguam, & labia prae reliquis servire suctioni notum est; unde integritas, & libera mobilitas harum partium requiruntur. Inter ligamenta, quae linguam firman, & in situ retinent, praecipuum est illud, quod anteriori, & inferiori parti linguae inseritur, & fraenum linguae dici solet. Si aperto ore sursum elevetur linguae apex, statim oculis apparet: est autem continuatio, & duplicatura, laxa cohaerens, membranae, quae inferius oris cavum investit. Ligamentum illud impedit, ne lingua nimis retrahi possit versus fauces: observatur autem, finem illius ligamenti in recens natis propius ad apicem linguae extremum accedere, quam in adultis; imo quandoque, licet rarius, ad extremum linguae apicem usque produci, & tunc impedire, ne lingua ad palati fornicem elevari, vel ad labiorum extrema usque adduci possit. Sic linguae liber motus, qui ad suctionem requiritur, impeditur. In tali casu, levi sectione prudenti manu facta, ligamenti pars anterior a linguae apice solvitur.

Pess.

(1) Brouzet *Educat. Médicin.* Tom. I. Chap. V. pag. 205. & seq.

Pessimus mos obtinuit, ut sciolae obsterrices hoc unguibus lacerarent, vel & forfice rescinderent, credentes certissime, hoc absolute requiri ad facilem suctionem: imo adultis nunquam expeditam loquelam fore, nisi illud fraenulum linguae resectum fuerit. Unde in proverbium abiit de garrulis dicere: *Lorum linguae illis nimis resectum fuisse.*

Facile patet, primo inquirendum esse, an illa sectione opus sit, nec ne, quod sic exploratur. Si infans possit linguam producere ad extrema labia usque; si apice linguae palatum tangere possit; si digitum ori immissum sugendo prehendar; tunc hac sectione opus non est, cum lingua habeat mobilitatem requisitam ad illos usus, quibus infans hac aetate indiget, ad suctionem nempe, & deglutitionem. Celebris, & toties jam laudatus *Petit (a)*, si dubitaret de sectionis fraeni necessitate, infantem admovebat uberibus; si fugere poterat, non secabat, licet ipse crederet, linguae motum ob hoc impedimentum non satis expeditum esse. Malebat enim operationem differre, donec adultior foret infans; quia tunc facilius tentari potest; & saepe observaverat, vitium illud sensim per aetatem emendari, ita ut postea liberime loquerentur, licet omnes statim post nativitatem voluissent sectionem faciendam esse. Praeterea cum in recens natis difficilior sit hanc sectionem instituere, ut nec justo major, nec minor sit, hinc merito differtur, nisi fugendi impossibilitas urgeat. Vidit enim *Petit (b)*, postea novam sectionem debere fieri ad tollendum loquelaе impedimentum in adultiori, dum prior linguam non satis liberaverat. Contra, si sectio productior facta fuit, linguae pars non satis sustinetur.

Vidit infantem balbutientem, & credidit, hoc factum fuisse, quod temere, absque ulla necessitate, resectum fuerit fraenulum. Fatetur, plus quam medietatem infantum, ad quos vocatus fuit, nulla sectione opus habuisse, neque se hoc tentasse in omnibus, quibus fraenulum linguae motum difficiliorem reddere videbatur.

Adjacent utrinque huic linguae fraenulo vasa ranina, arteriosa, & venosa, quae imperita manu facile laedi possunt; imprimis venosa, quae ante arterias locantur: dum autem suctionem perpetuo fere tentat infans recens natus, hinc haemorrhagia augetur, & proprium sanguinem exfugens perit. Infelix talis casus legitur (c), ex *Dionysio* descriptus, de recens nato in diviti familia haerede, cui Chirurgus, secando fraenulum, raninam venam laeserat inscius. Dum vidit, infantem ubera cum facilitate ducere, securus abiit. Nutrix infantem lacte saturum, ut putabat, in cunis reposuit: pergebat labia movere, ac si fugeret, quod satis consuetum est infantibus; unde nemo quid mali suspicabatur: sed incipiebat pallefcere, debilis fieri, & paullo post moritur. In cadavere inventus fuit ventriculus sanguine plenus. Plures similes casus in Historia Medica habentur.

Patet inde, prudentem manum requiri, ut haec operatio tuto fiat. Haemor-

(a) Acad. des scienc. l'an. 1741. Mém. pag. 333. & seq. (b) Ibid. pag. 339.

(c) Andry Orthopédie tom. 2. pag. 266.

morrhagia talis, licet terreat semper, & infausti casus docuerint, illam periculo non carere, tamen arte supprimi potest, si peritia, & dexteritas Chirurgus non defuerit, simulque constantis animi sit. Testatur *Petit* (d), quod nullus infans, ad quem vocatus fuerat, tali haemorrhagia perierit. In adultis, uti notum est, venae raninae satis tuto lanceola pertundi possunt; verum illi, dum monentur, linguam immotam retinent, & sanguis, aqua frigidissima, vel glaciei frustulo sub lingua posito satis cito compescitur. Verum infantes, dum sanguis exit, perpetuo sugunt, & sic haemorrhagia non tantum pergit, sed augetur. Praecipuum ergo auxilium ab eo pendet, ut, lingua immota reddita, suctio impediatur. Sumit *Petit* (e) furcinulam, ex ramulo mollis ligni paratam (*bouleau*), in illo loco, ubi bini ramuli, aequalis, quantum fieri possit, magnitudinis, bifurcantur: adhibuit ad hunc usum. Curavit autem, ut trunculus quatuor lineas, singuli vero ramuli octo lineas aequarent longitudine; adeoque confecit furcinulam, cujus manubrium duplo brevius erat dentibus: tenuis linthei fasciola obvolvebat totam hanc machinulam, & obvolutam supponebat linguae infantis ita, ut manubrii extremum tangeret, & inniteretur maxillae inferiori; angulus autem, ex divergentibus furcinulae hujus dentibus exurgens, applicaretur vasis apertis, dum simul dentes utrinque motum linguae in latera impedirent: Fasciam deinde, ex tenui lintheo paratam, ulnam longam, & octo, vel decem lineas latam, applicabat linguae, ita ut labiorum utrumque angulum tangeret; postea sub maxillam deducebat, prope laryngem decussabat illam, & utrumque fasciae extremum posteriori pileoli parti affigebat. Sic & lingua firmabatur, & vasa laesa comprimebantur. Hac methodo servatus fuit infans, licet jam durasset haemorrhagia per viginti quatuor horas, & admodum debilis foret(f).

Optime autem monet egregius ille vir, haemorrhagiam sequi posse, licet dexterrime peracta fuerit haec operatio, & nulla vasorum raninorum laesio facta sit. Vidit enim talem casum, ubi sectionis limes distabat ultra duas lineas a vasis raninis, & tamen notabilis copia sanguinis effluebat. Hoc contingere potest, si majores horum vasorum ramuli per duplicaturam fraenuli decurrant; quod imprimis fit, si illud solito crassius fuerit.

Sed & aliud periculum imminet, si linguae fraenulum absque ratione resectum sit, vel sectio nimis longa instituat: paucus sanguis, qui semper ex vasculis laesis exstillat, irritat infantem, ut deglutiat; sicque lingua, cum fraenulum resectum jam non firmet, & retineat illam, versus posteriora trahitur, apice suo pone velum pendulum palatinum deducitur, linguae basis retrorsum ducta Epiglottidem deprimat, rimam glottidis obturat, & infans brevi suffocatur. Tristem talem casum vidit *Petit* (g). Infanti statim post nativitatem secabatur fraenulum: & post quinque horas suffocatus periit: vocatus, ut mortis subitae causam rimaretur, digito in os immisso linguam invenire non potuit; sed tangebatur carneam quasi massam, obtu-

ran-

(d) In loco modo citato pag. 353.

(g) Ibid. pag. 339.

(e) Ibid. pag. 356.

(f) Ibid. pag. 353.

rantem aditum ex ore in fauces. Fissis utrinque ad masseteres musculos usque genis, vidi, carneam illam massam esse linguam retractam pone velum pendulum palatinum ita, ut linguae apex pharyngem spectaret. Sic evidenter patuit, quod miser infans propriam linguam deglutivisset.

Postea, dum recenti in memoria habebat hunc casum, vocatus fuit ad infantem, cui bihorio post nativitatem fraenulum resectum fuerat; qui paullo post in simile periculum incidit: statim digitum ori immisit, & invenit linguam nondum penitus in fauces retractam, quam digito reduxit; & audiebatur sonus, ac si vi embolus ex syphone extraheretur. Pergebat infans suctionis motum facere, audiebatur sonitus deglutitionis per quatuor, vel quinque minuta, & subito apparebant instantis suffocationis signa. Digito linguam ex faucibus statim reduxit, & reductam retinuit per aliquot minuta; tunc infans digitum fugere incepit, & oblatis uberibus lac avidè hausit. Omnia in vado jam esse, credebatur; sed post horae intervallum idem periculum rediit; quod *Petitus*, cum in vicinia esset, pro tertia vice feliciter superavit, simulque necesse credidit, illo tempore, dum non fugebat infans, linguae motum impediendum esse. In hunc finem linguae imposuit splenium, duos pollices longum, quindecim lineas latum, sex lineas crassum, atque fascia quatuor capitum firmavit. Amovebatur ille apparatus, dum mammas fugeret infans, & mox denuo apponebatur: cum tota die feliciter cederet haec methodus, nutrix cum infante rus petiit. Stupida haec mulier, inutilem credens hunc apparatus, amoverat; &, dum illa obdormisceret, miser infans strangulatus periit. Lingua retro velum pendulum palatinum inventa fuit, ut in priori casu. Post duos, tresve annos similis casus denuo contigit; verum infans, debita cura adhibita, servatus fuit.

Magis adhuc mirum videtur, idem infortunium contigisse infanti bihorio post nativitatem, licet fraenulum sectum non fuerit. Testatur *Petit* (b), se hoc vidisse: casu statim digitus ori immittebatur, mox cessabat suffocatio, & digitum fugere incepit: idem periculum rediit saepius, simili modo levabatur. Dies, & noctes vigilare debuerunt custodes, ut ab instante suffocatione misellum infantem servarent; post duas, tresve septimanas desuevit propriam linguam deglutire. Notum est, Angolenses servos, propria lingua deglutita, se ipsos suffocare, si dura nimis servitus ipsis displicuerit; ut nempe, morte sua damnum hero inferentes, ulciscantur injuriam. Quis illos docuit funestam hanc artem, cujus unicum tantum experimentum capere licet? An in hoc infante fraenulum linguae nimis cedere potuit? An in Epilepticis, qui in paroxysmo suffocantur, valide convulsis linguae musculis, simile quid contingit?

Ex his omnibus jure conclusit *Petit*, nunquam secandum esse linguae fraenulum, si infans ubera ducere valeat. Stolidae mulierculae, dum, ducto sub linguam digito, fraenulum tangunt, statim illud secandum volunt, ignarae, illud ligamentum naturaliter adesse, & magnum habere usum. Si autem

abso-

(b) In loco modo citato pag. 343.

absoluta necessitas hoc postulat, praesto debet adesse nutrix, quae mox det ubera. Sugere enim incipit infans sanguinem, qui ex hoc vulnuscule fluit; qui, si feliciter res peracta sit, brevi cessat; at, nisi ubera porrigantur, tunc pergit infans inanes deglutitionis nixus facere, sicque tandem propriam linguam deglutit.

Ubi autem sectio froenuli omnino requiritur, omnis cautela adhibenda est, ut vitetur laesio vasorum raninorum. Si digitos Chirurgus inter linguam, & maxillam inferiorem ponere possit, satis facile haec sectio institui potest forfice, cujus apices obtusi sunt. Saepius autem contingit in tali casu, sic impeditam esse linguam, ut ejus apex elevari non possit. Pulcrum invenit, descripsit (i), & figura expressit instrumentum, quo haec operatio tuto fieri possit, & alterius, quod laudari solebat, vitia detexit.

Quandoque, sed rarius, laterales linguae partes necuntur ligamentis praeternaturalibus (k) ad vicinas partes, quae ressecandae sunt; quod satis tuto fieri poterit, cum non sit tantum periculum laesionis vasorum.

Observata fuit & alia causa, quae suctionem impedit, de qua vix cogitatum fuit. Contingit quandoque ut lingua arctissime applicetur cavo palati fornici, & sic adhaereat, ac si glutine interposito juncta foret. Spatula tunc, vel alio simili instrumento removenda est lingua a palato, ut infans sugere, & deglutire possit. Tres recensentur casus (l) infantum, qui per plures dies ubera ducere non poterant ob hanc causam, & feliciter hac methodo servati sunt.

Possunt & obstacula in velo pendulo, vel faucibus adesse, quae suctionem, & deglutitionem difficiliorem reddunt, dum expeditam actionem partium, ad deglutitionem requisitarum, turbat. Sic Hippocrates (m) notavit: *Quos infantes, dum lac sugunt, tussis obsidet, illi uvam majorem habere consueverunt.* Postea & plura memorat de ulcerosis malis, has partes quandoque obsidentibus.

Si labium superius a nativitate fissum fuerit (labium leporinum vocari solet), suctio difficilis fit, praecipue cum plerumque palati fornix simul fissus sit, & ob liberum aëris per hanc rimam ingressum suctio impediatur, vel si quid lactis ex mammis trahant, per vias plerumque regurgitet: idem fit, si cochleatim misellis his nutrimentum operatur. Unde non mirum est, si plures ex his pereant. Tamen quidam emergunt. Videntur enim sensim adfuescere, ut, elevato dorso linguae, fissuram palati claudant, apice linguae, & labiis fugentes. Dum, aetate jam robustioribus factis, fissa labia uniuntur arte Chirurgica, in plerisque sensim minuitur palati fornicati fissura, & tandem integre aboletur (n). Vidi tamen aliquos, quibus labium superius a nativitate integrum fuit, & fornix palati magnam fissuram habebat a parte posteriori, quae apicem digiti minimi facile capere poterat. Vidi

(i) In loco modo citato pag. 351.

(k) Levret l'art. des accouchem. pag. 222.

(l) Mém. de l'Acad. Royale de Chirurgie tom. 3. pag. 16.

(m) De Dentit Charter.

Tom. VII. pag. 872.

(n) Levret l'art des Accouchem. pag. 224. Mém. de

l'Académ. Royal. de Chirurg. Tom. I. pag. 605.

virum, quingenario majorem, cui labium, nulla cura adhibita, fissum mansit; fornix palati tamen erat integer. An antea fissuram habuerit, nec ne, expiscari non potui.

Ex haecenus dictis satis constitit, lac esse naturale, & optimum recens natis nutrimentum. Considerandum jam est, quomodo illud lac in ventriculo retentum mutari debeat, & quaenam inde mala sequi possint, si non rite digeratur.

Lac, uti notum est, si in vase puro quiescit, primo aequabilissime candidum apparet; dein cremorem album, crassum, pinguem, ejicit sursum; quo ablato, manet lac defloratum, subcaerulescens, & magis pellucidum, quod partem serosam lactis, & caseosam simul continet. Si autem coagulum lactis, paratum de succo ventriculi ruminantium, lacti miscetur, fit una, aequabilis, coagulata, scissilis massa, quae brevi sponte secedit in serum, & colostratum, sive caseosum (o). Unde patet, lac coagulari naturaliter in ventriculo. Ideoque etiam infantes, si avidius ubera duxerint, paullo post eructant lactis colostrum, sed molle, nec fortiter compactum. Simul notandum est, lac humanum minus illius colostri continere, quam aliorum animalium: humanum enim lac valde dulce, & tenue est; proximum asinum; dein equinum, caprillum, & ovillum; denique bubulum, omnium crassissimum, magnam casei copiam continet. Unde alia ratio patet, quare lac humanum recens natis infantibus prae reliquis lactis speciebus conducatur. Verum lac, in loco imprimis calido retentum, sponte sua in acidam acrimoniam vergit, quae, ubi nata fuit, lactis in ventriculo coagulum accelerat, & auget; unde dicitur in textu, quod tunc multum patiantur infantes a lacte, si illud nimis cito, & fortiter in stomacho coaguletur, ac compingatur. Vidi aliquoties post mortem totum ventriculum crasso colostro distentum, acidum redolente.

Dum autem lac coagulatum, sed molle adhuc, sensim per pylorum exit, statim occurrit in intestino duodeni bili saponaceae, & succo pancreatico, salivae simillimo, quorum efficacia diluitur, & solvitur illud concretum, sicque aptum redditur, ut in reliquo tractu inde resorbeatur omne utile, & faeces inutiles per anum exeant; quae in infantibus, solo lacte materno nutritis, satis solidae, & copiosae observantur. Videntur autem faeces illae, pro maxima saltem parte, originem debere caseo in lacte contento. Unde Hippocrates videtur monuisse (p): *Quibus lacteum vomitione refunditur, illis alvus sistitur*. Notari enim meretur, quod non dixerit, lac refundi, sed *refunditur*; id est, colostrum revomunt, & eructant, sed molle; sicque copiosius per alvum excrendae, minuitur. Habet & sequentia (q): *Infantes copiosius mejunt, quam deficiunt, pro ratione melius nutriuntur*. In illis enim lacte solubile vi viscerum chylopoieticorum resorbetur in sanguinem; unde parva faecum alvinarum copia; cum

ta.

(o) Her. Boerh. chem. tom. 2. pag. 298.
pag. 871.

(q) Ibid.

(p) Dentit. Charter. Tom. VII.

tamen urina copiosior monstret, quod satis multum lactis hauserint. Contrarium autem damnavit (r): *Qui non pro ratione mejunt, sed a pueris alvus crebro crudum deficit, ii morbis sunt obnoxii.* Alvum autem copiosorem laudavit, quam bona coctio comitaretur: *Quibus copiosa profluit alvus, & belle concoquant, ii magis sanitate fruuntur.* Tunc enim copia lactis assumti, & bene digesti significatur.

Unde naturaliter quidem coagulatur lac in ventriculo infantis; sed tunc morbosum dicitur coagulum, si nimis cito, & fortiter fiat. Multum hoc caveri posset, si attenderetur ad sequentia.

Infantes molestias, quas patiuntur, & necessitatem alimenti solo indicant ejulatu. Saepe contingit, ut nutrices ubera porrigant statim, de reliquis ejulatus causis parum sollicitae, & si lacte abundant, repetant brevi temporis intervallo. Expedit quidem recens natis, ut saepius ubera ducant; sed simul modicam tantum lactis copiam hauriant: aliter enim ventriculus nimium distendetur, nec poterit tunc agere in lac contentum; quod, brevi acescens, novos ejulatus excitabit, & si denuo sugat infans, omnia mala augeruntur quam maxime. Unde prudenter monuit *Moschion* (s), non ad omnem ploratum exhibenda esse ubera, sed indagandum sollicite, an forte nimia fasciarum adstrictio membrorum per fascias distorsio, urinae, aut faecis alvinae excretio, fletibus causam dederint. Tunc autem nutrimento opus habere infantem, dicit, *si hypochondria cava sint*, ventriculo nempe depleto; si ab ultima suctione tantum temporis effluxerit, ut nutrimento opus habeat; si os aperiat, labia moveat; si digitum labiis admotum prehendat, & sugat. Premitur autem quandoque, & angitur a nimia lactis ventriculo contenti copia: tunc hinc inde se jactat, & obtumentem ventriculum turgent praecordia: in tali casu a novo lacte ingesto molestiae augerentur. Si nihil inveniatur, cui ejulatus causa tribui potest, monet *Galenus* (t), praeter nutriceis papillam, & alia duo superesse harum molestiarum lenimina: *Motum medicorem, & vocis modulationem*; quibus perpetuo usae non solum mitigant, sed etiam somnum conciliant; vel hoc ipso testificantes, ad *Muscam* eos, & exercitia suapte ingenio esse propensos.

Verum & alia causa est, quae lactis coagulationem auget, & accelerat; motus nempe cunarum nimis validus. Notum est, sola agitatione lac recens in vasis vitreis purissimis in coagulum vergere, & quandoque intra breve temporis spatium separari partem pinguem butyraceam lactis a reliquis, quae paullo post acescit, & mora in acrimoniam rancidam mutatur. Ablato hoc butyro, relinquitur serum, cum parte lactis caseosa mistum; quod lac ebutyratum vocatur, satis spissum est, & mox acescit. Ubi jam infantum custodes valida cunarum agitatione morosos ejulatus compescere tentant, lac in ventriculo simili modo mutatur brevi. Antea ad §. 63., ubi de noxis acrimoniae acidae in ventriculo agebatur, notatum fuit, ventriculum ipsum forte non adeo sensilem esse; sed orificium superius ventriculi ab acri quocumque affici

(r) De Dentit. Charter. Tom. VII. pag. 872.

100. 101.

(s) Spach. Gynaec. pag. 9. num. 99.

(t) De sanitat. tuend. Lib. I. cap. 7. V. Charter Tom. VI. pag. 51.

affici multum, & dolere: unde, dum acidum in ventriculo quietum haeret, nulla molestia percipitur; verum, simul ac ructus expellens sursum, motus, vel mutatus situs corporis facit, ut acidum acre applicetur orificio superiori ventriculi, molesta cardialgia sequitur. Quantum ergo patietur misellus infans, dum, horizontali fere situ in cunis jacens, valide agitur! Imo cerebrum, adeo mobile in hac aetate, per validos cunarum concussus turbari poterit; praecipue, si inaequales fuerint; unde vertigines, vomitus, convulsiones merito metuuntur (u). Novi, puerum, robustum, octo annorum, dum a sodalibus in cunas projectus vi retinebatur, a rapido cunarum motu vertigine tenebricosa correptum fuisse, sequente vomitu bilis aeruginosae: miser per aliquot dies postea languit.

Ideo praeferuntur cunae, quae non insistant pavimento, sed, suspensae utrimque, laenissimo motu agitari possunt quam aequabilissime, minimo cum attritu, penduli instar oscillant, sensim minuto motu ad quietem redeunt, tandemque absque ullo subsultu quiescunt. In cunis, quae super pavementum rotantur, simul ac motus cessat, expergefieri solent infantes.

Placidus talis cunarum motus infantibus optime conducit; est enim lenissimum exercitationis corporis genus, quod & delectat, & prodest.

§. 1355. **H**Aec enim sensim acrior, acidiorque reddita faeces alvi virides, acidum spirantes, materiem vomitu rejectam acidam, hinc tormina, flatus, dolores, & infinita alia excitat, maxime convulsiones.

In capitulo, ubi de *Morbis spontaneis ex acido humore* agebatur §. 60. & sequentibus, patuit, praecipuam sedem acrimoniae acidae esse in primae digestionis officina, ventriculo nempe, & intestinis; adeoque haec viscera primo affici.

Mora autem lac coagulatum in ventriculo acrius fit, & acore semel nato in ventriculo, quidquid de lacte ingeritur, statim coagulatur fortiter, & cito eandem acrimoniam induit: hinc prudentes Medici, simul ac eructando infans acidum spirat, vel acidam materiam vomitu rejicit, statim absorbentibus acidum remediis illam acrimoniam domare conantur; probe gnari, difficilius curari hoc malum, si mora longiori tota superficies cava ventriculi acido quasi imbuta fuerit. Uti enim lac recens, immissum vasi, quod lac acidum diu continuit, statim corrumpitur; sic idem fit tunc in ventriculo, dum de novo lac ingeritur. Brevi tunc & illa, quae tota intestinorum longitudine continentur, in acidam acrimoniam degenerant, faecesque alvinae viridescunt, & acidum fortiter spirant.

Magnum in recens natis hepar copiosam bilem fecernit, quae colostro caseoso per pylorum egredienti admista, illius tenacitatem solvit, & acidam
acri-

(u) Brouzet *Educat. Médicin. des enfans* Tom. I. pag. 123.

Tom. IV. pars II.

acrimonia cavet, vel emendat: hinc in sanis infantibus faeces alvinae aequabiles sunt, & flavescent. Simul ac vero bilis inertior redditur, vel copia deficit, albicantes grumi caseosi cum faecibus misti ano exeunt, & simul faecum flavus color mutatur in viridem, quandoque tam profundum, ut aeruginis instar lintea tingantur maculis vix delendis. Unde Medici ex faecibus alvinis infantum de acidae acrimoniae praesentia certam Diagnosin habet. Si enim faeces aequabiles fuerint, absque grumis caseosis intermixtis, pro optimo signo habetur. Si faeces flavae quidem ano emittuntur, sed, in linteis relictæ, cito viridescent, jam signum dant, acidam acrimoniam in procinctu esse. Si autem virides exiverint, acidum spirantes, merito concluditur, totum tractum intestinorum acido lactis colostro repleti (vide §. 63. 64.) Sed a tali acrimonia, perpetuo irritante, & continuo peiori reddita, dolores, tormina, flatus, & alia plura mala fieri, facile intelligitur.

Simul emaciantur toto corpore, abdomen, a colostro in intestinis coacervato, intumescit, & nisi illud evacuari possit, acidumque domari, misere pereunt. Ubi enim eo usque pervenerit malum, difficulter curatur. Saepe tamen voraces sunt; & videtur hoc indigitasse Hippocrates (vv), dum dicit: *Qui mammam sugentes non probe aluntur, macilenti sunt, & aegre reficiuntur, uti & in alio textu (x); voraces, quique copiosum lac trahunt, non pro ratione corpulenti evadunt. Quibus modice (fertur alvus), & sunt voraces, neque pro ratione enutriuntur, morbis sunt obnoxii.*

Toties occurrunt Medicis miseri tales infantes, qui, toto corpore emaciatissimi, turgidum, & prominulum abdomen monstrant; imprimis apud inferioris sortis homines, qui dura pauperie, & curis domesticis pressi, saepius negligunt incipiens malum, & sero nimis medicam implorant opem. Tarda diu moratur alvus in misellis, postea colliquans diarrhoea sequitur, vires collabuntur, & mors his malis finem imponit. Mirum videri posset forte, quod morbus ab acida acrimonia natus, desinat in diarrhoeam putridam. Sed gangraenescentium tandem viscerum tabus per alvum fluit, & praeterea caseosa lactis pars, licet primo acescat ob copiosum admistum serum, ex sua tamen natura in animale indolem vergit. Caseus enim antiquus putrescit, acris fit: imo, licet nondum putruerit, igni impositus funditur instar cornu, & similem ingratum nidorem spirat, ac partes animalium solent, dum comburuntur. Sed & Chemico examine caseus similia producta dat, ac ex partibus solidis, & fluidis animalium per ignem prodire solent.

Saepe tamen non eo usque adolefcit malum, sed prius pereunt convulsi; dum acre acidum intestina rodit, & totum systema nervorum adeo mobile in hac aetate irritat. Unde Hippocrates (in textu §. 712. citato) monuit: *Pueris vero convulsiones fiunt, si febris acuta fuerit, & venter non dejiciat, & vigilant, & perterreantur, & ejulent, & colorem immutent, & ex viridi pallidum, aut lividum, aut rubrum colorem induant. Haec autem promptissime accidunt puerulis recens natis ad septem annos usque.* Alvus stricta retentam materiam

riam indicat, & reliqua mala doloris signa sunt. Unde & alibi (y) similia leguntur: *Puerulis febris acuta, & alvus suppressa, cum vigiliis, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborem habere, convulsorium est.* Dum enim torminibus ventris corripuntur infantes, pedibus calcitrant perpetuo. Convulsiones etiam praefagiunt mirae rotationes bulborum oculi, quae & sub palpebris clausis apparent: adsunt quoque illi meticulosi quasi adspectus versus custodes suas, mox vomendi nixus sequitur; & post hunc convulsio.

§. 1356. **Q**uae curantur Antacidis fixis, Purgantibus permistis, Clysmatibus similibus, Carminantibus blandis, Oleosis internis, externisque.

Acida acrimonia tuto domari potest remediis absorbentibus, uti antea dictum fuit; verum hoc in casu non sufficiunt illa, sed praeterea requiruntur talia, quae possunt concreta illa caseosa sic solvere, ut facile per pylorum exire, & dein per intestinorum anfractus transire queant. Simul prodest lenis stimulus purgans, ut facilius, & citius per alvum expellantur.

Cum autem per acidum concretio colostri caseosi augeatur, hinc antacida fixa, sales nempe alcalini, laudata fuerunt, ut & acidum destruendo, & solvendo illa, quae per acidum concreverant prius, prodesse. Unde Hoffmannus (z) adeo laudavit *usum pulverum absorbentium, oleo tartari per deliquium imbibitorum; si cum aequali portione rhabarbari, addita una, vel altera guttula olei anisi, vel foeniculi, vel etiam pauxillo croci, misceantur, & crebrius offerantur.*

Directis tamen experimentis constitit (a), oleum tartari si lacti admisceatur, illud coagulari, & secedere in massulas coagulatas, quamvis haud adeo magnas, compactasque, ac ab acido, nec tam facile durescentes. Praeterea, si lacti per acida, vel per coagulum coagulato, & fervido, alcali admisceo, videtur, non esse verum, quod ubique asseritur, resolvi illud coactum in antiquum liquidum rursus, & resolvere alcalia, quae ab acidis erant densata. Cum ergo antacida illa fixa habeant acrimoniam satis notabilem, quae nocere posset, nisi statim acido occurrens per illud mitigaretur, neque tamen vi solvendi concreta per acidum se commendent, plures Medici maluerunt innocuis absorbentibus remediis acidam acrimoniam domare, & simul adhibere talia, quae vi solvente concretum colostrum pollent, ac blanda sunt.

Tria imprimis laudari solent remedia in hunc usum. *Bilis, ovi vitellus, sapo ex oleo presso, & sale alcalino fixo paratus.* Bilis, si bona fuerit, & copiosa satis in infante, coagulatum in ventriculo lac solvit, dum ipsi in intestino duodeno miscetur. Coagulum lactis in primo vitulorum ventriculo copiosum reperitur; post bilem admistam autem sic solvitur denuo, ut in quarto horum animalium ventriculo dispereat. Ubi ergo a coagulo lactis

t 2

nata

(y) Coacar. Praenot. n. III. Charter. Tom. VIII. pag. 858. (z) Med. ration. & systemat. tom. 2. pag. 341. (a) Herm. Boerh. Chem. tom. 2. pag. 302. 303.

nata symptomata apparebant, concludebant Medici, bilem vel copia deficere, vel nimis inertem esse, ut munere suo rite fungi possit: nihil autem in tali casu magis congruum videbatur, quam bilem in alio animali sano paratam, in corpus infantis ingerere: amarities difficultatem pariebat quidem, & hinc clysmatibus miscebatur. Sed & fel bubulum leni igne inspissatum in officinis præstat, ex quo, addito pauco croci pulvere, conficiuntur parvae molis pilulae, rite deaurandae, quarum aliquot semel, aut bis de die, crassiori pulticula tectae, dantur: succedit hoc quandoque satis feliciter; imprimis si voraciores infantes deglutiant cito, antequam maceratae in pulticula pilulae solvi incipiant.

Simili artificio vesiculam fellis, bile sua plenam, ex anguilla pisce desumptam, adhibuerunt quidam. Cum autem hoc animal dentibus careat, & feliciter digerat, creditur, magis actuosam bilem a natura ipsi concessam fuisse. Simul & ideo placebat, quod meraca haec bilis, nullo igne mutata, proprio folliculo contenta, dum deglutita in ventriculo haeret, sensim stillaret per ductum angustum, & sic contentis in ventriculo misceretur.

Vitellus ovi, uti notum est, olea, & balsama nativa, si cum illis misceatur, reddit apta, ut in aqua dilui possint; imo & resinarum tenacitatem frangit: hinc laudatur ad solvendum lactis coagulum, quod praeter caseosum colostrum, & pinguem butyraceam lactis partem continet, quae per vitellum ovi commode solvi potest. Simul nullam acrimoniam habet vitellus ovi, & blandum nutrimentum dat.

Quando sal alcalinus per calcem vivam admistam acrior redditus, cum oleo presso coquitur, addita aqua, fit perfecta unio salis alcalini cum oleo, & ex hac unione prodit massa alba, consistens, scissilis, in aqua perfecte solubilis, quae nec in aëre sponte deliquescit, nec acrem alcalinum saporem linguae exhibet. Vocatur tunc sapo (b); qui eo melior, & usibus medicatis aptior censetur, quo alcali purius, & oleum magis sincerum fuerit, nec odore, & sapore ingratum. Manet in hoc concreto antiqua salis lixiviosi vis, qua detergit, glutinosa attenuat absque rosionis metu. Obstat acidis, ne cogant chylum, vel lac; imo & his, acido densatis, iterum resolutionem affert; quod sales alcalini soli non faciunt. *Facit sapo, quod aqua nequit, quod oleo negatur, id praestat. Efficit tuto, quod alcalia cum periculo. Potest exsequi, quod reliquis salibus nefas.*

Novimus autem per certas, & numerosas observationes, saponem Venetum larga quantitate posse ferri a corpore humano absque ulla noxa. Unde nemo mirabitur in *Materia Medica* ad hunc numerum binas saponis drachmas, addita dupla copia vitelli ovi, dilui in quatuor unciiis aquae, & cochleatim dari infantibus: adduntur *rhabarbarum*, *cancrorum lapides*, & pro edulcoratione mollis *de Althaea* syrupus. Convenit autem dare talem saponis quantitatem, dum tensio ventriculi, & abdominis indicant, copiam densi colostri in ventriculo, & intestinis collectam haerere. Solent tunc brevi post per alvum
pro-

(b) Herm. Boerh. Chem. tom. 2. pag. 257. & seq.

prodire massulae caseosae, primo albae, dein rhabbari colore parum tinctae, cum insigni levamine, & abdominis detumescencia. Lenis *rhei* purgans stimulus per totum tractum intestinorum saponis vim solventem promovet, una cum pulveribus absorbentibus, qui acidum, cui occurrunt, domant. Sic pulcherrime omni indicationi haec methodus respondet.

Talia remedia ad solvendum, & expellendum colostrum requiruntur: sed longe minor saponis copia sufficit ad cavendam nimiam lactis in ventriculo coagulationem. Antea, ubi in cura *Phthiſeos*, & ad *Podagrae* tormenta lenienda, lactis usus commendabatur, suusum fuit, ut lactea diaeta utentes sumerent mane sex, vel octo grana saponis in hunc finem.

Si malevolus quis, rustico nocere volens, drachmam tantum saponis immittat magno vasi, in quo lac valide, & perpetuo agitari solet, ut butyrum inde separetur, vel nulla omnino, vel difficulter admodum fit separatio partium, quae lac constituunt. Unde recens natis per aliquot septimanas bis, vel ter de die unum, alterumque cochlear similis mixturae dari, curavi, in qua tantum quindecim, vel viginti grana saponis soluta erant. Sic metuendum lactis coagulum, & acidam acrimoniam, cavere potui, semper optimo cum successu.

Eidem scopo serviunt clysmata, quae saponem habent, aut bilem, ut nempe solvatur, & educatur simile colostrum, si in crassis intestinis haeserit. Formulae in *Materia Medica* ad hunc numerum pariter habentur.

Carminantia, id est, flatus discutientia, remedia sola possunt prodesse, quae blanda sunt; de quibus videantur illa, quae habentur ad §. 650., ubi de *Ructibus*, & *Flatibus* agebatur. Causa enim irritante emendata, vel expulsa, omnis illa flatulentia cessat.

Olea interne data quid efficiant, & qua cum cautela dari debeant, ad §. 1348. dictum fuit. Externo usu, una cum molli frictione, prodesse possunt; sed si calida, & aromatica olea huic usui adhibeantur, debent refracta dosi, vel aliis mollibus oleis mista applicari, ne tenera infantum cutis inflammetur, & magnas pariat molestias.

Ubi autem in infantibus acida acrimonia dominatur, tunc convenit nutricis dietam sic dirigere, ut lac ejus minus in acescentiam pronum sit; de qua re videantur illa, quae ad §. 66. dicta fuerunt.

§. 1357. **I**nsultus porro Epileptici hinc plerumque originem ducunt, irritato genere nervoso ope acrimoniae vellicantis.

In infantibus caput maximum est, totum corpus molle, nervi tenerrimi, & a levioribus etiam causis valide afficiendi. Ideo sollicita natura cavit, uti antea dictum fuit, ne a vivida luce oculi, a valido sono aures affici facile possent. Non mirum ergo, si ab acrimonia acida vellicante genus nervosum irritetur, & motus Epileptici sequantur, qui non tantum ob instans mortis periculum metuendi sunt, verum etiam, quia, licet evaserint infantes, saepe tristissima mala per totam vitam supersunt. Membra distorta,

ta, luscitatem, surditatem, loquelam deperditam, fatuitatem perpetuam, funestas convulsionum sequelas fuisse, docent numerosa observata.

Unde merito *Celeberrimus Hoffmannus* (c) dixit: *Morbi, infantibus tenellis, & pueris quoque proprii, infestant maxime caput, inque ejus parte, tam externa, quam interna, fixam suam sedem, & domicilium habent: quod deinde recensione plurium morborum infantilium probat.*

§. 1358. **U**Nde & his remediis solis curantur, si medelam capiunt.

Nugantur hic imprimis mulierculae, dum *corallia rubra, ungulam alcis, dentes lupi*, & nescio quae amuleta ex infantis collo suspendunt: interim talia facile tolerat Medicus, modo iis contentae non impediunt efficaciorē medelam, quae sola his malis profligandis prodest, de qua dictum fuit. Sed non semper haec mala superari possunt, praecipue, si jam provecta nimis haec sint; dum infantum custodes multa nugacia tentare soleant, priusquam Medici implorent opem. Vidi post mortem ventriculum distentum ingenti caseosa mole, & adeo plenum, ut nec alimentum, nec medicamentum recipere posset: vidi colostrum durum, cunei instar pyloro intrusum, sicque omnem exitum ex ventriculo impedientem, lethales fecisse convulsiones.

Disputaverunt Medici, an Infanti, quamdiu ubera ducit, conveniat alios etiam cibos porrigere. Quidam summopere noxium crediderunt, si una cum lacte juscula carniū, panatellae, vel similia ingererentur, & credebant, bonam digestionem inde impediri quam certissime.

Recens natis lac maternum, vel nutricis sanae omnium maxime congruum dat, & sufficiens alimentum, neque videtur conducere, ut alio praeter hoc alimento utantur. Circa tertium mensem solent semel, vel bis de die unum, alterumve cochlear lactis vaccini cum pauca farina leviter cocti dare, non adeo, ut augeatur nutrimenti quantitas, vel robur, quam potius, ut sensim assuescant ex cochleari alimentum fumere. Primis enim diebus, dum hoc tentatur, pusilli pulticulam talem ore volvunt, sed maximam partem expuunt, & parum deglutunt. Usus habet hoc tentasse, ut ali possit commode infans, si matri, vel nutrici quid sinistri contigerit, quod per aliquod tempus lactationem suspendit, licet nondum omnimoda ab lactatio requiratur. Sic v. g. si nutrix subito, & valido animi affectu corripitur, non sine periculo hoc tempore lac haurire poterit infans, sed per aliquot horas expectandum est, donec omnes illae turbae sopitae fuerint prius. Certa enim observata docuerunt, subito convulsos fuisse infantes, si ira furoris, vel metu fere enectae, nutricis ubera ducerent.

Nocet certe pulticulis talibus implere ventriculum infantis, qui avide copiosum lac ex uberibus haurit, ut scilicet plus nutriatur: gravatur enim tunc ventriculus, & multa mala sequi possunt, praecipue si copiosa farina addita,

(c) *Medic. ration. system. Tom. II. pag. 340.*

addita, diu coquendo, spissas pulticulas conficiant, quae viscido lentore gravant magis, quam nutriunt. Notari simul meretur, quod farinae magna diversitas in variis regionibus inveniatur. Memini, me lectissimam farinam in itineris usum mecum tulisse ex patria, cujus partem residuam dum compararem farinae Austriacae, manifeste vidi, Batavam farinam longe viscidiorum esse Austriaca. Si ex *Malta* parata farina adhiberetur, illa minorem lentorem haberet: notum enim est, frumenti grana, aqua respersa, in tepido loco, brevi germinare: simul ac germinatio incepta est tantum, valido calore exsiccantur subito haec grana, & tunc vocatur *Malta*; quae cerevisiae parandae inservit. Per inceptam hanc, & mox suffocatam vegetationem lentor farinosus insigniter minuitur (*d*). In pane per inceptam fermentationem, quae mox clibani calore supprimitur, idem obtinetur; hinc panis, intritus lacti calido potius, quam coctus, iisdem usibus fervire poterit.

Sensim enim, auctis infantis viribus, ejus ventriculus sic firmatur, ut praeter lac & alios cibos digerere possit: sed ita incipitur a levioribus, & quae magnam similitudinem cum lacte, quod ex uberibus ducitur, habent; sic enim lac animalium lacti humano miscetur. Multi infantes hanc dietam facile sustinent ad ablactationem usque; &, postquam ablactati sunt, similibus pulticulis adhuc satis commode nutriuntur, praecipue, si ex pane bis-cocto parentur, qui omni lentore farinoso caret, & lacti aequabilissime unitur; in quo & vitellum ovi diluere solent.

Multi jubent, omnino abstinendum esse a lactis usu, simul ac aliis alimentis uti incipit infans (*e*); adeoque incongruum videretur, vitellum ovi miscere lacti, cum ad regnum animale pertineat. Bona fide affirmare possum, me nullum unquam damnum observasse, & saepe vitello ovi usum fuisse, uti §. 1356. monui, ad tollendam nimiam coaguli lactis in ventriculo cohaesionem.

Omnes mutationes subitae in victu, sanorum etiam, & robustorum hominum, suspectae sunt; adeoque videtur minus tutum, si ablactationis tempore, simul, & semel omne lac repudietur, nisi ipsa sub lactatione sensim aliis cibis assueverit infans. Fatetur ipse egregius vir (*f*), vegetum colorem mutari, & macilentiores fieri, dum ablactantur, subita tali victus mutatione facta. Credit, per ablactationem infantibus conciliari morbum, sed talem, qui si rite tractetur, suos usus habet in generali vitae Oeconomia. Fateor, mallem sanitatem illibatam pergere, quam turbari per ablactationem: hinc solitus fui, post sextum mensem, & quandoque citius, si lacticia fastidire inciperent (quod in quibusdam contingit), panatellas cum jusculo pulli, vel & vitulinae carnis paratas porrigere bis de die; sed in initio tantum parca copia simul; attentus eram semper, an quid invenirem mutatum in sanitate. Hoc unicum notavi, quod faeces alvinae magis fusci coloris fierent, simul ac carniū jusculis uterentur; caeterum nil mali observavi,

(*d*) Brouzet Essays sur l'Educat. Médic. des Enfants Tom. I. pag. 215.

(*e*) Ibid. pag. 270. (*f*) Ibid. pag. 259. 260.

fervavi, licet tot regiarum prolium curam gesserim, ad omnia ratione muneris attentissimus. Omnes ablactationem facile tulerunt. Adstipulatur & Hippocrates (g), dicens: *Qui dum lac sugunt, interea cibum capiunt, facilius ablactantur.*

Hinc non videtur adeo metuendum esse a lactis miscela cum aliis cibis ex carnis succo paratis: imo antea notatum fuit, lactis partem crassiore, caseum nempe, magis animalis naturae esse, quam serum, & butyrum, quibus miscetur. Imo multis in more est, ut post ablactationem & lacte animalium, & jusculis utantur, absque noxa sensibili: sic sensim pusilli assuecunt vario victus generi.

Interim in ciborum delectu post ablactationem attendendum est ad aetatem infantis, & robur. In votis habuerunt Medici, ut ablactatio non tentaretur, antequam dentes adsint numerosi, & firmi satis, ut solidum magis alimentum non tantum dividere, sed etiam diligenter manducare possint (h); tuncque commendant, ut rarius infanti porrigantur ubera, sed alii cibi offerantur, ut sic sensim ablactetur.

Verum aliquando contingit, ut nutrici per morbum, vel sponte lac deficiat, antequam dentes satis numerosi emerferint; tunc animalium lac, si alia nutrix haberi nequeat, substituendum est: vaccinum si detur, aquae quarta parte diluitur, & pauculo saccharo addito, dulcedo ipsi conciliatur, ut lacti humano reddatur similis. Solent quandoque talem miscelam infundere vasi stanneo, cujus apex, molli corio tectus, papillae molem, & figuram refert, pluribusque foraminibus pertunditur, ut infans facile sumat: si plus aquae misceatur, potus loco servit. Simul tunc puliculae, de quibus ante dictum fuit, dantur subinde: sic pergitur, donec dentes numerosiores, & firmiores adsint, qui indicant, parum solidiorem cibum nunc concedi posse. A saccharo autem lacti addito nihil mali metuendum est (i). Veteres Medici mel, & mulsam dederunt etiam recens natis infantibus: imo, saccharo addito, minus fortiter coagulatur lac. Miratus fui quandoque Medicos, severe omnem sacchari prohibentes usum, dum eodem die syrupos ex saccharo paratos praescribebant.

Quoad tempus ablactationis, in genere statuitur, tunc illud adesse, dum copiosi satis, & firmi dentes prodierint: cum autem hoc omnino variet in diversis infantibus, illud exacte determinari nequit. Vidi, uti ad §. 1359. monui, abortum quinque mensium, cui bini dentes incisores in maxilla inferiori manifeste prominebant. Vidi sanam, & vegetam puellam, cui decimo nono mense primus dens erumpebat. Circa septimum mensem solet frequentius incipere dentitio; & incisores primo prodeunt in utraque maxilla. Saepe contingit, ut molares dentes, minores nempe, caninis proximi, prodire incipiant, antequam octo dentes incisores proruperint omnes. Post hos sequi solent canini, sed tardius. Cum autem dentitionis tempore saepe gingivae

(g) De Dentit. Charter. Tom. VII. pag. 872.

(h) Moschion apud Spach. gynaec. pag. 10. n. 113. Harmon. gynaec. part. prior. cap. 22. pag. 18.

(i) Brouzet Educat. Médic. des Enf. Tom. I. pag. 273.

gingivae pruriant, doleant, tumeant, magnum solamen habetur, si hoc tempore infans ubera nutricis ducere possit, cum cochlearis attractum dolentes gingivae ferre vix possint; unde prolongatur ablactatio, prout serius, vel ocyus dentes erumpunt. Cum autem saepe dentium incisivorum octo, quatuor molarium, & quatuor caninorum, octodecimo mense absoluta sit eruptio, suaserunt Medici (k), ut post sesquiannum, vel biennio absoluto, tentetur ablactatio. Vix autem quid metuendum videtur pro infante, si diutius nutricis ubera ducat. Fortissima mater, dum crudelem Antiochum irridens ultimum natu filium hortaretur, ut pro patria lege strenue martyrium ferret, dixit: *Fili mi, miserere mei, quae te in utero novem mensibus portavi, & lac triennio dedi, & alui, & in aetatem illam perduxi* (l).

Post ablactationem tamen non statim infantibus exhibenda sunt quaevis, etiam duriora, edulia; a mollioribus sensim incipiendo, ad solidiores cibos procedendum est, ut sensim viscera his assuescant. Ciborum avidi sunt, imo satis voraces, si sani fuerint; &, licet dentibus satis valeant, oblatos cibos vix manducant, sed illico deglutiunt. Apud plebejos moris est, ut parentum mensae adsint, qui infantum voracitate delectantur, & obvia quaevis porrigunt edulia. Ingeruntur haec quidem, sed non digeruntur: infarctum abdomen tumet quidem, sed totum corpus emaciatur, & saepe cachectici pereunt.

Nitiditas autem quam maxime requiritur, ut tota cutis terfa semper sit, neque diu maneat conspurcata faecibus, aut urina; inde enim cutis rubores, & erosiones molestissimae metuendae sunt. Sed & cutaneis morbis infantes frequenter obnoxii sunt, dum sordes in cryptis cutaneis collectae manent, quae molli abstersione, spongiis aqua tepida, & lacte plenis tolluntur; & cum bis de die hoc fiat, cavetur, ne similia imposterum facile colligantur in cute. Observatum fuit, infantes feliciter nutriri, & crescere, si haec mundities rite observetur (m). Balneis, ex aquae, & lactis partibus aequalibus paratis, atrophicam puellam feliciter curavit *Fischerus* (n).

Profuit e gelida tantum aqua lavare infantes, & sensim assuefacere, ut frigidam lavationem ferant: multum enim sic roboratur corpus, & postea a tempestatum mutationibus non facile adficitur (o). In genere mollis nimis educatio, & superfluae illae cautelae, quae a nimis sollicitis matribus imperantur, infirma reddunt corpora, ita ut postea minimam in sex rebus non naturalibus mutationem sentiant. Galliae Regina, cum plures proles anxia nimis educatione perdidisset, ex Medicorum consilio infantiam *Henrici quarti* rustico commisit, voluitque, ut eodem victu, & vestitu uteretur cum rustici prolibus: sic robustus, agilis, laborum tolerans evasit. Ita saltem fert constans traditio (p).

(k) Aeginet. Lib. I. Cap. V. pag. 2. versa. Mosch. apud Spach. gynacc. pag. 10. n. 113.

(l) Machab. Lib. II. cap. VII. vers. 27.

(m) Aët. Erudit. 1727. pag. 526.

(n) De remedio rustic. variol. per balnea &c. curand. pag. 30.

(o) Tissot avis au peuple sur sa santé §. 340. pag. 389.

(p) Brouzet. Educat. Médic. Tom. I. pag. 329.

§. 1359. **S**imul ac haec superarunt mala infantes, & incipiunt uti cibis crudis, fructibus horaeis, carnibus, caseo, similibusque, Vermes oriuntur.

Postquam ab uberibus remoti sunt infantes, & communi adulatorum victu uti incipiunt, prudentia suadet, ut gradatim solidioribus cibis adsuescant, & primo talia exhibeantur fercula, quae facilis digestionis sunt.

Frequenter observatum fuit, hoc aetatis tempore infantes verminosos esse: unde *Hippocrates* (q), postquam recens natorum, & dentientium morbos recensuerat, dixit; inter alios morbos, illis jam adultioribus factis contingentes, numerari lumbricos rotundos, five teretes, & Ascarides. Taeniam in hoc loco non memorat; quia videtur credidisse, hunc vermem homini coaevum esse, uti postea dicetur. Voluit *Galenus* (r) in Commentariis ad hunc Aphorismum, illos vermes, non ex semine, sed ex putredine gigni; praecipue si calor major simul accedat; & ideo putavit, in adultioribus jam vermes potius gigni, quam in recens natis, & lactantibus, quia major in his calor adest.

Satis quidem verosimile videtur, in adultioribus, communi adulatorum victu jam utentibus, frequentius observari vermes; sed tamen negari nequit, in lactantibus, & quandoque in recens natis vermes inventos fuisse. Celebris Medicus *de Lille* (s), in propria filiola, undecim hebdomadas nata, integros vermium nidos observavit, licet mater illi praeter ubera nihilum adhuc, neque lac coctum quidem, praebuisset: cum autem vermium symptomata plurima ab ipsa nativitate in hac filiola observasset, vix impedire potuit, quin crederet, vermes congenitos fuisse.

Plures observationes foetuum, vermes in intestinis habentium, dum in utero materno adhuc haerebant, collegit egregius Medicus *van Doeveren* (t); cuius Dissertatio legi meretur quam maxime.

Honesta, & ingeniosa matrona, filium trimestrem lactans, mihi testata fuit, se saepius vidisse, parvos vermes ex ano filii prodiisse.

Quamdiu infans ubera ducit, lac nondum expositum aëri haurit; postquam cibos aëri expositos sumit, possunt ova insectorum una cum his facilius in corpus venire; imprimis, si crudi assumuntur, & non cocti. Fructus horaei toties verminosi inveniuntur; caseus saepius minimis vermiculis non tantum, sed etiam majoribus scatet. Novi olim hominem, qui simul ac caseum album manducaret, bidui tempore post molestem pruritum ab ascaridibus copiosis, circa anum sentiebat: erat ille caseus, qui ex toto lacte, non separata prius parte cremoracea, conficitur; hinc pinguis satis est, & sapore gratus. Si abstineret a talis casei esu, vel alia casei specie uteretur, brevi cessabat molestus ille pruritus, nec amplius apparebant ascarides.

Hinc

(q) Aphor. 26. sect. 3. Charter. Tom. IX. pag. 121.

(r) Ibid. pag. 122.

(s) De cordis palpitatione pag. 133.

(t) Dissert. Inaugur. de verm. Intestin. ho-

min. Lugd. Batav. 1753. pag. 31.

Hinc non mirum videtur, ab ovis assumtis excludi animalia, cum calor, & humiditas faveant exclusioni. Sed manet tamen illa difficultas, quod extra corpus humanum non sint adeo obvii vermes humani, ut certo constare possit, ab ovis horum ingestis frequenter adeo observatos vermes produci; de qua re sequenti paragrapho dicetur.

§. 1360. **C**ausam dant ova insectorum, in aëre, vel terra viventium, assumpta, neque vi tenelli motus destruenda.

Antea, ut notum est, credebatur ex putrefactione vermes, & alia animalia nasci posse, imprimis insecta. Postquam autem summorum virorum industria detecta fuit mirabilis, & artificiosissima insectorum fabrica, facile patuit, impossibile esse, ut ex putredine informi exurgeret animal, quod adeo multiplices, adeo diversas, adeo miro ordine dispositas partes haber, numero, & situ semper easdem in eadem specie. Unde penitus evuluit haec sententia. Veterum opinioni forte ansam dederat, quod in putridis, vel cito, & facile putrescentibus ova sua deponerent insecta frequentius, ut & calore, putredinem comitante, foverentur, & ex ovo prorepens vermiculus paratum inveniret nutrimentum. Sic fervida aestate circumvolitantes muscae carnibus animalium mactatorum imponunt ova sua, & citissime quidem: gravida musca turgido abdomine quingenta, quandoque & plura ova continet, quae paucio tempore in obvias carnes distribuere novit; sicque hominum cibos vermibus brevi nascituris foedat. Cum autem plurimorum animis haec opinio insedit, vermes putredinem comitari, hinc detestantur carnes, si vel unicum vermiculum in illis invenerint. Certum tamen est, teneras, & sapidissimas carnes a muscis eligi, in quibus ova sua ponant: sic & optimorum fructuum selectum facere noverunt, ut in molli pulpa tuto ova collocent.

Nec viventibus parcunt animalibus, sed cavo aculeo, ovum continente, cutim perforant, sub illa ovum deponunt; vermiculus ex ovo emergens rodit domicilii sui parietes, inflammat locum, pure, inflammationem sequente, nutritur, crescit, mutatur in chrysalidem, ex qua prodiens musca cutim perforat, avolat. In vaccis observata fuerunt talia apostemata saepius.

Sed & in cervorum, & ovium nares ingrediens musca, ova in his cavis deponit. Alia muscarum species equos circumvolat, & dum hoc animal alvum egerit, per anum intrat, antequam ani sphincter claudatur, lateribusque intestini ova sua affigit. Innumerae artes sunt, quibus insecta prospicere noverunt progeniei, ut commodum locum, teporem requisitum, & obvium nutrimentum procurent; de quibus videri possunt illa, quae *Svammerdam*, *Valisnieri*, *Redi*, *Reaumur*, *Lionnet*, *Bonnet*, & alii incomparabili industria, & improbo labore collegerunt.

Cum jam in aqua toties minimorum animalculorum myriades detegerentur, & in aqua, ubi nulla microscopiis detegebantur talia, si aëri exponeretur, vel, cum plantarum partibus infunderetur, post ingens horum numerus occurreret, hinc conclusum fuit, aërem, quem haurimus, viventibus

bus plenum esse. Cum autem & terra scateret his, minus mirum videbatur, cur horum ova, quorum ingestio inevitabilis omnino videbatur, pullularent etiam in corpore.

Postquam autem summorum virorum indefessa industria detexerat sexus diversitatem in insectis, & copulam, in aliis utrumque sexum, quæ tamen cum sibi similibus duplici coitu uniebantur, dum quaedam vivos foetus ponerent, plurima essent ovipara, credebatur universalis lex esse, ut vel vivo partu, vel ovis depositis, propagarentur insecta. Unde concludebatur vel ex insectis vivis minoribus deglutitis, vel illorum ovis corpus nostrum ingressis, vermes in corpore humano produci. Cum autem & in viviparis animalibus ova, & ovaria detecta fuissent, hinc statuebatur satis unanimiter, *omne animal ex ovo esse.*

Verum reservatum erat ingeniosissimo, & naturalis historiae amantissimo, viro *Trembley*, alium propagationis insectorum modum videre (u). Viderat in aqua aliquod corpusculum, nudis oculis facile conspiciendum, semen *cardui benedicti* non inepte mole, & figura referens, de quo dubitabat; an ad vegetabilium, an vero ad animalium classem pertineret. Sedulo examine constitit, in motum localem habere illud corpusculum, cirrhis emissis, vermiculos in aqua natantes arripere, arreptos ori admove, & deglutire: unde merito conclusit, animal esse, & *Polypum* vocavit, cum & cirrhis, & reliquo corporis habitu *Polypum piscem* referret.

Novo hoc spolio laetus mirabatur, ex corpore hujus animalculi nasci alium *Polypum* similem, eodem modo, ac rami de trunco arboris prodeunt, cito crescere; & parenti adhuc haerentem cum illa de praeda certare. Sperabatur quandoque sponte a matre *Polypus*, & vivus natabat, vermiculos devorabat, digerebat, egerebat. Quandoque & matri adhuc cohaerens similem progeniem simili modo producebat, quæ, calida tempestate, brevi aequæ foecunda erat, ac mater, & avia. Sic miro spectaculo ramosus *polypus* medium quoddam inter animale, & vegetabilem familiam avidis monstrabat oculis, dum motu locali, & praedam sectando, animal, propagatione plantam referret. *Polypus* enim ex *polypo*, uti ramuli ex truncis plantarum crescebat.

Sed & longe magis mira inventa fuerunt. Dum medius secabatur *Polypus*, ex capite nova crescebat cauda, & novum caput emergebat ex caudæ extremo, quod trunco cohaeserat: eadem reproductio succedebat, si secundum corporis longitudinem bifariam scinderetur *Polypus*. Hanc divisionem, & subdivisionem eo usque produxit egregius *Trembley*, donec ex uno *Polypo*, in sexaginta quatuor partes diviso, totidem novi producerentur. Praeterea dexteritate summa, non facile ab unoquoque imitanda, totum *Polypi* corpus invertit, ita ut interior tota corporis superficies foret exterior, & contra exterior occuparet interiora: adeo vexatum hoc animal oblatam praedam devoravit, ut ante, & novis foetibus pullulantibus ramosum postea apparuit.

Plu-

(u) Mémoires pour servir à l'Hist. d'un genre de Polype d'eau douce.

Plura ex his stupendis propriis oculis vidi, dum ipse harum rerum primus inventor solita sua humanitate mihi demonstraret; quaedam, tanti Praeceptoris vestigia sequens, licet impare gressu, imitari conatus fui. Postea & in aliis majoribus infectis similia tentata fuerunt, & non sine successu, in lumbricis terrestribus, hirundinibus, &c. licet non adeo foecunde, ac in Polypis.

Saltem inde discimus, ne tam facile generales regulas statuamus, quamvis numerosis observationibus fultae videantur. Forte enim numerosiora adhuc nos latent, quae contrarium evincunt. Plantas ex seminibus propagari constat; sed non unica est in plantis propagationis methodus: per corticem, ramos, folia, radices multiplicationes plantarum obtineri possunt; licet & feliciter eadem ex seminibus crescant. Notum est, radices quarundam plantarum in partes dissectas, terrae fertili commissas, novam dare progeniem. Aloë, prolifera dicta, uti propriis oculis vidi in horto *Augusti Imperatoris*, caulem ramosum ingentem educit, florigerum; delapsis floribus, millenae novae plantulae in caule ramoso apparent; quae, sponte delapsae, speciem laetissime propagant. Sicut jam in plantis non unus, sed plures propagationis modi sunt, an non in regno animali idem obtinere poterit? Certe Polypus non per copulam redditur foecundus; sed in se ipso, & in singulis dissecti corporis partibus vim producendi sui simile habet. Observaverunt celebres viri ante laudati, quaedam infecta esse vivipara aestate, autumnos ovipara: inventa fuerunt alia, quae foecunda erant, & vivos foetus pariebant absque ullo commercio cum aliis: egredientes ex matris alvo foetus, statim remoti, solitarii, vitro tecti, servabantur caute, & tamen suo tempore vivos foetus pariebant: nova haec proles simili modo custodiebatur solitaria, & tamen foecunda erat; idem experimentum successit per plures successivas generationes.

Forte haec, & alia plura, quae a tantorum virorum industria sperare licet, majorem lucem aliquando affundent generationi, & propagationi vermium in corpore humano. Haec obiter hoc in loco monuisse sufficit, postea enim ad §. 1363. de hac re quaedam adhuc dicenda erunt, ubi de vermibus in corpore humano maxime obviis agetur; qui nempe in primae coctionis viis inveniuntur.

Cum tantus infectorum numerus sit, & tam facile minora, vel & majorum ovula, cum aëre, cibis, potibus in corpus humanum venire possint, non adeo mirum videbatur, in ventriculo, & in intestinis vermes frequenter inveniri. Sed major difficultas visa fuit, dum & in aliis corporis locis inveniebantur, ad quae non intelligebatur adeo facilis aditus. Dum *Rayschius* (vv) non tantum in hepate, in ductu cystico, poro bilario, & vesica fellea ovium (ad quae loca minus difficilis via vermibus ex intestinorum cavo videtur), vermes inveniebat; verum etiam frequenter in canum renibus, & semel in humanis renibus illos viderat; imo etiam in arteriis viventium equorum, & apud
magni

(vv) Observ. Anatom. Chirurg. n. 64. pag. 62.

magni nominis auctores legerat, etiam in cerebro vermes fuisse repertos; fatetur, quod dubitare coeperit, *an omnia ex ovo generentur, uti Harveus, ejusque sectatores volunt.* Cum autem ventriculi, & intestinorum actione solidiores etiam cibi tantam mutationem patiantur, fatebatur, se intelligere non posse, quomodo tenera insecta, illorumve ovula, horum viscerum actionem experta, potuerint manere integra. Addebat & hoc argumentum, *quod nullus mortalium unquam ejusmodi vermes extra corpus viderit;* de qua re postea dicetur: interim in figuris *Ruyfchii* delineat taeniam expisce desumptam (x). Videri possunt & illa, quae de vermibus alia occasione ad §. 916. dicta fuerunt.

Sed & veteres Medici de vermibus agentes, videntur ambigui haesisse; imprimis de taenia, quae cum magnam adeo longitudinem quandoque acquirit, ut fere intestinorum omnes gyros aequare posse videatur, dixit *Aëtius* (y); *Est autem latus lumbricus, si ita dicere libeat, permutatio pelliculae, intrinsecus tenuia intestina ambientis, in corpus vivum quoddam, quod continuos stomacho morsus infert, & ad cibos incorrigibilem appetitum.*

Mirae habentur observationes de vermibus in diversis corporis locis inventis. Celebris *Du Verney* (z) refert, infantem quinque annorum semper conquestum fuisse de dolore valido circa nasi radicem: per tres menses decubuit febre lenta: dein validae convulsiones secutae fuerunt: post mortem inventus fuit in sinu longitudinali cerebri vermis, quinque circiter pollices longus i lumbrico terrestri similis. Credi forte posset, quod fuerit concretio polyposa; qualis satis frequenter in hoc sinu invenitur; quae vermis specie fallere potuisset: sed addit, quod vermis ille a sexta matutina ad tertiam pomeridianam usque vixerit. Videtur fuisse de teretium genere, qui lumbricis satis similes apparent.

Apud *Baglivium* (a) in epistola ad celeberrimum *Andry* scripta, legitur de homine quadraginta annorum, qui de repente laborare coepit doloribus stomachi, & partium vicinarum vehementissimis; hi per octo dies perdurarunt: postea diu, noctuque singulo semiquadrante horae convellebatur leviter toto corpore, sed momento temporis tantum, cum pallore vultus, & virium prostratione. Afflicto per octo dies his malis misero aegro, derepente quieverunt omnia per duas circiter horas; quibus vix elapsis, supervenit dolor stomachi, ac pectoris tam crudelis, ac vehemens, ut ejus vi paullo post perierit. Dicebat ante mortem miser, cor, & ventrem sibi veluti a canibus lacerrari. Aperto cadavere, inventus est in cavitate pericardii vermis niger, pilosus, vivus, palmaris fere longitudinis. Cor erat valde lividum.

Celeberrimus *Senac* (b), cum viderat concreciones polyposas rubras, figuram vermium exacte referentes, vermium in corde, vel cavo pericardii nidulantium historiam in medio relinquit; sed testatur tamen, quod *De Lapeyronie* ipsi

(x) Observat. Anatom. Chirurg. n. 64. pag. 60.

(y) Sermon. 9. cap. 40. pag. 173.

(z) Acad. des scienc. l'an. 1700. hist. pag. 15.

(a) Oper. omn. pag. 699.

(b) Traité de la structure du coeur tom. 2. pag. 437.

ipsi affirmaverit, se in diversis canibus invenisse vermium convolutorum glomeres inter basim cordis, & pericardium; imo & in ipsis cordis ventriculis. Hinc concludit, nullo modo impossibile esse, ut in corde humano similia observentur.

Cum autem cor in pericardio clauso undique haereat, nulli parti corporis nexum, nisi sibi ipsi per vasa, debuit vermis ovum, vel quodcumque aliud statuatur ejus primordium, per vasa huc delatum fuisse: sed quam tenuia haec sunt, quae ex cordis superficie, & pericardii tenui membrana, rorem tenuissimum, cor perpetuo humectantem, exhalant! per tenuiora adhuc vasa debuit transivisse insecti primum stamen, si ab *Adriano Spigelio* in humore vitreo oculi equini inventus fuerit Vermiculus (c).

Verum quidem est, in aquis stagnantibus, in plantarum infusis per microscopium detegi minutissima animalcula, quae, si liquidis nostris mista forent, cum his per minima vasa transire possent. Sed nulla observata docuerunt, minuta haec in tantam molem excrescere posse, ut palmarem v. g. magnitudinem aequarent.

Non mirum ergo videri poterit, si tot difficultates motae fuerint ab exercitatissimis in naturali historia viris contra generationem vermium humanorum ex ovis in corpus ingestis. Hujus loci non est omnia haec singulatim expendere, cum Medico sufficiat novisse signa, quae docent, infestos illos hospites in corpore humano nidulari, praevidere mala, quae inde sequi possunt, & scire methodum, ac remedia, per quae de corpore expelluntur. Caeterum videri possunt illa, quae de his difficultatibus dicta sunt (d). Imprimis apud *Clericum*, ubi harum collectio legi potest. *Svammerdammius* (e), adeo oculatus, adeo sedulus in his rimandis, postquam omnia confideraverat, dixit: *Difficillimum quidem est explicatu, quam ratione vermes in animantibus viventibus generentur &c.: Quantum ad me attinet, fateor ego, tam pauca mihi circa hanc rem experimenta solida suppetere, ut hactenus nihil omnino in ea videam, etiamsi multos, modisque multifariis constitutos, vermes in viventibus, & se moventibus tam terrestrium, quam aquatiliū, & aëreorum animalium corporibus conspexerim. Attamen nihil solidi quidquam, certive hic pronunciare valeo.*

Non mirum hinc, si in diversas sententias abiverint Eruditi viri, dum vermium humanorum originem rimabantur. Quidam putaverunt, vix morbosos vocandos esse vermes. In lacertae Indicae squamosae ventriculi parte superiori inventus fuit faccus plenus vermibus vivis, aciculam longitudine, & crassitie aequantibus, quorum numerus ad millesimum accedebat; nec videbantur morbofi esse, cum in alia Lacerta ejusdem speciei similis omnino faccus verminosus inveniretur. Copia vermium in Tigridis ventriculo inventa pariter fuit (f); quod & recentiora observata confirmarunt. Uti jam singulis

lis

(c) Bonet. sepulcret. Lib. I. sect. 18. Observ. VI. tom. 1. pag. 422.

(d) Académ.

des scienc. l'an. 1709. Hist. pag. 36. Dan. Clerici hist. natur. & Medic. lator.

lumbr. Lib. I. cap. 14. pag. 546. & seq. (e) Bibl. Natur. tom. 2. pag. 708. 709.

(f) Acad. des scienc. l'an. 1703. Hist. pag. 47.

lis animalium speciebus, imo & plantarum certa insectorum species familiaris est, ita suspicabantur, quandam forte utilitatem vermes corpori adferre, vel talia saltem consumere in suos usus, quibus facile carere possumus, sicque nostris impensis quidem, sed absque noxa vivere. Tunc tantum nocituros credebant, si numero nimis aucti, vel alia quacumque de causa deficiente pabulo, vicina irritarent, vel roderent. *Hippocrates*, uti postea dicitur, coevam credidit humano generi taeniam. Interim patebit, credo, ex sequentibus, vermes non adeo innoxios esse; licet negari nequeat, quandoque copiam vermium prodire de corpore hominum, quos nulla signa docuerant, verminosos esse.

Historiae naturalis, & thesauri regii descriptione adeo Celebris *Buffon*, postquam consideraverat illa, quae circa vasa seminalia *Polypi*, *Sepiae*, *Loliginis* detexerat acutissimus *Needham* (g), fuit in illa opinione, quod omnia corpora viventia, aut vegetantia continerent partes quasdam organicas, viventes quidem, sed quae tamen nec animalia, nec vegetabilia forent, at medium quid. Animalcula, spermatica dicta, voluit esse tales moleculas organicas, quae, licet motum habeant, tamen non sint animalia. In alimentis, ex vegetabilibus, & animalibus paratis, latere statuit talia, quae ope moduli cujusdam interioris effingerentur in moleculas organicas viventes, residua, bruta quasi, alimentorum materia, separatis actuosis illis moleculis, inutili jam, de corpore expulsa. His moleculis perditorum restitutionem, & corporis incrementum tribuit; easdem collectas haerere in locis ad hunc usum destinatis, & semen animalium constituere, voluit. Credidit etiam, easdem moleculas organicas, si colligantur in locis, ubi sibi invicem uniri possint, & magna simul copia praesto sint, tunc in animalium corpore formari in alia animalia, qualia sunt taenia, ascarides, vermes aliquando reperti in venis, & finibus cerebri, hepate, &c. haec autem animalia non debent suam existentiam aliis animalibus ejusdem speciei; non enim generantur simili modo, ac alia animalia; sed producuntur ab illa materia organica, si extravasata fuerit, vel non resorpta per vasa, quae nutriendo corpori serviat. Satis enim probabile credit, substantiam illam productivam, semper actuosam, & tendentem in organizationem, producere vermes, aliaque minuta corpora diversae speciei, pro diversitate locorum, & matricum, in quibus accumulatur.

Legi merentur illa, quae egregius ille vir subtiliter de his disputat (h).

Interim haec opinio, licet ingeniosa, non videtur carere magnis difficultatibus.

Unde haecenus communior illa sententia viget, vermes humanos ab ovis, foris in corpus humanum delatis, originem ducere, & in ipso corpore, more aliis animalibus consueto, multiplicari (i). *Quaquam vero & haec sententia suis vexatur dubiis, quae expediri aegre quaeant; non sunt tamen ista tanti momenti,*

(g) Nouvell. découv. par le microscope de T. Needham pag. 60. & seq. (h) Hist. natur. génér. & particul. tom. 2. pag. 18. 19. & seq. & pag. 258. & seq.

(i) Van Doeveren dissert. de verm. intest. pag. 25. & seq.

ti, ut non sperare liceat, ulteriori scrutinio tandem ad liquidum perductum iri. Quod ipsa natura dictavit systema, non illico turbandum, si qua forsan parte ob cognitionis humanae defectum hiat (k). Supponit autem haec sententia, similia his animalia extra corpus humanum existere, de qua re postea ad §. 1363. quaedam dicentur.

§. 1361. **N**idum dat pituita intestinalis, vel gastrica, in qua haerent, foveantur, pariunt, augenturque.

Cum vermes humani in primis viis praecipue reperiantur, & maxime communis opinio sit, uti dictum fuit, originem illos ducere ex ovis ingestis, videbatur verosimile, quod haec vel destrui deberent motu peristaltico, vel saltem, si huic resistere potuerint, cum reliquis faecibus per alvum expelli, nisi lateribus intestinorum fixa haerent, quacumque de causa haec adhaesio fieret.

Notum est, ventriculum, & intestina obduci glutinoso muco, sed benefico, & naturali, quo lubricatur, inungitur interna illorum superficies, simulque ab omni acrimonia defenditur, uti & asperitate ingestorum, quae in voracibus hominibus saepe non satis comminuuntur dentibus, antequam deglutiantur. Hic mucus nidum dare poterit vermium ovis satis commodum, in quo foveri poterunt, & per quem adhaerent intestinorum parietibus sic, ut nec motu intestinorum peristaltico, nec a transeuntibus per cavum intestinorum ingestis cibis, & faecibus, loco moveri possint. Cum autem mucus ille abundet in junioribus, hinc creditur, vel ab hac causa illos vermibus laborare frequentius. Non mirum ergo, quod vermes tali muco undique obducti quandoque inventi fuerint.

§. 1362. **H**inc raro in adultis; & in his modo torpidis, & leucophlegmaticis.

Cum autem in adultis major corporis siccitas fiat, bilis, & omnes humores in ventriculum, & intestina depluentes acriores sint, quam in junioribus, hinc minus frequenter vermibus molestantur, nisi lenti, frigidi, mucosi, humores copiosi in corpore adsint; ut in illis observatur, quos Leucophlegmaticos Medici vocant. De qua re videantur illa, quae ad §. 69. & sequentes habentur, ubi de glutinoso spontaneo agebatur.

Interim certum est, non omnes adultos, licet etiam optimam corporis temperiem habuerint, a vermibus immunes vivere. Cum totum corpus firmitus sit, & nervosum systema minus irritabile, saepe non sentiunt tantas a vermibus molestias, ac quidem juniores pati solent: hinc saepe vermes habent inscii, qui per medicamenta purgantia imprimis expelluntur; quandoque & acutorum morborum tempore prodeunt improvise. Unde Hippo-

Tom. IV. pars II.

u

crates

(k) Gaub. Institut. Patholog. §. 587. pag. 302.

crates (1) dixit: Sed & lumbricos teretes, morbo iudicium subeunte, una cum excrementis prodire, utile fuerit. Cum autem illo tempore, dum morbus iudicium subit, multae turbae in corpore fiant, & magnae humorum mutationes, mirum non est, vermes teretes, qui satis mobiles sunt, ex sede sua exturbari. Unde videtur vermium horum exturbatio criticam perturbationem designare, non tamen bonum semper effectum. Si enim humores per validum morbum corrupti, affatim per alvum ruant, simul expelluntur vermes; sed funesto cum eventu. Sic apud *Hippocratem* (m) legitur de homine, qui incalescens coenavit, multum bibit, & deinde hypochondrii dolore inflammatorio correptus, acute febricitavit cum malis symptomatibus; *Septimo die ab alvo irritata liquida, & turbulenta cum lumbricis secesserunt*; sed absque levamine symptomatum, & undecimo die periit.

Sic & observatum fuit *Biterris* (Béziers) anno millesimo septingentesimo trigesimo, epidemicorum more, verminosam colluviem afflixisse plurimos. Licet enim & aliis temporibus vermes satis frequentes fuerint incolis, illo anno tamen cujusvis sexus, aetatis, temperiei homines vermibus infestabantur; & quidem ita, ut aliqui succubuerint, frustra adhibitis omnibus remediis; quae satis valida dari debebant, ut sursum, aut deorsum expellerentur vermes, quorum plurimi exhibant vivi de corpore (n).

Toties in castris observatae fuerunt vermium excretiones in militibus, dysenteria, febribus intermittentibus, remittentibus, aut continuis laborantibus. Teretes autem erant vermes, qui in his morbis excernebantur (o). Monet simul egregius auctor, non cogitandum esse, vermes fuisse dysenteriae, aut harum febrium causam, sed tantum reddidisse hos morbos peiores. Idem in nostro exercitu observatum fuit. Unde patet, & in adultis, duro labore exercitatis corporibus, vermes satis frequenter adesse, qui non prodissent, nisi hi morbi adfuissent. Videtur enim admodum verosimile, hos vermes ante morbum jam extitisse.

Praeterea Taenia, sive vermis latus in adultis observatur satis frequenter.

§. 1363. **S**untque rotundi, lati, ascarides.

Tres illae vermium species communiter occurrunt in ventriculo, & intestinis humanis; ideoque de illis in vermium historia, & cura imprimis agitur, licet negari nequeat, & alias insectorum species in his locis fuisse deprehensas. Si enim foecunda aliorum insectorum ova ad has partes delata fuerint, non videtur mirum, quod in loco tali humido, & calido excludantur. Plures observationes in historia medica leguntur ranarum, lacertarum,

(1) In Prognostic. Charter. Tom. VIII. pag. 628.

(m) Epidem. Lib. I. textu 12. Aegrot. 12. Charter. Tom. IX. pag. 114.

(n) Académ. des scienc. l'an. 1730. hist. pag. 57.

(o) Pringle observat. on the diseases of the army part. 1. Chap. 1. Pag. 10. Chapt. 2. pag. 30.

rum, per vomitum, vel per alvum redditarum; sed stagnantes aquae verno tempore sperma sic dictum ranarum &c. habent, & quandoque a sitientibus incaute potantur. A tali, vel simili causa videntur produci infecta, quae a vermibus humanis vulgo dictis penitus diversa in corpore humano reperiuntur. Indus triginta sex annorum molestum abdominis dolorem diu passus fuit: cum frequenter Indi vermibus laborent, Medicus Anthelminticum praescribit, quod *semen contra* (vermes scilicet) vocari solet. Paucotempore post hoc remedium assumptum dolores minuuntur, & alvo excernit vermem mortuum, qui septuaginta sex pollices, & quatuor lineas aequabat longitudine, & crassitie quatuor lineas. Vermis ille erat rotundus, coloris pallide flavescentis, caput durum habebat, & a capite usque fere ad caudam numerabantur centum, & septemdecim annuli cartilaginei, omnes integri. Expulso hoc verme, cessabat omnino dolor, vivus redibat vultui color, nec postea de ullo malo conquestus fuit (p). Facile patet, vermem illum a teretibus vermibus humanis omnino diversum esse.

Aliud mirabile exemplum legitur (q). Nobilis puer, unicus viduae matris filius, vermibus laborabat cum summis doloribus abdominis, convulsionibus &c. Sentiebat miser puer, repere in ventriculo serpentem, ut credebat; percipiebat, morfu lacerari viscera. Ab amaris, anthelminticis purgantibus exasperabantur omnia symptomata; imo a diagridio dato sequebantur convulsiones. Celebris ille Medicus, videns, ab irritantibus augeri omnia mala, dedit satis largum haustum lactis vaccini, quo potato mox sopiebantur omnes dolores; qui, dum redirent, lacte epoto pariter placabantur. Denuo ab alio Medico datum fuit purgans; verum omnia mala recrudescebant; lacte poto iterum cessabant, & totam curam anxia mater Celebris Gallo commisit, qui tentavit allicere vermem odore lactis calidi versus os, hac spe, ut vel sponte exiret, vel arreptus extrahi posset. Feliciter cessit haec methodus: tertio enim tentamine, ascendens ad radicem linguae vermis, tenaculo prehensus educebatur. Vermis ille niger erat, rotundus, & pilosus, crassitie calamum scriptorium superans, & triginta palmas Italicas longus, quem in rei insolitae memoriam servavit Medicus.

Per biennium laborabat homo doloribus colicis admodum validis, cum nixibus vomendi vehementibus, & fame fere insatiabili. Copiam vermium planorum quandoque integros glomeres alvo deponebat. Praescriptae fuerant pilulae, certo intervallo temporis sumendae, una cum quodam decocto. Pertaesus tot molestiarum aeger, saepius, quam praescriptum fuerat, sumsit haec remedia; unde animi deliquia, & syncope sequebantur, ita ut morti proximus videretur. Simul tam valida aderant abdominis murmura, ut ad triginta, & ultra passuum distantiam auribus percipi potuerint. Tandem prodierunt vermes, quorum quidam satis longi erant, praecipue ultimus, qui infestissimus aegro hostis fuisse credebatur merito.

(p) Feuillée journ. des observat. phys. &c. Tom. I. pag. 421.

(q) Gallo dissertaz. dell' uso del latte. Tom. 2. pag. 133. & seq.

Vermis ille vivus prodiit, sedecim pedes longus, caput ad sesqui-pedis longitudinem elevatum tenens semper, sive in terra reperet, sive in glomerem convolutus jaceret. In vas aqua plenum dimissus, miris movebatur modis, semper erectum tenens caput, quod nigrum erat, & instar pisi rotundum: collum habebat valde angustum, & binos oculos: eminentias habebat vertebrae similes. Aeger postea optime valuit, laudans suam temeritatem, quae forte ad curationem necessaria erat, vel saltem illam acceleravit (r).

Describitur & vermis, qui per anum exivit, longus sesqui-pedem; corporis diameter aequabat pollicem cum dimidio; totus vermis sanguine plenus erat; dum exibat, simul aliquot librae sanguinis prodierunt, & per aliquot dies postea sanguinis grumosi aliqua copia per anum exiit. Vermis ille mortuus prodibat, & annulos habebat instar lumbrici terrestris. Caput erat reliquo corpore angustius, os triangulare, hirudinis instar. Postea nunciavit aeger, se alium similem evacuassee vermem, priori potius adhuc majorem, qui frustillatim prodiit (s). Vermis ille ab idoneis testibus visus fuit, & a perito pictore delineatus in Icone exhibetur.

Plura similia facile colligere potuissem; verum haec sufficient, ut constet, in ventriculo, & intestinis humanis quandoque alia insecta reperta fuisse, praeter vermes rotundos, latos, & ascarides, de quibus singulis nunc dicetur.

Rotundi. Vocantur & teretes; reliquis vermibus humanis frequentius reperiuntur in intestinis: cum autem externa forma satis similes appareant lumbricis terrestribus, quorum ingens copia ubique praesto est, hinc multi crediderunt, ex ovibus lumbricorum, quocumque demum modo haec corpus humanum ingressa fuerint, teretes vermes produci. Sic *Celeberrimus Linnaeus* (t) voluit, *lumbricum intestinorum esse eandem speciem cum lumbrico terrestri vulgarissimo*. Eandem sententiam amplexus fuit *Scopoli* in historia naturali admodum versatus (u). *Docet hoc communis utriusque fabrica, habitatio, vita, foecunditas, & communia utrisque venena*. Foecunditas satis convenit: sed nec habitatio, nec vitae genus eadem sunt. In terra nidulantur lumbrici, terram comedunt, quae & in illorum interaneis invenitur, & per illorum alvum egeritur: vermes humani in intestinis habitant, & longe alio fruuntur alimento. Vermes terrae sanguinem rubrum habent (v), & pedes, vel saltem pedibus quid analogum in illis *Svammerdam* detexit. Voluit quidem, ridiculam esse illorum opinionem, quae ex ovulis deglutitis vermes in nobis oriri, statuit, cum longe aliud alimentum requirant. Sed credidit tamen, tunc possibile hoc esse, si corpori humano ingerantur ova talium insectorum, quae in aliorum animalium intestinis vixerunt (x) Vermes

(r) Académ. des scienc. l'an 1740. hist. pag. 72.

(s) Medic. Essays and observat. Tom. 2. Art. XXVI. pag. 336.

(t) In system. Natur. pag. 85.

(u) De Hydrarg. Idriens. tentamin. 157.

(v) Svammerd. Bibl. nat. pag. 120. 247.

(x) Ibid. pag. 710.

mes humani, quantum constat, nullam unquam fubeunt metaphorphosin, nec etiam lumbrici terrestres. Non tamen impossibile est, insecta in ipsis animalium intestinis metamorphosin subire posse. Musca illa, de qua ad §. 1360. dictum fuit, per anum equi ingreditur, ova ponit, quae vermem excludunt, suo tempore in chrysalidem mutandum, ex qua musca prodit postea.

Verum inveniuntur in aliis animalibus teretes vermes, humanis omnino similes (de reliquis postea dicetur.) Vermes rotundos invenit in vitulorum, & quidem adhuc lactantium, intestinis *Celeberrimus Vallisnerius*; disseccuit summa, qua valebat, dexteritate; & invenit structuram diversam a lumbricis terrestribus: vidit ova vera, sed numerosissima (y). *Clericum* citavi, quia & *Vallisnerii*, & *Redii* observata collecta apud hunc auctorem habentur.

Egregius *Edw. Tyson* (z) disseccuit & vermes teretes humanos, illosque omnino diversos a lumbricis terrestribus invenit. Credidit, se diversitatem sexus invenisse in vermibus teretibus, & figuris expressit marem, ac foeminam dissectos: delineavit vasa feminalia in utroque sexu, & ova microscopio conspecta, quorum plus quam decem millia in uno verme adesse credit. Omnem hunc ovorum numerum non excludi in corpore, facile creditur; plura cum faecibus alvinis exire, probabile videtur; quae si postea, quocumque modo humanum corpus, vel & aliorum animalium ingrediantur, species propagari poterit, dum consuetum parentibus domicilium, & alimentum tunc acquirunt. Mira observatio *Celeberrimi Listeri* huic opinioni favere videtur (a). Puella octo annorum ulcus habebat circa malleolum, dolens valde; juniorem catulum chirurgus discidit, & imposuit loco ulcerato: dum removel postea, sexaginta ad minimum vermes invenit partim in catuli corpore dissecto, partim extraxit ex malleoli ulcere: catulus denuo applicatus fuit ulceri, & dum secunda vice removebatur, aderat *Lister*, viditque unicum tantum vermem, sed vivacissimum: postea injectionibus adhibitis, plures vermes enecti fuerunt. Examinans autem illos vermes, dixit sequentia: *Affirmo, hos vermes, quantum cognoscere potui, (& habui opportunitatem illos comparandi), esse ejusdem speciei cum lumbricis teretibus, quos infantes frequenter per alvum reddunt; tres, quatuorve circiter pollices longi erant; omnes fere ejusdem crassitie, ac si eodem tempore fuissent exclusi; parum crassiores anatis penna; utrumque extremum in apicem acutum desinebat; vermes illi erant rigidi, perfecte rotundi, absque incisuris, & tamen facile se movebant (vivi nempe). Vermes illi magis albicabant, quam teretes intestinorum.* Unde patet, vermes teretes non tantum in ventriculo, & intestinis, sed & in aliis corporis locis ex succis humanis vivere posse.

Verum quidem est, Muscas in ulceribus ova quandoque deponere; sed ex his vermes tantae magnitudinis non producuntur, at longe minores.

Tom. IV. Pars II.

u 3

Nec

(y) Dan. Cleric. Hist. natur. & medic. lator. lumbric. pag. 227. 252.

(z) The Philosoph. transact. &c. abrig'd Tom. III. pag. 130.

(a) Ibid. pag. 132.

Nec videtur ulla suspicio, illos vermes in catuli intestinis latitasse prius. Testimonium autem *Listeri* magni ponderis est, cum similium aptissimus iudex esset, & non perfunctorie hanc rem examinaverit. Vermium ergo horum ova vel per vasa cum humoribus ad ulcus delata fuerunt, vel debuerunt ab extra ad ulcus pervenisse; in quo casu rotundi vermes, vel eorum ova etiam extra corpus humanum subsistere potuerunt.

Non videtur probabilis illa opinio, quae statuit, vermes rotundos esse larvas seu nymphas, taeniarum (*b*), quae *Celeberrimo Fritschio* tribuitur. Accurata dissectio vermis teretis contrarium docet: non enim latens sub involucri taenia deprehensa fuit, sed canalis alimentarius, anus, os, & nitidissimus apparatus vasorum seminalium &c. Notum est, insecta, dum sub larva Nymphae, aut Chrysalidis latent, nullum nutrimentum sumere, nec vivacissimos tales motus edere unquam, quales in vermibus rotundis observati fuerunt, qui per omnia intestina repunt ad ventriculum usque, & ex ventriculo ad intestina redeunt.

Caeterum, licet ova vera invenerint *Celeberrimi* viri ante laudati, observatio legitur (*c*), quae probare videretur, vermes teretes esse viviparos. *Puella Scarintii*, quum vermibus quoque laboraret, & illi tarde datum esset medicamentum, unum praemagnum egressit vermem rotundum, cuius cum pater pede calcasset caput, ex eo alii prodierunt vermes: puella tamen brevi mortua est.

Rudis satis observatio haec est, & fide patris, harum rerum procul dubio ignari, nititur. Si enim vermis teres monstretur imperitis, per integumenta manifeste conspiciuntur vasa seminalia albicantia, vario modo convoluta, quae minorum vermium in maiore latitantium speciem non inepte referunt. Accedit, quod in vermibus rotundis humanis, ad tertiam circiter totius longitudinis a capite distantiam, rima adsit (quae in teretibus vitulinis capiti propinquior est), per quam, calcato verme, totum vasorum spermaticorum systema elabi possit. Servo talem vermem teretem integerrimum, cui vasa haec ex illa rima propendent omnia, & liberrime in liquore, in quo conservatur, fluctuant. Nec repugnat tamen, vermes rotundos esse & viviparos, & oviparos; cum antea monitum fuerit, dari talia insecta, quae uno tempore anni sunt vivipara, altero autem ovipara.

Caeterum vermes rotundi crassitiem calami scriptorii solent habere plerumque, raro illam excedunt, quandoque & tenuiores inveniuntur: longitudo varia est; rarius pedis mensuram superant. Memini, me vidisse, qui sesquipedem aequabat. Notandum autem, hic agi de vermibus rotundis proprie dictis: nam in eadem hoc paragrapho notatum fuit, sursum, vel deorsum quandoque excerni vermes alterius speciei, qui vermes rotundos mole multum superant. Talis videtur fuisse vermis, qui apud *Andry* (*d*) describitur. Fatetur enim *Celeberrimus* Vir, quod differebat a verme rotundo, cum totus rugosus esset, & rictum manifestum haberet.

Lati

(*b*) Van Doveren de verm. intest. pag. 24.

(*c*) Amat. Lusit. curat. medicin. Cent. V. n. 46. pag. 513.

(*d*) Tom. I. pag. 190.

Lati, vocantur, & *Taeniae* a figura plana, & longitudine totius vermis, quae saepe immensa est. Dicitur & *Vermis solitarius*, quia credebatur solus esse semper, & totam longitudinem intestinorum adaequare: haec Hippocratis (e) erat sententia, qui statuebat, vermem latum in puero, dum adhuc in utero est, procreari. Credebat autem, vermes ex putredine originem habere; & cum in nato jam homine, si sanus futurus sit, hesternum stercus semper cunctis diebus excernatur, hinc colligebat, nec moram satis longam esse materiae putrefaciendae, nec sufficientem ejus copiam, ut tantae longitudinis vermis in intestinis formari posset: aliud autem obtinebat, dum infans in utero latens, per novem menses alvum non evacuabat. Notat, recens natis talia ingeri, quae faeces expellunt; dein addit: *Multi sane pueri tum rotundos, tum latos lumbricos, una cum primo stercore, per alvum excreverunt*. Tales vermes certe in utero geniti fuerant, & hoc factum aliquoties fuisse, antea dictum fuit. Subjungit. *Et teretes quidem pariunt; lati vero non amplius; etsi eos parere dicunt*. Quicumque enim homo latum lumbricum habet, quale cucumeris semen alias, atque alias cum stercore dejicit; & sunt homines, qui hoc lumbrici partus esse affirmant. Mihi vero, qui talia proferunt, haud recte dicere videntur. Neque enim ab uno animali tot pulli nasci possunt, neque tanta est in intestino capacitas, ut partus educare queat. Credebat autem, vermem latum una cum puero crescere, & circa pubertatem intestinorum longitudinem jam aequare: cum tamen vermis latus crescere pergit, per rectum intestinum cum stercore excernitur, & velut cucumeris semen excidit; plerumque etiam major. Nonnullis vero iter facientibus, aut vehementer laborantibus, & ventre incalcescente, deorsum prodit, ipsisque ex recto intestino inflatus prominet, idque facit, & ex ano ressecatur, aut retrocedit. Quod vero non pariat, sed velut ego dico, se res habeat, haec signa sunt. Quod si quis hominem verme (lato) laborantem curet, & medicamentum, aut potionem dederit si quidem homo probe praeparatus fuerit, totus rotundus, ut globus, prodit, & homo sanus evadit. Si vero ad medicamentum prodeat, & recta (pars) abruptitur duorum, aut trium cubitorum longitudine, aut etiam longe major. Quumque abruptus fuerit, multo tempore cum stercore nulla se produnt signa, postea vero inrescunt. Ex quibus patet, Hippocratem vermem latum bene cognovisse; simulque apparet ratio, cur solitarium crediderit; quia nempe vermis ille totam intestinorum longitudinem occupat solus. Hippocratis opinionem plures Medici, & inter illos Celeberrimus Andry, fuerunt amplexi; quam refutavit Dionis (f), qui in homine, penitus emaciato, & febre lenta fere exhausto, vidit prodire duas taenias singulas propria membrana inclusas: quindecim dierum spatio appetitus, & vires redierunt, atque integre convaleuit (g). Plures observationes habentur, quae docent, taeniam non semper solitariam esse, sed quandoque plures simul in hominibus nidulari (h).

(e) De morb. lib. IV. cap. 15. Charter. Tom. VIII. pag. 613.

(f) Dissertat. sur le Taenia, ou ver plat pag. 14. & seq.

(g) Ibid. pag. 21.

(h) Van Doeveren Dissertat. de verm. intest. pag. 39.

In aliorum animalium corporibus frequenter inveniuntur plures taeniae; in cane tres ipse vidi, in diversis, & satis a se mutuo distitis intestinorum tenuium locis. *Celeberrimus Lister* (i) testatur, se invenisse in cane forte plus quam centum lumbricos latos, ita ut intestinum duodenum, his plenum, admodum distenderetur. In mure invenit duodenum, mole ventriculum excedens multum, pariter plenissimum vermibus latis; sed diversae formae penitus, ac unquam viderat. In cane illo aderant & taeniae in jejunio, & ileo, sed ad aliquam distantiam a se mutuo remotae; in crassis intestinis nullae aderant. In jejunio, & ileo taeniae jacebant quandoque singulae, quandoque binae, vel plures inter se convolutae. In vicinia horum vermium semper invenit illorum excrementa, grisei coloris. Omnium extremum tenuius superiora spectabat, ac si descendenti chylo inhiarent. Omnes illi vermes habebant eandem longitudinem, nec pedis mensuram excedebant. Latius extremum latitudinem habebat unguis digiti minimi, & in lanceolae quasi acumen definebat. Si ab extremo hoc latiori binae partes totius longitudinis vermis computentur, tunc incipiunt articuli sensim fieri angustiores, & tandem desinunt in extremum tenue, cujus apex in globulum definit, caput aciculae mole aequantem. Comparavit has taenias canum iconi taeniae humanae, quae apud *Tulpium* (k) habetur, & invenit magnam similitudinem. Notandum imprimis videtur, quod *Tulpius* affirmat de hac taenia: *Idque non semel, atque iterum, sed tertium: quippe toties hoc insectum excrevit uxor Guilielmi Smitii. Modo quidem frustulatum, & mutilum, sed interim ter integrum, & omnibus numeris absolutum. Erat autem caput hoc non minus acutum, quam planum, & ore admodum exili, plane eadem forma, qua ejus iconem, dum adhuc reperet, aeri incidit Salomon Saverius, artis ejus abunde peritus. Ex hac Tulpii observatione pluralitas taeniarum in corpore humano confirmatur.*

Sed & vermis latus alias vermium species comites quandoque habet. Sic observavit *Raulin* (l), hominem, qui taenia laborabat, etiam vermes teretes per alvum deposuisse. In fele, cocculis sumtis necato, invenit *Vvepserus* (m) vermem latum adhuc vivum, & plures lumbricos teretes. In lupo semestri, & robusto, post napelli radicem sumtam occiso, invenit sequentia: *Duodeni, & jejuni superficiem incrustabat substantia coagulo lactis similis, alba, viscida, alicubi flava. In ileo continebantur cucurbitini vermes solitarii, semen cucurbitae figura, & magnitudine referentes, cohaerentes, duas spithamas longi, desinentes in filamentum prope spithamae longitudine, in cujus extremo globulus, caput acus referens: item taeniae, seu lumbrici lati, omnes adhuc viventes* (n). Satis convenit haec observatio descriptioni *Listeri*, quam modo recensui; sed mirum est, quod vermes cucurbitinos, sibi mutuo cohaerentes, & desinentes in filum, cujus extremum in globulum definit, distinguat a lumbricis latis. Saltem pluralitas vermium latorum *Vvepseri* testimonio confirmatur.

Vi.

(i) Philosoph. Transact. abrig'd Tom. 3. pag. 119.

(k) Lib. 2 observat. Medic. cap. 42. pag. 161.

(l) Des malad. occas. par les variat. de l'air pag. 425.

(m) Cicut. aquar. histor. & noxae cap. 12. pag. 186.

(n) Ibid. cap. 11. pag. 180.

Videntur plures taeniae species esse. *Celeberrimus Andry* (o) duas descripsit: prima distinguitur, quod articuli constituentes longitudinem taeniae, in medio corpore longi sint satis; hinc inter unum articulum, & proximum satis magna ibi distantia est; versus extrema autem hi articuli magis sibi invicem propinqui sunt; imprimis circa illud extremum, quod caput vocat, & in apicem globosum definit; ubi parum admodum a se mutuo distant: talis taeniae iconem habet (p). In medio cujusque articuli, in ipso margine, conspicitur quasi papilla, foramen in apice habens, in quo observavit vas subcaeruleum, quod ad medium usque latitudinis corporis penetrat. Papillae autem illae inaequali ordine distribuuntur; quandoque in uno latere binae sunt, & in latere opposito unica tantum; quandoque tres ab una parte, & nulla in parte opposita. Altera teniae species ab eodem auctore (q) describitur, differtque a priore, quod articulationes minus prominent, & minus a se invicem distent: hinc media inter binas articulationes pars brevior est, quam in specie praecedenti. Simul adest series nodulorum, sive granorum scabrorum, quae secundum totam longitudinem vermis lati disponuntur, in recta linea, & spinae dorsi figuram referunt. Plures tales vermes latos *Celeberrimus Andry* iconibus expressit.

Praeter binas has species tertiam invenit *Dionis* (r), quae sacculo membranaceo haeret inclusa; quo rupto erumpit. Quando talis vermis latus in sacculo haerens, ano exit, tunc facile haberi posset pro verme tereti; & forte hinc nata fuit opinio, de qua paullo ante dictum fuit, quod vermes teretes forent nymphae vermis lati. Accuratissimus in his, & dexterrimus *Vvinslow* (s), talem vermem, qui teretem referebat, disseccuit, & invenit sub hoc involucre contineri taeniam. In murium hepatibus inventi fuerunt vermes lati; sed cystidi inclusi (t). Icones tamen horum vermium videntur differre a vermibus latis.

Forte & aliae vermis lati species acutissimorum observatorum industria detegentur.

Interim mirum hoc animal multum exercuit Philosophorum ingenia: quidam voluerunt, vermem latum non esse unicum animal, sed congeriem animalium potius: cum enim, qui hoc verme laborant, saepe excernant ano vermes cucurbitinos dictos, quia figuram semini cucurbitae officinarum satis similem habent (u), qui in loco citato delineati habentur, & vivi adhuc, & mortui; cum manifestum motum habeant, & magna copia excernantur quandoque, ita ut pyxidem magnam, cucurbitinis his plenam, obtulerit *Celeberrimo Andry* (v) aeger, qui taeniam in intestinis gerebat; hinc habebantur vel pro ovis, vel pro foetibus vermis lati a quibusdam. Praeterea, cum vermis latus distrahitur ita, ut articuli separentur a se mutuo, tunc singuli articuli referunt vermem cucurbitinum (x); hinc non mirum est,

(o) De la générat. des vers pag. 194. & seq.

(p) De la générat. des vers préface pag. 4.

sur le taenia pag. 21.

du Cabin. du Roy Tom. VII. pag. 315.

(v) Ibid. pag. 218.

(s) Ibidem

(x) Ibid. pag. 219.

(q) Ibid. pag. 195.

(r) Dissert.

(t) Hist. natur. &c. avec la descript.

(u) Andry générat. des vers pag. 224.

est, alios in hanc sententiam venisse, vermem latum esse tantum catenam vermium cucurbitinorum: favebat huic opinioni, quod frequenter plures ulnae vermis lati per anum prodirent, licet nihil capiti, vel caudae analogum in extremis partibus inveniretur; imo quod saepius similia vermis lati fragmenta prodirent ex eodem corpore diversis temporibus; quod facile explicari poterat, si cucurbitini vermes sibi mutuo juncti taeniam constituerent. Alii voluerunt, non tantum cucurbitinos necti sibi invicem, sed post hunc nexum unitos non esse amplius numerosorum vermium congeriem, at unum tantum animal, ex pluribus unitis concretum: unde, dum novi cucurbitini secundum longitudinem necterentur vermi lato, poterat augeri ejus longitudo immaniter; sicque perpetuo crescebat vermis latus; & licet plures ulnae exirent de alvo, damnum illud brevi, ac facile poterat restitui. Quamvis autem illa concretio plurium animalium in unum creditu difficilis videretur, reponi posset, quod hoc saeculo tot nova, tot mira detecta fuerint circa generationem insectorum, ut vix quis aliquid impossibile imposterum affirmare audeat. Si quis enim dicere ausus fuisset antea, dari animal, quod in, sexaginta quatuor partes dissectum, totidem nova, sibi omnino similia, reproduceret animalia, procul dubio ab omnibus risu exceptus fuisset: si addidisset, idem illud animal, inversum instar chirothecae digiti, praedam devorasse, & ingestam digessisse, ut antea, increvisse, & sui simile produxisse, meras narrari fabulas, credidissent omnes. Tamen haec omnia quam verissima esse, novimus hodie.

Interim negari nequit, si taenia componeretur ex vermibus cucurbitinis, five simplici nexu unitis, five in unum animal concretis, deberet taenia constare in tota sua longitudine partibus homogeneis. Si vero deprehendi possit taeniae pars reliquis dissimilis, & diversam habens fabricam, tunc haec opinio cadit; quae tamen jam dudum apud Celebres Medicos invaluit (y), & postea a *Vallisnerio*, *Couleto*, aliisque defensa fuit.

Vermis latus quandoque integer prodit, uti *Hippocrates* (vide locum ante citatum) notavit, sub forma glomeris; qui, si evolvatur, quantumvis longior, vel brevior fuerit, desinit, sensim decrefcentibus in longitudine, & latitudine articulis, in extremum angustum valde, in ultimo apice globulo quasi munitum: illud vermis lati extremum vocatur filum a quibusdam, & nisi illud exiverit, periti metuunt, ne vermis latus recrefcat postea, quantumque etiam longitudo ejus per anum prodierit. Vidi saepius illud filum in vermibus latis integris, vel per morbos, vel per vim remediorum expulsi.

Monet *Celeberrimus Tyson* (z), plures angustiore hanc taeniae partem habuisse pro cauda vermis lati; inter quos numerat *Spigelium*, & *Amatum Lusitanum*. Ipse autem caput esse credit. Invenit enim in canis dissecti intestino Ileo vivum vermem latum (a), qui non jacebat directus, sed in multis locis convolutus, & duplicatus: caute findens intestinum quaesivit extremum angustum vermis lati, quod versus duodenum intestinum protende-

(y) Marcel. Donat. de Medic. histor. mirab. cap. 26. pag. 255.
Transact. abridg'd tom. 3. pag. 121.

(a) Ibid. pag. 124.

(z) Philosoph.

debatur, dum extremum taeniae latius, liberum, nullique parti adhaerens, deorsum versus intestinum rectum tenderet. Angustius autem taeniae extremum infigebatur internae intestini tunicae, & adeo firmiter haerebat, ut non sine difficultate leviter illud ungue elevans, ab intestino separare potuerit: dum hoc faciebat, contorquebat se vermis, & a digito decidebat, moxque se intestino infigebat ita, ut simili modo, aequali cum difficultate inde separari debuerit. Microscopio examinavit illud extremum, & binis iconibus expressit illa, quae viderat: invenit enim, illud non esse planum, sed utcumque convexum, dense confitum hamatis quasi pilis, quos postea, attente dum conspiceret, etiam nudis oculis videre potuit. Eandem structuram observavit & in aliis duabus taeniis.

Vermes firmiter adhaerere intestinis, pariter observavit *Vuepferus* (b): invenit enim mucum, cum aliquot lumbricis latis, cucurbitinis, & teretibus, quorum plures adhuc vivebant, Proboscides firmissime intestinorum tunicae infigentes, a qua etiam hirudinum instar pendebant, sublato intestino.

Credidit *Tyson* (c) illam partem modo descriptam, quam pro capite vermis lati habuit, praecipue servire, ut stabili in loco maneat vermis latus, neque facile integer per anum prodeat, sed saepe plures ulnae reliqui corporis separatim exeant. Dubitat tamen, an per illam partem adeo parvam, ac caput est, nutrimentum recipere posset taenia, quod tantae corporis longitudini alendae, & augendae sufficeret: unde potius credit, papillas illas, quae in singulis teniae articulis reperiuntur, uti ante dictum fuit, chylum sorbere, quo tota vermis lati longitudo repleta invenitur, & qui album illud sedimentum dat in fundo lagenae, dum vermis latus in spirituofo liquido servatur. Caeterum caput vermis lati vidit distinctius, & icone expressit *Celeberrimus Bonnet* (d); cui historia naturalis tantum debet, tam in regno animali, quam in vegetabili. Eodem in loco omnia collecta habentur, quae hodie novimus de verme lato, simulque diversae clarorum virorum observationes accurate expenduntur, & exacto ratiocinio, certisque observatis demonstratur, quid de singulis censendum sit. Pluribus enim de hac re agere, non videtur huius loci esse.

Cum autem, de origine vermium humanorum ubi agitur, probabilis maxime opinio sit illa, quae statuit (vide §. 1360.), aliunde hos in corpus humanum venire, non autem esse absolute inquilinos, aut congenitos, hinc merito inquisitum fuit, an vermis latus extra corpus humanum inveniat. *Celeberrimus Lynnaeus* (e), se in praesentia septem sociorum invenisse in ochra acidularum vermem latum testatur. Egregius *Tissot*, (f) memoriae tradit, puerum, quatuor annos natum, cum levi ani pruritu deiecis-
bum,

(b) *Cicut. aquat. histor. & noxae cap. XIII. pag. 206.* (c) *Philosoph. transact. Abridg'd tom. 3. pag. 126. 127.* (d) *Mémoires de Mathém. & Physiq. présentés à l'Acad. des scienc. &c. Tom. I. pag. 478. 530. & Considérations sur les corps organisés pag. 202. &c.* (e) *In systemate naturae: observat. in regn. animale.* (f) *De morbo nigro, scirrhis &c. pag. 31. Van Doeveren dissert. de vermib. intestin. pag. 33.*

bum, aequabile, viginti quinque circiter pollices longum, quatuor, aut quinque circumvolutum gyris, iisque omnino similem, quas in fontibus Sueciae invenit Ill. Linnaeus, & in fonte Helvetico amicus Medicus. Ex agni nondum trimestris intestinis eductae taeniae frustum, viginti sex pedes longum, vidit Raulin (g). In bobus taenia observatur saepe, in vitulis rarius, frequentissime in piscibus, & quidem varii generis (h). Cum autem haec animalia cibum hominibus praestent, suspicio nasci potest, hoc modo taeniam in corpus humanum venire posse.

Verum quidem est coctione, assatione, aliisque artibus culinariis cibos sic mutari, ut non facile manere possit ovorum insectorum integritas, si per hanc viam in corpus venirent. Quaedam tamen observata docere videntur, vermem latum ferre posse insignem caloris gradum, vita superstita. Propriis oculis vidit Illustr. Archiater Roseen (i), una cum aliis septem testibus, inter pisces coctos mensae illatos fuisse unum, qui taeniam adhuc viventem, & se moventem continebat. Taenias illas in piscibus vivis frequenter satis vidi; sed inveni illas extra intestina in abdominis cavo viventes, per viginti quatuor horas, & ultra in aqua servavi, & motum manifestum toto hoc tempore observavi; de qua re & videri potest Andry (*), qui notat, multos habuisse hos vermes pro lactibus piscium, & manducasse. Observavit Coulet (k), Ascarides, quos non differre a cucurbitinis aliorum auctorum voluit, illico frigescere; simul atque ex recto exiverunt, & modestissimum frigoris sensum excitare in cute externa, ubi haerent: simul vixit, in aëre frigido mori cito. Testatur, quod aquam fervidam ferant facile; imo duos ascarides in brodium carnis vitulinae fervidum immittebat, illudque in eodem caloris gradu, mediante igni mediocri, in balneo Mariae per duodecim horas continebat, & tum illos aequè vivos, agiles, ac sanos inveniebat, atque erant, dum primo ex intestinis deciderent. Ex quibus concludi potest, vermes hos, absque destructione, intensum satis calorem ferre posse, & hinc nascitur major probabilitas, quod ipsi hi vermes, vel illorum ova una cum cibis in corpus humanum venire possint.

Caeterum, antequam materiam hanc de verme lato dimittam, operae pretium duxi, recensere miram observationem, quae Couleti opinioni multum favere videtur. Celeberrimus Koenig (l) vivum vermem cucurbitinum manus calidae dorso imposuit, cui una, vel altera guttula lactis inspersa erat, viditque vermem transversim prorepere; & tuberculum illud, sive papillula, quae in latere corporis haeret, de qua ante dictum fuit in verme lato, & quae vix amplitudinem habet puncti lacrymalis in homine, coepit intumescere, & extraverso rotundo labio, decuplo amplius fieri: armato autem lente convexa oculo vidit, ex hac dilatata bucca emergere proboscidem quasi, lineam cum quarta parte longam, in extremitate fuscam, & il-

(g) Sur les maladies par les variat. de l'air pag. 444.

Abridg'd tom. 3. pag. 123.

pag. 161.

(*) De la générat. des vers pag. 53. & seq. & lumbrico lato pag. 30. 31.

(h) Philosoph. Transact.

(i) Des Schwedischen Akadem. abhandl. 22. stuck

(k) De Ascarid.

(l) Act. Helvetic. volum. I. pag. 28.

& illam versus lactis guttulam dirigi. Dum autem altiori voce compelleret praesentem *Herrenschuvandium* (aptissimum certe in similibus testem) monens, se rem nunquam visam observare, respondit ille, se simili spectaculo frui. Subito tamen vermis proboscidem illam retraxit, sive ob frigus aëris, sive a fortiore vocis emissionem percussus fuerit. Haec observatio docet, stigmata illa, sive papillulas oris officio fungi; cumque in vermis lati articulis singulis similia deprehendantur, iusta nascitur suspicio, quod & in illo idem praestent officium. Sed postea addit (m), quod doctissimo, & expertissimo viro *Ernstio*, qui dissertationem de *Taenia secunda Plateri* scripserat, communicaverit quaedam experimenta, ex quibus constitit, quod hi vermes, cum se jungunt, ita connectantur, ut canales communes toti seriei connexorum vermium tunc disponantur eo modo, uti, si liquor aliquis coloratus per osculum saepe dictum injiciatur, per siphonem ei osculo aptum, is per omnem ambitum vermis, paralelogrammum referentis, in determinato canale satis amplo decurrat, & eo loco utrimque, ubi isti vermes conjuncti sunt, in vicinum vermem, & simili ratione in propinquum transeat, ut taenia marginibus egregie a colorato liquore pictis exurgat, qui liquor aliquando ex ore in illa serie decimi vermis rursus efflueret. Sic certe hi vermes & soli vivere possent; & dum uniti sunt, non sibi solis, sed & aliis dant alimentum, & vicissim ab iis accipiunt. Unde etiam mirum non est, ab eodem homine & singulos, & concatenatos, jam in vermem latum mutatos, expelli.

Certe mirae observationes *Trembley* docent, quod Polypus, ex matre tanquam ramus ex trunco prodiens, non tantum a matre alatur, sed & matrem alat. Felicitas nostri saeculi est, quod multa jam cognoscamus vera, quae antea ne quidem verosimilia credi potuissent. Plura adhuc a tot, & tantorum Virorum industria sperare licet, qui difficultates, quae adhuc superfunt, elucidabunt.

Ascarides. Hos definivit *Galenus* (n), quod sint *tenuēs quidam lumbrici, in parte praecipue inferiori crassi intestini procreati*. Sunt autem teretis figurae, parvi admodum, utrimque mucronati; ingenti numero finem intestini recti obsident quandoque, & cum faecibus alvinis excernuntur. Admodum autem irrequieti sunt, & vivacissimi; unde nomen videntur adepti fuisse. *Ασκαρίζειν* enim idem, quod *Σκαρίζειν*, significat (vide *Foessi Oeconomiam*), nempe saltare, salire, palpitare, moveri; unde & irrequietus foetus maturi in utero motus eodem nomine vocatur (o). Omnes fere, qui Ascaridum mentionem fecerunt, tenues, & exiguos illos esse, notant. Quoad figuram, colorem, magnitudinem, habent maximam convenientiam cum illis vermibus, quos in caseo videmus admodum frequenter. Unde multi crediderunt, inde ortum ducere (p). Antea ad §. 1359. dictum fuit, hominem quemdam ascaridum molestias illico sensisse, postquam caseum album comederat. Toto tamen

(m) Act. Helvetic. Volum. I. pag. 30. 31.

(n) Comment. in Aphor. 26. sect. 3. Charter. Tom. IX. pag. 122.

(o) Galen. Comment. in aphorism. 37. sect. 5. Ibidem pag. 217.

(p) Van Doeveren de verm. intestin. pag. 10.

tamen coelo differre creduntur ab ascaridibus vermiculi in caseo reperti; quia nempe hi metamorphosin subeunt; non tamen videtur repugnare, casei vermiculos pariter admodum vivaces, dum vivi deglutiuntur, ad anum delatos, molestum pruritum excitare posse, aequae ac Ascarides; qui cum teretium vermium, de quibus ante dictum fuit, figuram referant, sed mole longe minores sint, hinc suspicio nata fuit, an forte essent teretium vermium foetus. De hac re tamen, quantum novi, nil adhuc certi constat. Vermes teretes dicti, uti antea monitum fuit, calami scriptorii crassitiem habent plerumque, quandoque & superant; sed inventi fuerunt in hominum, & animalium corpore vermes similis figurae, tenues admodum. In tribus equis dissectis plus quam sexaginta vermiculos albos subtilissimos, & teretes invenit *Vandellius*, celebris Medicus (q). Libere perreptabant totam abdominis cavitatem, & maxime prope hepar inveniebantur. Horum vermiculorum longitudo tres, vel quatuor pollices, crassities mediam lineam Parisiensem aequabat. Reliqua descriptio satis videtur respondere teretibus vermibus. Postea ab equorum lanionibus intellexit, in omnibus equis hujusmodi vermiculos minori, aut majori quantitate extra intestina morari.

Si ascarides teretium vermium foetus fuerint, anne potuerint se aliquando insinuare inter tunicas ventriculi, ac intestinorum, & ibi crescere in majorem molem? Tanquam dubium propono, quia quaedam observata tale quid utcumque suadere videntur. *Damianus Sinopeus* (r) in cadavere invenit ventriculum flaccidum, tumidulum, fideratum, duobus lumbricis vivis inter tunicas ejus haerentibus, altero circa fundum, altero in parte superiori: quisque spithamam erat longus, ac uterque recta extensus juxta longitudinem ventriculi, nisi quod in medio parum deorsum flexus, ac rursus elevatus. Neuter autem vel forinsecus, vel intrinsecus apparebat, neque loculo suo moveri poterat absque incisione parietum; quamvis superiorem, priusquam parietes incidi, leviter palpando susque deque adegerim, quo forte, illo moto, observare possem foramen, per quod eo penetrasse credebam, ingruente morte; sed nec ita, nec aliter, lustrando superficiem cum exteriorem, tum maxime interiorem, ullum foramen animadverti. Intervallum tunicarum, in quo quisque lumbricorum haerebat, seu loculus cujusque, pure semiplenus, laxae respondebat figurae, & magnitudini hospitis sui, nullo caniculo ultra porrecto.

Ex quibus conclusit egregius ille Medicus, lumbricos illos diutius inter ventriculi tunicas latuisse.

Inter tunicas intestinorum latentes vermes teretes vidit *Storck* (s) in foemina viginti, & quinque annorum, quae post usum remedii anthelmintici fursum, & deorsum innumeros lumbricos excrevit, nec tamen signa vermium in intestinis latitantium evanuerunt, & tabe periit. In cadavere intestina, variis in partibus penitus arrosa, inflammata, corrupta, & microscopio

(q) Domin. Vandellii Dissertat. tres pag. 21.

(r) Parerg. Medic. pag. 62.

(s) Ann. Medic. secund. pag. 228.

pio infinita, oblonga insecta visa sunt. Intra ipsam substantiam intestini jejuni (intra membranas nimirum,) latuerunt tres lumbrici, quorum quilibet longitudine quatuor pollices superavit.

Videtur Coulet manifeste voluisse, illos vermes, quos alii auctores cucurbitinos dixerunt, vocandos esse Ascarides. Patebit hoc evidenter, si Couleti (t) figurae conferantur cum figuris, quae apud Andry (u) habentur. Ascarides vero Graecorum, qui breves, & rotundi dicuntur, noluit esse aliud vermium genus; dicit enim: *Eos nonnisi Ascaridum nostrorum partum juniorem pronunciare minime dubito* (v). Videtur autem hoc assertum nullibi probare, quod nempe minores, & rotundi illi vermiculi mutarentur, dum adollescere, in cucurbitinos vocatos aliis auctoribus.

Caeterum illa, quae Veteres de Ascaridibus dixerunt, hodie etiam observantur. Hippocrates (x) notat, Ascarides vesperi imprimis molestos esse: idem saepius observavi. Celeberrimus Bianchi (y) narrat de amico suo, quod quotidie ab hora nona vespertina ad decimam per plures annos molestam adeo titillationem sentiret ab Ascaridibus, ut nullis negotiis vacare posset illo tempore. Reliquo tempore ab his molestiis omnino liber erat. Contingebat autem *id constantissime per omnes tempestates anni, omnesque status affecti*. Monuit Galenus (z), Ascarides vehementiora remedia poscere, ut expellantur: Bianchi (a) fatetur, *verminosam hanc familiam a quocumque remedio indomabilem fuisse*. Scripserat Hippocrates, quarto de morbis libro, in muliebri sinu, pudendoque gigni Ascarides, ut Hollerius (b) monet; dein addit; *Et nos scimus, e meatibus urinariis cum urina exclusos*.

Postquam sic recensita fuerunt praecipua, quae de triplici hac vermium humanorum specie habentur cognita, sequitur, ut agatur de variis noxis, quae ab iisdem in corpore humano producuntur; ex quibus cognitis simul eruuntur signa Diagnostica, quae vermium in corpore praesentiam docent.

§. 1364. **E**fficiunt irritatione nauseas, vomitus, alvi fluores, animi deliquia, pulsus exiles, deficientes, intermittentes, pruritus narium, insultus epilepticos.

Quaenam mala metuenda sint a vermibus, diversa corporis loca occupantibus, antea dictum fuit: possunt enim turbare omnes functiones partium, in quibus nidulantur. Verum hoc loco agitur praecipue de illis, quae vermes, in ventriculo, & intestinis dum haerent, producere solent.

Nauseas, vomitus. Ubi §. 652. de nausea, & vomitu agebatur, probatum fuit, causam proximam nauseae, & vomitus esse convulsionem fibrarum muscularium faucium, oesophagi, stomachi, intestinorum, diaphragmatis,

(t) De Ascarid. & Lumbrico lato post praefationem. (u) De la générat. des vers pag. 224. (v) Coulet. ibid. pag. 5. (x) Epidem. Lib. 2. sect. 1. text. 3. Charter. Tom. IX. pag. 113. (y) Histor. Hepat. Tom. I. part. 2. cap. 7. pag. 166. (z) Method. medend. Lib. XIV. in fine. Charter. Tom. X. pag. 343. (a) In loco modo citato, (b) In coac. Hippoc. comment. pag. 262.

tis, musculorum abdominalium: pro remota autem causa statuebatur omne illud, quod irritando fibras descriptas, vel facile convellenda viscera, stimulat. Si plumula in faucibus mota, si iners gluten in ventriculo partim fluctuans, partim ejus lateribus haerens, nauseam, & vomitum facere possint (vide §. 71.) multo magis hoc fiet, dum vermes per ventriculum, & intestina repunt, vel haec vellicant. Unde Hippocrates (c) dixit: *Quaecumque autem, dum jejuna sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque uterum gestent, neque febricitent, eas interrogare oportet, an lumbricos rotundos simul vomant; si enim hoc non consentient, praedicendum est, ipsis futurum esse. Fit autem hic morbus maxime quidem mulieribus; deinde vero etiam virginibus: aliis autem hominibus minus.* Vermes enim teretes mobiles sunt fatis, & quaquaversum repunt, versus loca, ubi alimentum invenire solebant: vermis latus minus mobilis est; & hinc saepe per plures annos in corpore hospitatur, absque multa molestia.

Ob eandem rationem haud difficulter intelligitur, cur vermibus laborantes illico tumeant post pastum; dum nempe agmen vermium versus superiora repit. Ubi enim §. 646. & sequentibus de *Ructibus*, & *Flatibus* agebatur, constitit, illos nasci ab elastica materia, quae nunc coërcetur, contractis ventriculo, & intestinis, nunc vero, laxato claustro coërcente, exploditur cum sono, & impetu.

Verum ab aëre deglutito cum cibus, & potibus, praesto est elastica talis materies, cujus copia augetur, dum per ciborum digestionem magis extricatur, & separatur aër ab ingestis; causam irritantem in contractiones intestina praebet vermium motus, & vellicatio. Unde subitus abdominis tumor post pastum inter signa vermium in intestinis latentium numerari solet.

Alvi flares. Antea ad §. 719. & sequentes, dum de *Diarrhoea Febrili* agebatur, dictum fuit, praeter stimulum irritantem, pro causa haberi vires in intestina expellentes validas, dum simul in ipsis intestinis contrahentes vires debiles, vel in vasis absorbentibus intestinorum impedimenta sunt, ne admittant.

Sed vermes, rependo, & vellicando, agunt instar stimuli, & videmus, nauseantibus os liquidis impleri: simul vermes turbant naturalem motum peristalticum, qui resorptionem, liquidi in cavo intestinorum, contenti adeo promovet. Insuper pituita, vermium nidus, de quo §. 1369. dicetur, impedire potest facilem humorum resorptionem, obstruendo venarum in intestina hiantium oscula. Accedit, quod, si numerosa vermium cohors adsit, plures ex illis moriantur, mortui putrescant in intestinis, sicque nova floris alvi causa nascatur.

Animi deliquia. Dum vermis, in cavo pericardii haerens, cor irritabat, mirum non erat, frequentia adfuisse animi deliquia; sed, ventriculo turbato, cordis motum turbari, antea pluribus demonstratum fuit; imprimis §. 700.

&

(c) Praediction. lib. 2. cap. 14. Charter. Tom. VIII. pag. 824.

& sequentibus, ubi de *Delirio Febrili* agebatur. Ob hanc causam ventriculi superius orificium *καρδία* vocarunt veteres Medici, quia tantum in cordis actionem habet imperium. Multis agit Galenus (d) de ventriculo, & cardia, concluditque: *Nec mirandum, si ejus dolores, tum animi deliquia, tum virium lapsus, comitentur. Quam enim digiti offensione videantur aliqui animi deliquio laborare, mirum profecto non est, affecto stomacho id accidere; quum & ob eximum sensum, & ob situs vicinitatem, duo principia promptius in consensum adsciscere possit.* Alio in loco (e), de eadem re agens, plurima recenset symptomata, quae cardiacam male affectam sequuntur; dein addit: *Atque horum symptomatum vix ullum crederes a ventriculi ore procedere, quemadmodum nec syncopas quoque, nisi crebro ita evenire videretur.* Si jam cogitemus, ventriculum, & intestina non tantum irritari, ac vellicari a vermibus, sed quandoque perterebrari, syncope etiam lethalis sequi poterit. *Sed & doloris vehementia vires prosternit; nimirum si repente vel morsus incidat, vel tormina, vel colicus affectus, vel ileos (f).*

Pulsus exiles, deficientes, intermittentes. Tales pulsus enim solent praecedere animi deliquia, & designant, vires vitales labascere: ratio modo dicta fuit.

Pruritus narium. Membrana, quae nares internas investit, pituitaria dicta, videtur continuari per pharyngem, oesophagum, & forte ulterius: omnia enim haec loca madent muco ab arteriis secreto, similisque ventriculi, & intestinorum superficiem inungit, ac lubricat. Vasorum artificiosa repletio per materiam ceraceam abunde docet, diversum apparatus esse in naribus, oesophago, ventriculo, & intestinis; nec mirum, cum adeo diversae sint functiones harum partium. Verum videtur esse membranae continuatio in his partibus, ex qua, praeter alios usus, mollis mucus secernitur. Dum ergo vermes in intestinis, vel ventriculo repunt, non adeo mirum est, si & nares leviter irritentur, per quas nervi distribuuntur numerosi, & adeo sensibiles, ut afficiantur a minimis rerum odoratarum effluviis, quae nullis aliis sensibus percipi possunt. Certum est, constanti observatione, etiam vulgo notissima, verminosos infantes nasum perpetuo fricare.

Insultus Epilepticos. Hoc jam notatum fuit ad §. 1075. N. 4.; & numerosae observationes confirmant, vermes satis frequenter dedisse *Epilepsiae*, dirisque convulsionibus causam. Verum & *Catalepsis*, in quo mirabili morbo, uno quasi momento, totum sensorium commune immobile fit, omne mentis imperium in corpus cessat, omnia manent in eodem statu, in quo erant illo temporis momento, dum morbus invadit, ille, inquam, morbus a vermibus productus fuit. Videatur mirabilis ille casus, cujus oculatus testis fui; qui ad §. 1040. descriptus habetur. Vidi molestissimam vertiginem ilico sana-

(d) De symptom. caus. Lib. I. cap. 7. Charter. Tom. VII. pag. 60.

affect. Lib. V. Cap. VI. Charter. Tom. VII. pag. 492.

Medend. ad Glauc. Lib. I. cap. 15. Charter. Tom. X. pag. 360.

Tom. IV. Pars II.

(e) De locis

(f) Galen. Method.

sanatam, per vomitum excussis vermibus: mane jejunum hominem praecipue infestabat vertigo; minuebatur post sumtum jentaculum. Vermis latus teretibus vermibus minus mobilis est; & tamen de illo Hippocrates (g) monuit sequentia: *Ubi homo jejunus fuerit, alias, atque alias ad hepar fertur impetu, & dolorem excitat. Interdum autem, ubi ad hepar irrumpit, sputa ad os affluunt; interdum vero minime. Nonnullis quoque, ubi ad hepar vehementer proruperit, vocis defectionem inducit, & ex ore sputa admodum multa fluunt, quae paullo post sistuntur, subindeque tormina multa in ventre excitantur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit; illuc enim etiam decumbit.* Vermes, teretes imprimis, dum deficit in intestinis pabulum, versus duodenum prorepunt, quod sub hepate ponitur; & ideo videtur Hippocrates dixisse, quod in jejunis vermes ad hepar ferantur. Vidi in tyrone artis chirurgicae, miti febre continua decumbente, quae jam statum praetergressa manifeste declinabat, subito accessisse aphoniam cum involuntaria faecum alvinarum excretionem. Mirabar hoc imprimis, cum in toto morbi decursu nullum signum affecti cerebri adfuisset, nec ullam rationem invenirem cogitandi de metastasi materiae morbosae in caput. Paullo post evomuit vermem teretem vivum, & illico omnia haec mala evanuerunt, morbusque reliquum decursum absolvit feliciter, & brevi.

Ancilla, triginta trium annorum, subitis & validissimis abdominis doloribus, praecipue circa ventriculum, obnoxia, convellebatur fortiter, nec ullum verbum proferre poterat, licet mente, & sensibus valeret: sequebatur tetanus universalis, cum palpitatione cordis; mens constabat; dolores ventriculi horrendi manebant; & tertia die periit. Cum pessima, & anomala symptomata veneni dati suspicionem facerent, apertum fuit cadaver; & in intestino duodeno, atque in cardia, sive sinistro ventriculi orificio inventi fuerunt numerosi vermes teretes, magni, quorum quidam quindecim, & sedecim pollices longi erant. Cardia autem sanguinolenta, & erosa inveniebatur (h).

Sed & molesta tussis aliquando a vermibus excitatur. Docet Diemerbroeck (i), quandoque vermes in pulmonibus repertos fuisse; & testatur, se vidisse vivum vermem, magnitudine, & forma bombycem majusculum referentem, sed subrubrum, cum valida tussis a muliere quadam excussum. In aspera arteria ciconiae Vvepferus (k) invenit plurimos vermes, ascaridibus similes; sed crassiores, & longiores circa asperae arteriae primam divaricationem; & in bronchiis vicinis in glomerem coacti erant. Mirum minime est, tussim fieri a vermibus in pulmone nidulantibus; sed videtur etiam tussis excitari posse a vermibus, qui in ventriculo, & intestinis haerent.

Antea ad §. 1345. notatum fuit, tussim natam fuisse ab attactu intestini coli, cujus abscissi extremum in abdomine vulnerati olim militis prominebat.

Cer-

(g) De Morbis Lib. IV. Cap. XV. Charter. Tom. VII. pag. 614.

(h) Heisters Wahrnehmungen N. 372. pag. 614. 615.

(i) Anatom. lib. 2. cap. 13. pag. 306.

(k) Cicut. aquat. histor. & noxae cap. 19. pag. 236.

Certe *Aëtius* (l) inter signa vermium in intestinis latentium numerat *tussiculas tenuissimas*, ac frequenter irritantes, quum tamen nihil rejiciatur. Eru-
ditissimus *Freind* (m), licet crederet, tussim inter vermium symptomata non
numerari ab antiquis Medicis, tamen testatur, recentiorum numerosa obser-
vata, & propriam experientiam evincere, in pueris praecipue, qui vermi-
bus laborant, tussim esse symptoma frequentissimum.

Facile patet, ingentem Symptomatum varietatem obtinere posse, prout
vermes has, illasve partes irritant, aut rodunt; neque tantum ex ipsa laesione
partium sola, verum etiam quatenus inde aliae partes dislitae in suis functio-
nibus turbari possunt; uti ex dictis patet.

In *Coacis Praenotionibus* (n) leguntur sequentia: In *Lientericis cum animal-
culis* (*μικρὰ θνητῶν*), dolores tormine soluti partes circa articulos tumefaciunt: ex
talibus squamulae rubicundae, postulosae: exsudantes hi velut flagris caesi rube-
fiunt. Verum quidem est, *πὰς θνητῶν* pro feris & malignis ulceribus haberi
apud *Hippocratem*, & lienteriam saepe sequi post longas dysenterias, in qui-
bus intestina ulcerata sunt; sed & plurimis in locis *πὰς θνητῶν* intestinorum ver-
mes significant; quod credo in hoc textu obtinere: quia in oenopola quo-
dam, vermibus laborante, totam horum symptomatum seriem, eodem ordi-
ne, ut hic recensentur, vidi: quam maxime mirabar in hoc homine, post-
quam sudaverat, totum corpus vibicibus rubris obsideri, ac si virgis caesus
fuisset. Caeterum bidui spatio hi vibices disparuerunt; & a morbo suo
post aliquod tempus integre curatus fuit.

§. 1365. **E**fficiunt consumptione chyli esuriem, pallorem, debilita-
tem, alvum adstrictam, inde tumorem abdominis,
ructus, horborygmos.

Vermes, uti ex ante dictis constat, quandoque ingenti numero adsunt in
intestinis, & ventriculo: taenia immanem quandoque longitudinem habuisse
observata fuit. Nutrimento hi indigent, ut sustineantur, & crescant; quod
videntur invenire in locis corporis, ubi habitant. In renibus inventi fuerunt
vermes, qui totam illorum substantiam consumserant; in hepate nidulabatur
vermis, qui illud viscus eroserat (o), viginti pollices longus, & diametro
pollicem aequans, ruber, sanguine plenus, saturae hirudinis instar. SENSE-
rat misera aegra vivi animalis motum; summos dolores cum manifesto rosio-
nis sensu querebatur; praedixerat Medicis, & adstantibus saepius, vivum
animal viscera discerpere. Tales vermes chylo non nutriri, certum est.

Sed vermes intestinorumundique chylo alluuntur; albi coloris sunt; si aquae,
vel & spirituofo liquido immittantur, illud lacteo colore turbidum reddunt;
non semper vellicant intestina; ita ut saepe per plures annos haereant in cor-

x 2

po-

(l) Sermon. 9. Cap. 39. pag. 171.
Charter. Tom. VIII. pag. 879.
pag. 67. & seq.

(m) Histor. of Phys. Tom. 2. pag. 100.

(n) N. 467.

(o) Medic. Observat. and Inquir. vol. I. N. IX.

pore, imprimis vermis latus, absque magna molestia. Unde patet, quod non ex substantia ipsa ventriculi, & intestinorum hauriant nutrimentum, sed ex illis, quae horum viscerum cavo continentur; inter quae certe chylus blandus nutriendis his animalibus aptissimus videtur. Dubitavit de hac re *van Doeveren* (p), an non, praeter chylum, etiam sanguinem haurirent vermes. Meminit taeniae, quam amicus expelli vidit, *cujus osculis singulis guttula sanguinis effluebat*. Confirmari hoc credidit observatione vermis excreti (q), qui totus sanguine plenus erat; quem vermem latum credidit. Verum, si examinetur figura hujus vermis, Icone expressa, omnino differt a verme lato; sed potius videtur similis illi, qui hepar eroserat, cujus statim mentionem feci.

Omnia haec modo dicta si considerentur, videtur admodum verosimile, quod vermes intestinorum chylo nutriantur: neque videntur argumenta clarorum virorum (r), qui contrariam opinionem tuentur, omni exceptione majora esse.

Opponi forte posset *Couleti* (s) observatio. Vidit enim, *Ascarides* ipsi vocatos vermes, simul ac ano exiverunt, emittere substantiam quandam albissimam sub forma liquoris; quod optime apparet, si *Ascaris* in aquam, aliumve liquorem demittatur; *tunc enim visibiliter exit a partis anterioris extremitate media, eodem fere modo, ac fumus e camino, vel vapor tenuis ex angustiore parte Infundibuli inversi prodire consuevit* &c. Post aliquod temporis spatium illud album petit fundum, sub specie pulveris tenuissimi, atque albissimi.

Albus ille liquor, qui instar guttae lactis conspicitur, brevissimo tempore totus exsiccat, & refert cretam, aqua gummata solutam, ac siccata, simulque tenaciter haeret obviis corporibus: sed liquor ille, sive fluidus adhuc, sive exsiccatus fuerit, intensissimae falsedinis saporem linguae imprimit. Unde sequi videtur, quod ille liquor a blando chylo diversus omnino sit.

Verum considerari debet, chylum intestinorum, si vermibus alimentum det, ulterius adhuc elaborandum esse in vermium corpore, antequam illum nutrire possit; & tunc longe alias dotes acquirit, ac prius habebat: hinc falsus ille, albus, cito exsiccandus, humor, quem eructat *Ascaris*, non est chylus, sed ex chylo in vermis corpore elaboratus liquor.

Si ergo, uti admodum credibile videtur, vermes chylo alantur, defraudatur nutrimenti parte corpus, dum vermes illud consumunt; hinc perpetua alimenti necessitas adest, & vermibus laborantes magis esuriunt. Insatiabilem sic famem observavit, quam *Bulimum* vocant Medici, *Alexander Trallianus* (t) in homine, cui vermis in stomacho haerebat. Quandoque famem acerrimam illico nausea sequitur, motis nempe vermibus post cibum ingestum, uti aliquoties in verminosis observavi.

Pal-

(p) Dissertat. de verm. intestin. pag. 48.

(q) Medic. Essays and observat. vol. 2. N. 26. pag. 333. & seq.

(r) Essais sur l'educat. medic. des Enfants rom. 2. pag. 37. &c.

(s) De Ascarid. & Lumbr. lato Cap. 8. pag. 19. & seq.

(t) Lib. VII. cap. 4. pag. 324.

Pallorem, debilitatem. Cum ex bono chylo per actionem vasorum, & viscerum sanguis confici debeat, a quo reliqui humores subtiliores debent secerni, patet sponte, ob solam copiam chyli minutam, minui debere & sanguinem rubrum; unde pallor, quem, a tali causa natum, semper debilitas comitatur.

Alvum adstrictam &c. Praecedenti paragrapho dictum fuit, vermes irritando alvi fluores quandoque producere. Verum, ubi morbus adultior est, & vermium copia aucta, tunc omne fluidius ex contentis intestinorum vermes consumunt, crassum manet, & ob turbatum motum peristalticum non propellitur expedite anum versus: hinc intestina impleta dilatantur; vis contractilis illorum minuitur; & ideo magis magisque abdomen turgescit, ut in verminosis pueris quotidiana observatio docet.

Ructus, & borborygmi. Videantur illa, quae ad §. 648. de his dicta fuerunt: causa enim spasmos intestinorum produciens adest, irritatio nempe a vermibus facta, & major acrimonia materiae retentae; sed & simul a putredine retentorum produciuntur copia elasticae materiae, adeoque ructuum, flatuum, borborygmore causa completa adest in verminosis.

§. 1366. **E**fficiunt saepe perforationem ipsorum intestinorum.

Fuerunt clari in arte Viri, qui dubitaverunt, an unquam vermes intestina perforare possent. Nondum enim a naturalis historiae auctoribus descripta fuerunt talia in vermibus humanis organa, quibus possent perforare, & erodere intestina. Negari non potest, inventos fuisse in cavo abdomine vermes, & adfuisse simul intestinorum perforationem. Malebant tamen credere, solutionem illam continui, in tubo intestinali post mortem deprehensam, esse effectum gangraenae, quae dum in tabum putridum diffluit, vel separatur per suppurationem, natam a vivis partibus vicinis, necessario viam facit, per quam vermes in cavum abdominis venire possunt (u). Vix dubium est, quin hoc quandoque contingat. Sed numerosa, & fidelia observata docuerunt, vermes sibi ipsis viam parasse, perforando intestina.

Acerbissimus ille casus, cujus §. 1364. memini, de adulta virgine, quae post enormes dolores tetano correpta periit, hoc docet evidenter. In ventriculo enim numerosi vermes teretes inventi fuerunt, & cardia erat sanguinolenta, ac erosa.

Dolores molestissimi, qui toties in verminosis observantur, idem suadent, & ideo ab *Hippocrate* inter signa Diagnostica numerantur, quae vermium praesentiam in corpore humano docent: *Oris ventriculi dolores cum tormine ventris animalcula (νεῖα) erumpere faciunt.* Aperuit *Heisterus* cadaver pueri septennis, qui ab aliquo tempore molestos dolores abdominis passus fuerat, & li-

cet

(u) Bruzet sur l'educ. medic. des Enfants Tom. 2. pag. 38.

cet optimo gauderet appetitu, tamen sensim torositate corporis imminuta periit. In abdomine aliquot uncias aquae flavae invenit, quibus spongia absorptis in conspectum veniebant plures vermes teretes; & licet cadaver sequente post mortem die apertum fuerit, unicum inter illos invenit vivum. Intestina tenuia foraminulenta erant, & plures adhuc continebant vermes, sed omnes mortuos. Nullam gangraenae mentionem fecit; sed invenit in quodam loco intestinorum tenuium tumorem rubrum, durum, qui patula aliquot foramina habebat, per quae vermes intestinorum in cavum abdominis prorepisse credebat (v). Eadem haec observatio, latina lingua scripta, alibi legitur (x).

Foeminae, torminibus, vomitu, & stricta alvo laboranti per quinque dies, varia adhibebantur absque multo fructu: frequenti usu clysmatum emollientium alvus evacuabatur, cum aliquo levamine torminum ventris; sed manebat vomitus. Octavo die evomuit vermem teretem, qui pollicem longitudine aequabat. Inde levamen circa ventriculum sensit; sed manebant tormina, licet leniora.

Monebat, tumorem adesse in inguine dextro jam per octodecim menses, instar ovi gallinacei minoris, qui tumor nunquam haecenus doluerat, sed cedebat pressioni manus. Herniosum tumorem suspicabatur peritus chirurgus Douglas (y), illumque ex arte tractabat per triduum, cum aliquo aegrae levamine. Quarto die dolor multum augebatur in tumore, cum sensu pulsationis; tunc primo permisit Chirurgus, ut oculis lustraret malum, quod haecenus sollicite texerat. Invenit tumorem inflammatorium largum, in suppurationem tendentem, absque ulla intumescencia glandularum inguinalium: applicato cataplasmate suppuratorio per biduum, ruptorio communi decima quarta morbi die apertus fuit tumor; exiverunt quatuor circiter unciae puris serosi, quod successive in melius mutabatur: sed vigesimo tertio die ex ulcere prodiit vermis teres, simulque recordabatur, biduo post aperturam ulceris similem vermem exivisse; postea adhuc alter prodiit: circa quadragesimum diem ulcus consolidatum fuit: post mensem tamen parva apertura denuo in cicatrice apparuit, per quam tenuior pars excrementorum prodiit. Sed leve hoc incommodum postea facile toleravit.

Satis similem praecedenti affectum tractavit (z) *Celeberrimus Benevoli*, qui omnibus consideratis credidit, intestinum a vermibus perforatum esse; *uti cadaverum incisio docuerat, saepius contigisse* (a). Ex urethra pueri septennis prodierunt vermes intestinorum saepius, quos pater, dum circa glandem haerebant, solebat extrahere. Semel dum hoc tentaret, ruptus fuit vermis, & residuum, in urethra haerens, impedivit urinae excretionem; tabescente tamen brevi verme, ut praedixerat celeberrimus ille Vir, urina libere prodiit. Mortuo puero, in vesica inventi fuerunt duo calculi. Sed collum vesicae obli-

(v) Heisters Wahrnehm. N. 515. pag. 869.

(x) Act. Phys. Med. Volum. I. observ.

172. pag. 391.

(y) Med. Essays and. observat. Tom. I. N. XIX. pag. 223.

(z) Dissertat., e Osservaz. N. XVII. pag. 145. & seq.

(a) Ibid. pag. 149.

oblique perforatum erat; quae perforatio respondebat simili foramini in intestino recto: patebat ergo sic via, per quam vermes ex intestino in urethram venire poterant. Dubium tamen manet (ut nil dissimulem), an erodendo vermes viam sibi paraverint. *Alghisi* enim, inter lithotomos sui temporis adeo celebris, credebat, forte post toleratas variolas, abscessu hic nato, erodi potuisse intestinum rectum, & collum vesicae; tamen in historia morbi non memoratur, quod constet, talem abscessum in his locis adfuisse (b).

Tulpius (c) observavit, ex ulcere inguinali mulieris erupisse lumbricum vivum; & licet Chirurgus inde metueret immedicabile intestinorum ulcus, tamen brevi curata fuit.

Egregius vir *Jacquin*, dum in America degebat, ut colligeret specimina rerum naturalium, quae ingentem thesaurum *Augustissimi Imperatoris* augment, & ornant, scripsit mihi, incolas, vermibus frequentissime laborantes, saepius perire, eroso a vermibus ventriculo. Fidem, & diligentiam hujus viri nemo facile in dubium vocabit: luculentum enim testimonium dat splendidum opus Botanicum, quod hoc anno in lucem prodiit.

Credo haec sufficere, ut probetur, perforationem intestinorum a vermibus metuendam esse.

§. 1367. **U**Nde & toties lethales reperti sunt.

Verum quidem est, quod *Hippocrates* (d), de verme lato agens, dixerit frequentia: *Qui hunc vermem habet, ei toto quidem tempore nihil valde metuentum accidit; quum vero debilis extiterit, aegre reficitur. Vermis enim eorum, quae ventriculum ingrediuntur, partem aliquam assumit. Si igitur, ut convenit, curatus fuerit, convalescit; si vero non curetur, sua sponte non exit; mortem tamen non infert; sed una consenescit.* Negari nequit, vermem latum per multos annos quandoque hospitari in corpore absque periculosis malis; sed non absque molestia semper. Verum illa, quae haecenus dicta fuerunt de vermibus, satis probant, saepius mortem his imputandam esse, sive lentam, dum miseri infantes ob nutrimenti defectum, tumente abdomine, vero marasmo pereunt, sive subitam, dum diris convulsionibus necantur. Plures observationes enarratae fuerunt, quae hanc veritatem docent.

§. 1368. **C**Ognoscamus ab aetate, victu, temperie, effectibus,
(1364. 1365. 1366.)

Antequam de curatione vermium dicatur, operae pretium est considerare illa signa, quae docent, vermes adesse in corpore, ne anthelmintica remedia adhibeantur, dum ab aliis causis symptomata observata ortum ducunt. Si

x 4

ver-

(b) Dissertaz. e osservazion. VIII. pag. 109. & seq. (c) Lib. 3. observat. 12. pag. 199.

(d) De Morb. Lib. IV. cap. 15. Charter. Tom. VII. pag. 614.

vermes sursum, vel deorsum prodierint, credere possumus, plures adhuc latere in corpore, si eadem symptomata maneant, vel augeantur; & tunc facilis est Diagnofis. Verum, ubi nulli unquam vermes excreti fuerunt, & tamen vermium suspicio adest, tunc ad omnia sollicitè attendendum, ut bona Diagnofis haberi possit.

Aetate. Juniores magis infestantur vermibus; & ideo inter morbos infantum vermes recensentur: tamen ex antedictis patuit, reliquas vitae periodos a vermibus non semper immunes esse. Voraces & in junioribus, & in adultis saepius inveniuntur verminosi.

Victu. Observavit modo laudatus *Jacquin*, plurimos laborare vermibus, qui fructibus horaeis nondum bene maturis, piscibus & carnibus salitis, copiose vesciebantur, dum reliqui, meliori diaeta utentes, magis immunes forent. Narravit mihi probus ex Franciscanorum familia religiosus, qui per aliquot annos in aula Regis Marocco vixerat, plurimos delectari crudae carnis esu, & vermibus pessime laborare, non sine periculo, nisi singulis mensibus, valido, purgante remedio sumto, verminosa haec saburra de corpore expellatur. Pauperum infantes, qui meliori victu carent, & obvia quaeque comedere solent, longe frequentius aliis, vermibus cum tumido abdomine laborant, uti quotidianis observatis constat.

Temperie. Si nempe laxi, pituitosi fuerint, in quibus omnes corporis functiones languidius excercantur. Videantur illa, quae §. 1360. 1361., circa hanc rem dicta sunt.

Effectibus. Qui paragraphis hic citatis enumerati fuerunt.

Sed & vermium copia quandoque una cum morbis Epidemicis observatur. Sic in Budensi obsidione prima morbus Epidemicus verminosus grassabatur (e). Saepius in morbis castrensis hoc observatum fuit, uti etiam post largas inundationes. Plurimae observationes, quae hoc confirmant, collectae habentur (f). Verno tempore 1763., ruri degens, longe plures rusticorum pueros curandos habui, qui vermibus laborabant, quam aliis annis. Praecesserat tamen hyems acerrima, & longa. Autumnali tempore solent ut plurimum vermes magis molesti esse. *Hippocrates* (g) dixit, *Autumno maxime lumbrici, & cardialgia.* Idem confirmat *Raulin* (h), qui observavit hominem, taenia laborantem, qui per viginti quinque annos singulis autumnis colicis doloribus vexabatur, reliquo autem anni tempore solitis exercitiis vacabat, & appetitu gaudebat integerrimo. Praeter hos dolores colicos autumnales nullum aliud symptoma aderat per quatuordecim annos, nisi quod subinde, circa finem hujus periodi, vermes cucurbitini per anum exirent, qui, non sine ratione, pro signo latentis taeniae haberi solent.

Quaedam adhuc alia signa latentium in corpore vermium apud auctores habentur.

(e) Marfigl. Histor. Danub. Tom. VI. pag. 114.

(f) Van Doeveren dissert. de verm. intestin. pag. 27.

(g) Epidem. lib. 2. text. 3. Charter. Tom. IX. pag. 119. & lib. 6. Epidem. text. 14. Ibid. pag. 376.

(h) Des malad. occas. par les variat. de l'air pag. 424. &c.

bentur. Sic *Jacotius* (i) monet sequentia: *In pueris autem, tum ex aliis signis, tum familiari illo deprehenduntur, quod, per somnum concipientes lumbricorum in ventre morsum, mastigent musculis masticatoriis imaginata, ut volunt, exprimentibus.*

Alii addiderunt, praeter signa memorata, odorem quemdam peculiarem, qui describi verbis non potest, singultum, terrores in somnis, nasum album cerae instar (k), subitas mutationes coloris in facie. *Celeberrimus Alexander Monro* (l) addidit adhuc aliud signum: *Diu observavi, inquit, in illis hominibus pupillam esse dilatatam, qui vermibus in ventriculo, vel intestinis laborant; & si non pro signo pathognomico, saltem pro syndrome, sive symptomatum concursu, & optima Diagnosi haberi potest.* Phoenomenon autem hoc explicat ex unione paris nervorum octavi cum nervo intercostali. Constat enim, dissecisso nervo intercostali in cane vivo, oculos obscurari, splendorem amittere, lacrymari, cavos fieri, globum oculi minui, pupillam coarctari. Unde conclusit, nervum intercostalem dilatationi pupillae servire, & ab irritatione nervorum ventriculi, ac intestinorum actionem ejus augeri.

Notum est, in vera & perfecta amaurosi pupillam esse dilatatissimam, & oculos apparere nitidissimos, lucentes quasi. Scripserat autem ad me *Jacquin*, dum in America degebat, incolas frequentissime vermibus infestari, & observavit signa sequentia, quae aderant; *Somnolentia, tormina ventris, oculi clari, sed flavescentes, palpebra inferior flavescent, vel caeruleascent, convulsiones subito lethales.* Pulcre certe confirmatur sic *Celeberrimi Monro*i opinio.

Nunquam nocebit plura signa colligere, ut tanto certior habeatur Diagnosi. Quandoque enim plura vermium symptomata occurrunt, licet nulli adsint. Memorabilem talem casum recenset *Celeberrimus Edinburgensis Professor St. Clair* (m). Puer quatuor annorum stomachi dolores patiebatur; narium aderat pruritus, pervigilia, terrores in somnis, & tunc subito cum subfultu evigilabat; postea nares perfricabat perpetuo, sive vigilaret, sive dormiret; sequebantur convulsiones, quibus sexto die periit, incassum tentatis pluribus, secundum artis praecepta, remediis. Intestinis in tota sua longitudine caute dissectis, uti & ventriculo aperto, nulli apparuerunt vermes; sed inveniebantur unciae circiter binae substantiae viscidae, gelatinae instar, circa jejuni intestini principium.

Quandoque observatum fuit, expulsis jam vermibus, quaedam adhuc manere symptomata, quae vermibus imputari possent. Sic toties contingit, Epilepsiam a vermibus productam, si frequentes jam fuerint, & validi paroxysmi, manere, vermibus sublatis. Manet tunc in sensorio communi, toties, & tam valide turbato, character ille Epilepticus, qui diu sopitus silet; sed non tantum a vermibus, verum & ab aliis causis proëgumenis excitari potest, & actuosus reddi. De qua re videantur illa, quae in Capitulo de Epilepsia habentur.

(i) Holler. in Coac. Hippoc. pag. 594.

(k) Brouzet Educ. Médic. des Enfants Tom. 2. pag. 57.

(l) Nervor. Anat. contract. pag. 39. in notis.

(m) Medic. Essays and observ. Vol. 2. Artic. XVIII. pag. 294. & seq.

bentur. Cum enim, uti postea dicetur, in cura validis purgantibus opus sit, minime tutum foret corpus per haec emungere ulterius, si non vermes, sed levia tantum symptomata quaedam superessent.

§. 1369. **C**uratio fit 1. nidum destruendo (§. 1361.) per alcalia fixa, gummata phlegmagoga, mercurialia, antimonio, aromatica amara.

De pituita, tanquam vermium nido, ad §. 1361. jam dictum fuit: adest mucus inungens internam superficiem intestinorum, & lubricans; haec quandoque augeri potest, mollemque nidum vermibus parare. Verum & ex ipsa superficie corporis vermis videtur secerni copia viscerum humoris, quo undique tegitur, & sic ab acrimiae ingestorum actione defenditur. Mucus, vermem involvens, copia auctus, secedit, novusque in eisdem usus secernitur. Ob hanc causam creditur, illos, qui vermibus laborant, frequenter mucosa per alvum excernere (n).

De cura talis glutinis, in primis viis collecti, dictum fuit ad §. 75. ubi de curandis morbis ex glutine spontaneo ortis agebatur. Amara biliosa, saponacea solventia, gummi aromatica stimulantia, quae simul leniter evacuant, salina solventia, aromatica roborantia, blanda mercurialia laudantur imprimis. In *Materia Medica* ad hunc numerum habentur formulae, quae huic scopo servire possunt, & ad quarum normam aliae plures similes possent praescribi.

Facile intelligitur, in horum usu semper habendam esse rationem aetatis, ac virium; & augeri, vel minui debere dosin horum remediorum pro re nata.

§. 1370. **T**um externe inungendo abdomen balsamicis ex aromaticis fortissimis, permixtis purgantibus, oleosisque.

Pleraque ex remediis modo laudatis amara sunt, alia satis nauseosum saporem habent: unde saepe admodum difficile est, infantibus saltem, talia ingerere ea copia, ut effectus inde sperari possit. Hinc coacti fuerunt Medici ad externa remedia confugere.

Bina talia Unguenta in plerisque officinis prostant, quae, abdomini inuncta calide, penetrabili vi agunt in intestina, saepe cum hoc effectum, ut valida purgatio sequatur. *Unguentum Agrippae* acerrima purgantia continet, *radicem Bryoniae*, *Elaterium*, sive *cucumerum asininum*, *Scillae bulbum*, *Iridis radicem*. Alterum est, *Unguentum Arthanitae*, sive *de Cyclamine* dictum; quod praeter *Cyclaminis* radices, & *Cucumerem Asininum*, continet *Colocynthidis* pulpam amarissimam, *Fel taurinum*, *Baccas Mezeraei*, *Scammoneum*, *Euphorbium*, *Aloen*, &c. Utriusque hujus Unguenti aequalis copia miscetur in *Materia Medica*, ut pauxillum subinde inungatur umbilici loco.

Ple-

(n) Philosoph. transact. Abrig'd vol. 3. pag. 130.

Pleraque remedia, ex quibus componuntur haec unguenta, validissime alvum movent; unde non, nisi magna cum prudentia, interno usu adhiberi possunt in sanis, & robustis hominibus: a leniorum enim usu externo nihil sperari poterit. An vero stimulans vis horum medicamentorum, per cutem penetrans, in supposita intestina agat immediate, an vero resorpta per venas absorbentes cutis, cum reliquis corporis humoribus fluens per vasa, alvi purgationem producat, disputatur. Certum est, quod, similibus umbilico inunctis, in tenella aetate, secuta fuerit aliquando periculosa hypercatharsis, quae molestant Dysenteriam producere poterit. Unde pauculum tantum illinitur simul, & dum de ventris torminibus conqueri incipiunt, prudentia suadet, non amplius umbilicum inungendum his esse, antequam constet de effectu. Si autem copiosa evacuatio sequatur, abluendus est ilico umbilicus, & vicina cutis *Saponis Veneti* lixivio; ne quid de unguento maneat amplius in cute, quod similes turbas augere posset.

In *Materia Medica* ad hunc numerum & alia formula habetur, quae nulla purgantia remedia habet, sed cujus efficacia a fragranti aromate *Tanacetii* praecipue pendet.

§. 1371...2. **V**ermes necando: quod fit ope Medicamentorum mellitorum, salinorum, indigestibilibus vermibus, amarorum aromaticorum, Mercurialium, Acidorum, Vitriolatorum ex chalybe, vel cupro.

Vermes intestinorum, dum vivunt, sic videntur haerere posse intestinorum lateribus, ut illo motu, per quem ingesta ad anum usque sensim protruduntur, non expellantur de corpore. Vermes teretes tamen facilius prodeunt, & frequentius per anum; praecipue si mortui fuerint; quandoque etiam vivi, domicilii sui pertaesi, prorumpunt per anum; quandoque & ventriculum ingressi per vomitum expelluntur vivi, uti frequenti Medicorum observatione constat. Sed vermes teretes satis mobiles sunt; & probabile est, quod locum saepe mutant; imo morborum tempore, uti antea dictum fuit, nullis anthelminticis remediis datis, dum nec aeger, nec Medicus illos adesse suspicatur, sponte prodeunt. Forte humores, per morbum mutati, in intestinis collecti, vermibus infesti fiunt, sicque cogunt, ut locum mutant. Si illo tempore, dum valido nixu alvi vel invitatus homo cogitur faeces expellere, quidam vermes non haereant intestini lateribus, una cum faecibus abripiuntur. Taenia autem, uti antea dictum fuit, tenuiori suo extremo figitur, & haeret firmiter intestino: hinc etiam difficilior expellitur; & raro sponte prodit integer; satis saepe tamen notabilis ejus pars abrupta, multas quandoque ulnas longa, expellitur, uti numerosa observata docent. Ascarides, & cucurbitini, admodum mobiles cum sint, frequenter per anum prodeunt.

Si autem hoc obtineri possit, ut vermes moriantur in intestinis, tunc cum reliquis faecibus facile expelleantur, dum motui peristaltico intestinorum resistere

sistere tantum possint vivi. Et licet vermes, jam mortui, adhuc adhaerent intestinis, in loco calido, & humido brevi tabescerent, sicque nexus ille solveretur.

Optime hoc notavit *Aëtius* (o), dum de vermium cura agit, dicens: *Viventes equidem vicinas partes apprehendunt; mortui vero, una cum stercore, evacuantur. Prodeunt autem quidam adhuc vivi, sed vertigine affecti, & si ita dicere libeat, seminecati.*

Verum, dum vermes necandos esse indicatio suadet, simul cavendum quam maxime est, ne exhibeantur talia, quae intestina, aut ventriculum, laedere possent. Plura recensentur remedia ad hunc paragraphum, quae considerari singulatim merentur.

Ope Medicamentorum mellitorum. Solventes in melle vires agnoverunt omnes; hinc solvendae pituitae, & attenuandae prodesse potest. An autem vermibus infestum mel ipsum sit, non adeo constat. Verum quidem est, *Aëtium* (p) ad vermes laudasse mulsam, & suasisse; *In sorbitiones vero mellis plurimum conjiciendum.* Notandum tamen est, veteres Medicos bilem vermibus adversam credidisse, etiam externe umbilico inunctam. Simul autem statuerunt, mel in bilem verti in corpore humano; praecipue, si simul adsit calida temperies. Sic apud *Galenum* (q) de melle leguntur sequentia: *Siquidem illis, qui jam in flore aetatis sunt, potissimum si calidiore natura sint, ac vitam degant laboriosam, in iis totum mel vertitur in flavam bilem.* Quod idem alio in loco (r) confirmat. Forte & ob hanc rationem mel laudatum fuit inter anthelmintica remedia. Caeterum lubricando, & alvum solvendo prodesse potest. Crediderunt postea recentiores Medici, vermibus ideo nocivum mel esse, si copiosum ingeratur, quod obstruere posset tracheas dictas in insectis, a *Malpighio* in *Bombyce* descriptas, per quas respirant. Verum illae tracheae in vermibus humanis nondum demonstratae sunt; & forte non respirant, cum in intestinis humanis vivere debeant, quorum cavum a contentis repletur; praecipue, cum in statu naturali contracta sint intestina, uti alia occasione in *Capitulo de ructibus, & flatibus* dictum fuit.

Ob eandem rationem & olei usus commendatus fuit, si magna nempe daretur copia, ut intestina hoc non tantum inungerentur, sed quasi repleantur. Sic cyathum olei omphacini propinari, jussit *Aëtius* (s), & ptisanæ oleum plurimum omphacinum incoquendum, *praebitiones vero ex oleo semper augendas*, voluit. Rationem autem dedit hanc: *In universum enim omnia, quae lumbricos educunt, aut per acredinem occidendo, aut per amaritiam subduendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentem ad ea, quae exhibentur, lubricitatem, efficacia cognoscuntur. Extrahuntur autem simul, ut verisimile est, per sorbitiones vias lubricas reddentes, aut etiam per innominatam aliquam*

(o) Serm. 9. cap. 39. pag. 173.

(p) Ibidem.

(q) De natur. facultat. lib. 2. cap. 8. Charter. Tom. V. pag. 45.

(r) De Aliment. Facultat. lib. 3. cap. 39. Charter. Tom. VI. pag. 399.

(s) Serm. 9. cap. 39. pag. 173.

quam qualitatem. Sic & *Vegetius* (r) una cum aliis remediis oleum copiosum miscuit, & vel per cornu ingessit animalibus, vel per clystma injiciendum curavit; dicens; *Quae virtus medicamentorum, & lenitas olei animalia ipsa intus occidit, & foras ejicit.*

Caeterum experimenta capta varium effectum demonstrarunt. *Celeberrimus Lanzoni* vermem humanum vivum excretum oleo communi immerfit; qui statim vivere desit. Lumbricum vomitu rejectum in melle posuit, qui statim mortuus est. Alium vomitu rejectum oleo amygdalarum dulcium immerfit; qui brevi mortuus est (u). Vermes illi teretes fuerunt. Sed *Coulet* cucurbitinos in nullo liquore longius vivos servare potuit, quam in oleo amygdalarum, in quo per 24. horas vixerunt (v). In verme lato, si vivus, & integer ex corpore egeritur, non memini haec experimenta instituta fuisse; cum brevi, postquam expulsus fuit, perire soleat. Experimenta videri possunt plura apud *Celeberrimum Torti* (x), quibus constat, vermes teretes, in Oleo communi, & Melicrato, sive aqua mulsa per plures horas commode vixisse.

Mel, uti etiam oleum, magna quandoque copia adhibui; sed in verme lato necando nil profeci: cum saepe haec nauseam moveant, & vomitum, vidi aliquando per vomitum prodiisse vermes teretes; & a melle copioso dato, si alvi fluxus sequeretur, ut saepe fit, quandoque simul vermes prodierunt. Non tamen ita certus horum effectus fuit, ut fidere liceat. Dum *Ascarides* molestissimum circa anum pruritum facerent, oleum injici curavi saepius, uti & mulsum; sed spem fefellerunt haec auxilia.

Salinorum. Sales, imprimis acriores, vel & leniores majori copia exhibitos, vermibus molestiam facere posse, vix dubium est; sed haec omnia non possunt dari, nisi tam moderata copia, ut intestina laedere non possint; adeoque minor tunc spes erit, vermes inde multum affici posse. Ubi autem sales simul catharticam vim habent, tunc majorem utilitatis spem faciunt. Unde *Salem Sedlicensem*, *Ebsbamsensem*, aliosque his similes prae caeteris laudaverunt Medici.

Ut *Ascarides* in intestino recto, aut pudendo muliebri nidulantes exturbarentur, jussit *Hippocrates* (y), ut muria colluantur haec loca.

Indigestibilium vermibus. Cum vermes videantur potissimum nutriri chylo, hinc vix videntur talia adhiberi posse, quae a vermibus assumerentur, & sumpta illis nocerent.

Dum praecipua remedia talia anthelmintica, ab auctoribus commendata, consideramus, videntur in tres classes satis commode distribui posse. Illa primae classis aspera, ac scabra sunt; & ab his speratur, quod, motu peristaltico in-

(r) Art. veterin. Lib. I. cap. 44. 45. Script. rei rustie. tom. 2. pag. 1065. 1066.

(u) Acta Phys. Med. nat. curios. Vol. I. observ. 94. pag. 173.

(v) De Ascarid. & Lumbrico lato pag. 31. & 33.

(x) Therapeut. special. ad febres &c. Lib. V. cap. 6. pag. 510. & seq.

(y) De Mulier. Morb. lib. 2. cap. 60. Charter. Tom. VII. pag. 832.

intestinorum mota & pressa, tenera vermium corpora destruerent, vel multum laederent; unde mortui, vel saltem debilitati Vermes facilius expelli possent de corpore. Secunda classis continet talia, quae ingratum, & penetrabilem halitum per totum primarum viarum tractum dispergunt, tali modo adhibita, ut continua, nunquam interrupta, actio habeatur. Tertia demum classis complectitur illa, quae licet nec scabritie partium, nec ingrato nidore vermibus infensa esse possint, tamen per observationes comperta sint, quod vermibus noceant insigniter.

Ad primam classem videtur pertinere illud remedium, quod usu efficacissimum se comperisse, testatur *Celeberrimus Mead* (z): *Stanni rasi*, & *coralli rubri* partes aequales in pulverem subtilissimum terebantur, cujus drachmam, cum conserva summitatum *absinthii maritimi* in bolum redactam, exhibebat bis de die. Longe majori copia stannum purum dedit verminosis *Celeberrimus Aston* (a). Post datum catharticum, sequenti die mane vacuo ventriculo dabat unciam stanni puri pulverisati, per cribrum, ex pilis equinis paratum, angustissimas nassas habens, transmissi: miscebat stanni pulverem quatuor unciiis syrupi nigri, vilissimi, qui in depuratione sacchari, sedimenti instar, relinquitur (*Molosses*); & hinc faex sacchari vocatur. Sequenti die unciam mediam stanni pulverisati dabat, permisti duabus unciiis ejusdem syrupi; & eandem dosin exhibebat die tertio. Sequenti die, quarto nempe, dabatur purgans, ex infuso *foliorum senae* & *manna* paratum; quale remedium & fuerat exhibitum pridie antequam pulvis stanni daretur: testatur, se felicissimos effectus hujus remedii vidisse, quod simul ventriculi dolorem, a vermibus natum, statim levat; licet vermes non nisi aliquot diebus postea prodeant. Haec stanni quantitas adultis hominibus datur; in junioribus copia minuitur pro varia aetate.

Quamvis autem stannum, in pulverem redactum, vario modo vermibus nocere possit, credidit tamen *Celeberrimus Vir*, imprimis hoc modo agere, quod pulvis stanni se interponat inter ventriculi, intestinorumque tunicas, & vermes, sicque impediatur, ne vermes facile adhaerere possint ventriculo, & intestinis; unde, dato cathartico, facile expelluntur.

Forte & simili modo agit *ferrum limatura*, si per plures dies omni mane ad drachmae pondus detur (b). Cum tamen ferrum satis facile & in humoribus nostris, & in potu ingesto solvatur, admodum verosimile est, quod non tantum vi mechanica, sed & virtute metallica medicata, agat; de qua re statim adhuc dicetur.

Videtur ob eandem rationem, asperitatem nempe mechanicam, inter anthelmintica remedia nomen celebre obtinuisse plantula marina (forte cum multis aliis ad regnum animale reducenda), quae sub *Corallinae* nomine in officinis prostat. Certe *Conradus Gesnerus* (c) ad vermes necandos praescripsit *Corallinam*

(z) Monit. & Praecept. Medic. sect. 3. pag. 119.

(a) Medic. Essays and observat. Vol. V. part. I. pag. 89. & seq.

(b) Van Doeveren de verm. intestin. pag. 71.

(c) Epistol. Medic. pag. 91.

linam tritam, sed non cribratam. Facile patet, & alios pulveres scabros, & innoxios tentari posse ad eundem usum.

Secunda classis continet illa remedia, quae ingrato foetore vermibus infesta sunt.

Allium inter haec principem locum obtinet, cum odorem satis fortem, penetrabilem, ingratum non assuetis spiret quaquaversum. Ab humano corpore facile fertur, multisque, uti notum est, in deliciis est, dum alii abominantur ejus odorem; inter quos & *Horatius* fuit, qui in parricidii poenam *allium*, *cicuta* nocentius, dari voluit: cum tamen videret, impune comedi a plebe, exclamavit. *O dura messorum Ilia!* Semper in deliciis fuit hominibus, qui duro labore vitam ducunt. Mille, & sexcenta talenta erogata fuerunt in *allia*, *cepas*, & *raphanos*, pro operariis Pyramides exstruentibus (d). Adeo autem penetrabile *allium* est, ut tota cutis, ad apices digitorum usque, spiret *allium* in hominibus, qui quotidiano ejus usui indulgent: imo dum *cataplasma*, ex *Allio*, *malva*, &c. paratum, in *Ischuria* applicabatur lumbis, post mortem aperto abdomine statim exspirabat *Allii* odor (e). Hinc *Allii* virtus aequae facile per venas absorbentes ingreditur, ac per vasa arteriosa penetrat. Ob penetrabiles illas *Allii* vires *Galenus* (f) dixit: *Itaque ego agrestium Theriacen illud edulium appello. Ac, si quis vel Thracas, vel Gallos, vel denique qui frigidam regionem incolunt, vesci illis vetuerit, non leviter iis hominibus nocuerit.* Eodem in loco dixit; *Allium* flatu discutere: sed *Hippocrates* (g) dixit de *Allio*; *Flatum autem parit propter spiritus vehementiam*; & alibi (h); *In utero autem quum flatum excitare volueris, allii caput unicum, & laseris succum ad subdititia admisceto.* Verum in Capitulo de *Ructibus*, & *Flatibus* dictum fuit, carminantia, sive flatu discutientia remedia, dum flatu discutiunt, etiam flatu producere, cum blando aromatico stimulo leviter irritent intestina, ut in variis locis contrahantur, hoc effectu, ut spasmus fixior in quodam loco solvatur; tunc sequuntur borborygmi, & paullo post flatuum explosio sursum, vel deorsum.

Prodesse poterit ergo *Allium*, non tantum, dum odore vermibus molestum est, verum etiam, dum, aucto motu in fibris intestinorum, adhaesionem vermium ad latera intestinorum minuit ita, ut facilius a catharticis remediis expelli possint. Imprimis autem actio *Allii* efficacior erit in illis, qui non assueverunt quotidiano ejus usui; in talibus enim minus agit. Bulbum *allii*, si minor fuerit, integrum, vel in aliquot partes sectum, si deglutiant aegri semel de die, tunc manet odor *Allii* perpetuo in ventriculo, & intestinis. Cocti in aceto bulbi *allii* condimentum mensis dant satis gratum; verum tunc *Allii* vis inertior est. Si *Ascarides* in pudendo muliebri nidulentur, pessaria anthelmintica commendavit *Hippocrates* (i); sed simul addidit; *Et allii coctis & crudis vescatur, & Ascarides exeant, ac moriuntur.*

Ad

- (d) Herodot. lib. 2. pag. 137. (e) Lobb of curing. fevers. pag. 53. (f) Method. Medend. Lib. XII. Cap. VIII. Charter. Tom. XII. pag. 291. (g) De victus rat. sanor. lib. 2. cap. 7. Charter. Tom. VI. pag. 470. (h) De Infecund. Capit. XVIII. Charter. Tom. VII. pag. 857. (i) De Mulier. Morb. lib. 2. cap. 60. Charter. Tom. VII. pag. 832.

Ad similes usus commendatur *Afa foetida*, longe magis graveolens alio; imprimis si recens, lactei adhuc coloris, ex Asia adfertur: qualem aliquando videre mihi contigit; tunc enim vix tolerabilem odorem spargit: unde sacculi, recens collecta Afa pleni, dum transferuntur navi, ex mali cacumine suspenduntur; si enim in navi recluderentur, nemo tolerare posset foetorem, qui tamen sensim exsiccatione mitigatur. Interim in Asia inter menfarum delicias Afa numeratur, dum condimentis miscetur, vel patinae levissime perfricantur. De his legi potest *Koempferus in Amoenitatibus exoticis*. Unde *Hoffmannus* (k) verminosam progeniem exturbare solebat specifico suo anthelmintico, pilulis nempe ex *Afa foetida*, *myrrha*, *croco*, & *mercurio dulci* paratis.

Ad hanc classem spectat & *radix Valerianae Sylvestris*; quam *Pbu verum Dioscoridis* esse, voluit *Eabius Columna* (l), & in se ipso aliisque ad sanandam Epilepsiam invenit efficacem, si ad drachmam semissem mane sumeretur radix in pulverem trita. *Celeberrimus Marchant* (m) tentavit hujus radicis usum in Epilepticis sanandis; & quidem pulcro cum successu; sed simul vidit, vermes expelli de corpore, & sudare fortiter aegros. Radix haec gravem valde odorem spirat, & cum praecipue per sudorem agat, raro alvum moveat, videtur infesta vermibus esse. Tot novis in usum Medicum deductis remediis celebris *Archiater Storck*, felicissimo cum successu, radicem *Valerianae* junxit purgantibus, & aromaticis, ad vermes pellendos (n).

Ob eandem, vel similem saltem rationem laudatur, tanquam optimum anthelminticum, caput mortuum, quod superest, postquam magno igne expulsa fuerunt omnia volatilia ex *Cornubus Cervinis*. Carbo enim manet solidus, friabilis, foetidus, amarus, oleo crasso tenaci piceo inquinatus adhuc (o).

Forte & huc spectat *sulphur*, quod, si crudum humano ingeritur corpori, parita, sed repetita crebro dosi, primas vias mire repurgat, tandem satis valide, tumque morbos quosdam cutaneos, verminosos, metallicos, minerales, efficaciter sanat (p). Saepius dedi sulphur tali modo, & licet ipsum ex se vix odorum sit, nisi vel attritu, vel igne caleseat, tamen, dum solvitur in primis viis five vi nostrorum humorum, five ab ingestis, tunc per alvum exeunt olidissimae faeces. An ab illo insolito foetore vermibus noxa fit?

Minime improbabile videtur, quod plura alia detegantur five casu, five attenta observatione, & variis tentaminibus prudenter institutis. Summa talium utilitas stimulum addet Medicis, ut in haec inquirent ulterius.

Sequitur tertia classis, quae continet illa remedia, quae vermibus nocere observata sunt, licet nec asperitate partium, nec ingratissimo odore praedita fuerint.

Scripsit *Galenus* (q) de *Perfica arbore*, quod in germinibus, & foliis vincentem habet

(k) *Medic. ration. system. tom. 3. sect. I. cap. 5. §. 32. pag. 110.*

(l) *In Phytobasano pag. 113. 121. & in Ecphrasi plantar. pag. 210.*

(m) *Académ. des Scienc. l'an 1706. Mém. pag. 430. &c.*

(n) *Ann. Médic. secund. pag. 228.*

(o) *H. Boerh. Chem. tom. 2. process. 120. pag. 359.*

(p) *H. Boerh. Chem. tom. 2. pag. 419.*

(q) *De Simplic. rer. facult. Lib. VII. N. 17. Charter. Tom. XIII. pag. 209.*

bet amarā qualitatem, & ideo folia ejus irita, & super umbilicum imposita vermes necant. Ex observatis Celeberrimi Boulduc (r) constat, infusum florum, uti & tenerorum foliorum arboris persicae blandam vim purgantem habere; illudque laudat, tanquam optimum remedium ad vermes infantum. Quid de amaris sentiendum sit, dicetur statim, & paragrapho sequenti patebit, lenia purgantia vix unquam sufficere. Unde hoc remedium peculiari quadam virtute in vermes agit.

De Filice dixit Galenus (s); Radicem habet maxime utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat. Confirmat Galeni sententiam Celeberrimus Marchand (t). Testatur enim, constare infinito numero experimentorum, radicem filicis esse mirum, & certum, remedium ad expellendos omnis generis vermes de corpore humano. Verosimile videtur, remedium illud ex filice paratum (Eau de Fougères), quod tanquam arcanum Andry sibi, & genero suo Dionis reservavit, filicis radicem pro basi habere, nec diffitetur hoc; sed peculiarem quamdam filicis radicem praeparationem requiri praetendit (u). Post mortem Andry gener ejus Dionis (v) publico persuadere conatur, pauculum tantum de filice ingredi hoc arcanum, & numerosa alia adesse ingredientia. Sed quisque novit, arcanorum venditoribus non semper habendam esse fidem. Ingenuum decet, ut generis humani utilitatem lucro magis aestimet. Sed auri sacra fames saepe aliud suadet. Nunquam me poenituit, candide communicasse omnibus, si quid in arte utile novissem, nec poenitebit, certus sum, illo tempore.

Dum numina nobis.

Mors instans majora facit.

Plura forte alia similem effectum habent. Scordium, in pulverem tritum, saepe profuisse in affectibus verminosis, testatur Barrere (x). Ingens Antelminticorum remediorum catalogus videri potest (y).

Amarorum, Aromaticorum. Talia remedia ad roboranda viscera primae coctionis solent proficere, & Leucophlegmaticam corporis cachexiam, quae verminosis morbis favet (1362.), emendant. An vero amarities vermibus adeo infesta sit, non ita constat.

Scriptit quidem Galenus (z), vermes necari amaris, & postea addidit; *At teretes quidem Absinthium perimere potest. Lati vehementiora remedia desiderant, cujusmodi est filix; pari modo & quae ascaris dicitur.* Sed ex ante memoratis observatis patuit, vermes in duodeno intestino repertos fuisse saepius, in quod
per

(r) Académ. des scienc. l'an 1714. hist. pag. 49. (s) De simplic. rer. Facult. Lib. VIII. N. 39. Charter. Tom. XIII. pag. 223. (t) Académ. des scienc. l'an 1701. Mém. pag. 285. (u) Andry sur la génération des vers pag. 531. (v) De Taenia pag. 46. (x) Observat. Anatom. &c. pag. 170. (y) Andry sur la générat. des vers pag. 609. & seq. Le Clerc histor. Lumbric. lat. pag. 408. & seq. (z) Meth. Medend. Lib. XIV. cap. ultim. Charter. Tom. X. pag. 343. Tom. IV. part. II.

per ductum communem depluit amara bilis. Constat *Celeberrimi Redi* experimentis, vermes tam terrestres, quam humanos in amarissimis decoctis manere diu superstites; b. vi autem perire in aqua, melle, vel saccharo edulcorata. Non tantum in hepate, bilis officina, inventi fuerunt vermes, sed in ipsa cystide fellea ovis, bilem amarissimam continente, placide natabant vermes (a). Fatetur *Coult* (b), quod nullum invenerit liquidum adeo amarum, quod amaritiae suae vermes extinguere posset. Immo ex opposito eos semper & vivaciores, & vegetiores in talibus liquidis inveniebat. Addit tamen, quod vermes non diutius vixerint in amaris liquoribus, quam in aqua pura. Teretes vermes, ex vituli mactati intestinis desumpti, bili bubulae immerfi vixerunt per novem circiter horas. In amarissimis infusis *Aloes*, & *colocynthis*, uti & in infuso *corticis Peruviani* tam diu vivebant vegeti hi vermes, ut *Celeberrimus Torti* (c), morae pertaesus, eductos ex his liquoribus vermes immerferit *spiritui vini*, in quo statim necabantur. Sed & *Allii* succum, pauca aqua dilutum, tulerunt facile. Haec sufficere videntur, ut pateat, ab amaris aromaticis non tam facile necari vermes, ac quidem multi crediderunt.

Mercurialium. Cum infectis cutaneis necandis argentum vivum, pinguius subactum, serviat egregie, hinc cogitatum fuit, vermibus intestinorum necandis illud etiam utile futurum. Sunt, qui ex *Brasavoli* consilio pauca grana mercurii crudi infantibus ingerebant ad vermes necandos; & dicitur, hoc pulcro cum successu factum fuisse (d). Dubitari tamen non sine ratione potest, an tantillum argenti vivi vermes necare posset. Tutum enim minime foret in tenella aetate repetitas tales doses exhibere. Imo non videtur certo constare, quod argentum vivum adeo noxium vermibus sit. Observavit egregius Medicus, & Historiae naturalis cultor, *Scopoli* (e), nullibi plures, aut frequentiores observari lumbricos intestinorum, quam circa fodinas argenti vivi. Nulla aetas reperitur, & nullus est sexus, qui iisdem non laboret. Tamen homines illi vivunt in aëre, volatili per ignem reddito argento vivo, inquinato, & saepe ab his exhalationibus male afficiuntur. Praeterea argentum vivum ore haustum, etiam majori copia, solet satis cito per alvum exire.

Alii fuerunt in hac opinione, aquam, si ebulliat cum argento vivo, vel digeratur tantum, acquirere vim anthelminticam insignem; unde, talem aquam, si potetur, vermes certo necaturam, asserunt. *Pauco tali, & innoxio potu omnes vermes interimunt tam in intestinis, quam alibi, in ulceribus etiam, si aqua ista affundatur*, statuit *Helmontius* (f). Crediderunt hinc multi, aliquid de argento vivo solvi in aqua; in qua opinione fuit & *Celeberrimus Hoffmannus* (g), qui sic habet; *Quin etiam sola aqua communis, propter subtilissimum illud universale, in poris ejus residens, sal, tandem, coctione diutius instituta, ex argen-*

(a) Le Clerc Histor. Lumbr. lat. pag. 94.

(b) Tractat. de Ascarid & Lumbric.

lat. pag. 32. 33.

(c) Therapeut. spec. febr. Lib. V. Cap. VI. pag. 510. 511.

(d) Herman. Kau diss. de Argento vivo pag. 14.

(e) De Hydrargyro Idriensi

pag. 155.

(f) In fine capituli *Sextuplex digestio alimenti humani* pag. 180.

(g) Medic. Ration. & system. Tom. II. Cap. VI. pag. 261. 262.

argento vivo partes abradit; unde hoc decoctum ad luis Venereae virus, item ad progeniem verminosam expellendam in praxi non ignotum est. Imo Dionis (b) testatur, se vidisse aegros, post diuturnum aquae mercurialis usum, tremore omnium membrorum correptos fuisse, ut contingere solet illis, qui mercurio crudo imprudenter usi fuerunt, vel halitibus mercurialibus diu expositi, uti in deauratoribus toties observatur. Heisterus notavit (i), columbas verminosas sanatas fuisse, dum potabant aquam, cui argentum vivum miscebatur.

Experimenta tentata fuerunt (K), ut detegeretur, an aquae purae argentum vivum aliquid largiretur per infusionem, digestionem, coctionem ipsam. Conclufum fuit, nihil decessisse argento vivo. Cum autem raro aquae, quae potui communi servire solent, purae sint ab omni fale, & hodie noverimus, mercurium solvi non tantum in acidis, verum etiam affici a salibus alcalicis, & neutris, hinc mirum non est, si tali aquae aliquid communicetur a mercurio. Sed simul videtur ab aqua pura argentum vivum nullo modo affici. Credit & hoc Helmontius (l), qui affirmat, virtutem anthelminticam conciliari aquae, si in illa maceretur argentum vivum; praecipue autem, si ebullitio accesserit: Haec aqua namque, licet ne minimum quid de argento vivo in se sorbeat, aut ad sui naturam convertere queat, attamen ab argento vivo proprietatem, non item substantiam mutuatur, sic, ut pota aqua ejusmodi necet lumbricos universos, & ascarides, existentes etiam, quo potus iste nunquam pervenit; quippe qui mox totus in lotium rapitur &c. Sic unica uncia argenti vivi millies poterit inficere mensuram aquae, attamen permanere in pondere, & proprietate pristinis &c. Fit nempe id absque ulla argenti vivi passione, diminutione, mutatione, debilitate, atque alteritate. Deinde illud adhuc latius deducit.

Fateri debemus, dari remedia talia, quae absque jactura sensibili ponderis sui imbuunt liquida, quibus infunduntur, vi medicata, quae totum corpus turbat mirabiliter. Vitrum Antimonii, regulus Antimonii, infusa vino, non mutantur, nec perdunt sensibilibiter de pondere suo; nec vini sapor, odor, color mutantur; & tamen unciae binae talis vini antimoniatum si dentur homini sanissimo, totum corpus turbant, sursum, deorsumque evacuant.

Unde apparet, liquidis, dum infunduntur, vel decoquantur cum rebus metallicis, posse communicari vires mirabiles. Sollicita, & repetita observatio sola determinare poterit, quid ab hoc remedio sperandum sit. Torti (m), vi illata, submersit lumbricum hydrargyro, qui, aliquo etiam nonnunquam mercurii granulo onustus, emergebat: huic post modum aqua simplex superaddebatur, ipsius praeeexistentis mercurii agitatione, quantum licet, roborata, qua lumbricus ab externi aëris immediato contactu, & injuria tutus evadebat. Cum autem per novem, & ultra horas viveret vermis, morae pertaesius Torti illum spiritui vini immisit, atque necavit.

Cae-

(h) Dissertat. sur le taenia pag. 45. & seq. (i) VVarhrnehm. n. 200. pag. 351. 352.
 (K) Institut. Bonon. tom. 2. part. 1. pag. 118. part. 2. pag. 117. (l) In capitulo: In verbis, herbis, &apidibus est magna virtus. pag. 459. (m) Therapeut. Special. feb. Lib. V. Cap. VI. pag. 510. 511.

Caeterum praeparata Mercurialia expellendis de corpore vermibus prodesse insigniter, patebit sequenti paragrapho.

Acidorum. Fortia, & rodentia acida nocere vermibus, certum est; sed haec ferri non possunt ab intestinis, & ventriculo, nisi prius copiosa aqua diluta fuerint; at tunc minus nocebunt vermibus. Observatum fuit, acetum alacres, & vividissimos reddidisse vermes humanos, dum cito necaret vermes terrestres (n). Verum illa vivacitas, & alacritas ex valido vermium motu cognoscitur illo tempore, dum irrorantur aceto, & inde concludi probabiliter posset, vermes humano non refici aceto, sed molestiam pati, quam irrequietus motus testatur. De Lumbricis terrestribus pariter observavit *Torti* (o), quod statim interirent, si aceto immergerentur (p). Vermis autem teres vitulinus sex horarum spatio mansit in aceto, antequam moreretur. Videtur ergo acetum vermibus molestum esse, & forte hoc efficere, ut irrequieto motu vermes removeantur ab adhaesione ad intestina, sicque facilius expelli possint. Apud *Amatum* (q) describitur pulvis ad vermes, cui magnam efficaciam tribuit: *Corallinae, Sem. Santonicae ana partes duas: Dictamni albi, bistortae, tormentillae, ana partem unam*. Haec in pulverem redacta irrorabantur aceto acerrimo; dein in umbra ficcabantur. Dosis erat a drachma ad drachmas tres, pro diversa virium, & morbi magnitudine. Post exsiccationem aceti partem acidissimam manere, ex Chemicis satis notum est. *Aloen, Crocum, Myrrham* sumebat *Boerhaavius* (r); his adfundebat vigecuplum aceti stillatitii vini acerrimi, in alta phiala chemica; coquebat per duodecim horas; colatura a subsidente faece removebat acetum, viribus ingredientium dives; residuo affundebat dimidium prioris quantitatis, coquebat, ut prius; binas illas tincturas mistas, leni igne destillando, inspissabat usque ad residuum tertiae partis; adeoque remanebat concentratum satis acidum aceti, impraegnatum viribus ingredientium. Laudat (s) hoc remedium; *Quoties in primis viis putredo, bilis foetida, concreta pituita, lumbrici, & infiniti, de quatuor his causis orti, morbi praedominantur*.

A drachma una ad drachmas tres sumitur hoc remedium, ex mulsa, hydromele, aut vino molli, dulci, mane, vacuo ventriculo, duodecim ad minimum horas post ultimum pastum. Egregie hoc profuisse saepius novi.

Vitriolorum ex chalybe. In eadem hoc paragrapho dictum fuit, limaturam ferri profuisse verminosis, quatenus scabritie suarum partium molesta foret vermibus. Notum autem est, ferrum satis facile solvi in humoribus nostris, & insigniter prodesse ferri scobem debili sexui languenti; imo magis quam alia ex ferro per artem laboriosam praeparata (t). Si limatura ferri solvitur in oleo vitrioli, aqua diluto, paratur inde *Vitriolum Martis* in officinis dictum; cuius drachma si diluatur in libra aquae purae, & potatur jejuno

ven-

(n) Van Doeveren de verm. intest. pag. 68.

Cap. VI. pag. 512.

Curat. 97. pag. 354.

(s) Ibid. pag. 278.

(o) Therapeut. special. Feb. Liv. V.

(p) Ibid. pag. 510.

(q) Curat. Medicin. Cent. 3.

(r) Chem. Tom. II. Process. 81. pag. 277.

(t) Ibid. pag. 440.

ventriculo, cum leni deambulatione, *aperit, laxat, pergit, urinam movet, lumbricos necat, pellitque, foeces alvi aterrimas tingit, aut instar terrae argillaeae format, fibras roborat, hacque ratione multos, hosque diversissimos, morbos sanat* (u). Haec quantitas adulto homini datur, minor junioribus: quibusdam nauseam movet; tamen satis facile fertur, & potest syrupo quodam officinali edulcorari malignus vitrioli martis sapor. Cum autem faeces tingat atro colore, si per tres, quartove dies successivos hoc remedium adhibetur, totus tractus intestinorum imbuatur sapore vitriolico, & pariter omnia liquida, quae ingeruntur, vel ex visceribus secreta in intestina derivantur. Vermes in ventriculo satis certo, ac cito noceat; & tunc plerumque paullo post vomitu expelluntur. Observatum est aliquoties, post limaturam ferri datam prodiisse vermes colore ferrugineo tinctos. Ferrum, in acido vegetabili solutum (v), mitius dat remedium, efficax tamen.

Vel cupro. In omnibus remediis, quae ex cupro sunt, longe majori cautela opus est; vitriolum martis cum acido potentissimo, vitrioli nempe oleo, paratum tuto datur, & notabili copia fertur a corpore humano, uti modo dictum fuit: sed cuprum in acido vegetabili solutum, quod multo mitius est, non nisi summa cum prudentia, & vix sine periculo, interne dari potest. Notum est, quanta mala contingerint, dum aerugine infecta vasa cibis parandis adhibita fuerunt. Novi, optimum, & sincerum vinum, in phiala argentea clausa servatum, pessima mala produxisse, dum potaretur: illud autem non ab argento factum fuit, sed a cupro, quod in utensilibus ex argento paratis semper adest. Phialae enim illius argenteae superficies interna aerugine obducta inveniebatur, dum in causam horum malorum inquirebatur.

Interim tamen cuprum in acidis solutum dat efficax infectis venenum. *Solutio cupri in aqua forti si diluatur aqua quam plurima, pediculos, pulices, pediculos planos pubis, promte enecat* (x). Vidi, infecta in sinibus frontilibus nidulantia, dolores saevos, & vertiginem molestissimam producentia, enecta, & expulsa fuisse; dum granum vitrioli cupri in uncia media aquae solutum per nares attrahebatur.

Cuprum solutum in sale alcalino volatili, vel & in salibus neutris, mitius agit. Unde laudata fuit tinctura caerulea, quae ex saturata maria salis ammoniaci, & limatura cupri paratur, tanquam antepilepticum puerorum remedium. Notum est, frequenter insultus epilepticos a vermibus produci. *Guttulae pauculae, in hydromelle datae jejunis, levi motu, alvi subductione, nausea inducunt, mire mutant pigros, tenellos, stomachos; hos excitant, aquae, pituitas, educunt, vermes occidunt* (y). Notavit idem Celeberrimus auctor (z), quasdam aquas stillatitias anthelmintica vi imbui tantum ideo, quia cuprum solutum continent. Dum enim accurate describit methodum parandi aquas stillati-

(u) Chem. Tom. II. Process. 81. pag. 439.
Ibidem Process. 190. pag. 477.

(v) Ibidem pag. 441.

(x) Ibi-

(y) Ibid. pag. 476.

(z) Ibid. Process. 15.

pag. 71.

Tom. IV. pars II.

latitias ex fragrantibus plantis, notat, primo prodire aquam, quae alba, crassa, odora, sapida, spumosa, turbida apparet; quae ad usus medicatos servanda. Si continuetur destillatio, sequitur altera aqua, pellucida, tenuis, odore proprio plantae carens, sapore nativo plantae destituta, sed acidula fere. Si cava superficies alembici aenei stanno haud accurate obducta fuerit, tunc haec aqua postrema cuprum rodit, viridescit quandoque, nauseosa, emetica, venenata evadit utentibus, debilibus imprimis, infantibusque, sursum deorsum acri cum tormine alvum perturbans. Tunc haec aqua vim anthelminticam acquirit, sed a cupro soluto tantum, quod vermibus admodum infestum esse, docent experimenta *Torti* (a), qui observavit, vermes teretes vitulinos, dum immergerentur infusioni viridis aeris, mox fecisse observabiles admodum motiones, & contorfiones; in aliis liquidis longe minus; vitam tamen satis diu protrahebant in illa infusione aeruginis. Adeo autem agitabantur vermes, dum immergebantur huic solutioni, ut non semel ad explorandum, an vermis aliquis, de quo adhuc ambigebatur, num esset exstinctus, vere viveret (quod in insectis hisce haud ita facile semper noscitur), tanquam ad *Lydium lapidem* factus fuerit recursus ad infusionem viridis aeris. Si enim non plane mortuus erat vermis, statim aliquem motum edebat.

Observaverat *Van Doeveren* (b) miros effectus a spiritu juniperi vulgaris, quo plebs apud Batavos abutitur toties; hinc dubitat, an non peculiari quadam efficacia ageret. Spiritus fermentatus ex frumento paratus destillatur cum baccis juniperi, quarum fragrantia, spiritui frumenti unita, dat spiritum juniperi dictum. Non videtur autem a junipero pendere vis anthelmintica. Experimenta *Torti* (c) docuerunt, in spiritu vini statim necari vermes teretes vitulinos: lumbrici terrestres vix tangebantur a spiritu vini, quin perirent illico. Hinc videtur spiritus frumenti plus, & citius nocere vermibus, quam Juniperi aroma. Unde conclusit *Torti* (d) sequentia: Cum primo in vini spiritu, mox in aceto, & tertio loco in vino interire lumbrici utriusque speciei fuerint observati, videtur conjici posse, quod vino, aliisque liquoribus ex vino prodeuntibus, praecipue vero parti illius spirituosiori insit aliquid hujusmodi insectis inimicum, quod illos hebetet, inebriet, ac tandem occidat, quemadmodum gallinas, grano vini spiritu imbuto nutritas, fere ut mortuas ad tempus in terram concidere, vulgo satis est notum. Credebat *Van Doeveren*, in pituitam, vermium nidum, agere spiritum juniperi; sed ipsis vermibus videtur nocere potius. Confirmari hoc videtur praeterea observatione Medica, quae apud *Baglivium* (e) legitur, de constitutione fere Epidemica febrium putridarum, atque malignarum, quae *Massae Tudertinorum* in *Umbria* regnabat ultimo elapsi saeculi anno. Singuli aegri vermes teretes magna copia excernebant: Hi vermes vivi, positi in vinum, statim peribant; in oleo, aqua saccharata, spiritu vini, aceto, succo limonum, per plures horas vivebant, ac plures dies. Aegroti, qui vi-

num

(a) Therapeut. Spec. febr. Lib. V. Cap. VI. pag. 510. 511.
Verm. Intestin. pag. 69.
pag. 512.

(c) Vide locum modo citatum.

(e) Oper. omn. pag. 699.

(b) Dissertat. de
(d) Ibid.

num bibebant, omnes sanabantur pene. In febre Castrensi verminosa vinum, & imprimis serum lactis vinosum, profuisse novi, dum larga copia potabatur. Si in ventriculo haerent tales vermes, statim a potu vinoso afficiuntur.

Caeterum in observatis *Torti*, qui vermes teretes vitulinos exploravit, habetur, quod citissime necabantur in *spiritu vini*, dein in *aceto*, tardius in *vino*: hinc mirum videtur, quod teretes vermes humani cito extincti fuerint in vino, & per horas, imo per dies, in spiritu vini, & aceto vivere potuerint. An in observatione ipsa subrepsit forte incuria? An diversa natura vermium teretium vitulinorum ab humanis in causa est?

Cum autem nec vini copia, nec spiritus vini tolerari possit absque periculo in prima aetate, patet facile, in adultis tantum quid sperari posse a similibus.

Ex observatis *Coulet* (f) patuit, vermes humanos magnum calorem ferre posse; illico autem necari a glacie, vel & aqua gelidissima, sed nondum congelata. Multi glacie delectantur; & videtur assuetorum ventriculus illam ferre posse: periculosum tamen semper est, ventriculum simul, & semel implere aqua gelidissima, quae nocere quidem posset vermibus in ventriculo haerentibus, sed certo frigoris illum gradum amittet aqua, antequam ad intestina pervenerit, adeoque vermibus intestinorum infesta esse nequit. Gelidam aquam per clystma injicere suaserunt aliqui; sed nec haec ad intestina tenuia penetrare poterit; obstat enim coli valvula. Forte *Ascarides*, circa finem intestini recti haerentes, & intolerabilem quandoque pruritus excitantes, glacie ano admota necari possent: sed agilissimi illi vermes, simul ac inferum frigus sentiunt, tutiorem locum invenient facile.

Caeterum in *Materia Medica* ad hunc numerum plures habentur formulae, quae ad necandos vermes, in juniore imprimis aetate, adhiberi solent, & ad quarum normam plures aliae similes parari poterunt facile. Forte vel casus fortuitus, vel industria Medicorum detegent alia anthelmintica, adhuc efficaciora, quae absque laesione ventriculi, aut intestinorum vermes occidere valent. Haec enim cognita remedia nondum talem efficaciam monstraverunt, cui certo confidere possumus in necandis vermibus. Viderat *Celeberrimus Homberg* (g) sanum in reliquis juvenem, qui quatuor, vel quinque annorum spatio quotidie per alvum excernebat magnam copiam vermium, qui quinque, vel sex pollices longi erant: semel, aut bis reddidit partem *Taeniae*, ulnam cum dimidia longam; unde verosimile videtur, reliquos vermes, quos excrevit, fuisse cucurbitinos dictos. A lactuca, & fructibus horaeis abstinuit omnino; & quaevis anthelmintica, tunc temporis cognita, adhibuerat; sed absque fructu.

Credo, omnes Medicos, qui praxin exercent, saepius doluisse, quod minus felices effectus habuerint in necandis vermibus. Saepius successit vermium sive vivorum, sive mortuorum expulsio per purgantia, sive sola, sive admistis simul talibus, quae vermibus infesta esse creduntur; de qua methodo nunc dicendum erit.

(f) De *Ascarid.* & *lumbr.* lato pag. 3. Hist. pag. 11. §. 1372.

(g) *Académ. des Scienc.* l'an 1707.

§. 1372. **E**Xpellendo Lumbricos vivos, enectosve ope purgantium amarorum, phlegmagogorum, Mercurialiumque.

Purgantia remedia praecipuum locum obtinuerunt semper inter anthelminthica, cum parum referat, an vermes vivi, an mortui fuerint, modo expellantur de corpore, & tuto simul hoc fieri possit. Si per remedia, praecedenti paragrapho enumerata, necati possint vermes, vel saltem sic enervari, ut fortiter se intestinis affigere nequeant, facilius exturbari per remedia cathartica poterunt.

Purgantibus usus fuit Hippocrates (b), ut latum lumbricum expelleret de corpore. Sic enim habet: *Quod si quis hominem lumbrico laborantem curret, & medicamentum, aut potionem dederit, si quidem homo probe praeparatus fuerit, totius rotundus, ut globus prodit, & homo sanus evadit.* Postea addit, quod si pars in rectum extensa abruptatur a lumbrico, duorum, aut trium cubitorum longitudine, aut etiam longe major, tunc non curatur homo; & quidem multo tempore cum stercore nulla signa se produnt; sed postea vermis increfcit. Haec respondent exactissime hodiernorum observatis. Dum enim integer expellitur vermis latus, semper in glomerem collectus apparet, & adest simul extremum tenuius, in globosum apicem definens; quod asilum vermis lati hodie vocari solet. Vermem latum in glomerem sic collectum figura expressit Andry (i).

Notum autem est omnibus, etiam in Hippocratis lectione vel mediocriter versatis, *φάρμακον* & *φάρμακένειον*, non de quibusvis remediis, sed de purgantibus dici praecipue. Simul constat, veterum purgantia fuisse admodum valida: Helleboris enim, Granis cnidiis, Elaterio, utebantur frequenter. Sic (k) Hippocrates fateatur de Scamandro, qui convulsus periit, octavo a primo convulsionis insultu die, quod diutius sustinere morbum potuisset, nisi validum medicamentum, sinceram bilem purgans, sumisset. Alia similia habentur (l); imprimis de muliere sana, & robusta, quae a catopoto, conceptas gratia deglutito, ventris dolore, & intestinorum torminibus corripitur, intumescerebat, sanguinem vomebat; sed non copiosum: tam male autem se habuit, ut quinquies jam mortua crederetur. Triginta amphoris aquae frigidae corpus perfundi debuit; quod unicum opem ferre videbatur, cum postea bilis copiosa deorsum secesserit. Vixit tamen.

Facile quis credet, tantis turbis in corpore excitatis, nec vermem latum resistere posse. Hinc cautela multa utebantur Veteres Medici, antequam purgans darent: *Quum quis corpora purgare velit, ea mirabilia facere oportet (m);* de qua re videantur illa, quae ad §. 605. n. 13. dicta fuerunt. Hinc, dum expulsionem vermis lati tentandam suadet Hippocrates, monet, ut prius probe

(h) De Morbis Lib. IV. Cap. XV. Charter. Tom. VII. pag. 614. (i) Sur la Géné-
rat. des vers pag. 33. (k) Epidem. Lib. V. Text. X. Charter. Tom. IX. pag.

336. (l) Ibid. textu XXV. & seq. pag. 342. 342. (m) Hipp. Aphorism.
9. Sect. 2. Charter. Tom. IX. pag. 49.

praepararetur corpus; antequam validum adhibeatur pharmacum. Balnea, cibi molles, quies, &c., adhibebantur illis, qui *Helleborum* erant sumturi.

Juvenis, gonorrhoea virulenta laborans, habebat urethrae orificium obstructum plurimis verrucis venereis; cum a me auxilium peteret, dedi validum purgans, ex *Turbith minerali*, *Scammoneo*, *Resina Jalappae*, compositum. Valide purgatus ab hoc remedio fuit; gonorrhoea fuit emendata; verrucae corrugatae, flaccidae, ceciderunt sponte post paucos dies. Sed simul ostendit mihi vermem latum integrum cum filo suo, qui medicamento vi expulsus fuerat. Noverat ille, quod vermem latum haberet; sed, de morbo venereo sollicitus tantum, mihi non indicaverat. Varia anthelmintica se sumfisse falsus est; sed incassum. Postea tentavi simile remedium cum successu aliquoties. Cum multum corpus turbet, dedi illud bis in mense; raro ter sumtum fuit, quin vermis prodierit totus.

Hydragogum Argentum Boylei, vel *Angeli Salac*, si sollicita arte paratum fuerit (n), & grana duo cum sacchari conici granis sex in mortario vitreo terantur minutissime, deinde cum decem granis pastae panis formentur in Catapotia, & deglutiantur ab homine adulto jeuno, superbibendo Uncias quatuor, vel sex, aquae mellitae calidae, purgatio per alvum sequitur: Necat lumbricos, taenias, ascarides. Cavendum a nimio usu; a nimis larga dosi cavendum: rodit semper, & labefactat, ventriculum imprimis. Quod vitii Rob Juperi baccarum sanat.

Celeberrimus *Boulduc* (o), examinans *gratiolam* dictam herbam, quae inter potentissima Hydragoga remedia numeratur, & sursum, ac deorsum potenter evacuat, dum in substantia vel infuso sumitur, invenit hanc plantulam habere insignem vim Anthelminticam; praecipue si infundatur lacti recenti; tunc enim mitius agit. In America parant decoctum ex *Spigelia Linnaei*; quae adeo venerata est, ut Galli huic plantae nomen famosissimae olim in Gallia veneficae (*Brainvillers*) dederint. Sursum, & deorsum fortiter evacuat, vermesque certo expellit. Cum autem verminosi morbi ibi frequentissimi sint, ex hoc decocto syrupum parant, ut omni anni tempore semper praesto sit efficax medela. Sic audivi a fide digno teste. Verum *Patrick Browne* (*) certitudinem virtutis Anthelminticae hujus plantae laudat quidem, sed testatur, hoc remedium somnum facere, instar opii. Simul monet, post usum hujus remedii, lene purgans debere dari ex infuso *senae*, *rhabarbari*, *mannae*, &c.

Satis autem patet, omnia haec valida remedia magna cum cautela tantum adhiberi posse, & vix locum habere in teneris infantibus unquam. Sed & mitiora habentur purgantia, satis efficacia tamen. *Jalappa*, notissimum purgans, & frequentis apud vulgum usus, tale dat remedium; de quo *VVepferus* (p) testatur sequentia; *Jalappam lumbricos latos prae multis expellere,*

pri-

(n) H. Boerh. Chem. Tom. II. pag. 467. 468.

(o) Acad. des Scienc. l'an 1705.

Mém. pag. 245.

(*) Civil and Natural History of Jamaica in three parts,

in folio, London 1756. pag. 156.

Car. Linnaei Amoen. Académ. vol. V. pag.

140.

(p) Cicut. aquat. Histor. & Noxae Cap. XV. pag. 224.

primum casu, postea plurimis experimentis didici. A magisterio, sive resina, Jalappae, ad scrupulum data cani semestri, & dein vivo dissecto, inventa quidem fuerunt in ventriculo, & intestinis signa inflammationis (q); sed hoc minus metuendum videtur a pulvere *radicis Jalappae*, quo uti malo potius, quam ejus resina, quae tenacissima est, & facile adhaeret superficiei ventriculi, ac intestinorum, tuncque tormina molesta, & hypercatharses saepe producit. Cum autem *Jalappae radix* seligatur talis, quae habet copiosas strias resinosas, hinc, majoris cautelae gratia, curo, ut pulvis ejus diu teratur in mortario vitreo cum dimidia parte sacchari puri sicci: sic enim tenacitas resinosa, a qua imprimis metuendum videtur, frangitur. Mulier quadragenaria, quae, instante menstrua periodo, vermes cucurbitinos, & vivacissimos quidem solebat excernere, praeterea aliquot ulnas vermis lati per alvum deposuerat ante biennium. unde de vermis lati praesentia nullum erat dubium. Tentavi decantatissima Anthelmintica: diu usa fuit cupro soluto in muria salis ammoniaci; sed absque ullo effectu. Inceperunt tumere pedes, crura, femora, dein & venter. Cum debilis, & languida esset, dedi drachmam mediam *radicis Jalappae*, diu cum saccharo tritae, & paullo post excrevit vermem latum, sex fere ulnas longum, vivum, & alacriter se moventem. Periit tamen postea lento hydrope.

Quandoque profuit per plures dies replere totum intestinale tubum halitibus foetidis, qui vermibus infesti creduntur, de quibus praecedenti paragrafo dictum fuit. Sic v. g. per triduum, vel quatrimum aliquot grana assae foetidae deglutienda dedi ter, quaterve de die, & postea purgans exhibui satis acre, habita semper ratione virium, & aetatis. Saepius feliciter cessit.

Aliis magis placuit Anthelmintica purgantibus miscere, ut haec, ingrata vermibus, citius per totum tractum intestinorum applicarentur. Felicem inde successum aliquoties vidi, & plures observationes hoc confirmant (r). *Extractum Hellebori nigri cum vitriolo Martis*, omnibus vulgaribus Anthelminticis incassum tentatis, nunquam caruisse successu, testatur De Lille (s). *Ex sale polychresto, jalappa, valeriana, ad drachmam sumtis, additis oxymelis scillitici unc: iv., uncia media corticis winterani, & vini generosi libris duabus*, confecit Storck remedium, cujus uncia quater de die dabatur adultis: junioribus vero ad drachmam unam, alteramve (t), felici pariter cum successu. In hoc remedio talia sunt, quae pituitam, vermium nidum, attenuant, alia, quae vermibus infesta habentur, & *Jalappae radix*, quae alvum movet.

Ex omnibus his patere videtur, praecipuam spem curandi morbos verminosos poni in remediis evacuantibus. Remedia, quae arcani sub titulo commendantur, & felici effectu se commendaverunt saepius, fuerunt inventa talia imprimis, quae corpus turbant satis, & sursum deorsumve evacuant.

Ad hanc classem videtur pertinere remedium D. *Herrenscheuand*, quod non-

(q) Cicut. aquat. Histor. & Noxae Cap. XV. pag. 122.

natur. curios. Vol. IX. observ. XIV. pag. 41.

(r) Ann. Medic. secund. pag. 228. & 286.

(s) Acta Physic. Med.

(t) De Palpitat. cord. pag. 255.

nondum publico communicatum fuit, & de quo sequentia novimus (a). Quatuor pulveres sunt, quorum primus, sub titulo remedii praeparatorii, sumitur pridie. Coena levis conceditur aegro; & dum se ad somnum componit, dantur bina cochlearia *olei amygdalini*, vel *olivarum*. Sequenti mane, jejuno ventriculo, primam dosin specifici remedii sumit aeger; a qua bis levis vomitus sequi solet, totidemque per alvum evacuationes, quae certo sequuntur; sed vomitus non semper, qui videtur fieri a motu vermis lati. Intra bihorii spatium & vomitus, & alvi evacuatio cessant; dein jusculum propinatur aegro. Hoc facto, secunda dosis exhibetur, quae eundem omnino praestat effectum, ac prior, sed plerumque vermis latus expellitur; unde non semper opus est, tertiam dosin exhibere. Si vero vermis nondum exiverit, post tertiam dosin assumptam exit certo, citius, vel serius, saepe vivus, semper integer, cum filo suo. Nec fatigatur aeger ab hoc remedio plus, quam si aliud catharticum remedium sumisset. Testatur auctor, se viginti, & tribus vicibus illud dedisse, aequali semper successu, in sexu, temperie, aetate variis, etiam teneris, & delicatis.

Omnia autem haec postea aliorum Medicorum observatis confirmata fuerunt.

Similia his in humanissimis literis ad me datis scripsit egregius auctor; addiditque, in ducentis casibus octo, vel novem vicibus tantum non successisse remedii effectum. Addit dein sequentia: *Omnes aegri sic curati erant, Helvetii circa Genevam, Neufchatel, de Bienna, & de Morat; neque per duos cum dimidio annos, quo dedit hoc specificum, ullus rediit querens de hoc verme; quem tamen subaudiverat rediisse in Hollandia post usum hujus specifici, quod fortiter purgat sursum, & deorsum. Bis vidit duos vermes latus excretos ab eodem aegro, qui pessime aegrotaverat. Plures aegri simul vermes teretes, & ascarides excreverunt. Servat Colon caninum, cujus tunicae villosae adhaerebant in spatio, quod nummum Imperialem (Ecu) aequat, duae taeniae completae, & adhuc tria filamenta, quae singula singulis punctis tunicae villosae affigebantur.*

In Historia naturali, aliisque scientiis adeo notus, Bonnet (v) quaedam habet circa specificum hoc contra taeniam remedium. Pulvis est levis, subtilissimus, coloris olivacei; qui videtur ad regnum vegetabile pertinere, in quo apparent, oculo nudo, & imprimis lente armato, particulae splendentes; crocum redolet, & saporem leviter falsum habet. Pridie, antequam detur specificum, hora quarta pomeridiana dat sex grana pulveris albi, qui continet vitriolum martis, ex aqua tepida; nec sequitur ullus effectus sensibilis. Pulvisculus autem ille non est absolute necessarius ad curam. Hora septima datur levis coena; post bihorium datur cochlear olei amygdalini, vel olivarum. Sequenti mane datur omni bihorio pulvis, qui drachmam, vel scrupulos quatuor aequat pondere; minuendo, vel augendo quantitatem pro diversis viribus aegri. Nunquam plures doses dantur, quam tres. Post primam dosin quandoque nullus sequitur effectus; aliquando levis vomitus; saepius succedit alvi

eva-

(a) Biblioth. Rais. Tom. 33. Octob. Novemb. Decemb. pag. 281. (v) Mém. de Mathem. & de Phys. présent. à l'Académ. Royale des Scienc. Tom. I. pag. 479.

evacuatio: tunc datur jusculum. Si vermis nondum prodeat, ut plerumque fieri solet, datur secunda dos, & si opus fuerit, etiam tertia. Attamen non sine molestia agit hoc remedium. Quandoque enim sursum, & deorsum purgat valide, tormina abdominis adsunt, & pulsus insurgit. Aliquando longe mitius agit remedium. Saepe post meridiem taenia expellitur; tardissime nocte, vel mane sequentis diei. Quater Genevae contigit, ut post primam dosin assumptam taenia expelleretur, quae si longior fuerit, post expulsionem sentiunt similia mala, ac ascitici, post aquas per paracentesin eductas, nisi abdomen rite firmatum fuerit. Quidam languent per unum, alterumve diem; alii febricitant; alii tam parum ab hoc remedio afficiuntur, ut eodem die domo exire possint.

Cum contigerit bis Genevae, ut sumto remedio nulla prodierit taenia; quae forte antea insciis aegris expulsa fuerat; hinc, ut certus sit, taeniam adesse; dat unciam mediam *Syrupi florum Persicorum*; si enim tunc cum foecibus prodeant grana, sive molculae albicantes, quas putat esse taeniae excrementa, tunc de taeniae praesentia minime dubitandum putat.

Dum autem Basileae suo remedio uteretur *Herreschuvand*, obstupuit, vermem latum nunquam integrum prodire, sed frustulatum tantum. Taeniae autem illae pertinebant ad secundam speciem *Plateri*, quam credit reliquis difficilius expelli.

Caeterum pulvis ille praeparatorius, qui pridie sumitur, licet omnino necessarius non sit, creditur hunc usum habere, quod nempe specificum sequenti die melius, & promptius agat. Testatur autem *Van Doeveren* (x), quod ipse *Herreschuvand* ipsi affirmaverit, suum remedium non convenire in illa taeniae specie, quae, ubi in intestinis nidulatur, portiones suas cucurbitini formes dimittit; cum hanc rarissime expellere possit; solam alteram speciem, quae non dimittit articulos, & secunda nostra videtur (articulis brevioribus) constantissimo effectu ab eo expelli. Simul observationibus variis confirmat, illud remedium non adeo lene, & blandum esse, sed saepe maximas excitare in corpore turbas. Variarum purgantium remediorum formulae pro junioribus in *Materia Medica* ad hunc numerum habentur.

§. 1373. **Q**uin Clysmata, Suppositoria, Unguenta externa, ad eadem profunt quam maxime.

De usu unguentorum externorum ad §. 1370. dictum fuit.

Suppositoria autem solent parari ex amaris, aliisque, quae Ascaridibus imprimis infesta creduntur; verum, ut ante monitum jam fuit, hi vermes, cum vivacissimi sint, brevi alium locum petent, si quid ingrati invenerint circa finem intestini recti. Alvum movent suppositoria vel mole, vel stimulo, dum irritant intestinum rectum. Clysmata pariter non pertingunt ad intestina tenuia usque; adeoque tantum nocere possunt vermibus, qui in crassis intesti-

nis

(x) Dissert. de verm. intest. pag. 73. 74.

nis nidulantur. Habent & hunc usum, quod morosis infantibus purgantia per clyisma exhiberi possunt, quae, si tripla dosi sic adhibentur, similem effectum faciunt, ac si simplex purgantis remedii dosi deglutita fuisset.

Sed & aliam ob rationem clysmata laudaverunt Medici; nempe, ut vermes locum mutarent. Dabant amara remedia potanda, dum lac simul per anum injici curabant, hac spe, ut vermes, amarorem horrentes, ex ventriculo, & intestinis tenuibus descenderent in crassa intestina, allekti lactis odore; sicque facilius per alia clysmata possent necari, vel per purgantia promptius expelli.

Imo *Duretus* (y) fuit in illa opinione, per solam mutationem loci vermes necessario perire, cum ex chylo vivant, quem in intestinis crassis nunquam adesse voluit. Sic autem habet: *Quae causa est, cur sapientes Medici potiones amaras exhibeant, praesertim e scordio: lac autem subjiciant, ut illinc fugati, hinc vero allekti, relicto jejuno, descendant in colon, ubi vel ad punctum temporis durare non possunt, vita superstiti. Omnia enim, quae vivunt, quaeque moventur, in suo quaeque loco servantur, & aluntur, ex quibus constant.* Interim certum est, contenta in crassis intestinis nondum omni chylo orbata esse penitus, cum Anatome detexerit vasa lactea, quae chylum absorbent ad extremum intestini recti usque. Praeterea ex haecenus dictis patuit, amara non adeo infesta vermibus esse, ac quidem dici solet; & vermes vivos inveniri in crassis intestinis, non tantum teretes, & ascarides, verum etiam taeniam; nec unicam sed plures in colo intestino vidit *Herrenschwand*, uti ad praecedentem paragraphum dictum fuit.

Caeterum in *Materia Medica* & clysmatum, & suppositoriorum formulae variare habentur, ex diversis Anthelminticis paratae; & plures similes ad harum normam facile concinnari poterunt.

§. 1374. **Q**Uando Dentes incipiunt prodire, maxime acuti, a tensione, punctura, laceratione gingivarum nervosarum, sanguinolentarumque oritur inflammatio, tumor, gangraena, convulsio, alvi fluor viridis, salivatio, febris, mors.

Constant observatis *Eustachii* (z), in recens natis, dissecta maxilla utraque, occurrere dentes partim mucosos, partim osseos non obscurae magnitudinis, suisque praesepioli undique vallatos, qui postea erumpent. His dentibus docta manu detractis, tenuissimum interstitium, vix osseum factum, conspicitur; quo pari diligentia amoto, obviam veniunt totidem dentes, pene mucosi, & longe minores, qui post alios priores in propriis caveis latent. Ultimi illi, prioribus deciduis, circa septimum annum prodire solent, citius, vel serius. Unde Autopsia docet, dentes, qui circa septennium renascuntur, cum prioribus nullo modo junctos esse, sed ne quidem illos tangere posse, quum inter utrosque medium sit interstitium osseum, primum, & secundum dentem a se invicem dirimens, quo postea perforato erumpet suo tempore dens secundus.

Un-

(y) In Coac. Hippoc. pag. 174.

(z) Tractat. de dentibus.

Unde cadit illa sententia, quod secundus dens ex radice prioris relicta germinaret (a). Neque tantum in recens natis, verum etiam in Embryonibus primos, & secundos dentes invenit *Celeberrimus Albinus* (b); ita tamen, ut nondum sepimento osseo interposito discreti fuerint. Aliquoties in abortibus idem mihi videre contigit.

Magna autem diversitas observatur in tempore, quo dentes prodeunt. Communiter quidem statui solet, septimo circiter mense dentitionem incipere; sed contingit aliquando, & ipse vidi, recens natos jam unum, alterumve in maxillis ostendere dentem: imo in abortu quinque mensium vidi binos incisores ex maxilla inferiori prominere quam manifestissime. E contra in sana, vegeta, torosa puellula primus dens decimo nono mense prodiit, sequentibus fatis cito reliquis, & sine molestia fere ulla. In debilibus, & morbosis quandoque adhuc serius incipit dentitio. Ex quibus patet, primorum dentium eruptionem diverso tempore etiam naturaliter contingere. Longe major mora in secundorum dentium eruptione observata fuit. Vidit *Helmontius* (c) anno sexagesimo tertio aetatis Senem, & Vetulam, quibus quondam amissi dentes sponte renascebantur, etiam cum doloribus puerilibus. Nullam tamen notabat vitae longaevitatem, eo quod uterque eodem anno mortem oppetierit. Legitur (d) de fabro lignario octoginta quatuor annorum, cui biennii spatio quatuor dentes eruperant, duo nempe incisores, & totidem canini. Ipse vidi in Vetula, quae octogesimum sextum annum compleverat, binos dentes molares prodiisse; mortua fuit octogesimo octavo aetatis anno. Mirum est, tamdiu latere potuisse in maxillis dentium, fera tantum aetate proditorum, rudimenta.

Prudenter hinc statuit *Moschion* (e), septimo mense dentitionem incipere, sed non in omnibus aequaliter.

Naturaliter quidem ex maxilla utraque dentes erumpunt; quandoque, tamen deviant. Vidi ex medio palato dentem molarem erupisse. In thesauro suo servabat *Ruyfchius* (f) os palati humanum, ex cujus medio dens molaris erupit. Plures dentium aberrationes recensentur (g).

Solent primo omnium prodire dentes incisores; sed plerumque antequam octo incisores omnes prodierint, unus, alterve dentium molarium erumpit. Postea sequuntur, quandoque satis magno interposito temporis intervallo, quatuor canini. Legitur (h), in America septentrionali, in insula, quae a canibus nomen habet, incolae habere dentes incisores planos, dentibus molaribus similes. Curiosum foret scire, an illis etiam primo prodeant tales incisores, cum aeque difficulter ex maxilla erumpant, ac molares.

Cum ergo dentes lateant in alveolis suis, non tantum illi, qui primo prodituri sunt, verum etiam alii, qui circa septimum aetatis annum prodire solent,

(a) B. S. Albin. Acad. Annot. Lib. II. pag. 3. & seq. (b) Ibid. pag. 9. (c) In Capitulo. *Arcana Paracelsi* pag. 626. col. 2. (d) Académ. des scienc. l'an 1730. Hist. pag. 56. (e) Spach. gynaec. pag. 10. N. 118. (f) Mus. Anatom. sive Catalog. rar. pag. 177. (g) Albin. Academic. Annot. Lib. I. Cap. XIII. pag. 52. (h) Académ. des scienc. l'an 1722. Mém. pag. 446.

lent, incipiunt augeri mole; dum exitum moliantur, crusta adamantina muniantur, ut suo munere postea fungi possint. Quomodo hoc fiat, credo, quod hactenus ignoremus: quis enim solidam, & evidentem rationem dedit, cur primus dens incipiat augeri, exurgere, viam sibi parare? dum secundus dens, ipsi suppositus, quiescit, post septem annos demum similia praestiturus: hoc fieri videmus evidenter, licet rationem facti non intelligamus. Haerent illa dentium germina in alveolis maxillarum; sed horum alveolorum exitus tegitur membrana satis densa, coriacea, quae ab erupturo dente pertundi debet, quin imo lacerari; ita ut post eruptionem dentis lacerae hujus membranae laciniae observatae fuerint ab accurato in similibus indagandis *Herissant* (i). Exsiccatae dein hae laciniae sponte cadunt. Magna ergo satis vis a dente erupturo fieri debet, ut hanc membranam rumpat. Egregius *De Lafône* (K), qui pulcra dedit observata de organisatione ossium, & dentium, credit, quod, postquam dentis superior pars jam induruerit, tunc interior pars mucosa, vegetare pergens, nec potens superare obstaculum durum in parte dentis superiori, urgeat interiora, ubi minor est resistentia; & hoc mechanismo putavit formari dentium radices, quae productae deorsum, occurrentes diaphragmati osseo, quod inter primum, & secundum dentem interjacet, non amplius descendere possunt; sed, pergente eadem vi dentem elongante, necessario superior dentis pars elevari debet; unde sensim lacerabitur membrana, alveolos tegens, & dens prodibit. Ingeniosa certe haec explicatio est; nec tamen videtur difficultatem modo propositam solvere; cum nulla pateat ratio, quare in primo dente illa vegetatio adeo efficaciter agat, dum per tot annos iners quiescit in dente secundo, qui primo adeo vicinus est.

Praeterea plures dentes primos, dum vacillare incipiunt, eductos examinaui, & in plurimis ne vestigium quidem radices inveni. Mirabantur hoc chirurgi peritissimi, qui in dentium morbis curandis versatissimi merito habebantur. Statuebant, dentes, qui circa septimum annum cadere solent, radices habuisse: dum illos, jam vacillantes, levissima vi educebant, nullas radices inveniebant. Ut hoc explicarent, dixerunt, secundum dentem, dum assurgit, atterere radices prioris, & sic comminueri in minutissimum pollinem, qui prae tenuitate sua evanesceret totus; nam nemo illum unquam invenit. An lente ascendentis dentis secundi, dum primum loco movet, actio tanta esse potuit, ut prioris radices in pollinem comminueret? Egregius in hac chirurgiae parte *Bourdet* (l) statuit, primos dentes, antequam vacillent, habere radices aequae fortes fere, & duras, quam observantur in secundis. Dum autem refutat sententiam *Bunon*, qui statuebat, radices illas a frictione ascendentis dentis secundi destrui, provocat ad illa, quae in recentis cadaveris maxillas inveniuntur, dum secundi dentes jam ossei fieri incipiunt, & primi dentes, lactei dicti, adhuc adsunt; *sive firmi adhuc haereant*, sive jam plus minusve vacillare inceperint. Apparet enim, dentem secundum, dum assurgit, sua membrana

(i) Académ. des Scienc. in 4. l'an 1754. Mém. pag. 431. (K) Ibid. l'an 1752. Mém. pag. 168. (l) Recherch. & observat. sur l'art du Dentiste §. 5. pag. 511.

brana involutum manere, donec exitui proximus sit. Radicibus ergo dentis lactei, & assurgenti denti secundo interponitur membrana. Radices tamen dentium lacteorum destructae jam sunt, antequam secundidentes illas tangere possint. Praeterea parva distantia observatur inter dentem primum, & secundum; unde concludit, radicem dentis lactei consumi ab alia causa, non vero per attritum dentis suppositi. Hinc maluit credere, ab adjacentibus partibus secerni acriorem quemdam humorem, qui illas radices consumeret.

Fateor, quod mihi longe probabilior videatur opinio, quae statuit, dentes lacteos carere radicibus. *Celeberrimus Albinus (m)*, de his agens, dicit: *Quum dentis naturam dentes induunt, testa quaedam primum oritur, forma folliculi parvuli. Eaque ad corpus dentis pertinet, radice nondum inchoata.* Talia dentium corpora absque ullo radicum vestigio in abortuum, & recens natorum maxillis dissectis vidi saepe. Eadem in tabulis nitidissime expressa habentur (n). Ubi simul videri potest, quomodo successive radices ex dentis corpore protrudantur. Dens ergo fuit absque radicibus, &, dum cadit lacteus, radicibus caret. An credibile videtur, denti lacteo crevisse radices, & denuo destructas fuisse, antequam caderet, dum nulla probabilis destructionis radicum causa fuerit unquam inventa? Ab attritu secundi dentis assurgentis hoc fieri non posse, ex dictis patuit evidenter. Rodentem liquorem hic in auxilium vocare, quam precarium est!

Videntur tamen observationes docere, quod dentes lactei, si non cadant suo tempore, aut jam vacillantes non eximantur, apti sunt, ut radices protrudant ex suo corpore, quibus postea fixi in maxillis haerent saepe tota vita.

Vidi attentus toties, vel sponte cadentes, vel Chirurghi manu eductos, dentes lacteos, & inveni limbum inferiorem non aequalem, sed hinc inde prominentiis, quandoque processibus acutis asperum, quos in illis, quibus diutius relictis fuerant dentes lactei, inveni jam longiores multo, & concavitate sua respondentes suppositi dentis convexae superficiei; ita ut manifeste se accommodarent vicino obstaculo, ut profundius descendere possent. Ante laudatus *Bourdet (o)* eadem omnino vidit, licet in alia opinione fuerit. Sedecim annorum virgini jam a sex septimanis dens caninus perforaverat superiorem partem gingivae in maxilla superiori: locum suum servaverat dens caninus lacteus ipsi respondens; qui tamen multum vacillabat; quem dum eduxerat, vidit, aliquam radiceis partem habere, illam esse punctis quibusdam, five asperitatibus inaequalem; hinc adstantium una firmiter credidit, fracto dente, radicem in alveolo mansisse: fatetur, quod vix contrarium persuadere potuerit. Praeterea vidi saepius, dentem lacteum, a binis vicinis dentibus nimis pressum, non vacillasse illo tempore, dum naturaliter cadere debebat, hinc in loco suo relictum fuisse, dum interim secundus dens emergens, ante, vel retro priorem, maxillam perforaret; unde quandoque deformitas nata fuit, ad quam tollendam dens lacteus, jam firmiter haerens, dum educeretur, radici-

(m) Annot. Academ. Lib. II. Cap. II. pag. 16.
& observ. sur l'art du Dentiste pag. 52, 53.

(n) Ibid. tab. 2.

(o) Recherch.

dicibus praeditus erat. Unde merito concluditur, dentem lacteum posse radices producere deorsum. Si enim secundum multorum opinionem dentis lactei radices consumtae fuissent, dum cadere deberet, novae renatae essent; & tunc statuum foret, bis in eodem dente radices natas fuisse. Unde videtur, dentes lacteos naturaliter carere radicibus, dum sponte cadunt; aptos tamen esse, ut radices producant, si diutius in loco suo relinquantur, & quod saepe in dentibus lacteis, dum sponte cadunt, vel jam vacillantes educuntur, detegantur erumpentium radicum prima vestigia; quae ab aliis habentur pro reliquiis radicum detritarum, quae prius adfuerant.

Quamvis autem dentium eruptio naturalis sit, & in multis infantibus absque magna molestia contingat, in quibusdam tamen gravibus dentitio stipatur symptomatibus, quae aliquando aliis morbis attribuuntur, licet a sola dentitione pendeant. Unde sollicite monet *Sydenhamus* (p), dum febres Epidemicae grassantur, & infantes aegrotant, omni cum cura inquirendum esse, an febris illa ad constitutionem epidemicam referenda sit, an vero a dentitione pendeat. *Uulgo enim notissimum est, infantes a doloribus, ex dentitione ortis, saepius in febres agi, quae haud ita facile ab alterius generis febribus internoscuntur.* Operae pretium est ergo, considerare illa signa, quae docent, dentitionem imminere, vel jam inceptam esse.

Patuit ex antedictis, tempus dentitionis satis incertum esse, adeoque non adeo magnum momentum inter signa dentitionis habere, nisi quod incitet attentionem Medici, ut circa septimum mensem magis invigilet.

Dum de morbis aetatum agit *Hippocrates* (q) dicit: *Ad dentitionem vero productis, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, diarrhoeae; ac maxime, cum caninos dentes edunt, crassissimisque pueris, ac duras alvos habentibus.*

Primum, quod observare potui, dentitionis incipientis signum erat, si arcus maxillae superior, qui ex convergentibus alveolorum lamellis constituitur, incipiat latior fieri, sensim a se invicem secedentibus his lamellis, ut denti erupturo locus fiat. Videtur hoc fieri a dente sensim ascendente: hoc tempore internum, quasi in ipsa maxilla, pruritus sentire videntur, dum perpetuo faciem, nares imprimis, & mentum fricant: gingivae enim, nec membrana alveolos regens, tensae, aut rubrae adhucdum apparent. Simul de nocte infantes minus quieti sunt, & solito morosiores: neque hoc mali ominis est. Monuit enim *Hippocrates* (r): *Quicumque dentientes bene habitus manent, & altiori somno premuntur, periculum est, ne convulsione corripiantur.*

Harris (s) duplex dentitionis tempus statuit; unum nempe, quo dens ex osse maxillari primum emergere nititur; & tunc haec symptomata adfunt. Optime monet, hoc dentitionis stadio *gingivam in parte externa, & superiori, absque aliquo ejusdem tumore, albido quodam circulo circumscribi.*

Quan-

(p) Schedul. Monit. de nov. febr. ingress. pag. 674.

(q) Aphor. 25. Sect. 3. Charter. n. IX. pag. 120.

(r) Lib. de Dentit. text. 9. Charte. Tom. VII. pag. 871.

(s) De morb. acut. infant. pag. 35.

Quandoque apparent duo, vel plura talia loca, ac si dens emerfurus pelluceret per gingivam. Saepe per aliquot septimanas durat hoc dentitionis stadium, antequam incipiat alterum, quo dens mole jam auctior, & major factus, gingivam tumidam semper reddit, inflammationem insignem in eadem parit, atque eam perrumpere omni vi conatur. In difficili dentitione haec vera sunt: saepe tamen facilius haec peragitur; & tunc omnia haec symptomata adeo levia sunt, ut dens, non advertentibus infantum custodibus, prodeat. Simul solet adesse major salivae copia, quandoque & tussis: nares pluunt, genae rubent a dentis emerfuri irritatione, humoribus majori copia versus caput derivatis, ut docent symptomata plura, quae apud auctores collecta leguntur.

Sic Moschion (1) habet: *Gingivarum pruritus; fervor genarum; dolor nervorum in cervice; frequentius sanguinolentus humor per os, vel aures exit.* Ita & apud Aëtium (u) leguntur sequentia de dentitione: *Circa septimum mensem infantes dentes producere incipiunt, punguntur, stimulantur, tanquam a paxillo quodam, separante gingivas dente. Inflammationes succedunt gingivarum, & maxillarum, & tendinum; quas febres plerumque sequuntur. Succedit & pruritus in meatibus auditoriis, & aures humescunt: nonnullos ophthalmia corripit, & sanguis ex canthis (oculorum) fluit. Pluribus perturbatur venter, ob stomachi inflammationem, ventrisque exsolutionem.*

Cum autem omnia haec mala a tensione, punctura, laceratione gingivarum nervosarum, sanguinolentarumque oriantur, patet facile, omnia haec mala magis metuenda esse, dum erumpunt dentes canini, qui obtusum apicem habent, & satis crassi sunt. Incisores acutum referunt cuneum; hinc facilius membranam incumbentem findunt. Molares autem, licet latiore superficiem habeant, quam canini, & quatuor apices, facilius feruntur; quoniam non simul, & semel, sed successive illi apices emergunt. A solo dolore intensiori convulsiones metuendas esse in infantibus, quibus nervosum genus adeo facile irritatur, facile intelligitur. Unde etiam (§. 1075. 4.) inter epilepsiae causas dentitio numeratur; ubi simul notatur ex Hippocrate, non omnes ex dentitione convulsos interire, sed multos fospites evadere, uti quotidiana in Praxi observata docent. Si autem multum tumeat gingiva, simulque admodum rubeat, validae inflammationis signum est, quae quandoque in gangraenam satis cito terminatur; praecipue, si acrior humorum indoles simul adfit. De qua re videantur illa, quae in Capitulo de Gangraena dicta fuerunt. Cito autem gingivae sic affectae putrescunt, & malum ad vicina loca propagatur, nisi spiritu salis marini misto cum melle rosarum saepius tangatur locus gangraenosus, sicque sistatur proserpens putredo. Vidi aliquoties in pauperum infantibus, qui omnino neglecti fuerant, partem ossis maxillae cecidisse, una cum alveolis, & dentibus contentis: unde in hoc loco destructae maxillae tota vita fuerunt edentuli.

Alvi fluor viridis suspectus est, dum dentitionis tempore adest. Antea dictum fuit, dum acido in primis viis laborant, faeces alvinas viridescere; unde

(1) Mosch. apud Spach. gynaec. pag. 10, n. 118.

(u) Lib. 4. cap. 9. pag. 68.

unde & ab hac causa possent viridia per alvum excerni, licet a dentitione hoc non fieret. Verum si faeces, quae naturaliter flavescent in infantibus, dentitionis tempore subito fiant aeruginosae, tunc periti Medici convulsiones metuere solent; quia ex illa coloris mutatione concludunt, sensorium commune, & totum nervorum systema turbari. Si sanus homo subito in gyrum rotetur, vertigine corripitur; & nisi haec rotatio cesset, cadit, bilemque aeruginosam vomit. Unde etiam §. 275. pro malo signo habetur, si post concussum validum capitis biliosus vomitus sequatur.

Caeterum alvus laxior dentientibus infantibus prodest potius. *Quibus in dentitione alvus multoties subducitur, illi minus convelluntur, quam quibus ita paucies.*

De salivatione, dentitionem consequente, jam dictum fuit.

Febris, mors. Dolor molestus, inflammatio gingivarum, insomnia sufficiunt, ut febris excitetur, quae certe, si valida fuerit, tenerum corpusculum brevi destruere poterit. Interim non semper funestum eventum a febre, dentitionem comitante videtur metuisse *Hippocrates* (x): dicit enim: *Quibus in dentitione febris acuta oboritur, raro convelluntur.* Caeterum hyemale tempus dentitioni magis convenire statuit (y), ita ut facilius emergant, caeteris paribus, hoc anni tempore. Simul observavit, illis, qui cum tussi dentiunt, dentes tardius erumpere, verum in punctione magis extenuari. Solet enim in omnibus dentientibus torositas corporis minui, & carnes fieri flaccidiores, praecipue dum dentes canini prodire incipiunt.

§. 1375. **Q**uae cuncta facile ex eadem causa oriri demonstrantur.

Sensim enim distrahitur membrana, quae alveolos claudit, & tegit; si jam inflammatio adsit, & a duro dente inflammatus ille locus rumpi debeat, facile patet ratio, quare omnia illa mala, modo recensita, sequi debeant.

§. 1376. **Q**uin sublata irritatione nervorum (§. 1374) sponte cessant.

Dolor, uti alia occasione ad §. 220. & sequentes dictum fuit, ponit fibrā nervosā sic affectā, ut dissolutionem minitetur: hinc dolor acrior est, dum fibra nervosa est rupturae propior. Unde patet, quare molestiae omnes augeantur, dum dens eruptioni proximus est, & denuo cessent, simul ac dens membranam prius tensam ruperit. Cessat enim tunc nervorum irritatio. Hinc simul patet, quid sentiendum sit de omnibus illis *Periaptis*, & *Amuletis*, quae infantibus, dentitionis tempore, appendi solent, hac spe, ut dentes facilius, & citius erumpant. Dentitio naturae solius opus est; hanc accelerari posse per artem, nemo peritus facile credet. Verum molestias,

(v) Hippoc. lib. de Dentit. Charter. Tom. VII. pag. 871.

(x) Ibidem.

(y) Ibidem.

stias, dentium eruptionem comitantes, lenire ars valet, uti sequenti paragrapho dicetur. Facile tamen permittitur mulierculis, ut *Corallia rubra*, *paeoniae radicem*, *dentes lupi*, *apri*, *vulpis*, & his similia collo dentientis infantis appendant; a quibus nulla metuenda est noxa. Solent enim tunc magis morigerae esse Medicorum consiliis.

§. 1377. **Q**Uod fit 1. gingivas emolliendo, refrigerando, leniendo mollibus, glutinosis, antiphlogisticis. 2. saepe atterendo ad corpora dura, glabra. 3. diffecando ope lanceolae.

1. Quantam efficaciam habeant in dolore leniendo omnia illa, quae distentam fibram dolentem laxant, antea ad §. 228. 1. dictum fuit. Cum autem tensa, & dolens sit haec membrana, quae dentem erupturum coërcet, facile patet, quare emollientissima hic locum habeant. Cum autem plerumque gingivae, leviter saltem, inflammatae sint hoc tempore, hinc foveantur refrigerantibus, & antiphlogisticis, quae optime prosunt, si simul leviter glutinosa sint, ne a copiosa saliva, quae dentitionis tempore profluit, abluantur illico. *Semper vivi majoris* succus recens pressus, cum *syrupo florum violarum*, addita mucilagine *gummi Arabici*, *Tragacanthi*, *Sem. Cydoniorum*, &c. aptissimum tale remedium dat, si saepius gingivis illinatur. *Cremor recens lactis*, cum *vitello ovi*, & *syrupo florum violarum* mistus, si aliqua copia *aquae stillatitiae rosarum* diluatur, optime prodest. *Flores Sambuci*, si una cum *plumbi* frusto in nodulo ligentur, & in fundo vasis vitrei cylindrici ponantur, dein lac recens superaffundatur, & haec omnia ponantur in leni digestionem, brevi in summitate vasis colligitur cremor, qui fragrantiam florum sambuci redolet, & gingivis illinitur saepius, optimo cum effectu. Plumbum autem additur, ut deprimatur nodulus ad fundum vasis, sicque facilius colligi possit cremor in superficie suprema; simul plumbum externo usu magnam efficaciam habet in sedandis inflammationibus incipientibus. Novi quidem, plumbum non sine ratione suspectum esse Medicis, imprimis usu interno; sed parum admodum de plumbo in lacte solvitur; & illud pauculum solutum potius in fero lactis haeret, quam in parte cremoracea: unde videtur tale remedium tuto usurpari posse; imprimis cum gingivis dolentibus pauculum cremoris tantum illiniatur, vixque deglutiat aliquid de hoc cremore infans; sed fere totum cum saliva copiosius affluente exeat ex ore. Si vero gingivae, profunde rubro colore tinctae, gangraenam minitentur, tunc aliquot guttulae *Spiritus salis marini* adduntur *Syr. fl. violarum*, addito nitro; & haec diluuntur in *aqua stillatitia florum rosarum*, aut *florum sambuci*, ut gingivae saepius tali mixtura foveantur. Antea, ubi de *Angina gangraenosa* agebatur, uti & in capitulo de *Scorbuto*, laudata fuit efficacia *Spiritus salis marini* in similibus malis. Caeterum in *Materia Medica* ad hunc numerum tales formulae habentur.

Quandoque contingit, gingivas sic inflammari, & dolere, ut valida accendatur febris, & sequantur convulsiones: tunc Sydenhamus (z) commendat venae sectionem, tanquam optimum, & efficacissimum remedium: simulque statuit, aequè tuto ex infantum venis, quam aulorum, sanguinem extrahi posse. Necessitatem quidem evacuationis sanguinis in tali casu agnoscit Harris (a); sed maluit unam, alteramve hirudinem infra utramque aurem applicare. Certum enim est, venae sectionem difficilius saltem institui in infantibus, ob venarum exilitatem, & inquietum membrorum motum. Imo ipse Sydenhamus (b), dum in febre dysenterica sanguinis missionem judicabat necessariam, dixit: *Si infans hac febre laboret, tum hirudines duae utrimque applicentur pone aures*. Notum autem est, Sydenhamum hanc schedulam scripsisse circa finem vitae, & quaedam, quae antea scripserat, mutasse, vel emendasse.

Optime monet Harris (c); *Inter dentiendum os tanta teneritudine saepe affligitur, ut omne alimenti genus pertinaciter respuant*. In hoc casu summo opere cavendum, ne alimentum calidum, imo vix tepesactum, infantibus praebetur. Nam calor oris, & gingivarum, fere exurens, vix minimum caloris adventitii gradum fert, sine molestia, & dolore accedenti. Unde fit, ut vix cochlear ferre possint infantes; & hinc patet utilitas differendi ablactationem, donec dentitio absoluta fuerit. Mollem enim nutricis papillam longe facilius ferunt. Accedit, quod nutrici ingerere possimus copiam remedium emollientium, & antiphlogisticorum, quae infanti prodesse possunt. Simul etiam, mutando nutricis dietam, possumus lac ejus reddere congruum praesenti infantis morbo. Hanc utilitatem agnoscit Moschion (d), dum suadet, ut dentitionis tempore nutrix vinum non bibat, & tenuiori nutrimento utatur.

Simul patet, huic beneficio renunciare illos, qui lac humanum damnant, & aliorum animalium lacte infantes nutriendos volunt.

2. Circa hanc rem in diversam opinionem abiverunt illi, qui de dentitione, & de dentium conservatione scripserunt. Quidam laudaverunt, alii improbaverunt omnino. Si gingivae inflammatae doleant, noceret certe attritio ad corpora dura; sed tunc ne quidem attactum ferunt infantes, quin statim misero ejulatu dolorem testentur. Verum, ubi haec abest, videtur levis pressio gingivarum a natura indicari. Dentitionis tempore videmus, infantes propriis digitis perpetuo dentes fricare, obvia quaeque, quae arripere possunt, ori immittere, & inter maxillas comprimere quam fortissime. Videntur enim molestum in gingivis pruritum sentire, quem hoc modo lenire tentant. Nullum enim doloris percepti indicium dant; e contra hilares, & quieti sunt, dum non impediuntur ab hoc opere; & vidi saepius, inquietos admodum infantes pacatissime obdormivisse, dum nutrix digito prurientes gingivas molliter perfricabat.

Aëtius

(z) Prax. Medic. cap. V. pag. 248. 249.

(a) De morb. infant. pag. 35.

(b) Schedul. Monitor. De novae febris ingressu pag. 673.

(c) In loco modo citato,

(d) Spach. gynaec. pag. 10. n. 119.

Aëtius (e) quidem monuit, cavendum esse omnino, ne quid durum mandendum praebeatur, ne gingiva callosior reddita nascituros dentes impediat: eandem sententiam & alii tuentur (f). Verum vix videtur ab hac frictione adeo metuenda callositas, cum perpetuo os madescat simul. Imo alii (g) optabant potius hanc callositatem, dum credebant, facilius rumpi membranas tensas, & duriores, quam molles, quae denti exsurgenti cedunt nimis. Unde *Andry* damnavit emollientium usum, nisi gingivarum inflammatio illa posceret. Et quia hyeme omnia ossa fragiliora fiunt, ideo credidit, *Hippocratem* statuisse, dentitionem felicius procedere hyeme, quam aliis anni temporibus. Addit ex observatione *Spigellii*, citius erumpere dentes in maxilla superiori, quia haec magis rotatur supra papillam nutricis, quam inferior, adeoque & plus atteritur.

Cum ergo ipsa natura videatur indicare in dentientibus frictionem gingivarum, utile erit, si talia corpora dura, glabra ex crystallo, corallo rubro, ebore &c. parata porrigantur infantibus dentientibus, modo nullas omnino eminentias habeant, & parata fuerint ex tali materia, quae in saliva solvi nequeat: unde ex crystallo parata praeferuntur reliquis; metallica vero repudiantur, auro purissimo excepto; argentum enim, quo ad similia conficienda utuntur, semper aliquam partem cupri continet.

3. Sectio illa tunc tantum opportuna est, cum membrana alveolum tegens a dente emergente elevatur, tenditur, rubet, dolet intense; tunc plerumque valida satis febris adest, & convulsiones metuuntur, nisi denti subito via concilietur: at post sectionem factam dens illico prominet. Si vero profundius adhuc haereat dens, dum haec sectio instituitur, vulnusculum hoc inflictum brevi consolidabitur, & cicatricula resistet magis denti postea erupturo. Fama etiam Medici insigniter periclitatur, si incisionem suaserit, nec, hac facta, dens appareat. Novi contigisse, ut dens octo mensibus post factam incisionem eruperit tantum.

Antea ad §. 1374. dictum fuit, duplex esse dentitionis stadium: primum adest, dum dens ex osse maxillari primo emergere nititur; signa hujus tunc dicta sunt. Secundum stadium est, dum dens jam gingivam perrumpere conatur. Monuit autem *Harris*, (h), quod, *In primo illo dentitionis molimine, aeque ac in secundo, Chirurgi gingivas infantum quacumque ex occasione imperite incidunt, quo scilicet dentes facilius erumpant; unde vulnus citra necessitatem, & nullam plerumque opem ferens, teneris promiscue infligitur; quum secundum solum dentitionis tempus (quod diligenter notandum) eam plagam inferri proprie requirat.*

Simul, noluit in hoc casu phlebotomo, five lanceola incisionem fieri, cum nimis cito coalescat tale vulnusculum. Unde monuit; *Curandum est igitur Medico, ut instrumento magis commodo (sive sit scalpellum, quo calami scripto-*

(e) Lib. IV. Cap. IX. pag. 68.

(f) Bourdet. recherch. & observat. &c. Tom. I. §. IV. pag. 40.

(g) *Andry* l'orthopedie tom. 2. pag. 210. & seq.

(h) De morbis Infant. pag. 35.

scriptorii vulgo conficiuntur, sive sit aliud, cujus dorsum in densitatem novaculae aemulam assurgat) incisio semper fiat. Sic enim labia vulnuseculi magis distant a se invicem, & tardius concresecunt. Forte ob hanc rationem quidam voluerunt (i), unguibus lacerandam esse hanc membranam, quae alveolum tegit; tunc enim certe minus cito consolidabitur vulnus. Verum facile patet, hoc majorem dolorem facere, & imperita manu fieri; unde videtur sectio praeferenda esse in tali casu semper.

Monet celebris in hac chirurgiae parte *Fauchard* (k), incisionem secundum longitudinem arcus maxillae debere fieri pro dente incisorio erupturo: crederem etiam pro canino: crucialem incisionem suadet pro dente molari; sed simul prudenter monet, tunc tuto talem incisionem fieri, si gingiva rubescat, tumeat, tensa sit, si dens visu, aut tactu percipiatur, dum sub membrana coërcente haeret. Caeterum diuturno artis usu edoctus, affirmo, sectione hac raro opus esse, etiam in difficiliore dentitione.

§. 1378. **C**onvulsiones hinc oriundas minuta Sp. C. C. dosis feliciter tollit.

Dictum fuit §. 229. doloris sensum, & multos doloris effectus, qui independent, tolli posse, licet causa doloris maneat. Hinc lenia paregorica, ex *syr. flor. rhoead.*, & ex ipso *papavere* parata, in hunc finem cum prudentia tuto adhiberi posse, certus sum; modo alia, quae in causam doloris agunt, non neglegantur. Observatis *Sydenhami* (l) constat, paucas guttulas, tres, quatuorve, spiritus cornu cervi, ex vehiculo idoneo exhibitas, profuisse insigniter ad curandam febrim, quae dentitionem difficilem comitatur, si quarta quaque hora ad quatuor, vel sex vices propinarentur. Formula talis in *Materia Medica* ad hunc numerum habetur.

(i) Brouzet. educat. médic. des enfants Tom. I. pag. 234.

(k) Le Chirurg. Dentiste Tom. I. Chap. XV. pag. 175.

(l) In Sched. Monit. de novae febris ingressu pag. 675.

FINIS TOMI QUARTI.

(1) *Ischnura elegans* (Linn.)
(2) *Ischnura elegans* (Linn.)
(3) *Ischnura elegans* (Linn.)

FINIS TOMI QUARTI

